《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂
國家古籍整理出版重點項目

四庫提要著録叢書

北京出版社

四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

子部第一八冊目次

赤水玄珠三十卷（二）（明）孫一奎撰 明萬曆刻清修本 ……〇〇一
醫旨緒餘二卷（明）孫一奎撰 明孫泰來孫朋來刻本 ……三二六
廣筆記十三卷（明）繆希雍撰 丁元薦輯 莊綬光增輯
炮炙大法一卷用藥凡例一卷（明）繆希雍撰 明天啟二年莊綬光刻本 ……四二一
傷寒舌鑑一卷（清）張登撰 清康熙七年刻本 ……五三二
周髀算經二卷 題（漢）趙君卿註（北周）甄鸞重述（唐）李淳風等註釋
周髀算經音義一卷（宋）李籍撰 宋刻本 ……五七二
紹聖新儀象法要三卷（宋）蘇頌撰 清鈔本 ……六一四

赤水玄珠三十卷（二）

（明）孫一奎撰

明萬曆刻清修本

赤水玄珠婦人門第二十卷

薛氏校註合宜禁忌凡例　調經門
經水或紫或黑論　居經
月經不通　崩
治赤白帶下　熱入血室
寡婦師尼寒熱如瘧　夢與鬼交
心胸嘈雜　痃癖癥瘕
脬轉小便不利　小便數
遺尿失禁

赤水玄珠婦人門第二十卷

新安生生子孫一奎著輯

薛氏校註合宜禁忌凡例

一云丹溪謂白芍藥性寒味酸產後宜忌恐伐生生之氣若用之於大補湯八珍等湯內以酒拌炒用無妨凡屬脾胃虛寒虛弱面色痿黃者俱宜酒拌炒用

一通經丸若脾胃無虧暴怒氣逆或生冷所傷陰血凝滯月經不通者宜暫用之若脾胃虛弱不能生血者宜用六君當歸若因脾胃鬱火內耗其血者宜用歸脾湯若因脾肝鬱怒氣血傷而月經不通者宜加味逍遙散

一艾附丸若脾胃虛寒陰血不足氣逆發熱月經不調或胎氣不成者宜暫用之若肝腎虧損陰虛發熱月經不調或崩漏帶下或便血吐衄小便淋澁或晡熱內熱寒熱往來或盜汗自汗不時倏熱宜用六味地黃丸若兼脾氣不足飲食少思者佐以六君子湯

一四物湯若脾経血燥發熱或月経不調宜暫用之若因脾経虚熱肝経怒火所致宜四君子佐加味逍遥散若因脾経氣虚血弱晡熱内熱宜用八珎湯加柴胡丹皮若因元氣下陥而致諸症宜補中益氣湯

一人參橘皮湯若胎前氣痞痰滞作嘔不食者宜暫用之若脾胃氣虚胸膈痞脹痰停作嘔飲食少思者宜半夏茯苓湯若因怒動肝火尅制脾土而致前症者宜六君子加柴胡山梔枳殻脾

胃虚寒者六君子加木香砂仁内半夏治脾胃虚諸症尤當用

一紫蘇順氣飲若胎動不安元氣無虧者宜暫用之若因脾氣虚弱者宜六君子加紫蘇枳殻鬱結傷脾者宜四君子加柴胡山梔藴梗鬱怒傷肝脾者六君子加柴胡黄芩枳殻

一四物膠艾湯若内熱胎痛下血不止者宜暫用之若因肝経風熱而下血者用防風子芩丸若因肝火血熱宜加味逍遥散若脾経鬱火宜加

観注廿葉廿頁内肚上逢條牌虚青面青舌赤吐沫母死子活當遵修改正

味歸脾湯若因肝氣虚陥宜補中益氣湯倍加升麻柴胡若因事下血者宜八珎湯加膠艾

一黄芩白术二味為安胎之藥若脾胃蘊熱中氣無虧者宜暫用之凡属脾胃虚痞飲食少思或泄瀉嘔吐面色痿黄肢躰倦怠者宜六君子湯

一達生散若厚味安逸者宜用若藜藿勞役者不宜用

一妊娠腹痛須驗其面赤舌青者此胎已死用平胃散加朴硝三錢下之下後随用八珎大補等

湯調補之若唇口俱青吐出痰沫者子母俱死也若面青舌赤俱青者母死子活産下亦死（同註有舛文容查對明）

一小續命湯若外中風邪腰背反傷筋脉瘈瘲者宜暫用之若産後失血過多陽火熾盛虚熱生風者宜八珎湯加鈎藤丹皮如不應當用四君子湯加當歸丹皮鈎藤若陽氣脱陥者宜補中益氣湯如不應急加附子氣虚血敗者宜用十全大補湯如不應急加附子亦有生者

一澤蘭湯若産後惡露腹痛胸満少氣宜用之若

體倦面黃食少少寐而惡露不止宜加味歸脾湯若氣血虛損而惡露上攻先用失笑散後用八珍湯禁用黑神散奪命丹之類

一產後口鼻起黑氣鼻衄者是胃氣虛敗而血滯也急用二味參蘇飲多有生者

宮人孀婦治驗

一婦人年三十有七早孀居兩腿骨作痛晡熱體倦月經不調或發寒熱數年矣一日頸項兩側結核兩脇脹痛此係肝經鬱火而成也先用小柴胡湯合四物數劑肝症頓愈又用加味逍遙散加澤蘭乳香沒藥三十劑血症漸痊再用加味歸脾湯年餘而安

一孀婦兩腿作痛或用除湿化痰等藥遍身作痛而無定處此血症也不信乃服流氣飲之類而歿

一放出宮人年四十餘臂腿內股作痛晡熱口乾月經不調此係肝經血少不能養經絡而然也宜加味逍遙散加澤蘭葉五十帖諸症稍緩又以歸脾湯二百餘劑而痊

一放出宮人臂腿腫痛內熱晡熱惡寒體倦咳嗽胸痞月經過期而少彼以為氣毒流注服清熱理氣之劑益甚此肝經瘀血停留所致蓋肝經上貫鬲布脇肋循喉嚨下循胭內臁繞陰器抵少腹主治之法但當補其所不勝而制其所勝補者脾也制者肝也經曰虛即補之實則瀉之此定法也彼不信仍服前藥遂致不起

婦人症與男子無以異也所異者月水胎產崩帶等症耳今惟蒐其異與赤緊者集為一門餘雜症治同男子當於雜症門中求之茲不重録

一調經門

岐伯曰女子七歲腎氣盛齒更髮長二七而天癸至任脉通太衝脉盛月事以時下天謂天真之氣癸謂壬癸之水故云天癸也然衝為血海任主胞胎二脉流通經血漸盈應時而下常以三旬一見以像月盈則虧也若遇經行最宜謹慎否則與產後症相類若經行惱怒勞役則氣血

錯亂經脉不行多致瘀瘵等疾若逆於頭面肢體之間則重痛不寧若怒氣傷肝則頭暈脇痛嘔血而瘰癧癰瘍若經血內滲則竅穴淋瀝無已然此六淫外侵而变症百出犯時微若秋毫成患重如山岳可不畏哉

褚澄遺書曰飲食五味養骨髓肌肉毛髮男子為陽〻中必有陰〻〻中之數八故一八而陽精升二八而陽精溢女子為陰〻中必有陽〻〻中之數七故一七而陰血升二七而陰血溢皆飲食

五味之實透也方其升也智慮開明齒牙更始髮黄者黑筋弱者強暨其溢也凡充身躰手足耳目之餘雖針芥之歷無有不下凡子形肖父母者以其精血嘗於父母之身無所不歷也是以父一肢廢則子一肢不肖其父母一目虧則子一目不肖其父母然雌烏牝獸無天癸而成胎何也烏獸精血往來尾間也精未通而御女以通其精則五體有不滿之處異日有難狀之疾陰已痿而思色以降其精則精不出而內敗

小便澁而為淋精已耗而復竭之則大小便牵痛愈痛即愈便愈便即愈痛女人天癸既至十年無男子合則不調未逾十年思男子合亦不調不調則舊血不出新血悮行或漬而入骨或变而為腫後雖合而難子合多則瀝枯虛人産衆則血枯殺人觀其精血思過半矣

夫血者水穀之精氣也和調五臟洒陳六府男子化而為精女人上為乳汁下為經水故雖心主血肝藏血亦皆統攝於脾補脾和胃血自生矣

凡經行之際禁用苦寒辛散之藥飲食亦然

王子亨方論曰經者常候也謂候其一身之陰陽愆伏知其安危故每月一至太過不及皆為不調陽太過則先期而至陰不及則後時而來其有乍多乍少斷絕不行崩漏不止皆由陰陽衰盛所致故曰血氣和平則樂有子和則陰陽不爭月水以時下也

薛氏曰經云脾統血肝藏血婦人多因恚怒傷肝鬱結傷脾所致當從二經為主而參以前論治

之
產寶方序論曰大率治病先論其所主男子調其氣女人調其血氣血者人之神也然婦人以血為基本苟能謹于調護則血氣宣行其神自清月水為期血凝成孕若脾胃虛弱不能飲食榮衛不足月經不行肌膚黃燥面無光澤寒熱腹痛難於子息或帶下崩漏血不流行則成瘕症

經水或紫或黑論

丹溪曰經水者陰血也陰必從陽故其色赤稟火色也血為氣之配氣熱即熱氣寒即寒氣升則升氣降即降氣凝則凝氣滞則滞氣清則清氣濁即濁往往見有成塊者氣之凝也將行而痛者氣之滞也來後作痛者氣血俱虛也色淡者亦虛也而有水混之也錯經妄行者氣之亂也紫者氣之熱也黑者熱之甚也今人但見其紫者黑者作痛者成塊者率指為風冷而行温熱之劑則禍不旋踵矣良由病原論月水諸病皆曰風冷乘之宜其相習而成俗也或曰黑北方

水色也紫淡於黑非冷而何予曰經云亢則害承乃制熱甚者必兼水化所以熱則紫甚則黑也況婦人性執而見鄙嗜慾加倍臟腑厥陽之火無日不起非熱而何若曰風冷必須外得設或有之蓋千百一二者也

治經水紫黑為熱例

海藏四物芩連湯 治經水如黑豆汁

四物湯四兩 黃芩 黃連各一兩 為末醋糊為丸服

丹溪治月水黑口渴倦怠脉不匀似數

黃栢炒 黃芩各三錢 甘草二錢 赤芍藥 香附各半兩

右醋糊丸白湯下五六十丸

一婦二十歲月水二月不行忽行小腹痛有塊血紫色 白芍 白术 陳皮各半兩 黃芩 川芎 木通各二錢 甘草五分 右水煎服

一婦氣滞血澁脉不濇經不調或前或後紫色兩大腿外膁麻木或時痒而生瘡大便秘滞

火麻仁 桃仁 芍藥各二兩 枳殼 威靈仙

白术　歸頭　訶子肉　生地　陳皮各五錢
大黃煨七錢為末粥丸梧子大白湯下五六十丸

調經之劑

局方四物湯　治衝任虛損月水不調臍腹疞痛
當歸　川芎　白芍藥　熟地黃各分半　水煎服

逍遙散　治血虛煩熱月水不調臍腹脹痛潮熱
咳嗽　炙甘草五分　當歸　茯苓　白芍　白术
柴胡各一錢　右加薄荷葉生薑水煎服

膠艾湯　治勞傷血氣衝任虛損月水過多淋瀝

不斷　阿膠炒　川芎　炙甘草各五分　當歸
艾葉炒各一錢　熟地　白芍各二錢　水煎服

温經湯　婦人血海虛寒月水不利遶臍疼痛
桂枝桃仁湯萬病丸皆可用　當歸　川芎　芍藥　桂心
丹皮　莪术各五分　人參　甘草　牛膝各一錢
水煎服

丹溪加味四物湯調經例
經候過而作痛血氣俱虛也宜本方對四君子
將來而痛者血實也本方加桃仁黃連香附
經水不及期者血熱也本方加黃連
過期者血少也本方加參术有痰加半夏陳皮
過期紫黑有塊者血熱也必作痛加香附黃連
過期而淡色者痰多也芎歸二味入二陳湯
紫色成塊者熱也本方加黃連柴胡
肥人不及日數而多痰者乃血虛有熱本方加
香附南星半夏黃連白术
瘦人血枯經閉者本方加桃仁紅花或越鞠丸

四物加減調經例

經水微少漸漸不通手足煩痛肌漸瘦生潮熱
脉微數本方去川芎地黃加澤蘭葉三倍甘草
半分
經水過多本方去熟地加生地
經行身熱脉數頭昏本方加黃芩柴胡各半兩
經行微少或脹或疼四肢疼痛加玄胡沒藥
經候不調心腹疞痛只用芎歸二味名君臣散

元戎加味四物湯
氣充經脉故月事頻併臍下多痛本方加芍藥

經欲行臍腹絞痛本方加玄胡檳榔苦練木香
經水過多本方加黃芩白术
經水澁少本方加葵花紅花
經水適來適斷或往來寒熱宜先服小柴胡去
寒熱後以四物湯和之
簡易當歸散　經候不勻或三四月不行或一月
再至或天癸已過期經脉不調　川歸　白芍
川芎　黃芩　白术各半两　山茱萸肉一两半
右爲末每服空心溫酒調二錢日三服

寶鑑生地黃丸　治婦人血實厥陰脉絃而長惡
風體倦乍寒乍熱面赤心忪或時自汗如傷寒
狀宜服抑陽藥
生地二两　柴胡　秦芁　黃芩各半两　芍藥一两　右
爲末蜜丸梧子大烏豆湯呑三四十丸日三服
薑黃散　治血臟久冷月水不調臍腹刺痛
當歸　丹皮　玄胡各二两　芍藥三两　川芎　紅花
桂心　莪术各一两　川姜黃四两
右爲末每服一錢酒水同煎服

理氣之劑
澹寮煮附丸　經候不調血氣刺痛腹脇膨脹頭
暈惡心崩漏帶下並宜服之
香附子擦去毛米醋浸一日磁器煮醋盡炒乾
右醋糊爲丸梧子大每服五十丸淡醋湯下
艾附丸　治同前
艾葉四两　川歸二两　香附子一斤　照上製爲丸服亦同
嚴氏抑氣散　婦人氣盛於血变生諸症頭暈膈
滿　香附四两　茯神　炙甘草各一两　陳皮二两

右爲末每食遠沸湯調下二錢
正氣天香散　治婦人一切氣氣上湊心心胸攻
築脇肋刺痛月水不調　台烏藥二錢　香附八錢
陳皮　蘇葉各一錢　乾薑半錢　右分二帖水煎服
丹溪治一婦年四十八因有白帶口渴月經多初
血黑色後来血淡倦怠食少臍上急
白术一錢半　紅花豆許　陳皮一錢　木通　黃芩各五分
縮砂　炙甘草各三分　枳殼五分　白芍一錢　水煎呑保
和丸三十九抑青丸二十九

經水過多　黃芩炒　芍藥各一兩炒　黃柏三錢炒
龜板一兩炙　香附二錢半　樁根白皮七錢半　酒糊為丸
白湯呑五六十丸
一婦脉絃而大不數形肥初夏倦怠月經來時多
此禀受弱氣不足以攝血故行多也　黃芪
陳皮各一錢　白朮錢半　人參五分　炙甘草三分　水煎服
四物加熟地當歸湯　治經水少而色和
四物湯四兩　熟地　當歸各一兩
丹溪抑氣丸　臨經之時腹痛以四物湯加玄胡

索陳皮丹皮甘草　痛甚以豆淋酒下　痛輕
以童便香附入條芩為丸
又一婦年四十月水不調行時腹痛行後又有三
四淋瀝皆穢水口渴面黃倦怠無力　白朮一兩
歸身尾六錢　陳皮七錢　黃連三錢　木通　黃芪　黃芩
各二錢　炙甘草二錢　分八帖水煎呑五靈丸四十粒
桂枝桃仁湯　經前腹痛不可忍　桂枝　芍藥
生地各二錢　桃仁四枚　甘草一錢　薑三片棗一枚水煎
服　又方當歸玄胡索每服三錢薑三片水煎稍熱服

本事方　治婦人月經壅滯每發心腹臍疞痛不
可忍及治產後惡露不快血上搶心迷悶不省
人事氣絕欲死者琥珀散　京三稜　蓬莪朮
赤芍藥　劉寄奴　牡丹皮　熟地黃　官桂
真蒲黃　菊花　當歸各一兩　右前五味用烏豆
一升生薑半斤切片米醋四升同煮豆爛為度
焙乾入後五味同為末每服二錢溫酒調下空
心食前服一方不用菊花蒲黃用烏藥玄胡索
亦佳○予家之秘方也若是尋常血氣痛只一

服產後血衝心二服便下常服尤佳予前後救
人急切不少此藥亦宜多合以救人
交加散　治營衛不和月經湛濁逐散惡血腹痛
經血諸疾並皆治之　生薑二斤　生地二斤二味製
白芍藥　當歸　桂心各一兩　紅花炒無惡血不用　沒藥
另研各半兩　蒲黃隔帋炒　玄胡索醋帋包用布擦去皮各一兩
右將地黃汁炒生薑滓薑汁炒地黃滓各焙乾
用諸藥為細末每服三錢溫酒調下　若月經
不依常蘓木煎酒調下　若腰痛砂糖酒調下

交加地黄丸　治婦人經不調血塊氣痞肚腹疼痛　生地　老薑各一斤　玄胡　當歸　川芎　芍藥各二兩　明沒藥　木香各一兩　桃仁去皮尖　人參各半兩　香附半斤　右為末先以薑汁浸地黄渣地黄汁浸生薑渣晒乾皆以汁盡為度共十一味作一處晒乾研為末醋糊為丸空心以薑湯下

一婦患經血紫黑一月二次行不思食口苦時發熱　麥冬　歸身　白芍　陳皮　白朮各一人參　地黄　茯苓各半兩　木通三錢　生甘草一錢　右分十帖食前熱飲下柳青與點各十五丸

益母草膏　益母草未結子時採來搗汁熬膏每用半杯和酒或薑汁調服大治汙血及月經不調

肥人不及期而多痰者血虛有熱南星白朮蒼朮黄連香附川芎作丸服

婦人血脉不調往來寒熱狀如勞倦　川歸　川芎　甘草　黄芪　官桂各一兩　熟地　白朮　白芍各二錢　柴胡　阿膠各半兩　右每服五錢棗一枚水煎空心溫服為末白湯調下亦得常服則無帶下極調血脉養子宮終身無病

薛氏曰有脾經血燥而經先期者加味逍遙散○脾經鬱火先期者歸脾湯○肝經怒火而先至者加味小柴胡湯○血分有熱而先至者加味四物湯○勞後火動補中益氣湯○有脾經血虛而後至者人參養榮湯○肝經血少而後至者六味地黄丸○氣虛血弱者八珎湯盖血生于脾土故云脾統血凡血病當用苦甘之劑以助陽氣而生陰血也

十七

經行臍腹痛甚以桃仁桂枝湯一劑而痊

經行腹先痛用局方七氣湯送來復丹局方積氣丸痃癖癥瘕諸氣亦効

丹參丸　調經養血　金陵一家專製此與四製杜仲丸兩京甚重此二其

丹參一斤淨四兩酒浸一宿日晒乾　大川芎一兩半　川歸身酒浸二兩淨

天台烏藥一兩　香附三兩童便浸炒十次只用淨末一兩

右為末煉蜜為丸梧子大每空心酒吞七十丸

經水當止不止

婦人四十九歲已後天癸當住每月却行或過多不止乃血熱也宜芩心丸　黃芩心枝條二兩米泔浸七日炙乾又浸又炙如此七次為末醋丸梧子大每服七十丸空心温酒送下日三

良方曰婦人月水不斷淋瀝腹痛或因勞損氣血而傷衝任或因經行而合陰陽以致外邪客於胞內滯於血海故也但調養元氣病邪自愈若攻其邪則元氣反傷矣

薛氏曰前症若是欝結傷脾用歸脾湯恚怒傷肝

逍遥散肝火妄動加味四物湯脾氣虛弱六君子湯元氣下陷補中益氣湯勞傷元氣加麥冬五味黃栢炒黑

許學士云經脉過期不及腰腹疼痛或七七數盡而月經仍下者宜用簡易當歸散治之方見調經門者去黄芩加桂心一兩

黃芩湯　治經血不止方出前

居經

婦人月水當三旬一見今三月始一至名曰居經

脉經曰少陰脉微而遲微則無精遲則陰中寒濇即血不来此為居經三月一来

脉經曰婦人年已五十一旦而清血二三日不止何以治之師曰此婦人前絶生經水不下今反清血此為居經不須治當自止經水下常五日止者五日愈

月經不通出婦人良方

婦人月水不通或因醉飽入房或因勞役過度或因吐血失血傷損肝脾但滋其化源其經自通

若小便不利若頭眩痛腰背作痛足寒時痛久而血結于內变為癥瘕若血水相併脾胃虛弱壅滯不通变為水腫若脾氣衰弱不能制水水漬肌肉变為腫滿當益其津液大補脾胃方可保生

東垣曰經閉不行有三婦人脾胃久虛形體羸弱氣血俱衰而致經水斷絶不行或病中消胃熱善食漸瘦津液不生夫經者血脉津液所化津液既絶為熱所燥肌肉漸瘦時見渴燥血海枯

竭病名曰血枯經絶宜瀉胃之燥熱補益氣血經自行矣此症或經適行而有子子亦不安為胎病者有矣

或心包脉洪數躁作時見大便秘澁小便雖清不利而經水閉絶不行乃血海乾枯宜調血脉除包絡中火邪而經自行矣

或因勞心心火上行月事不來者胞脉閉也包脉者屬心而絡于包中今氣上迫肺心氣不得下通故月事不來宜安心補血瀉火經自行矣

潔古曰女子月事不來者先瀉心火血自下也內經曰二陽之病發心脾有不得隱曲故女子不月其傳為風消王啟玄註曰大腸胃熱也心脾受之心主血心病即血不流脾主味脾病即味不化味不化則精不足故其病即不能隱曲脾土已虧即風邪勝而氣愈消也又經曰月事不來者胞脉閉也宜先服降心火之劑後服局中五補丸後以衛生湯治脾養血也

五補丸　補諸虛安五臟堅骨髓養精神

熟地　人參　牛膝　白茯苓　地骨皮各等分

右煉蜜丸梧子大每服五十丸温酒空心服

衛生湯

當歸　白芍各二兩　黃芪三兩　甘草一兩

每服五錢水煎空心服如虛者加人參一兩

按東垣潔古治血枯之法皆主於補血瀉火也補血者四物之類瀉火者東垣分上下中故火在中則善食消渴治以調胃承氣之類火在下則大小便秘澁治以玉燭之類玉燭者四物與

調胃承氣等分也火在上則得于勞心治以芩連及三和之類三和者四物涼膈當歸等分也潔古先服降心火之劑者蓋亦芩連三和玉燭之類後服五補衛生者亦補氣之劑也

黃帝曰有病胸脇支滿者妨于食病至則先聞腥臭出清液先唾血四肢清目眩時時前後血病名為何何以得之岐伯曰病名血枯此得之少年時有所大脫血若醉入房中氣竭肝傷故月事衰少不來也帝曰治之柰何岐伯曰以四

烏鰂骨一藘茹二味并合之丸以雀卵大如小
豆以五丸為后飯飲以鮑魚汁利腸中及傷肝
也
王啟玄註云烏鰂魚骨主血閉藘茹主散惡
血雀卵主血瘀鮑魚主瘀血河間宣明論方
烏鰂魚骨藘茹各等分雀卵不拘數和丸小
豆大每服五丸至十丸煎鮑魚湯下食後日
三服壓以美膳
養生必用論曰女子十四天癸至任脉通月事以

時于是有子天癸者物之自然月者以月至經
者有常也其來過與不及皆謂之病若榮血虧
損不能滋養百骸即髮落面黃羸瘦燥熱燥氣
盛則金受邪金受邪則為咳為嗽為肺癰為肺
痿必矣但助胃壯氣則榮血生而經自行須慎
飲食調七情保神氣庶可浔生若暴怒氣逆經
閉不行當用行氣破血之劑
劉宗厚曰榮者水穀之精氣和調于五臟洒陳于
六腑乃能入于脉也源源而来生化于脾總統

于心藏受于肝宣布于肺施泄于腎灌漑一身
目浔之而能視耳浔之而能聽手浔之而能握
足浔之而能步臟浔之而能液腑浔之而能氣
注之于脉少則澁充則實常以飲食滋養則陽
生陰長変化而為血諸經恃此則百脉長養耗
竭則百脉空虛可不慎哉若陰氣一傷変症百
出妄行于上即吐衄衰涸於下則瘀閉血滲腸
間則為腸風陰虛陽搏即為崩漏湿蒸熱瘀則為
滞下熱極腐化即為膿血火極似水則血紫黑

熱勝于陰發為瘡瘍湿滞于血則為痛痒癮疹
蓄之在上則善忘蓄之在下則善狂
寇宗奭曰夫人之生以氣血為本人之病未有不
先傷其氣血者若室女童男積想在心思慮過
度多致勞損男子即神色消散女子即月水先
閉且心病即不能養脾故不嗜食脾虛即金虧
故發嗽腎水絶則木氣不榮而四肢乾痿故多
怒鬢髮焦筋骨痿若五臟傳遍則死苟或自能
改易心志用藥扶持庶可保生切不可用青蒿

[illegible]虫等凉血行血宜栢子仁丸澤蘭湯益陰血制虚火也按内經五穀入于胃其糟粕津液宗氣分為三隧故宗氣積于胸中出于喉嚨以貫心脉而行呼吸營氣者泌其津液注之于脉化以為血以營四末内養五臟六腑若服苦寒之劑復傷胃氣是犯生生之戒必致於不起也

薛氏曰按經水陰血也屬衝任二脉上為乳汁下為月水其為患有因脾虚而不能生血者有因脾鬱而血不行者有因胃火而血消爍者有因

十四

脾胃損而血少者有因勞傷心而血少者有因怒傷肝而血少者有因腎水少不能生肝而血少者有因肺氣虚不能行血者治療之法若脾虚而不能行者調而補之脾鬱而不行者開而補之胃火而不行清而補之脾胃損而不行溫而補之勞傷心血而不行逸而補之怒傷肝而不行和而補之肺氣虚而不行補脾胃腎虚而不行補脾肺經云損其肺者益其氣損其心者調其營衛損其脾者調其飲食適其寒溫損其肝者緩其中損其腎者益其精皆當審而治之

蕭氏曰經云氣上迫肺則心氣不得下通故月事不来今用連朴之類導痰降火使氣不上迫于肺故心氣下通而月事来也

丹溪治一婦久瘧食少經閉兩手無脉每日與三花神祐丸十餘粒津嚥之月餘食進脉出又半月脉愈又一月經行亦此意也予嘗體此治陳婦二十歲形肥痞塞不食每日臥至未牌喫一盞粥粥後必吐水半碗復臥經閉三月前時忽

十五

通黑色脉之辰時寸關滑皆有力午後關滑寸不滑詢之因乘怒飲食而致遂以白术一兩半厚朴黃連枳實各一兩半夏茯苓陳皮山查人參滑石各八錢縮砂香附桃仁各半兩紅花二錢分十帖各入薑汁三匙日進之間三日以神祐丸神秘沉香丸微下之至十二日吐止食漸進四十日平復如故又汪氏年三十餘形瘦亦痞不食吐水經不通以前方加參术歸為君煎熟入竹瀝半盞薑汁服之但不用神祐丸下亦

平復若咳嗽寒熱而經閉者當于咳門求之
張子和曰凡月事不来用茶調散吐之次用玉燭散芎歸湯三和湯桂苓白术散之類降心火益腎水開胃進食分陰陽利水道之藥也
一婦月事不行寒熱往来口乾頰赤飲食少旦暮間咳一二聲諸公皆用虻虫水蛭乾漆硇砂芫青紅娘子没藥血竭之類惟予不然古方雖有此法柰病人服之臍腹必發痛飲食不進乃命止藥飲食稍進内經曰二陽之病發心脾心受之則血不流故不月既心受積熱宜抑火升水流濕潤燥開胃誘食乃涌出痰一二升下泄水五六行濕水上下皆去血氣自然湍流月事不為水濕所隔則依期而至矣亦不用虻虫水蛭有毒之藥如用之則月經縱来小溲反閉他症生矣凡精血不足宜補之以食大忌有毒之藥偏勝而致夭閼多矣

一婦三十四歲經水不行寒熱往来面色痿黄唇焦頰赤時咳二三声問其所服之藥黑神散烏金丸燒肝散四物湯鱉甲散建中湯寧肺散鍼灸千百轉劇家人意倦不欲求治予憫之先涌痰五六升午前涌畢午後食進餘症悉除後三日復輕涌之又去痰一二升食益進不數日又下通經散瀉訖一二升後數日去死皮數重小者如麩片大者如葦膜不一月經水自行神氣大康

室女月水不通　用雄鼠屎一两燒存性為細末空心温酒調下一錢神効

仲景礬石丸　婦人經水閉不利臟堅癖不止中有乾血下白物

礬石（枯三銭）　杏仁（二銭半）

二味末之蜜丸棗核大内陰中劇者再内之

琥珀散　治心膈迷悶肚腹撮痛月信不通等疾

烏藥（一两）　當歸　蓬术（醋煨各一两）

右為末温酒調下二錢

萬病丸　月經瘀閉臍腹作痛及産後癥瘕等病

乾漆（炒烟出青白為度）　牛膝（酒浸焙各一两）

為末生地黄汁一升砂器慢火熬膏丸梧子大

每服二十九空心米飲下
紅花當歸散　經候不行腰胯重痛小腹堅硬
紅花　當歸尾　紫葳　牛膝
炙甘草　蘇木各二錢　白芷　桂心各一錢半
赤芍一兩炒　劉寄奴苗五錢　為末酒調服三錢
栢子仁丸
栢子仁另研炒　牛膝酒洗炒　卷栢各半兩　澤蘭葉一兩
右蜜丸梧子大每服三十九空心米飲下
澤蘭湯　澤蘭葉二錢　當歸　芍藥各一錢炒
炙甘草五分　水煎服
茯苓補心湯　治婦人心氣虛耗不能主血又不
能制乎肺金氣得以乘乎肝木肝既虧損則血
不能藏漸致精血枯涸月事不調此方專補心
元之虛抑其肺氣調和營衛滋養血脉　前方
參蘇飲內除木香餘與四物湯對匀每服五錢
以薑棗煎溫服　此方常進用以治宮娥多効
牛膝散　治月水不利臍腹作痛或小腹引腰氣
攻胸膈　牛膝　桂心　赤芍炒

桃仁　玄胡索炒　川歸　丹皮各一兩
右為末每服一錢酒調服或每服五錢水煎服
地黃通經丸　治月經不行或產後惡露臍腹作
痛　熟地四兩　虻虫去頭翅炒　水蛭糯米同炒黃去米
桃仁去皮尖各五十枚　右煉蜜丸梧子大每服五七丸
空心酒下
牡丹皮散　婦人月水不利臍腹疼痛
丹皮　大黃炒各一兩　赤芍　生地　桃仁　川歸
桂心　赤茯苓　白朮各七錢半　石葦去毛　木香各半兩
右每服五七錢薑三片水煎空心服
本事通經丸　婦人室女月水不通疼痛或成血
瘕　桂心　青皮去白　大黃炒　乾薑　川椒
川烏　乾漆　莪朮　川歸　桃仁各等分
為末先將四錢用米醋熬成膏和餘末調匀搗
千杵丸如梧子大曬乾每服二十九淡醋湯下
加至三十九溫酒亦得
厚朴湯　治月水不通屢試有驗因氣滞痞嘔結痰在上寒熱
厚朴薑汁炙香　切細濃煎去渣空心服不過三四

劑瘥

丹溪積痰傷經不行夜則妄語

瓜蔞子一兩 黃連五錢 吳茱萸一錢半 桃仁五十枚

紅麯二錢 縮砂三兩 山查末

薑汁飪餅糊為丸

軀肥脂滿經閉者導痰湯加芎連不可服地黃如

用以薑汁炒過即二陳加枳實黃連是也

一婦年二十餘兩年經閉食少乏力

黃連二兩 白朮一錢半 陳皮 滑石各一錢 黃芩半兩

〈二卷 廿

木通分 桃仁十二枚 炙甘草少許 水煎服

瘀血鬱滯經閉或臨經時腰疼腹痛宜四物加紅

花桃仁莪朮玄胡香附木香發熱加黃芩柴胡

瘀血作痛經閉不行丸藥方

香附醋煮四兩 瓦楞子煅二兩醋煮一晝夜 桃仁二兩 丹皮

大黃蒸 川歸各一兩 川芎 紅花各半兩

為末飪餅丸梧子大空心溫酒下三五十丸

經水過期不行

玄胡索一錢 香附 枳殼各五分

為末杜牛膝汁半鍾空心調服

當歸散 治經脉不通

川歸 川山甲灰炒 蒲黃各炒半兩 辰砂一錢 射香少許

右為末酒調服二錢

菖蒲丸 血積心脾作痛

九節菖蒲六兩 吳茱萸炒 香附子各四兩 右為末醋

打神曲糊為丸梧子大每服五十丸薑湯下

沒藥散 血氣不行心腹疼痛或走注痛月經不

調發熱晡熱並宜用之

〈二卷 三二

紅花 沒藥 川歸 玄胡炒

右各等分為末每服二錢童便酒調下

威靈仙散 凡冷氣滯血少小腹疼痛或經行遇

怒腹脹痛宜用之

威靈仙一兩 川歸 沒藥 木香 桂心各五錢

為末每服一錢熱酒調下

當歸散 凡血積小腹痛或因氣逆月經不行肚

腹作痛 川歸炒 赤芍 沒藥 枳殼麩炒

劉寄奴 玄胡 各等分為末每服一錢酒調下

加味建中湯　血海受寒小腹作痛
桂心一兩半　白芍一兩　炙甘草二錢半　吳茱萸
當歸　玄胡　丹皮各五錢
每服五錢加薑棗水煎食前服

滋血湯　婦人血熱氣虛經候澁滯不通肢體麻木肌熱生瘡渾身痒倦將成癆瘵不可妄服藥餌宜以此滋養自能通利
馬鞭草　荊芥穗各四兩　桂心　枳殼　川芎
川歸　丹皮　赤芍各一兩
每服五錢烏梅一枚水煎食前服　如有此症服半月經脈自通百病皆愈　出適宜方

崩

生生子曰崩者謂傾陷之勢而不可遏俗曰血山崩謂血暴下如山之崩壞也又曰血海敗蓋衝任二脈為血之海附于陽明陽明者土也土位乎中故又曰崩中

內經陰陽別論云陰虛陽搏謂之崩東垣曰婦人脾胃虛損致尺部脈沉細而數或沉弦而洪大有力寸關脈亦然皆由脾胃有虧下陷于腎與陰火相合濕熱下迫經漏不止其色紫黑如夏腐肉之臭中有白帶者脈必弦細寒作于中中有赤帶者其脈洪數疾熱明矣必腰痛或臍下痛臨經欲行先見寒熱往來兩脇急縮兼脾胃症出見或四肢困熱心煩不得眠心下急宜大補脾胃而升舉血氣可一服而愈或人故貴脫勢人事疎少或先富後貧心氣不足其火大熾旺于血脈之中又致脾胃飲食失節火乘其中形質肌肉容顏似不病者此心病不行於診故脾胃症顯矣故經水不時而下或暴下不止治當先說惡死之言勸諭令拒死而心不動以大補氣血之藥補養脾胃微加鎮墜心火之藥治其心補陰瀉陽經自止矣痿論云悲哀太甚則胞絡絶胞絡絶則陽氣內動發則心下崩數溲血也故本病曰大經空虛發則肌痺傳為脈痿此之謂也

良方論曰婦人崩中由臟腑傷損衝任血氣俱虛

故也衝任為經脉之海血氣之行外循經絡内營臟腑若無傷損則陰陽和平而氣調適若劳動過多致臟腑俱傷而衝任之氣虚不能約制其經血故忽然暴下或由陰陽相搏為熱所乘攻傷衝任血得熱則流散甚者致于昏悶其脉數小則為順洪大為逆大法當補脾胃為主

薛氏曰經云陽絡傷則血外溢陰絡傷則血内溢又云脾統血肝藏血治法前症因脾胃虧損不攝血歸元用六君子加芎歸柴胡若肝經之火而血下行用奇効四物湯或四物加柴梔芩术若肝經風熱而血妄行用加味逍遥散或小柴胡梔芎丹皮若怒動肝火而血沸騰亦用前藥若脾經欝結而血不歸經用歸脾加柴梔丹皮若悲傷胞絡而血下崩用四君加柴梔升麻故東垣先生云凡下血症須用四君以收功厥有旨哉若大吐血毋以脉論當急用獨參湯救之若潮熱咳嗽脉數乃元氣虚弱假熱之脉尤當用人參温補此等症候無不由脾胃先損故脉

洪大察其有胃氣能受補則可救苟用寒凉止血之藥復傷脾胃反不能攝血歸源是速其危也

丹溪曰血崩亦有因涎欝胸中清氣不升故經脉壅遏而降下非開涎不足以行氣非氣升則血不能歸隧道此論血泄之義甚明盖開胸鬲濁涎則清氣升清氣升則血歸隧道不崩矣故其証或腹滿如孕或臍腹疠痛或血結成片或血出即快止即悶或臍上動其治法宜開結痰行滞氣消瘀血

又曰劳動過傷臟腑衝任之氣虚不能約制其經血故忽然而下謂之崩中暴下當宜大補氣血之藥舉養脾胃微加鎮墜之劑治其心補陰瀉陽經自止矣○急即治其標用白芷湯調百草霜末甚者棕櫚灰後用四物湯加炒乾薑調理○因劳者用參蓍帯升補藥○因寒者用乾薑因熱者用黄芩○崩過多者先以五霊脂末一服當分寒熱盖五霊脂能止能行○紫色成塊

者為熱四物湯加黃連之類○崩中用香附白
芷丸服氣虛血虛者皆以四物湯加參芪○漏
下為熱而虛四物加黃連○崩中白帶用樗白
末又用石灰炒去灰為末茜草少許粥丸服○
經血逆行或血腥或唾血或吐血用韭菜汁服
効
治血崩血瘕或經行產後心腹脇痛五靈脂炒烟
盡為末每服一錢溫酒調或用三錢水酒童便
煎服
（八二十卷）（三六）
治風熱血崩荊芥穗燈火燒焦為末每服三錢童
便調服又治產後昏暈俱妙
獨聖散　治肝經有風血崩
防風去芦　又為末每服二錢空心食前酒煮白麵
清飲調下極驗
神應散　治血虛內熱血不歸經而崩
桂心燒存性　為末每服一二錢米飲調下
又方　陳槐花一兩百草霜半兩為末每服一二
錢燒紅鐵秤錘淬酒調下

簡易黃芩湯　崩中下血陽乘陰經水沸溢
黃芩　為末每一二錢燒秤錘淬酒調下或用此酒
（各芩心丸赤炒）
伏龍肝散　治氣血勞傷衝任經虛血非時崩下
臍腹疼痛脉遲弱食或少或赤白帶下
伏龍肝　赤石脂　麥冬各一兩　炙甘草半兩
川芎二兩　當歸　乾薑七錢半　桂心半兩
艾葉三兩　熟地二兩　每服六錢棗一枚水煎服
羅氏備金散　治婦人血崩不止
（八二十卷）（三七）
香附子四兩炒　歸尾一兩二錢　五靈脂一兩炒
空心酒調服五錢立効
本事方　治下血不止或成五色崩漏
香附子舂去皮毛中斷之畧炒為末每服二錢
用清米飲調下○此方徐氏傳其內人有是疾
徧服藥不効後服此遂愈須久服為佳亦治產
後腹痛大是婦人仙藥常服益血調氣○大全
方用醋煮出焙乾為末醋糊為丸梧子大每服
五十丸米飲送下○數墮胎者此藥尤妙用前藥乾

荷葉濃煎湯調下更佳

縮砂散　治血崩

縮砂仁不以多少於新瓦上炒香為末米飲調下三錢

治血崩不止　五靈脂炒加當歸酒同煎或水酒童便各半盞同煎服

又方　水煎五靈脂半乾去渣清再熬成膏入神曲末為丸梧子大空心温酒下三五十丸便止

又方　鹿茸醋炙　當歸各二錢　蒲黃半兩炒

為末酒調五錢日三

仲景桂枝茯苓丸　治婦人有癥在臍上動下血不止　桂枝　茯苓　桃仁去皮尖炒

芍藥　丹皮去心各等分　為末煉蜜為丸梧桐子大每服十丸日三以知為度

又婦人陷經漏下色黑　膠薑湯主之即芎歸膠艾湯

芎藭　阿膠　甘草各二兩　艾葉

當歸各三兩　芍藥四兩　熟地　右水五升清酒三升煮取三升去渣內膠令消盡温服一升日三不瘥更煮一料一云加乾薑一兩

東垣益胃升陽湯　血脫益氣古人之法也先補胃氣以助生長故曰陽生陰長諸甘藥為之先務舉世皆以為補氣殊不知甘能生血此陽生陰長之理也故先理胃氣人身之內穀氣為寶

黃芪二錢　人參有嗽者去之　神曲炒各一錢半　升麻　柴胡各五分　白朮三錢　當歸身　甘草炙　陳皮一錢

生黃芩二錢瀉盛暑之伏金肺逢秋涼不用　右每服五錢如食添再加之如食減於五錢內減一二錢不可多服水煎服一方有生地　如腹痛每服內加白芍二分中桂少許如口乾渴加葛根二分先服此益胃升陽湯不止卻服後柴胡調經湯大舉大升之也

柴胡調經湯　治經水不止下皆鮮血項筋急腦痛脊骨強痛不思飲食

羌活　獨活　藁本　升麻各五分　蒼朮一錢

葛根　當歸　甘草炙各三分　柴胡七分　紅花少許

水煎稍熱服取微汗立止

又嘗治一老婦血崩不止流流不絕滿床皆血上床不得者三月矣腹滿如孕乃作虛挾痰積痰血治之用四物四兩參术各一兩甘草半兩以補虛香附三兩半夏兩半茯苓陳皮枳實砂仁玄胡各一兩以破痰積污血分二十帖每帖煎乾加乾荷葉側栢葉湯再煎服之服盡良愈今再不發如神

雲岐子栢黃散 療經血不止

黃芩一兩二錢半 側栢葉 蒲黃各一兩 伏龍肝一兩

水二升煎取八合分為二服

又方 崩中不止結作血片如雞肝色碎爛

芎藭一錢二分 阿膠 青竹茹各八分 續斷 地榆

小薊根各三分 當歸六分 生地 伏龍肝各一錢一分

水九盞煎三盞分三服

一婦經漏不止四物加黃連黃栢鹿角膠童便數劑而愈緣此婦素服不得參芪後又小產血崩不止亦以前劑進之而安

大全方 崩中下血不止小腹痛

白芍藥二兩酒炒 側栢葉六兩微炒 右水一升煎取六合入酒五合煎取五合空心分為二服 一方為細末酒調二錢 一方有鹿角膠等分酒調

治白帶臍腹痛

治經血不止歌曰 婦人經血正淋漓 舊蓮蓬燒作灰 熱酒一盃調八字 自然安樂更無疑

經驗方 百草霜二錢狗胆汁拌匀分作二服以當歸酒調下

黃芩湯 治經血不止

黃芩五分 川歸 側栢葉 蒲黃各四分

艾葉一分 生地二錢半 伏龍肝二錢

生薑三片水煎服

經驗方 治血崩不止

右用黃連解毒湯加艾葉服無不効者

南岳魏夫人濟陰丹 治婦人血氣久冷無子數經墮胎皆因衝任之脉虛損胞内宿挾疾病經水不時暴下不止月内再行或前或後或崩中

漏下三十六疾積瘕癖臍下冷痛小便白濁以上疾症皆令孕育不成以致絶嗣常服令人有孕及生子充實産後百日内常服能去百病去宿血生新血

木香煨 茯苓 京墨燒紅醋淬研末 菴仁去皮尖炒各一兩
秦艽 炙甘草 人參 桔梗炒 藁本
石斛酒浸焙 蚕退紙燒存性各二兩 乾薑炮 牡丹皮
桂心 川歸 細辛 川芎各一兩半
川椒去目炒出汗 山藥各七錢半一方三兩 澤蘭葉 熟地
香附炒各四兩 大豆黄卷炒半升 蒼术米泔浸去皮炒八兩 糯米炒一升

右為末蜜丸每兩分作六丸每服一丸嚼細食前温酒醋任下　此藥用之累効血崩服之即止　向有經候不行者二年腹内一似懷孕時或鼓動但脉絃疾非妊脉耳遂令服至半劑下血塊一盂自後服盡經候竟調若經病久無子者服之即孕且生子充實但服至有孕便當住服或脾胃素弱不宜用蜜丸則以醋煮薄麪糊為丸如梧子大每服五十丸温酒醋湯任下

赤白帶下

機要云赤者熱入小腸白者熱入大腸其本實熱寃結於脉不散故為赤白帶下也寃屈也結也屈滞而病熱不散先以十棗湯下之後服苦練丸大玄胡散調下之熱去濕除病自愈也　劉宗厚曰此論有給之至也

良方論云婦人帶下其名有五因經行産後風邪入胞門傳於臟腑而致之若傷足厥陰肝經色如青泥傷於手少陰心經色如紅津傷於手太陰肺經形如白涕傷於足太陰脾經黄如爛瓜傷足少陰腎經黑如衃血人有帶脉横於腰間如束帶之狀病生於此故名為帶

生生子曰按此論前既云傷於肝則色青傷於心則色赤云云是五臟皆能令人帶下也抑何待於奇經之帶脉病而後然歟緣帶乃有形之病如衣帶之狀所下之物亦必成條或成片而象之也雖有赤白之殊皆濕痰瘀血所致若局定指奇經帶脉之名而始名之

為帶下得無太泥乎哉攷之難經二十九難曰奇經之為病何如云云帶之為病腹滿腰溶溶若坐水中滑伯仁註曰任脉起胞門行腹故病苦内結男為七疝女為瘕聚帶脉廻身一週故病如是觀乎是在任脉則有男女之分在帶脉則無男女之分據乎是則凡帶脉所生之病乃男女均有之疾初非硬指帶脉之名為婦人今日所謂白物滛滛而下之帶也又按内經骨空篇曰任脉為病男子内結七疝女子帶下瘕聚亦是以任脉主帶下而不以帶脉名帶下也故後之歷代諸公所治亦不泥於帶脉予故辯而明之庶臨症者而毋以名拘焉

劉宗厚曰按良方此論言風氣寒熱傷於諸臓致症似言外邪大抵此症多有本於陰虚陽竭營氣不升經脉凝濇衛氣下陥精氣累滞於下焦奇經之分藴積而成其病或酔飽房勞服食燥劑所致也白物如涕之状故言帶者亦病形也

經云帶脉為病而得名而白者屬氣赤屬血東垣舉脉訣曰崩中日久為白帶漏下多時骨木枯言崩中者始病血崩久則血少復亡其陽故白滑之物下流不止此可見未得全拘於帶脉矣詳病亦有湿痰流注於下焦或肝腎陰滛之湿勝或因驚恐而水乗土位濁液下流或思慕為筋痿内經所謂二陽之病發心脾是也或餘經湿熱屈滞於少腹之下而病本殊則皆為氣血虚損營衛之精氣累治而成其病標一也前人立論殆盡病機則治法無定若戴人以帶下得而手脉俱滑大而有力乃上用宣去痰飲下以導水丸泄湿熱繼以淡劑滲之此為瀉實也如其諸脉微細或沉緊而濇按之空虚或洪大而濇按之無力正為元氣不足陰虚筋痿虚極中寒等症東垣有補陽調經固真等例乃兼其虚也丹溪先生治因湿痰下注用海石南星椿根皮之類較之前人下之而復吐以提其氣或發中兼補補中兼利燥中兼升發潤中兼益氣

温而兼收澁之例不同盖病機有輕重淺深之
異耳

仲景曰婦人帶下六極之病脉浮則為腸鳴腹滿
緊則為腹中痛數則為陰中痒痛洪則生瘡弦
則陰疼掣痛

又曰帶下有三門一胞門二龍門三玉門已產屬
胞門未產屬龍門未嫁女屬玉門

脉經問曰未出門女有三病何謂也師曰一病者
經水初下陰中熱或有當風或有扇者二病者（八千山灰）（四六）
或以寒水洗之三病者或見丹下驚怖得病屬
帶下

又問曰婦人年五十所病下痢數十日不止暮則
發熱少腹裏急痛腹滿手掌熱唇口乾燥何也
師曰此病屬帶下何以故曾經半產瘀血在少
腹中不去何以知之其症唇口乾燥故知之當
與溫經湯

內經曰脾傳之腎病名疝瘕少腹寃熱而痛出白
一名白蠱當此之時可按可藥　啟玄子註曰
出白溲出白液也盖便濁白帶之類

許學士云凡婦人有白帶多致不產育速宜治之

衍義治帶下并腸有敗膿淋露不已腥穢殊甚遂
至臍腹更增冷痛此盖敗膿血所致卒無已期
須以此排膿白芷一兩單葉紅蜀葵根二兩白
芍藥白枯礬另為末各半兩同以蠟丸如梧桐
子大空心及飯前米飲下十丸或十五丸俟膿
盡仍別以補藥佐之

本事方　治下元冷赤白帶下不問遠年近日盡（八三卷）（四一）
効　龍骨五錢　舶上硫黃三錢　右為末每服
半錢無灰酒下空心調服一日三服

伏龍肝散　治赤白帶下久不瘥肌瘦痒黃
棕櫚燒存性　伏龍肝　屋梁上塵懸長者炒烟盡出火毒
右等分為末入龍腦射香各少許每服二錢酒
或醋調服病十年者半年可安有人經年崩漏
不止諸藥不効脉濡微與此藥兼香礬丸服之
即愈

香礬丸　白礬四兩　香附子二兩　黃狗頭骨灰四兩

右為末粥丸梧子大每服三十丸
東垣補經固真湯　白文舉正室白帶常漏久矣諸藥不効診得右尺極微其白帶下流不止脉經云崩中日久為白帶漏下多時骨木枯言崩中者始病血崩久則血少復亡其陽故白滑之物下流不止是本血海將枯津液復亡乾枯不能滋養筋骨以本部行經為引用為使以大辛甘油膩之藥潤其枯燥而益津液以大辛熱之氣味補其陽道生其血脉以苦寒之藥泄其肺而救上熱傷氣以人參補之以微苦溫之藥為佐而益元氣名曰補經固真湯

柴胡　甘草炙　陳皮　郁李仁另研　生黄芩另入各一錢
人參　乾薑各二錢　白葵花七朵去萼　右除黄芩外以水二大盞煎至一盞七分再入黄芩同煎至一盞空心熱服以早膳壓之

桂附湯　治白帶腥臭多悲不樂大寒
肉桂一錢　大附子三錢　黄柏　知母各五分　如少食常飽有時似腹脹加白芍藥五分　如不思飲食加五味子二十粒　如煩惱面上麻木如虫行乃胃中元氣極虛加黄芪一錢　人參七分　炙甘草二分　升麻五分
作一服水二鍾煎至一鍾食遠熱服

酒煮當歸丸　治𩕄疝白帶下注脚氣腰以下如在氷雪中以火焙炕重厚綿衣蓋上猶寒不任冷之極也面白如枯魚之象肌如刀削消瘦之速也小便不止與白帶長流而不禁固自不知覺面白目青藍如菜色目䀮䀮無所見身重如山行步攲側不能安地腿膝枯細大便秘結口不能言無力之極食不下心下痞煩心懊憹不任其苦面停垢背惡寒小便遺而不知此上中下三陽真氣俱竭故噦嘔不止胃寒之極也其脉沉緊而澀按之空虛若脉洪大而澁按之無力猶為中寒之症況按之空虛者乎按之不鼓是為陰寒之極也其空虛乃血氣俱虛之極也

當歸一兩　茴香半兩　黑附子炮去皮臍　良薑各七錢
右四味剉以好酒一升半煎至酒盡為度炭火焙乾為細末入後藥　炒黄塩　丁香各半兩

全蝎三錢 柴胡二錢 升麻根 木香各一錢 苦楝子
炙甘草各五分 玄胡索四錢 俱為末與前四味和
匀酒煮麵糊為丸梧子大每服二十丸餓肚淡
醋湯下 忌油膩冷物酒麵

當歸附子湯 治臍下冷痛赤白帶下
柴胡七分 良薑 乾薑 黑附子各一錢 升麻
蝎梢各五分 炙甘草六分 當歸二錢 炒黃鹽三分 黃栢二分
每服五錢水煎服為丸子亦可

右炒鹽例東垣回陽丹註云必用炒黃鹽無則
不効蓋寒疝之要藥也

固真丸 治白帶久下不止臍腹冷痛其寒㮰之
如氷陰中亦然目中溜火上壅視物𥆧𥆧無所
見齒皆惡熱飲痛須得黃連末擦之乃止惟喜
乾食大惡湯飲此病皆寒濕乘其胞内故喜乾
而惡濕肝經陰火上溢走於標故上壅而目溜
火腎水侵肝而上溢故目中𥆧𥆧無所見齒惡
熱飲者是少陽陽明中伏火也當大瀉寒濕以
丸藥治之故曰寒在下焦治主宜緩大忌湯散
以酒制白石脂白龍骨以枯其濕以炮薑大辛
熱瀉寒水以黃栢之大寒為因用又為鄉導治
法云古者雖重罪不絕人之後又為之伏其所
主先其所因之意又瀉齒中惡熱飲也以柴胡
為本經之使以芍藥半錢以導之又恐辛熱之
藥太甚損其肝經故微瀉之以當歸之辛溫大
和血脉此用藥之法備矣

白石脂燒赤水飛研細晒乾 柴胡各一錢 炮薑四錢 黃栢酒洗
白芍各五分 龍骨酒煮水飛二錢 當歸酒洗三錢

右為末水煮稀糊為丸芡實子大每服三十丸
空腹時滾湯送下即以美饍壓之 忌生冷硬
物酒濕麪

補真潤腸湯 治白帶陰戶中痛控心而急痛身
黃皮緩身重如山陰中如氷名助陽湯
即前固真湯減人參加防風高良薑

海藏香附六合湯 治赤白帶下即四物加香附桂也

大全方 治赤白帶下年深月久不瘥
白芍藥二兩 乾薑半兩 各炒黃色為末米飲下二

錢日二服

丹溪治赤白帶下大法　或十棗湯神祐丸或玉燭散皆可用之虛者不可峻攻實者可行　血虛加減四物湯　氣虛以人參白朮陳皮間與之　主治燥濕爲先　濕甚者固腸丸　陰火動者諸藥中加炒黃柏　滑者加龍骨赤石脂　滯者加葵花白者治白赤者治赤　性躁者加黃連　寒月少加薑附臨機應變先須斷厚味　帶下與夢遺同法治之　肥人有帶多是濕痰用海石半夏南星黃柏炒青黛蒼朮川芎　瘦人帶病少如有者多是濕熱用炒柏蛤粉滑石川芎青黛樗皮　帶漏俱是胃中痰積流下滲入膀胱出於大腸小腸宜升提甚者上必用吐以提其氣下用二陳湯加白朮蒼朮　治結痰白帶以小胃湯半飢半飽津液下數丸候鬱行却服補藥　白朮一兩　蒼朮半兩　紅白葵花二錢半　白芍藥七錢半　右飪餅爲丸空心煎四物湯吞二十九

八十二卷　五二

一婦年七十形瘦善啖白帶食前薑湯吞大補丸五十丸一二次午饍後及臨卧時各與小胃丹十五丸愈

乳香散　治赤白帶下　草果一枚去皮入乳香一小塊用麵包煨焦存性連麵爲末　每服二錢重者三錢陳皮湯調下

帶下不止用椒目白芷　治白帶以椒目爲末米飲下

樗皮丸　治赤白帶有濕熱者

白芍五錢　良薑炒灰二錢　黃柏炒成灰二錢　椿皮一兩半

右爲末粥丸每服三五十丸米飲下

八十二卷　五三

治白帶因濕熱而勝下者　蒼朮鹽炒　白芍藥　滑石炒各一兩　枳殼　甘草各三錢　椿根皮炒　乾薑炒各二兩　地榆半兩　爲末粥丸米飲下

治帶下　椿根皮二兩　神麴炒　麩麴炒　黃柏炒　蒼朮各一兩　白芍一兩半　滑石　枳殼各五錢　右爲末糊丸梧子大空心服五十丸

赤白帶皆屬於血有出於大小腸之分黃荊子炒焦爲末米飲調三錢

固腸丸　治濕氣下利大便血白帶去脾胃陳積

之後用此以燥下濕亦不曾單用看病作湯使
椿根白皮為末粥糊為丸此藥性凉而燥須炒
用　一方加滑石一半
地榆膏　治赤白帶下骨立者
地榆一斤　用水三升煎至一半去渣再煎如稠
餳空心服三合日二次
治漏下五色地榆三兩用醋一升煮十餘沸稍熱
食前服一合
治白帶因七情所傷脉數者　〈二十六卷

黄連炒　側栢酒蒸　黄栢各半两炒　香附醋炒
白术炒　白芍各一两　白芷燒存性三錢　椿根皮炒二两
木香三錢　為末粥丸米飲下
千金方　治赤白帶下
三葉酸醬草陰乾為末空心温酒下三錢
丹溪治赤白帶　龜板酒炙二两　黄栢炒一两　乾薑炒一两
枳子二錢半　右酒糊為丸每服七十丸日二服
又方　治帶下脉數者　枸杞根一斤　生地五斤
右以水一斗煮取五升分五服

治帶下赤白腰痛或少腹痛有熱者
樗皮二两　玄胡索　桃仁　側栢葉　茴香
當歸　川練肉各半两　香附八錢　官桂
烏藥各三錢　麥皮曲炒一两
右為末酒糊為丸每服六十丸神効
白芷散　治下元虛弱赤白帶下或經行不止等
症　白芷一两　海螵蛸一枚燒　胎髮五九煆
為末每服二錢酒調下
東垣坐藥龍鹽膏　〈二十二卷　丁香　川烏炮　木香各一錢半

全蝎五枚　良薑　木通各一錢　枯礬五分　龍骨
茴香　歸梢　炒黄鹽　防己酒洗　紅豆
肉桂各二錢　厚朴三錢　玄胡索五錢　右為末煉蜜丸
彈子大綿裹留絲在外納陰戶內
又方勝陰丹為上藥力小再取三錢內加行性熱
藥　三柰子　川烏　大椒各五分　柴胡
羌活各二錢　全蝎三枚　大蒜　破故紙各一錢與蒜同焙
升麻　枯礬各二分　麝香少許　甘松三分
右為細末同前制用

又方回陽丹 全蝎 升麻 甘松各二分 羌活 草烏頭各三分 水蛭焙熟三條 蝱虫三枚去翅足炒 川烏 柴胡各七分 大椒 蓽撥 枯礬 三稜各五分 大蒜 破故紙各二錢 炒黃鹽一錢此必用之藥去之則不効

右為細末依前制如指尖大綿包納陰戶中覺臍下煖為効

丹溪治胡安人白帶下月經甚多食少倦怠面黃經中有如血塊者有如筋膜者與參朮芎補血氣調脾胃後諸症皆退惟帶未止以樗皮丸主之

張戴人治一婦帶下連綿不絕白物或來已三載矣兩手脉俱滑大有力六七至常上熱口乾眩暈時嘔酢水乃寒痰在胸中以瓜蒂散吐出冷痰二三升皆酢水也間如黃涎狀如爛膠次以漿粥養其胃氣又次用導水禹功以瀉其下然後以淡劑滲泄之藥利其水道不數日而愈

又息城李左衛之室病白帶如水窈漏中綿綿不絕穢臭之氣不可近面黃食減已三年矣諸醫皆云積冷陽起石硫黃薑附之藥重重燥補污水轉多戴人斷之曰此帶濁水本熱乘太陽經其寒水不禁固故如此也夫水自高而趨下宜先絕其上源乃涌痰二三升次日下沃水斗餘行三遍汗出周身至明旦病人云污已不下矣次用寒涼之劑服及半載產一男

仲景温經湯

吳茱萸三兩 川歸 芎藭 芍藥 人參 桂枝 阿膠 丹皮 生薑 甘草各二兩 半夏半升 麥冬一升

右十二味水一斗煮取三升分温三服 亦主婦人少腹寒久不受胎兼取崩中去血或月水過多及至期不來

五靈散 治赤白帶下

五靈脂半生半炒 為末酒調服

大全方 治白帶

嫩蓮葉三葉 甘草節一錢 茅花一握炒 棕櫚灰三十 右為末空心酒調方寸匕

益母散 治帶下赤白惡露下不止

益母草開花時採搗為末空心酒服二錢日三服

又方　治白帶用白芷以石灰炒去灰茜草少許
粥糊丸服
又方　白芍藥炒黑為末每服三錢七酒調下
丹溪治赤白帶用生狗頭骨燒存性為末酒調服
或入藥服
千金方　治帶下
雲母為末溫水調服三方寸七立見神効
妊娠白帶　蒼朮三錢　白芷　黄芩炒各二錢
黄連炒　黄柏炒　樗根皮炒各一錢半　山茱萸各二錢半　白芍二錢半　為末糊丸空心酒服五十丸

寡婦師尼寒熱如瘧
倉公傳與褚氏論皆云師尼寡婦獨陰無陽慾心萌而未遂是以懨懨成病以致乍寒乍熱而類瘧狀久則為勞又有經閉白淫痰逆頭風膈氣痞悶面黙瘦瘠等症皆寡婦之病診其脉獨肝部弦出寸口而上魚際皆血盛所致經云男子精盛則思室女人血盛則懷胎觀其精血思過半矣

薛氏曰前症若肝脉弦出魚際用生地黄丸血虚佐以四物湯若蒸怒動肝火而寒熱佐以加味逍遥散若欝損肝經而寒熱佐以八珎湯若欝損元氣而寒熱佐以補中益氣湯若欝傷脾氣而寒熱佐以濟生歸脾湯
治一寡婦不時寒熱脉上魚際此血盛之症用小柴胡湯加生地黄治之而愈但畏風寒此脾胃氣虚用加味歸脾湯補中益氣湯兼服而安
一婦因夫久出經商發寒熱月經旬日方止服降火涼血藥內熱益甚自汗盜汗月經頻數予曰內熱自汗乃脾氣虛弱也月經頻數乃血不歸脾也用歸脾湯六味丸而愈

一室女寒熱肝脉弦長而出寸口用小柴湯加生地烏梅治之而愈既嫁而諸症悉痊
一室女久患寒熱月經失期以小柴湯加生地治之少愈更以生地黄丸而痊
生地黄丸　許學士云有一師尼悪風体倦乍寒乍熱面赤心煩大小柴胡湯雜進其病益劇予

診視之曰三部脉無寒邪但肝脉弦長而上魚際服此丸而愈

柴胡　秦艽　黃芩各五錢　生地二兩

赤芍藥一兩　右為末煉蜜為丸梧子大每服三十九烏梅湯下一日三服

逍遙散　治日晡虛熱脉微細

地骨皮　甘草　黃芩　川芎各一錢

北柴胡五錢　香附三錢

右水煎空心服加竹葉十片

入二十卷　六十

柴胡散　治寒熱往來此陰陽相勝陰勝則寒陽勝則熱或是胎前雜病但服此湯如燒湯凝雪

北柴胡　黃芩　甘草各三錢

地骨皮一錢　荊芥　桂各二錢

水煎服　再仍服小柴胡湯三五帖

夢與鬼交

人稟五行秀氣而生承五臟神氣而養若調理失節氣血虛衰則鬼邪干共正隱避而不欲見人時獨言笑或時悲泣是其候也脉息遲伏或如鳥啄或綿綿而來不知度数面顔不變亦其候也

薛氏曰前症多由七情虧損心血神無所護而然也宜安神定志等藥則正氣復而神自安若脉來乍大乍小乍短乍長亦為鬼祟也宜灸鬼哭穴以患人兩手拇指相並用線紮扎當合縫處半肉半甲間灼艾灸七壯若果是邪祟病者即乞求免灸云我自去矣

茯神散　治妄有所見言語雜亂時或昏昧瘀熱

茯神一兩半炒　茯苓　人參　石菖蒲各一錢

入二十卷　六一

赤小荳五分　右水煎服

桃仁丸　治鬼魅交通

辰砂另研　檳榔　當歸　桃仁各三錢

水銀一錢棗肉研令星盡　射香　阿魏麵包煨

沉香各半兩　右為末煉蜜為丸梧桐子大每服十九空心桃仁湯下

辟瘟丹

虎頭骨二兩　辰砂　雄黃　雌黃

鬼臼　皂莢　蕪荑仁　鬼箭羽

鷄芎各一兩　右爲末蜜丸彈子大囊盛一丸男左女右繫臂上及用一丸當病人戶前燒之一切邪鬼不敢近

妙香散　治心氣不足精神恍惚虛煩少睡盜汗等症

甘草炙　人參　桔梗各半兩　黃耆　茯神去皮心　茯苓　遠志去心炒　山藥姜汁炙各一兩　辰砂二錢　射香二錢　木香二錢半

右爲末每服二錢溫酒調服

治婦人與鬼交

松脂　雄黃　先熔松脂乃入雄黃以虎爪不住手攪得所取如雞子黃大令患人卧以被蓋取藥薰之惟露頭在外勿令泄氣又不可過熱

鹿角散　男女夢與鬼交精神恍惚者　亦治遺精

鹿角屑三指撮日二服酒下　婦人被妖魅狐猫祟迷惑不肯言鬼鹿角屑以水服方寸匕即言實也

桃梟　一名桃奴　一名梟景　是過年樹上不落乾桃子味苦微溫主殺百鬼精物療中惡腹痛殺精魅五毒不祥正月採之

一熱入血室

婦人傷寒傷風發熱經水適來晝則安靜暮則譫語有如瘧狀此爲熱入血室治者無犯胃氣及上二焦宜服小柴胡湯

薛氏治一婦經行感冒風邪晝則安靜夜則譫語此熱入血室也以小柴胡加生地治之頓安但內熱頭暈用補中益氣湯加蔓荊子而愈後因惱怒寒熱譫語胸脇脹痛小便頻數月經先期此肝火血熱妄行以加味逍遙散加生地黃而愈

一婦因怒寒熱頭痛譫言妄語至夜益甚月經暴至此怒動肝火用加味逍遙散加生地治之神思頓清又用補中益氣湯而痊

一婦經行感冒譫語或用發散寒涼之劑前症益甚月經不止肚腹作痛嘔吐不食痰涎自出此熱入血室而藥復傷胃用香砂六君子歸脾湯

而安

乾姜柴胡湯　治婦人傷寒經脉方來熱入血室寒熱如瘧或狂言見鬼

柴胡一錢　桂枝三分　牡蠣煅　乾姜炮　甘草炙各二分　瓜蔞根五分　水煎汗出而愈

海蛤散　治婦人傷寒血結胸膈宜服此藥及針期門穴

海蛤　滑石飛煅水　甘草各二分　芒硝一兩

右為末每服二錢用雞子清調下小腸通利其結血自散更用桂枝紅花湯發其汗則愈

桂枝紅花湯　治傷寒發熱口燥舌乾經脉不行

桂枝　芍藥　炙甘草各一錢　紅花二錢

右姜棗水煎服良久更進汗出可解

加味逍遙散　肝脾血虛有熱遍身搔癢或口燥咽乾發熱盜汗食少嗜卧小便澁滯等症又治瘰癧流注虛熱等瘡熱入血室等症

炙甘草　當歸炒　芍藥酒炒　茯苓　白朮炒各一錢　柴胡　丹皮　山梔炒各五分

水煎服

逍遙散　即前方去丹皮山梔

加味小柴胡湯　治經水適來傷寒或經水適止傷寒晝則明了夜則發熱譫妄如狂　即小柴胡加生地黄牡丹皮

心胸嘈雜

婦人嘈雜此脾胃鬱火痰滯血液淚汗而成用豬血炒食之乃以血導血而使之歸源耳旋覆花湯尤善

薛氏曰若因食鬱用六君子山查山梔若因胃熱用二陳姜炒芩連若因六鬱用越鞠丸若因氣滯用四七湯桔梗枳殼大抵此症屬病氣元氣俱不足須用六君子為主少佐以治痰之藥若以火治之必變吞酸中滿

一婦飲食少思胸中嘈雜頭暈吐痰此中氣虛而有熱用六君子湯加炒黑梔子桔梗而愈後因勞役頭暈發熱吐痰不食用補中益氣加半夏

茯苓天麻而痊
一婦中脘嘈雜口中辛辣或咳嗽吐痰發喘面色或白或赤此脾氣虛而肺中伏火也用六君子加山梔桔梗柴胡及炒黑片芩治之愈
一婦嘈雜吞酸少食大便不結此脾氣虛寒而下陷用補中益氣湯加茯苓半夏炮姜漸愈又常服人參理中丸而安
一婦飲食後嘈雜吞酸此食鬱為痰用六君子送越鞠丸漸愈又用加味歸脾湯而痊後因怒而

脇脹痛中脘作酸四君子湯送左金丸漸安仍用六君子湯送越鞠丸而痊

旋覆花湯　治脾胃虛寒中脘停痰汪洋嘈雜腸鳴多唾嘔吐不食脇肋脹痛脉沉遲弦細

細辛　旋覆花　橘紅　桂心　人參
炙甘草　苦梗　白芍　半夏各五分　赤茯苓二分

用水加姜煎服

又心胸嘈雜茯苓補心湯最妙

茯苓補心湯　治面色黃瘁五心煩熱咳血吐血及嘈雜潮熱等症

半夏　前胡　紫蘇　茯苓　人參
枳殼炒　桔梗炒　炙甘草　乾葛各五分
川芎　川歸　白芍　陳皮各一錢
熟地黃各一錢半　入姜棗水煎服

痃癖癥瘕

婦人痃癖因元氣虛弱而邪氣積聚蓋痃癖者在腹內近臍左右有筋脉急痛如臂如指如弦之狀癖者僻在兩脇之間有時而痛皆陰陽不和

經絡痞隔飲食停滯冷氣固結而成也

婦人臟腑調和經脉循環則月水以時故能生子而無病若乘外邪而合陰陽則小腹胸脇腰背皆相引而痛月事不調陰中腫脹小便淋瀝面色黃黑則癥瘕生矣癥者痛也瘕者假也脉弦急者生虛弱者死尺脉濇浮牢為血實氣虛腹痛逆氣上行此為胞中有惡血久則結成瘕也

張子和曰遺溺閉癃陰痿脬痺精滑白淫皆男子之疝也若血涸月事不行行後小腹有塊或時

動移前陰突出後陰痔核皆女子之疝也但女子不謂之疝而謂之瘕

婦人積年血癥由寒溫失節脾胃虛弱月水不通相結盤牢久則腹脇苦痛宜用三稜煎主之

治痃癖神効　以豶猪肝一具重十餘兩用巴豆仁五十枚入肝內用釅醋三碗慢火熬乾研爛量入三稜末丸作梧子大每服五丸食前熱酒下

經行腹痛乃痃癖癥瘕局方積氣丸妙

蘆會丸　治疳癖肌肉消瘦發熱潮熱飲食少思口乾作渴或肝疳食積口鼻生瘡牙齦蝕爛等症

蘆會　胡黃連　黃連炒焦

木香　白蕪荑炒　青皮各五錢　當歸

茯苓　陳皮各一兩半　炙甘草七錢

右為末米糊丸梧子大每服七八十丸米湯下

麝香丸　治痃癖冷氣心腹作痛

射香二錢另研　五靈脂炒　阿魏九錢麪包煨好熟

桃仁　三稜醋製各二兩　芫花醋炒　檳榔各一兩

莪朮醋煨　桂心　沒藥　木香　當歸各五錢

右為末飯丸梧子大每服十丸淡醋湯下

阿魏膏　治一切痞塊更服胡連丸

羌活　獨活　玄參　官桂　赤芍

生地　川山甲　兩頭尖　大黃

白芷　天麻各五錢　紅花四錢　木鱉子十枚去殼

亂髮五錢　槐柳桃枝各三錢

右用香油二觔四兩煎黑去渣入髮油內煎髮化仍去渣徐下黃丹煎軟硬得中入芒硝阿魏蘇

合香油乳香沒藥各五錢射香三錢調勻成膏攤貼患處內服丸藥　凡貼膏藥先用朴硝隨患處鋪平半指厚以紙蓋用熱熨斗熨之良久如硝耗再加熨之二時許方貼膏藥　若是肝積加蘆會末同熨

乾漆散　治疝瘕脇肋疼痛

乾漆炒令烟盡　木香　芫花醋炒　赤芍　桂心

川歸　川芎　琥珀各五錢　大黃炒二兩　牛膝一兩

桃仁去皮尖一兩另研　射香一錢

右為末每服一錢溫酒調下

桃仁煎　治血瘕

　桃仁　大黃各炒一兩　䖟虫炒黑五錢　朴硝一兩

右為末以醇醋一鍾石器中煮三分下前三味不住手攪煎至可丸下朴硝丸梧子大不吃晚食五更初溫酒下五丸日午下穢物如未見再服仍以調氣血藥補之此方乃峻劑也下血塊與積甚速氣血虛者慎之

大硝石丸　治七癥八瘕當用此藥去之不令人困

　大黃四兩　硝石三兩　人參一兩　甘草八錢

右為末苦酒一升石器中先入大黃煎膏入餘藥丸梧子大每服三十丸米飲下三日一服宜下赤物

蟠葱散　治寒氣不散疝瘕脹痛脇肋痛甚神效男子婦人脾胃虛冷氣滯不行

　延胡索　肉桂　乾姜炮各四分　蒼术米泔水浸一宿

　甘草炒各二錢　砂仁　檳榔　丁皮各一錢

　三稜煨　莪术煨　茯苓　青皮去白各七分

連根葱白一莖水二鍾煎至熱服

寶鑑蒺藜湯　治陰疝小腹作痛小便不利手足逆冷或脇腹悶痛

　蒺藜子去刺　大附子炮　梔子仁各半兩

右為末每服三錢水煎食前服

川山甲散　治癥痞瘀血心腹作痛

　川山甲灰炒　鱉甲醋炙　赤芍　大黃炒

　乾漆炒烟盡　桂心各一兩　川芎　芫花醋炒

　歸尾各兩半　射香一錢

右為末每服一錢酒調下

三稜煎　治血癥血瘕食積痰滯

　三稜醋浸　莪术製全上各三兩　青皮去白　半夏

　麥芽炒各一兩

右用好醋一鍾煮乾焙為末醋糊丸梧子大每服三四十丸淡醋湯　痰積生姜湯下

脬轉小便不利

婦人脬轉或內熱傳於脬或忍小便氣逆於內以致小腹急痛不得小便甚者至死

薛氏曰前症不問男女孕婦轉筋小便不利命在

反掌非八味丸不能救
一婦因鬱怒小便滴瀝漸至小腹腫脹痰咳喘促
用八味丸料煎服小便即利而痊
葱白湯　治氣滯小便不通腹脹欲死
陳皮三两　葵子一两　葱白一莖　水煎分三服
八味丸　治轉脬小便不通殊有神効但世所
不用以致悞人　方見虛損
滑石散　脬轉数日不通
滑石一两　寒水石二两　葵子一合　右研以水

一斗煮至五升每服一升即通利
又方　亂髮煅　葵子　車前子　各等分酒
調下二钱
强忍小便致脬轉尿不利困篤欲死
滑石二两　髮灰一两　為末每服三钱桃白皮
一觔細切搗熟入水三盞絞取汁調服
千金翼用杏仁去皮尖二十枚麸皮炒黄嚼細水
送下立通
一方　皂角為末吹鼻内取嚏

石葦湯　治脬轉小便不通及小便實熱氣滯
淋瀝
石葦　黄芩炒　木通　葵子　榆白皮　瞿麦
甘草各五分　加生姜水煎服
小便数
薛氏曰小便数頻若肝經火動用逍遥散加龍膽
草車前子
膀胱火動六味地黄丸加麦門冬五味子
肝腎湿熱龍膽瀉肝湯　鬱傷肝脾加味逍遥散

加味歸脾湯　脾肺氣虛補中益氣加麦冬五
味　肝經血虛加味逍遥散　腎氣虛敗鹿茸
散如不應用八味丸
桑螵蛸散　治腎氣虛寒小便数少或時頻数
或夜間尤数
桑螵蛸十枚炒　鹿茸炙　牡蛎煅　炙甘草
炙黄蓍　右為末每服二三钱食前空心用
姜湯調下日二服
縮泉丸　治脬氣虛寒小便頻数或遺尿不住

小兒丸効

烏藥　益智仁　各等分為末酒煮山藥糊為丸梧子大每服七十丸塩酒或米飲下

鹿茸散　治腎氣虛寒便溺数甚或夜間頻数遺溺

鹿茸炙　烏賊魚骨　桑寄生　川歸　龍骨煅各二两　白芍炒　附子炮各三錢　桑螵蛸炙五錢

右為末每服二錢空心并食前温酒調下作丸亦可

遺尿失禁　附小便出屎　其名交腸病也

内經曰胞移熱於膀胱則癃溺血膀胱不利為癃不約為遺溺註云膀胱為津液之府水注由之然足三焦脉實約下焦而不通則不得小便足三焦脉虛不約下焦則遺溺也靈樞曰足三焦者太陽之别也並太陽之正入絡膀胱約下焦實則閉癃虛則遺溺

良方曰此乃心腎之氣失其常度故有便道澁而遺者有失禁而不知自遺者亦有傷産傷膀胱不時而遺者有脬寒臟冷而不自知者

薛氏曰設肝腎虛熱廷孔痿痹用六味丸如不應用加减八味丸陽氣虛憊膀胱積冷用鹿茸丸如不應用八味丸若脾氣虛弱不能禁止用補中益氣湯加山藥山茱萸五味若肺氣虛寒前湯加桂附此症屬虛熱者多真寒者少治宜審察

一婦小便自遺或時不利日晡益甚此肝熱陰挺不能約制用六味丸料加白术黄柏酒炒各七分知母五分数劑諸症悉愈若悮用分利之藥愈損真陰必致不起

一老婦患前症悪寒體倦四肢逆冷余以為陽氣虛寒用補中益氣湯加附子三劑不應遂以參附湯四劑稍應仍以前藥而安附子計用四枚人參三觔許

一婦病愈後小便出屎此陰陽失於傳送名大小腸交也先用五苓散二劑而愈又用補中益氣湯而安

鹿茸丸　治陽氣虛小便白濁滑数不禁或臍

腹陰冷大便不實

鹿茸炙 椒紅 桂心 石斛 附子炮 牡蛎煅 補骨脂炒 肉蓯蓉 雞肶皮炙 沉香各一兩 桑螵蛸三錢炙

右為末酒糊丸梧子大每服三十丸空心溫酒下

秘元丹 治陽氣虛小便不禁或夜多小便頻數

白龍骨三兩煅 訶子十枚去核 砂仁一兩

右為末糯粥丸梧子大空心鹽湯下五十丸酒亦可

又方 鹿角鎊屑炒為末每服三五錢空心熱酒調下

又方 雞膍胵炙為末每服二三錢空心食前酒調下日三次

又方 桑螵蛸酒炒為末每服二錢空心姜湯調下

終

赤水玄珠婦人門第二十一卷目錄

小便出血　陰腫
陰痒　陰挺下脫
陰瘡　交接輒血出痛
胎前惡阻痰逆　胎動不安
胎漏下血　胎氣上逼
妊娠心腹痛　妊娠腰背痛
妊娠小腹痛　妊娠心腹脹滿
妊娠數墮胎　胎不長
墮胎血下不止　未足月欲產
過期不產　妊娠欬嗽
妊娠吐血衄血　子煩

赤水玄珠婦人門第二十一卷

新安生生子孫一奎著輯

小便出血

良方曰心主於血通行經絡循環臟府得寒則凝澁得熱則妄行失其常道則溢滲於脬則小便出血也

薛氏曰前症肝經血熱者加味逍遥散怒氣血傷者同治調送血餘灰妙若肝經風熱用前散送子芩丸氣血俱虛者八珍散送血餘灰膏粱積熱者清胃散加槐花甘草風熱傷胃者四君子加防風枳壳胃虛不能攝血者補中益氣鬱結傷脾不能攝血者濟生歸脾湯

一婦小便出血服四物蒲黄之類更加發熱吐痰加芩連之類又飲食少思虛症蜂起肝脉弦而數脾脉弦而緩此因肝經風熱為沉陰之劑脾傷不能統血發生諸臟而然也用補中益氣六味地黄丸而痊

蒲黄鹿茸散　治勞損尿血發熱内熱或寒熱往來口乾作渴

蒲黄炒　鹿茸炙　當歸　生地　葵子炒

續斷酒炒各等分　為末每服二錢酒調日三服

髮灰散　起居所傷小便尿血或忍尿脬轉臍下急痛小便不通又治肺疽心衄内崩吐血舌上出血俱妙 本草云能療瘀血通關膈利水道破癥瘕癰腫狐疝刺痛疰雜瘀痺脬轉通大小便止咳嗽鼻衄　右每服二錢米醋湯調下

生地黄散　血熱尿血

生地二錢　黄芩炒五錢　阿膠炒　側栢葉炒各一錢

右水煎食前服

當歸散　血分熱尿血

川歸　羚羊角屑　赤芍各五分　刺薊葉一錢

生地一錢　右水煎服

又方　治血分有熱生地黄搗汁每用一小盞日三服

又方　治血分熱尿血用炒蒲黄末每以二錢溫酒下

鹿角膠散　鹿角膠炒為末二兩作二服長流水調妙

陰腫

良方曰陰腫曰胞絡素虛風邪客之乘于陰部血
氣相搏故也
薛氏曰氣血虛弱補中益氣湯肝經濕熱龍胆瀉
肝湯又當與陰痒陰挺陰冷相參而治
又云一婦陰中腫悶小便澁滞兩脇作腫內熱晡
熱月經不調時或寒熱此因肝經鬱怒元氣下
陷濕熱壅滞朝用歸脾湯加柴胡升麻解鬱結
補脾氣升元氣夕用加味逍遥散清肝火生肺
血除濕熱各數劑諸症悉愈又用四君芎歸卅

皮調補肝脾而經水如期
菖蒲散 治月水澁滞陰户腫痛
菖蒲 當歸各一兩炒 秦艽二兩
右每服五錢入葱白水煎服
白礬散 治陰腫堅痛
白礬五錢 甘草五分 大黃一兩
右為末水調如棗大綿裹內陰中一日兩換
以愈為度
陰痒

良方曰陰痒為三虫在腸胃之間因臟虛而蝕輕
則陰中痒甚則陰中痛也
生生子曰前症亦有虛者古人有用人參一兩煎
湯服之而愈予曾治一宦婦年廿一疹出未彌
月而犯房事熱因下陷陰中痒甚每一發神䰟
飄然兩手扒壁口中咬物鮮血淋漓瓜脱肉破
而不遑顧七日肌肉如削諸洗摶方歴試無功
作虫治尤劇欲懸梁求死予為籌之乃虛熱陷
入至陰當從陰引陽以黃芪六錢甘草二錢防

風一錢柴胡二錢水煎食前服之其疾頓止此
引金伐木之法也
薛氏曰前症屬肝經所化當用龍胆瀉肝湯逍遥
散以主其內外以桃仁研膏和椎黃末或鷄肝
內陰中以制其虫
一婦胸膈不利內熱作渴飲食不甘肢体倦怠陰
中悶痒小便赤澁此欝怒傷肝脾所致用歸脾
湯加山梔而愈復因怒患處并小腹脹痛用小
柴胡加芎歸山梔芍藥痛止用山梔入逍遥散

而痊又因勞役患處腫脹小便仍澁用補中益
氣加山梔茯苓丹皮而瘳
一方 新萞葉搗綿裹內陰中一日三易
大黃散 治陰痒
大黃微炒 黃芩 黃芪炙各五兩 赤芍 玄參
蛇床子 山茱萸 為末酒調服二錢
又方 杏仁燒灰乘熱綿裹納陰中日二易之
又詩曰 玉戶生瘡時痛痒皆因房色損其元黃
葱水洗二三次杏仁燒灰油調塗加麝香尤妙
八 廿一卷 五
又方 鯽魚胆搽之妙
陰挺下脫
良方曰婦人陰挺下脫或曰絕絡傷損或曰子臟
虛冷或曰分娩用力所致
薛氏曰前症當升補元氣為主若肝脾鬱結氣虛
下陷用補中益氣湯若肝火濕熱小便澁滯龍
胆瀉肝湯
一婦陰中突出如菌四圍腫痛小便頻數內熱晡
熱似痒似痛小便重墜此肝脾鬱結蓋肝火濕

熱而腫痛脾虛下陷而重墜也先以補中益氣
加山梔茯苓車前子青皮以清脾火升脾氣更
以加味歸脾湯調理脾鬱外以生猪脂和藜芦
末塗之而收
一婦陰中挺出五寸許悶痛重墜水出淋漓小便
澁滯夕與龍胆瀉肝湯分利濕熱朝與補中益
氣湯升補脾氣諸症漸愈再與歸脾湯加山梔
茯苓川芎黃柏間服調理而愈後因勞役或怒
氣下部濕痒小水不利仍用前藥即愈
八 廿一卷 六
一方[illegible] 治陰挺下脫 當歸 黃芩各二兩 牡蠣二兩半
蝟皮炙一兩 赤芍半兩 右為末每以二錢食前溫
酒調下米飲亦可
治陰挺長出玉戶數寸者疼痛不可忍飲食不進
用前方治其內仍以 大黃 山茨姑 石羔
牡蠣 乳香 為細末水調揣熱捏作条子如
中指大陰乾挿入玉戶其痛即止
陰瘡
薛氏曰此症乃七情鬱火傷損肝脾濕熱下流其

外症陰中突出如蛇如菌如鷄冠或生虫湿痒或潰爛出水或腫悶墜痛其内症体倦内熱經候不調或飲食無味晡熱發熱或胸脇不利小便痞脹或赤白帶下小水淋濇其治法腫痛者四物加柴胡丹皮山梔胆草湿痒者婦脾湯加柴胡山梔丹皮淋濇者龍胆瀉肝湯加白术丹皮潰腐者逍遥散山梔川芎腫悶墜痛者補中益氣湯加山梔丹皮佐以外治之法

一婦素性急陰内痛小便赤濇怒而益甚或發熱或寒熱此肝經湿熱所致用芎帰炒梔柴胡苓术丹皮澤瀉炒芍車前炒連甘草數剤漸愈乃去黄連澤瀉又數剤全愈

一婦臍腹上下并玉户遍生湿瘡状如馬爪瘡他處並無熱痒而痛大小便濇出黄汁食減身面微腫衆作惡瘡治反剥愈痛急令洗去乃用馬齒莧四两青黛一両同擣爛敷瘡上即時痒止痛定而熱亦退仍服八政散日三服分散客熱每數藥僅得一時久藥已乾燥再塗新湿藥又安凡如此二日僅減三之一五日減三之二自此二十日全安　縁此婦嗜酒貪啗魚蟹發風之物而中下焦蓄風熱之毒氣當作腸瘫内痔等疾后當禁酒及發毒之物

一方　治玉户生瘡　杏仁燒存性　雄黄　明凡各五錢　麝香一錢二分　右為末敷之

又方　飛丹研極細生桐油調搽二三日効

交接輙血出痛

薛氏曰一婦每交接便血出作痛此肝火動脾而不能攝血用補中益氣濟生婦脾二湯而愈若出血過多而見他症但用前藥調補肝脾

千金方　療交接血出　伏龍肝　桂心等分

為末每服一錢酒調下

胎前悪阻及痰逆不食

悪阻者謂嘔吐悪心頭眩悪食擇食是也脉息和順但覺肢体沉重頭目昏眩好食醎酸甚者或作寒熱心中憒悶嘔吐痰水不能支持古謂之子病由胃氣怯弱中脘停痰之所致也

薛氏曰脾胃虛弱嘔吐不食用茯苓半夏湯蓋半夏乃健脾化痰滯之主藥也痰涎壅滯飲食少思胎氣不安為必用之藥須倍加白朮然半夏白朮陳皮砂仁善能安胎氣健脾胃也予嘗用之驗甚若兼氣惱更加柴胡因風寒須用參蘇飲

生生子曰前症亦有因火者故丹溪用抑青丸前人亦有用瀉生竹茹湯者予歷歷見為火症者多寒者間而有之亦有愈治而愈逆者便當勿藥待之俟胃氣和當自瘳矣

茯苓半夏湯 姙娠脾胃虛弱飲食不化嘔吐不止

半夏泡炒黃 陳皮各一錢 白茯苓二錢 砂仁炒一錢 炙甘草五分 姜棗烏梅水煎服二帖后用茯苓丸

茯苓丸 姙娠煩悶頭暈聞食吐逆或胸腹痞悶

赤茯苓 人參 桂心 炮姜 半夏泡黃炒 橘紅各一兩 白朮炒 葛根 甘草炙 枳殼麩炒各二兩

右蜜丸梧子大每服五十丸米飲下日三服

白朮湯 胃虛惡阻吐水甚至十餘日粥湯不入

白朮炒一錢 人參五分 丁香 炙甘草各二分

右姜水煎服

保生湯 姙娠惡阻少食嘔吐或兼吐瀉作渴

人參一錢 炙甘草 白朮炒 香附 烏梅 橘紅各五分 右姜水煎服

仲景乾姜人參半夏丸 治姙娠嘔吐不止

乾姜 人參 半夏等分 為末姜汁糊丸梧子大米飲下十口三服

歸原散 惡阻嘔吐不止頭痛全不入食諸藥無効

人參 甘草 川芎 當歸 芍藥 丁香各五錢

茯苓 白朮 陳皮各一兩半 桔梗炒 枳殼炒各二兩半 半夏泡炒黃一兩 右每服五錢加姜六片棗一枚水煎服已上五方治寒痰惡阻之劑也

竹茹湯 惡阻嘔吐不下食 青竹茹 橘紅各二兩 生姜 茯苓各四兩 半夏五兩 右水六升煮取二升半分三服

人參橘皮湯 惡阻嘔吐痰水 人參 橘皮 白朮 麥冬各一兩 甘草三錢 厚朴制 白茯苓各五錢

右每服五錢加青竹茹一錢生姜三片水煎服

姙娠嘔吐痰水不食　生芦根一兩　橘紅七錢
生姜一兩　梹榔三錢　右作三次水煎服
姙娠惡食心中煩憒熱悶嘔吐　竹茹　麥冬各三兩
前胡二兩　橘紅一兩　芦根一握　水一大升煮半
升作二次食前服　已上四方治熱痰惡阻之劑也
羅太無半夏茯苓湯　惡阻心中憒悶頭目眩暈
四肢怠倦百節煩痛胸膈痰逆嘔吐惡心嫌聞
食氣好噉酸鹹多卧少起全不進食先服此湯
次服前茯苓丸　半夏泡炒黃兩二錢一　赤茯苓

熟地黃各七錢半　芍藥　旋覆花千金方無此兩有細辛紫蘇
橘紅　人參各半兩　川芎　桔梗　甘草各五錢
右每服五錢姜七片水煎空心服○若有客
熱煩渴口瘡去橘紅細辛加前胡知母七錢半
若腹冷下利去地黃加炒桂心五錢○若胃中
虛熱大便秘小便赤澁加六黃七錢半　去地黃
加黃芩二錢半

胎動不安

姙娠胎動或飲食起居不節或衝任經虛或因過
酒房室擊觸跌撲損動臟府或脾氣虛弱誤服
藥餌或感冒風寒當各推其因而施治之有因
母病而胎動者但治其母而胎自安有胎不堅
固動及母疾但安其胎而母自愈面赤舌青其
胎已死面青舌赤吐沫其母必死唇口色青兩
邊沫出子母俱死也
薛氏曰前証胎氣欝滞者紫蘇飲脾氣虛弱者六
君子湯加紫蘇枳壳欝結傷脾者歸脾湯加柴
梔欝怒傷肝脾者四七湯加芎歸怒動肝火者
加味小柴胡湯若胎已死急用平胃散加朴硝

腐化之
丹溪曰產前當清熱養血因火動胎逆上喘急者
以条芩香附之類為末調下墮胎乃氣虛血虛
血熱所致懐姙嗜物乃一臟之虛黃芩安胎妙
藥乃上中二焦之劑能降火下行加白朮為安
胎聖藥也俗不知以為寒而不取用殊不知產
前宜清熱令血循經而不妄行故能養胎
又曰將臨月胎熱以三補丸加炒香附白芍飩餅

為丸服抑熱以三補丸以地黄膏爲丸〇孕至
八九個月必用順氣須枳殼紫蘇梗
固胎方法　川芎　地黄　黄芩各五分　歸身
人參　白芍　陳皮各錢　白朮一錢半　甘草三分
黄栢　黄連俱少許　桑寄生一錢　右每服五六錢
加糯米五十粒水煎服　血虛不安者加阿膠
腹痛者加砂仁能止痛安胎行氣故也一方無黄芩
連名固孕丸
仲景云姙娠宜常服當歸散　當歸　黄芩
芍藥　芎藭各一兩　白朮半斤　右爲末酒調服方
寸七日二服常服之即易産胎無苦疾産後百
病悉主之
肘後方　治胎動不安　取苧根如足大指者一
尺水煎服一方有生姜五片○丹溪云苧根大能補陰血而行滞血
立効散　治胎動不安如重物所墜冷如氷即佛手散也
縮砂散　治胎動不安墮在須臾痛不可忍神効
砂仁連殼炒黑為末　每服二錢酒下
鈎藤湯　主姙娠胎動腹痛面青冷汗氣欲絶者

鈎藤鈎　當歸　茯神去木　人參各一錢　苦梗一錢半
桑寄生一錢　右水煎服煩熱者加石膏
黄芪湯　氣虛胎動腹痛下水　糯米一合　炙黄芪
川芎各一兩　水煎分三服
順氣飲子　産前服之安胎　紫蘇葉　木香煨
人參　草荳蔻　茯苓各一兩　炙甘草五錢
大腹子一兩氣虛者去之　右每服三五錢加苧根三
寸糯米三十粒水煎服
安胎寄生湯　姙娠下血或胎不安或腰腹痛
桑寄生　白朮各五分　茯苓四分　甘草一錢　水煎服
安胎飲　躰倦惡食或胎動腹痛或下血發熱腰痛
炙甘草　茯苓　川歸　熟地　川芎　白朮
黄芪　白芍炒　半夏泡　阿膠炒　地榆各五分
加姜棗水煎服
又方　好銀煮取水入葱白作姜食之妙
生生子曰按良方云姙娠婦人倘氣血虛弱無以
滋養其胎終不能成也宜下之以免其禍若胃
氣壯實衝任榮和如魚之處淵得其所也宜必

盡方技以補養之庶無所悞設曰病而胎不能安者不得不下之藥劑亦須謹慎

桂心散　姙娠因病而胎不能安者以此下之

桂心　瓜蔞　牛膝　瞿麥各五分　歸尾一錢

右水煎服

又方　牛膝一兩　酒煎食前空心服下

又方　生鷄子一枚　塩三錢　攪勻服之立下

佛手散更妙　凡胎死者即下生者即安

胎漏下血　附卒然下血下如荳汁

八　廿二卷　一五

良方曰姙娠經水時下由衝任氣虛不能約制盖心小腸二經相為表裏上為乳汁下為月水故姙娠經水壅之以養胎蓄之以為乳若經水時下名曰胞漏血盡則斃矣

丹溪曰胎漏有因氣虛者有因血虛者有因血熱者不可不察也

薛氏曰前症有風熱者以防風黃芩丸若因血熱加味逍遥散血虛二黃散血去太多八珍湯未應補中益氣湯若因肝火用柴胡山梔散脾虛加味帰脾湯若因事下血作痛八珍湯加阿膠熟艾脾胃虛者補中益氣湯加五味子下陥者倍升麻柴胡晡熱内熱用逍遥散亦有血氣盛養胎之外而有餘者不必服藥

卒然下血良方謂冷熱不調七情失宜氣血不和所致若傷於胎則痛血去多則墮矣　薛氏云前症氣怒者小柴胡湯風熱用一味防風丸血熱用一味子芩丸脾氣虛六君子湯中氣下陥補中益氣湯

八　廿卷　一六

一婦姙娠六月每怒下血甚至寒熱頭痛脇脹腹痛作嘔少食予謂寒熱頭痛乃肝火上冲脇脹腹痛乃肝氣不行作嘔食少乃肝侮脾胃下血乃肝火血熱用小柴胡加芍藥炒黒山梔茯苓白术而愈　訶子能止胎漏及胎動欲生脹悶氣喘

安胎散　治卒然腰痛下血

熟地　艾葉　白芍炒　川芎　黄芪炒　川歸

阿膠炒　甘草炙　地榆各五分　加姜棗水煎服

子芩丸　治肝經有熱妄行用細条芩沉實者炒為末每服一錢以鉄秤鎚燒赤淬酒熱調服若脾胃虛者不宜用

防風丸　治肝經有風血囙妄動而不歸經

防風為末每服一錢白湯調下

防風黃芩丸　治肝經有風熱致血崩便血尿血

用条芩炒焦防風等分為末酒糊丸梧子大每服三五十丸食前米飲或酒下

二黃散　治胎漏下血或內熱晡熱或頭痛頭暈煩躁作渴或脇肋脹痛等症

生地　熟地　為末每用三錢煎白朮枳殼湯調服（二黃杵膏為丸尤妙瘦不枯槁而有力也）

芎歸膠艾湯　妊娠下血腹中痛為胞阻以此安之

艾葉　阿膠炒　川芎　當歸各三兩　甘草一兩

右細切以水八升煎取三升内膠溶盡分三服

立聖散　治妊娠下血不止

鷄肝三枚用酒一升煮熟頓食之大効

阿膠散　妊娠無故下血不止

阿膠三兩炒為末酒一升半煎令溶一服愈

又方　治血熱下血及胎漏下血不止

阿膠二兩為末　生地黃半斤擣取汁以清酒三升絞汁分三服

又方　治胎漏下血不止胞乾即死宜急治之

生地黃汁一升　陳酒五合　全煎三五沸温三服（以止為度）

枳殼湯　治虛熱胎漏下血或囙事下血

枳殼　黃芩各半兩　白朮一兩　水煎食前分三服

本事方　治胎下血不止

尨奴（尨樹上乾不落尨子是也）燒存性為末水調服妙

妊娠胎漏下黃汁或如荳汁白漿或如赤荳汁予歷見此症不早治其胎必墮

大全方　治妊娠忽然下黃汁如膠或如荳汁胎動腹痛乃氣虛也

糯米五升　黃芪六兩　水七升煎取二升分四服

薛氏云若肝脾湿熱用升陽除湿湯肝脾風熱加味逍遥散肝脾鬱怒加味歸脾湯脾胃氣虛用錢氏白朮散若脾氣下陷補中益氣湯風入腸

胃用胃風湯

東垣升陽除濕湯　治婦人女子漏下惡血月事不調或暴崩不止多下水漿之物皆由飲食失節或勞傷形軀或素患心氣不足因飲食勞倦致令心火乘脾其脉緩而弦急按之洪大皆脾土受邪也

柴胡　羌活　蒼术　黄耆(炒各一錢半)　防風　升麻

甘草(炙)　藁本(各一錢)　蔓荊子(七分)　獨活　當歸(各五分)

右水煎食前服

胃風湯　治風邪乘虛客於腸胃水谷不化泄瀉下注腹脹虛滿腸鳴作痛及腸胃虛熱下如荳汁或瘀血日夜無度

人參　白术　茯苓　川芎　川歸　白芍

桂皮　粟米　右水煎食遠服

銀苧酒　治妊娠下黄汁或如赤荳汁

苧根(去黑皮)　好銀(各一斤)　水九升煮取四升每服入酒半升煎分二服

脉經曰婦人懷軀六月七月暴下斗餘水其胎必倚而墮此非時孤漿預下也(胎漏下水乃徐徐而下今暴下而多)故知胎墮

胎上逼(子懸也)

妊娠將養如法則血氣調和胎得其所而産亦易否則胎動氣逆上逼臨産亦难甚至危矣

陳良甫云治一婦人有孕七個月遠歸忽然胎上冲心而痛坐卧不安兩醫治之無效遂説胎已死矣用萆麻子研爛加射香貼臍中以下之命在垂亡召陳胗視兩尺脉絶他脉平和陳問二

醫作何症治答曰死胎也陳曰何以知之曰兩尺脉絶是以知之陳曰否此子懸也若是胎死却有辨處面赤舌青子死母活面青舌赤吐沫母死子活唇口俱青母子俱死今面不赤舌不青其子未死是胎上逼心宜以紫蘇飲治之至十服其胎遂不逼而下安矣

紫蘇飲　治妊娠胎氣不和逼上脹滿疼痛(謂之子懸)兼治臨産驚恐氣結連日不下

紫蘇葉(一兩)　大腹皮　人參　川芎　陳皮

白芍各五錢　當歸三錢　甘草一錢　右剉分三服
每服加姜四片葱白七寸水煎至七分空心
服○曾有累日産不下遍服催生藥不効此
必坐草少早心存一點畏懼氣結而不行非
不順也素問云恐則氣下蓋恐則精神怯怯
則上焦閉閉則氣還還則下焦脹氣乃不行
得此藥一服便産及治妊娠六七月子懸每
用此數數有驗不十服胎便近下而安
大全方　治胎上逼煩悶併治胎動困篤
八廿一卷　廿二
葱白二七莖濃煮汁飲之若胎未死則安已死
即下如未効再服○若脣口青黒手足厥冷
須佐以當歸湯○本草云葱白通陽氣安胎此方神妙脉浮滑者宜之
當歸湯　治胎動煩躁或生理不順脣口青黒手
足厥冷　人參　當歸　阿膠炒　炙甘草各一錢
葱根連白一握　右水四碗煎四味減半去渣入葱
再煎至一碗分二服
薛氏云一妊婦每因恚怒其胎上逼左關脉絃洪
乃肝火内動用小柴胡加茯苓枳殼山梔而愈

但躰倦不食用六君子調養脾土加柴胡枳殼
調和肝氣乃瘥
又一妊婦胎上逼胸滿噯氣飲食少思此脾氣鬱
滞用紫蘇飲頃安又用四君子加枳殼柴胡山
梔而瘥
大聖散　治妊娠怯悸夢驚心腹脹滿連臍急痛
白茯苓　川芎　麥冬　黃芪炒　川歸各一錢
人參　炙甘草　木香各五分　加生姜水煎服
白朮湯　妊娠遍身痛或冲心欲死不能飲食
八十二卷　廿三
白朮五兩　黃芩二兩　芍藥四兩　右水六升煮取
二升半分三服○緣胎有水致痛兼易産
妊娠心痛腹痛
妊娠心腹痛或宿有冷疾或新觸風寒或痰飲相
搏若痛傷胞絡必至動胎甚則傷墮
妊娠卒心痛氣欲絶
川芎　當歸　茯苓　厚朴制各一錢　水煎服
當歸芍藥湯　妊娠心腹急痛或去血過多而眩
暈　白芍炒　當歸　茯苓　白朮炒

澤瀉各一錢 川芎二錢 右水煎服

阿膠散 治胎痛腹痛 白茯苓 白朮炒

川芎 阿膠炒各一錢 當歸 陳皮各二錢

甘草炒三分 右姜棗水煎服

熟艾湯 治姙娠心腹痛或吐血衄血

熟艾如拳大水煮服之効○中惡亦妙

有癥者宜去癥凡胎動多在當臍今動在臍上故知是癥也此症宜以

仲景桂枝茯苓丸主之

桂枝茯苓丸 姙娠腹痛不能忍或偶有所傷胎

〈 廿一卷 廿三

動不安命將絶者砂仁不以多少連皮炒黑

色或单用仁炒為末熱酒調下二錢不飲酒

者米飲下但覺腹中熱胎已安矣懸命須臾

者以砂仁湯吞桂枝茯苓丸又名奪命丸專

治婦人小產下血子死腹中其婦增寒手指

唇口爪甲青白面色黃黑胎上搶心悶絶欲

死冷汗自出或食物或誤食草藥傷動胎氣

下血不止胎或未損者服此即安胎已死者

服此即下腐爛者亦能取下此方原係異傳

丹溪亦称其神此即仲景桂枝茯苓丸但用

淡醋湯嚼下耳 桂枝 茯苓 牡丹皮

桃仁去皮尖 赤芍藥 右各等分蜜丸彈子大

淡醋湯嚼下一丸不知漸加至三丸

姙娠腰背痛

腎主腰胎繫于腰痛甚者或因劳役傷損則胎墮

也

薛氏曰若外邪所傷用獨活寄生湯劳傷元氣八

珍湯杜仲砂仁膠艾脾腎不足以前藥加白朮

〈 廿一卷 廿四

補骨脂氣血鬱滯用紫蘇飲加桔梗枳殼肝火

所動以小柴胡湯加白朮枳殼山梔肝脾鬱結

用歸脾湯加柴胡枳殼

一姙婦頸項強直腰背作痛此膀胱經風邪所致

用拔萃羌活湯一劑而愈又用獨活寄生湯及

八珍湯以祛邪固本而痊

通氣散 腎虛腰痛神効 破故帋炒為末空心

每服二錢嚼胡桃肉半個以温酒下

杜仲丸 治姙娠腰背痛 杜仲炒 川續斷酒浸

各等分為末煮棗肉為丸梧子大每服七十丸酒或米飲下

膠艾湯　治腰腹疼痛胎動欲落即前妊娠下血安胎飲是也　熟地　艾葉　白芍　川芎　黄芪　阿膠　川歸　甘草炒　各等分加姜棗水煎服

獨活寄生湯　治足三陰虛風濕所侵腰膝歷節作痛

獨活　桑寄生　續斷酒炒　杜仲姜汁炒　細辛　秦艽　牛膝酒炒　茯苓　白芍炒　桂心　川芎　防風　人參　熟地　川歸　粉草炙各五分　右水煎服

一婦苦腰痛數年不愈用白朮一味大劑服不三月而痊乃胃氣虛閉之症白朮能利腰臍之血故安胎而治痛也

拔萃羌活勝濕湯　治頭疼脊痛腰似折項似拔

羌活　獨活各一錢　藁本　防風　炙甘草各五分　川芎　蔓荊子各二分　右水煎服如身重腰沉沉然是濕熱也加黄柏一錢附子五分蒼朮二錢

妊娠小腹痛

薛氏曰一妊婦小腹作痛其胎不安氣攻左右或時逆上小便不利用小柴胡湯加青皮山梔清肝火而愈後因怒小腹脹滿小便不利水道重墜胎仍不安此亦肝木熾盛所致用龍胆瀉肝湯一劑諸症頓愈乃以四君子加柴胡升麻以培脾土而安

龍胆瀉肝湯　治肝經濕熱兩拗腫痛或小腹痛脇痛小便澁滯等症　龍胆草酒拌炒黄　澤瀉各一錢　木通　生地　川歸　車前子炒　山梔炒　黄芩炒　甘草各五分　水煎服

阿膠散陳氏名膠艾湯　不問妊娠月數深淺或顛仆或因毒藥胎動不安腰疼腹痛搶心短氣

熟地　艾葉　白芍　川芎　黄芪　阿膠　川歸　甘草炙各一兩　右㕮咀每服五錢入姜棗水煎服　金櫃方無黄芪

妊娠心腹脹滿

薛氏曰若外感風寒內傷飲食用藿香正氣散若

食傷脾胃用六君子湯若陽氣壅滞用紫蘇飲

一妊婦飲食停滞心腹脹满或用人參養胃湯加山查青皮枳壳其脹益甚其胎上攻惡心不食右関脉浮大按之則絃此脾土不足肝木所侮用六君子加升麻柴胡而愈後小腹痞悶用補中益氣湯升舉脾氣乃瘥

妊娠數墮胎

夫胎乃陽施陰化榮衛調和經水完全十月而產若血氣虚損不能養胎所以數墮也凡妊婦腰

痛多致墮胎

薛氏曰丹溪云陽施陰化胎孕乃成血氣虚乏不能榮養其胎則墜譬如枝枯則果落藤痿則花墜嘗治賈氏婦每有妊至三月前後必墜診其脉左右大而無力重則濇知其血虚也補其中氣使血自榮時正初夏教以濃煎白术湯下黄芩末二錢與數十帖得保而生因而思之墮於内熱而虚者於理為多曰熱曰虚蓋妊至三月上屬相火所以易墮不然何以黄芩熟艾阿膠

等為安胎之妙如此也大抵治法須審其月屬某經育養而藥之

生生子曰胎猶瓜也瓜生於藤藤肥而瓜壮未熟而凋者由藤槁而風揺也胎蔵母腹繫于命門命門者督脉之所循也又衝任二脉為血之海妊婦而經不行者血蓄以養胎也足月而生者猶瓜熟而蒂落也苟内無所傷外無所感何墮之有衝任督三脉一宗衝脉由氣街而行足少陰任脉起於胞門子户由會陰而行腹督脉繫

廷孔由會陰而行背歷長強循腰腧命門而上巔驗今之墮胎者苟非衝任之不足必由色慾之縱恣淫火一動則揺撼其督脉胞門亦由之而不閉胎斯墮也胎墮必腰痛者腰腧命門皆督脉之所歷胎又繫于命門故也觀牝獸之護胎則可推其所慎矣牝牡交合有節懷胎之後牡獸近身則蹄而遠之是以交而必孕孕而必育者由交合之有節也懷妊而不遠慾即幸不墮生子亦必脆弱多疾痘疹亦多險逆皆淫火

煅煉所致覌丹溪曰虛曰熱抑豈無其所自乎
予故揭而告諸保孕者當知其所慎重至于藥
劑則虛熱二字爲之本矣是以八珍阿膠杜仲
黄芪黄栢黄芩桑寄生香附爲安胎之妙者得
非治其本歟

凡保胎當理脾胃脾胃爲倉廩五臟六府之所稟
受胚胎由之以滋养也胃屬陽明陽明者衝任
之長也

一方　鯉魚二斤者一尾粳米一升用塩醤和煮
食之甚善一月食三次爲佳

芎藭補中湯　懷妊血氣不能榮養以致半産早
能服此預先補之不致于墮

乾姜煨　阿膠炒　芎藭　五味子各五分　黄芪炒
川帰　白术炒　杜仲炒　白芍藥各一錢　人参
木香　甘草炙各五分　右水煎服虛寒所宜

千金保孕湯　氣血不足每至三四月而墮當預服之
人参　黄芪　白术　川歸　甘草　黄芩
杜仲　桑寄生　川續斷　白芍藥　砂仁
加糯米五十粒水煎食遠服○若氣痞悶不
舒加厚朴蘇梗○若腹疼加熟艾葉香附○
見血下加升麻地榆椿根白皮阿膠

醋附丸　治數墮胎者此藥甚妙　亦治崩漏帶
下積聚癥瘕臍腹疼痛
香附子擦去毛　用好醋煮透焙乾爲末仍以醋打
糊爲丸梧子大每服三五十丸米飲下

脉經曰婦人懷胎一月之時足厥陰脉養之二月
足少陽養三月手心主脉養四月手少陽脉養
五月足太陰脉養六月足陽明脉養七月手太
陰脉養八月手陽明脉養九月足少陰脉養十
月足太陽脉養諸陰陽脉各養三十日手少陰
太陽不養者上爲乳汁下主月水也値養胎之
經者不可針灸犯之必墮胎

胎不長

良方曰姙娠而胎不長者因有宿疾或因失調以
致臟腑虧損氣血虛弱而胎不長也當治其疾
疾益其氣血則胎自長矣

生生子曰曾見一宦婦每姙至五六月則墮如此者三次胎甚瘦小詢知少時患哮嗽因而背駝軀亦矮小因腹中不舒其胎不能長后治其哮嗽再孕乃不墮竟足月而産一子此固偶然則良方宿疾之説似不誣矣

薛氏曰一婦胎六月躰倦懶食面黄晡熱而胎不長因劳欲墜此脾氣不足也用八珍湯倍加參术茯苓三十餘劑脾胃漸徤胎安而長矣

生生子曰昔在西吳有張氏婦年二十三孕逵三月迎予胗之其脉兩尺皆濇左手短弱右関不充據脉濇不當有姙而其夫云向已受胎者二俱彌月而産躰皆不完始無舌次無水火門户産下隨死而無生氣今第三孕矣心憂之以翁治法多竒思幸投劑而保全之也予以脉叅之多為神志不足因處一方曰壮神益志保孕湯即語之曰是方每月可服十帖過八月則不必服矣彼欣然從而服之足月産一女形全而氣壮及再有姙未服藥雖生一女完矣而頭面為

白膜遮蔽隠隠僅見耳目口鼻而亦随死也後又孕逵予婦省其婦心憂失措夫諭之曰無恐前保孕方在向以未服乃致乖舛今可亟服也照方服如前至期生一子而無恙舉家以此方為神録而置之香火堂中尸祝之此亦愚見之偶中者人以旋服旋効而遂神之也亦其家為富而甚不仁丘里啣之當其産而偵之其産而怪以為作惡之報迨産子而無恙即以鄙為保孕之神至今傳頌不衰也予因記其事并戒夫人之為悪者

壮神益志保孕湯　茯神　當歸　酸枣仁　人參　遠志　山藥　黄芪　鹿角膠各一錢　白术二錢　砂仁三分　甘草四分　加龍眼肉五枚枣二枚水煎服

黄芪湯　治姙娠不長更安胎和氣　黄芪炒　白术炒　陳皮　麥冬　白茯苓　前胡　人參各五分　川芎　甘草炒三分　右姜枣水煎服

集驗方　用鯉魚長尺許者如食法整理飲其汁

則胎漸大而長矣然亦須每月服數次為妙

墮胎後血下不止

墮胎後復損經脉而下血不止甚則煩悶致死皆以調補胃氣為主

薛氏曰一姙婦墮胎昏憒不時吐痰自用養血化痰之劑昏憒不省自汗發搐痰涎湧出彼以為中風欲用祛風化痰予曰此屬脾氣虛寒所致遂用十全大補湯加炮姜二十餘劑尋愈

墮胎下血煩滿寒熱狂悶鎊鹿角屑為末每服三錢水調下日三服

〈八 廿一葉 廿三

墮胎下血腹痛 阿膠炒一兩 艾葉五錢 水煎服

補中益氣湯 加鹿角膠一錢臨服入童便半酒杯立止

人參黃芪湯 治小產氣虛血下不止

人參 黃芪炒 當歸 白朮炒 白芍炒

艾葉各錢 阿膠炒二錢 水煎服

未足月欲產

姙娠未足月而痛欲產者知毋丸佳氣血不足者芎歸補中湯倍加知毋或八珍湯內加之血熱所宜

薛氏曰一姙婦八月胎欲墜如產卧久少安日晡益甚此氣血虛弱朝用補中益氣湯加茯苓半夏隨愈更以八珍湯調理而安

芎歸補中湯 治氣血虛而欲產

艾葉代姜 阿膠炒 川芎 五味子杵炒 川歸

白朮炒 黃芪炒 人參 芍藥炒各一錢

甘草炙五分 杜仲一錢 水煎作二次服

知毋丸 十月未足而痛如產兼治產難及子煩

〈八 廿一葉 卌四

知毋為末蜜丸梧子大米飲下三十丸或酒下

又方 月數未足而似欲產腹痛

槐子 蒲黃 等分為末蜜丸梧子大酒吞三十丸痛止為度 蒲黃一味以井水調服亦隹

千金方 治月未足而欲產

菖蒲根搗汁一二升灌下 本草云菖蒲治胎動不安下血

過期不產

姙娠月足而過期不產者當補血行滯羅先生以四物湯加香附萉仁枳殼縮砂紫蘇水煎服之

數帖即生

妊娠咳嗽

夫肺内主氣外主皮毛腠理不密寒邪乘之則咳嗽秋則肺受之冬則腎受之春則肝受之夏則心受之其嗽不已則傳于臟府妊娠病久不已則傷胎也

薛氏曰若秋間風邪傷肺用金沸草散夏火邪尅金用人參平肺散冬寒邪傷肺用人參敗毒散春風邪傷肺用參蘇飲若脾肺氣虛用六君子芎歸桔梗若血虛桑皮杏仁桔梗腎火上炎用六味丸加五味子煎服脾胃氣虛風寒所傷補中益氣湯加桑皮杏仁桔梗

又治一妊婦氣喘痰甚諸藥不効素有帶下始于目下有浮氣兩月其面亦然此氣虛而有痰飲也用六味丸料數劑而愈

一妊婦嗽則小便出此肺氣不足腎氣虧損不能司攝用補中益氣湯以培土金六味丸加五味以生腎氣而安

一妊婦咳嗽其痰上湧日五六碗許諸藥不應予以為此水泛為痰用六味丸料及四君子湯各一劑稍愈數帖而安

一妊婦因怒咳嗽吐痰兩脇作痛此肝火傷肺金以小柴胡湯加山梔枳殼白朮茯苓治之而愈

但欬作嘔此肝侮脾也六君子加柴胡升麻而痊

桔梗散　治風寒咳嗽喘急不食　天冬去心　赤茯苓各一錢　桑皮　桔梗炒　紫蘇　貝母　人參各五分　麻黃去節　炙甘草各三分　右加姜水煎服

馬兜鈴散　治咳嗽氣喘　馬兜鈴　苦梗　人參　甘草　貝母各五分　紫蘇一錢　橘紅　大腹皮　桑皮各一錢　五味子十粒　右姜水煎服

百合散　咳嗽胸膈煩悶　川百合　紫菀　麥冬　苦梗　桑皮各五分　甘草三分　竹茹二分　加姜水煎服

妊娠傷寒涎多咳嗽　知母　杏仁　天冬　桑皮各五分　姜水煎服

加味參蘇飲　治項背拘急鼻塞頭眩時發寒熱

咳嗽　即參蘇飲加五味子杏仁是也

姙娠吐血衄血

姙娠吐血衄血由七情臟府所傷氣逆于上致血上溢不止心悶甚者多死或墮胎也宜用局方

必勝散

薛氏曰若肝經怒火先用小柴胡山梔生地次用前藥合四物後用加味逍遙散若肝經風熱防風子芩丸心經有熱硃砂安神丸心氣不足茯苓補心湯思慮傷心妙香散胃經有火犀角地黃湯膏粱積熱加味清胃散肺經有火黃芩清肺飲因氣鬱滯紫蘇飲子氣不攝血用補中益氣湯腎經虛火六味地黃丸

紫蘇飲　治姙娠失調胎氣不安上攻作痛或氣逆失血　方在胎上逼卷中

一姙婦因怒失血兩脇脹痛小便淋澁此怒而血蓄于上隨火出也用小柴胡合四物四帖血止用六君子安胎飲調理全安

必勝散　治男子婦人血妄流溢或吐咳衄血　妙蓮

小薊連枝用　人參　蒲黃炒　熟地　川歸
川芎　烏梅各一錢半去核　水煎服

黃芩清肺飲　治姙娠肺熱吐衄及治肺熱小便不利　黃芩炒　山梔炒各二錢　鹽豉二十粒　水煎服

加味清胃散　治醇酒厚味唇齒作痛或齒齦潰爛并頭面頸項疼痛及姙娠吐衄　川歸
黃連炒一錢半　生地　丹皮各一錢　犀角　連翹一錢二分
升麻二錢　甘草五分　右水煎服　便秘加大黃

子煩

飛方曰姙娠若煩悶者以四月受少陰君火以養精六月受少陽相火以養氣若母心驚胆寒多有是症產寶云是心肺虛熱或痰積于胸若三月而煩者吐涎惡食大凡停痰積飲寒熱相搏吐甚則胎動不安

薛氏曰內熱子煩用竹葉湯氣滯用紫蘇飲痰滯用二陳加白术黃芩枳殼氣鬱用分氣飲加川芎脾胃虛弱用六君子加紫蘇山梔

竹葉湯　姙娠心驚胆怯終日煩悶名曰子煩

白茯苓（二錢） 防風 黃芩 麥冬（各一錢） 竹葉（十片）
水煎服（一方有知母）
人參散 熱乘心脾煩熱乾渴 人參 麥冬
赤茯苓 地骨皮 黃芩（炒） 乾葛 甘草（五分）
犀角（各一錢） 水煎服
竹茹湯 妊娠煩躁或胎不安
淡竹茹一兩水煎服之
知母丸 知母一味炒為末棗肉丸如彈子大每
服一丸人參湯下 八十一卷 卅九終
分氣飲 脾胃虛弱氣血不和胸膈不利或痰氣
喘嗽飲食少思 陳皮 茯苓 半夏 桔梗
大腹皮 蘇葉 白朮（炒） 枳殼（炒） 山梔（炒各一錢）
甘草（炙五分） 右加姜棗水煎服
治子煩口乾不得卧用黃連為末每服一錢米飲
調下

赤水玄珠婦人門第二十二卷目錄

妊娠煩躁口乾 風痙子癇
妊娠痰癖 妊鬼胎
妊娠不語 傷寒熱病防損胎
妊娠傷寒 妊娠時氣
過時熱病 熱病胎死腹中
妊娠瘧疾 妊娠泄瀉
下痢黃水 大小便不通
小便不通（名曰轉脬） 子淋
妊娠遺尿 妊娠尿血
胎水腫滿 腹內鐘鳴
孕癰 臟躁悲傷
滑胎方法 十產論
產難方論 交骨不開產門不閉
下死胎方 產難生死脉訣
胞衣不出 產後血暈
產後顛狂 狂言譫語
產後不語

新安生生子孫一奎著輯

妊娠煩躁口乾

足太陰脾之經其氣通於口手少陰心之經其氣通於舌若臟腑不調氣血不和以致內熱乘於心脾津液消爍故心煩口乾也與子煩大同小異宜用益母丸（即前一味知母丸是也）

一妊婦煩熱咽疼用知母散加山梔清肺而愈后又內熱咳嗽小便自遺用補中益氣加麥門冬山梔以補肺氣滋腎水而痊

知母散 治煩躁悶亂口乾

知母 麥冬 黄芪（炒） 子芩（炒）
赤茯苓（各一錢） 甘草 水煎入竹瀝一合再煎一沸服之

人參黄蓍散 治身熱煩躁口乾

人參 黄蓍（炒） 葛根 秦艽 赤茯苓
麥冬（各一錢） 知母 甘草（各五分）
右姜三片竹葉十四片水煎服

妊娠風痙子癇

妊娠體虛受風而傷足太陽經遇風寒相搏則口噤背強甚則腰反張名之曰痙須臾自醒良久復作又名曰子冒又類子癇

生生子曰風痙乃外邪從足太陽而入有剛柔之分當從仲景法於傷寒門中求治子癇乃痰涎所致是內臟所生治當分別

薛氏曰若心經風熱用釣藤湯肝脾血虛加味逍遙散肝脾鬱怒加味歸脾湯氣逆痰滯紫蘇飲肝火風熱釣藤散脾鬱痰滯二陳姜汁竹瀝若兼症相雜看所兼重輕分治

一妊婦出汗口噤腰背反張時作時止此怒動肝火也用加味逍遙散漸愈又用釣藤散而止更以四君加釣藤山梔柴胡而安

一妊婦因怒忽仆地良久而甦吐痰發搐口噤項強用羚羊角散漸愈更用釣藤散始痊又用歸脾湯全安

羚羊角散 治妊娠冒悶角弓反張及子癇子冒

風痙等症

羚羊角　獨活　酸棗仁炒　五加皮　防風
川芎　苡仁炒　川歸洗　杏仁去皮尖
茯神各五分　炙甘草　木香各二分　右姜水煎服

鈎藤湯　方見胎動不安卷

雲箕子葛根湯　姙娠臨月因發風痙忽悶憒不識人吐逆眩倒併治子癇
葛根　貝母　丹皮　防風　川歸　川芎
茯苓　桂心　澤瀉　甘草各一兩　獨活
石羔　人參各三兩　右以水九升煮取三升分作三服○貝母令人易產未臨月升麻代之此症多由風寒濕乘虛而感皆從太阳經治

活人獨活防風湯　治太阳有汗名柔痙
桂枝　獨活　防風各一兩　芍藥三兩　甘草半兩
右每服乙兩水煎温服

防風葛根湯　治太陽無汗名曰剛痙
葛根四兩　麻黃三兩　芍藥　防風各二兩　桂枝一兩
每服一兩先煮麻沸去上沫入餘藥同煎温服

姙娠瘈瘲

瘈者筋脉急而縮也瘲者筋脉緩而伸也一縮一伸手足相引搐搦不已大抵與嬰孩發搐相似此症多屬風〻主搖動駱龍吉云心主脉肝主筋心屬火肝屬木〻主風〻火相熾則為瘈瘲也○治法若因風熱用鈎藤湯加柴胡山梔黃芩白术以平肝木降心火养血氣若風痰上壅加竹瀝南星半夏若風邪急搐加全蝎姜蚕氣血虧損用八珍湯倍加鈎藤山梔若抽搐無力戴眼反折汗出如珠者肝氣絶也皆不治

薛氏治一姙婦四肢不能伸服祛風燥温之剂遺屎痰甚四肢抽搐乃肝火血燥用八珍湯倍加炒黑黃芩佐以鈎藤湯而安後因怒前症復作小便下血寒熱少寐飲食少思用鈎藤散加山枝柴胡而血止續用加味逍遥散寒熱退而得寐用六君子湯加芍藥鈎藤飲食進而漸安

鈎藤散　治肝厥頭暈
鈎藤鈎　陳皮炒　半夏　麥冬　茯苓

茯神　人参　甘菊　防風各一錢　炙甘草三分
石膏煅二錢　姜三片水煎服

姙鬼胎

人由臟府失調血氣不充營衛虚損則精神衰弱而鬼魅之類得以乘之亦如懷姙之狀故名曰鬼胎也

薛氏曰一婦經閉八月肚腹漸大面色或青或黄用胎症之藥不應薛診視之曰面青脉濇寒熱往来肝經血病也面黄腹大食少体倦脾經血病也此欝怒傷肝脾之症非胎也不信仍用胎剤無功乃與加味歸脾湯逍遥散各二十餘剤諸症稍愈彼欲速効别服通經丸一服下血昏憒自汗惡寒手足俱冷嘔逆不食用人参炮姜二剤漸愈又用十全大補湯五十餘剤而安

治此症大抵要看虚實〻者可攻涉虚者必扵補中兼消而佐以雄黄丸之類行而散之

雄黄丸　治鬼胎瘀血腹痛

雄黄　鬼臼去毛　莽草　丹砂　巴霜

獺肝炙黄各半两　蜥蜴一枚炙　蜈蚣一条炙

右為末蜜丸梧子大每服二丸空心温酒下日二服或下蛇蟞之類

治鬼胎及血氣痛不可忍

班猫去頭翅足用糯米炒　延胡索炒等分

為末温酒下五分以去穢物為度空心服

斬邪丹　治鬼胎大如抱甕

呉茱萸　川烏　秦艽　柴胡　姜蚕

芫花醋炒　巴戟　巴仁各一两

為末蜜丸梧子大每服七丸蜜酒下取下惡物

姙娠不語此名曰瘖

黄帝曰人有重身九月而瘖此為何也岐伯對曰胞之脉絡絶也帝曰何以言之岐伯曰胞絡者繫扵腎少阴之脉貫腎繫舌本故不能言帝曰治之柰何岐伯曰無治也當十月復此至人窮理之言患此者當静以俟之不必驚惶而乱投剤十月分娩後當自語也

姙娠傷寒熱病防損胎

良方曰非節之氣傷扵姙娠熱毒侵損胞胎若不

早治多致墮胎漏血則子母之命亦不能全矣
薛氏曰此亦當分六經為主相參而治
妊娠傷寒身痛壯熱
葱白一升 前胡 葛根 石膏各二兩半 青代一兩
升麻二兩 梔子十二枚 水煎分三服
妊娠傷寒大小便閉結
前胡二兩半 大黃二兩 石膏各五兩 山梔十枚 知母一
黃芩 茯苓 生姜各二兩 水煎分三服
妊娠傷寒發斑忽黑小便如血其胎欲落
山梔 升麻各四兩 青代二兩 生地四兩 石膏八兩
葱白一升 黃芩二兩 水煎分三服
又用井中泥塗心下乾則易
妊娠熱病先宜白朮散以安其胎傷寒亦然
白朮 黃芩各二錢 加姜棗水煎服
若四肢厥逆陰症也不可服
妊娠傷寒
生生子曰妊娠傷寒所干甚大治之不早及治不
如法多傷胎損母古人以四物加入引經散邪
之劑可選而用之然亦不能盡其變茲錄以補
之
阿膠散 治時氣傷寒先服此以安胎却以主藥
相間服
阿膠炒 白朮炒 桑寄生 人參 茯苓
右為末每服一錢糯米飲調下日三服
前胡湯 治傷寒頭痛壯熱肢節煩痛
石膏一錢 前胡 甜竹茹 梔子炒 黃芩炒
大青 知母各五分 加葱白水煎服
蘓木湯 傷寒時行洒淅寒振或兼喘者
赤芍 橘紅 黃芩炒 黃連炒 甘草 蘓木
各五分水煎服汗出即瘥 如胎不安更服阿膠散
黃龍湯 妊娠寒熱頭疼嘿嘿不食脇痛嘔痰及
產後傷風熱入胞宮寒熱如瘧或經水適來及
勞復熱不解散者
柴胡二錢 黃芩炒 人參 甘草各一錢 水煎服
柴胡石膏湯 頭疼惡寒身熱拘急口乾
柴胡二錢 甘草一錢 石膏三錢 姜水煎服

若氣虛加人參

枳實散　傷寒四五六日腹脹少食腰疼脉重

枳實炒三錢　陳皮一錢　麥冬半錢　姜葱水煎服

旋覆花湯　傷寒頭目旋疼壯熱心躁

旋覆花　赤芍　甘草各五分　前胡　石膏各一錢

麻黄去根節　白朮　人參　黄芩各三分　姜水煎

麥門冬湯　傷寒壯熱嘔逆頭疼胎氣不安

人參　石膏各一錢半　前胡　黄芩各五分　葛根

麥冬各一錢　加姜棗竹茹水煎服

梔子大青湯　發斑變黑尿便血

升麻　梔子　大青　杏仁　黄芩各一錢

加葱白三寸水煎服

白朮湯　傷寒煩熱頭痛胎動或時吐逆不食

白朮　橘紅　麥冬　人參　前胡　川芎

甘草　半夏　赤茯苓各五分　姜竹茹水煎服

芎藭散　治外感風寒壯熱頭疼心胸煩悶

紫蘇葉　川芎　白朮　白芍　麥門冬

陳皮　乾葛各五分　甘草炙三分

右姜葱白水煎服

參蘇飲　治症同上

姙娠時行病

四季之間反常如春寒夏冷秋熱冬煖乃非其時而有其氣者謂時行不正之氣也感之者少長三五相似甚至沿門闔境相類姙娠患之重者多致損胎○亦當與傷寒熱病叅治

秦艽散　治時氣五六日不得汗口渴飲水狂言嘔逆

秦艽　柴胡各五分　石膏一錢　犀角　赤茯苓

前胡　甘草　葛根　升麻　黄芩各四分

加淡竹茹水煎服

葛根飲子　時氣煩熱口乾頭疼

乾葛　麻黄去根節各半兩　石膏一兩　豆豉一合

白米半升　梔子十四粒　葱白二莖

水煎分三服汗出為効

消熱飲子　治時氣六七日大小便不利

芒硝細研一兩　葵子二兩　水煎分三次以利為効

人參敗毒散　治四時傷風頭痛發熱咳嗽
此方即倉廩湯減陳倉米是也

過時熱病

冬時觸冒嚴寒即病曰傷寒不即病而毒藏於肌骨之間至春發爲溫病至夏發爲熱病也姙娠患之多致墮胎熱病與暑病相似但熱病脉實暑病脉虛治當審察

治姙娠熱病頭痛嘔吐煩悶
人參一方無　竹茹　葛根各一兩　芦根二兩　知母三兩
麥冬一兩半　每服五錢葱白三寸水煎服

梔子仁飲　治病發斑黑色小便如血氣喘急胎欲墮
梔子　升麻　石膏　生地各二兩　黃芩一兩
大青八錢　每服五錢葱白七寸豉四十九粒水煎服

大黃飲　治熱病六七日大小便秘澁
大黃微炒　石膏各一兩　知母　前胡　赤茯各七錢半
梔子　甘草　黃芩各五錢　生地黃一兩半
每服七錢水煎服

芦根湯　治熱病頭痛心煩嘔吐
知母四兩　竹茹三兩　每服五錢生芦根一握同糯米一撮水煎服

梔子五物湯　治姙婦傷寒壯熱頭痛
梔子　前胡　知母各二兩　黃芩一兩　石膏四兩
每服五六錢水煎服

升麻六物湯　治傷寒斑黑溺血
升麻　梔子各二兩　大青　杏仁　黃芩各一兩
每服五錢葱白五寸水煎服

又方
伏龍肝爲末每服一錢水調下外用水調塗臍下

又方
芦根煮汁時服一盞

熱病胎死腹中

良方曰熱病以致胎死腹中不能出者但服黑神散胎自下矣

陳無擇先生曰當視其産母若面赤舌青其子已死面青舌赤母死子生脣青吐沫子母俱死若

双胎或一死一活用黑神散

薛氏曰竊謂前症宜補助產母使其胎自下黑神散恐大熱不宜輕用果胎已死者用平胃散加朴硝水銀下之最為穩當庶不併傷生者

生生子曰前症姙毋既曰熱傷其胎矣必其母衛任熱極營衛枯槁其胎乃死猶之藤枯而瓜焦也仍以熱藥下之寧不重傷姙毋乎薛公評之當也而良方每每謂姙婦致疾多起於寒按其逐月所著养胎之方籍熱藥為主是亦一偏也

其間豈無挾熱者乎故丹溪曰虛曰熱謂涼血則血循經而胎得以滋養血熱則沸騰也今此症始既曰熱病胎死腹中矣又復以熱藥下之意者恐以死胎不下為急而不暇顧其毋耶不然必為用寒涼治熱太過而中氣虛寒熱劑為不得已用之也否則何陳無擇之高哲寧肯從而主之

黑神散又名烏金散

桂心　當歸　芍藥　甘草炙　乾姜炮

生地各一两　黑豆二两炒去皮　大附子炮去皮臍半两

為末每服二錢温酒下

又方　治胎死腹中

紅花　酒煮汁濃飲之二三碗效

又方

伏龍肝為末温酒下二錢白湯下亦可

又方

朴硝為末童便和熱酒調下一二錢立下

姙娠瘧疾

姙娠病瘧乃夏傷於暑客於皮膚至秋而發陽盛則熱陰盛則寒陰陽相離寒熱俱作姙娠而作多傷於胎　當於瘧症門尋治

薛氏曰若木侮土久而不愈用六君子為主佐以安胎藥乃參三陰三陽經而治之

即瘧症門仲景方劉守真分經治瘧法也

清脾飲　小柴胡湯　逍遙散　補中益氣湯

選而用之極為穩當○黄芩白朮陳皮三味煎湯服亦佳

妊娠泄瀉

良方論曰妊娠泄瀉或青或白水穀不化腹痛腸鳴謂之洞瀉水穀不化喜飲嘔逆謂之協熱下利並以五苓散利小便次以黃連阿膠丸或三黃熟艾湯以安之若瀉黃有沫腸鳴腹痛脉沉緊數用戊己丸和之噯腐不食胃脉沉緊用感應丸下之後調和脾胃若風冷水穀不化如豆汁用胃氣湯寒冷臍下陰冷理中湯治中湯伏暑心煩渴瀉水用四苓散傷濕泄瀉小便自利

八 廿二卷　十五

用不換金正氣散胃苓湯此四症之大略也仍參泄瀉門互治

生生子曰前症予見之屢矣人皆以為小疾忽而不治及生子率多虛弱予姪婦每懷妊必瀉治亦不愈分娩後又自止也其生子也脆而白無血色得非胎處之故歟予因思之妊娠則月水蓄之以養胎血亦濕類也以停濕故瀉經曰濕勝則濡泄是也治宜健脾燥濕后孕以白朮半夏等為丸與之而安

薛氏曰按前症若米食所傷用六君加穀蘖麵食所傷六君加麥蘖肉食所傷六君加山查若兼寒熱作嘔乃肝木侮脾土用六君加柴胡生姜兼嘔吐腹痛手足逆冷乃寒水侮土六君加姜桂不應用錢氏益黃散若元氣下陷發熱作渴肢体倦怠用補中益氣湯若泄瀉色黃乃脾土之真色用六君加木香肉果若作嘔不食腹痛惡寒乃中焦虛寒用六君加木香姜桂若瀉在五更侵晨飲食少思乃脾腎虛弱五更服四神

六 十二卷　一六

丸日間服白朮散如不應或愈而復發或飲食少思急用八味丸補右腎以培脾土為善

厚朴丸　治洞泄寒中

乾姜炮　厚朴製等分

為末糊丸梧子大米飲下五十丸

草果散　治虛寒泄瀉腹痛無度

厚朴二兩姜製　肉果十枚麵煨　草豆蔻十枚煨

每服三錢水煎服

妊娠下痢黃水

姙娠痢疾宜捜痢疾門叅治而痢黄水乃脾土虧損真氣下陷也當升補中氣看所兼何症而治之在臨病制宜不必拘用阿膠艾葉之類也

産寶方　治姙娠痢黄水

厚朴姜汁炒　黄連各二兩　肉果五枚

右水煎徐〻服以効為度

又方　治熱痢

黄連一升　黄栢一升　梔子二十枚

每服五錢水煎如嘔者加橘紅生姜

又方　姙娠下痢痛

糯米一合　當歸炒　黄芪各一兩　水煎分四服

臨産下痢用梔子炒為末每服二錢白湯調甚効

姙娠大小便不通

大小便不通由臟府之熱所致若大腸熱則大便不通小腸熱則小便不通大小腸俱熱更推其因而藥之

當歸散　姙娠因怒肚腹脹痛四肢浮腫氣急作喘大便難小便澁産門腫

當歸五分　赤茯苓　枳殻麸炒　白芍　川芎各一錢

白姜炮　木香　甘草各三分　姜一片　水煎

若氣弱者枳殻減半大便秘加蜜同煎服

姙娠大小便不通腹脇痞悶不思飲食

大黄炒　木通　檳榔各一兩　枳殻麸炒三錢

訶子四枚去核半生半熟用　大腹子二枚

共為末童便一盞葱白七莖煎六分調服二錢

治姙娠小便不利氣急服猪苓散不瘥用甘遂為末蜜和服豆許微利之未利再服利後仍服猪

苓散

猪苓散　治姙娠小便澁痛及胎水

猪苓去皮　為末白湯調下一錢加至二錢日三服夜二服

又方

車前子一兩　大黄炒半兩

共為末每服三錢蜜湯調下

姙娠小便不通名曰轉脬

姙娠小便不通為小腸有熱傳於脬而不通耳若

兼心肺氣滯則致喘急陳無擇云姙娠胎滿逼胞多致小便不利若心腎氣虚清濁相干而為諸淋若胞系了戾小便不通名曰轉脬若胎滿尿出名曰遺尿

薛氏曰按丹溪云轉脬小便閉多因胎婦虚弱憂悶性躁嗜炙厚味古方用滑利踈導藥鮮效若脬為胎所壓而不通但當升舉其胎俾胞系踈鬆而小便自行若臍腹作脹而小便淋閉此脾胃氣虚胎壓尿胞四物二陳參朮空心服後探

八 十二卷 十九

吐數次自安竊謂前症亦有脾肺氣虚不能下輸膀胱者亦有氣熱鬱結膀胱津液不利者亦有金為火爍脾土濕熱甚而不利者更當詳審施治

一婦患此小腹腫脹幾至於殆用八味丸一服小便淋瀝再以八味丸料加車前子一劑即利肚腹頓寬而安

八味丸 治姙婦飲食如故煩熱不得卧反倒倚息因脬系了戾不得溺名轉脬但利小便則愈内有茯苓故也緩則不救

其方即六味地黄丸加附子桂心

古今録驗治姙娠小便難飲食如故

當歸 貝母炒去心 苦參各三兩 滑石半兩

為末蜜丸小豆大每服三十丸米飲下

治姙娠小便不通臍下妨悶心神煩亂

葵子研 榆白皮各一兩 葱白七莖水煎分二服

古今録驗姙娠不得小便者

杏仁去皮尖 炒黄搗丸豆大燈心湯呑下七丸

八 十二卷

又用滑石末水和塗臍下

又方

車前草汁調滑石末塗臍周圍四寸熱易之

又方

杏仁 滑石末等分 飯丸豆大每白湯下廿丸

又方

紫菀為末井花水調下二錢

葵子散 姙娠小便不利身重惡寒眩暈水腫

葵子 赤茯苓各五兩 為末每服二錢米飲下

生生子曰予嘗以補中益氣湯加桔梗治數婦皆効但用滲利藥而不得通者必須升提氣升則水自降氣虛者非大補則提亦無功

子淋

姙娠小便淋者乃腎與膀胱虛熱不能制水然姙婦胞繫于腎腎間虛熱而成斯症甚者心煩悶亂名曰子淋也

薛氏曰前症若頸項筋攣語濇痰甚用羚羊角散若小便澁少淋瀝用安榮散若肝經濕熱用龍胆瀉肝湯若肝經虛熱用加味逍遥散腿足轉筋而小便不利急用八味丸緩則不救若服燥劑而小便頻數或不利用生地茯苓牛膝黄柏知母五味麥冬玄參若肺氣虛而短少用補中益氣加山藥麥冬若陰挺痿痺而頻數用六味丸若熱結膀胱而不利用五淋散若脾肺燥不能化生宜黄芩清肺飲若膀胱陰虛陽無所生用滋腎丸若膀胱陽虛陰無所化用六味丸

地膚大黄湯　治子淋

大黄炒　地膚草各三兩　知母　黄芩炒　猪苓　通草　赤芍藥　枳實炒　升麻　甘草各二兩

每服五錢水煎服

安榮散　治子淋甚妙

麥冬　通草　滑石　川歸　灯心　甘草　人參　細辛各五分　水煎服

治小便淋瀝心煩悶亂

瞿麥穗　赤茯苓　桑白皮　木通　葵子各一錢　黄芩炒　車前子炒　芍藥　枳殼各五分

右水煎服

治子淋小便澁痛

冬葵子　滑石　木通各半分

每服六錢葱白七寸水煎服

猪苓散　方見大小便不通卷

姙娠遺尿

良方曰姙娠尿出不知用白薇芍藥為末酒調下或白礬牡蠣為末酒調下二錢或鷄毛灰末酒服一匕或炙桑螵蛸益智仁為末米飲下

薛氏曰若脬中有熱宜加味逍遙散若脾肺氣虛宜補中益氣加益智若肝腎陰虛宜六味丸

一妊婦遺尿內熱肝脉洪數按之微弱或兩太陽作痛脇肋作脹以為肝火血虛用加味逍遙散六味地黃丸尋愈后又寒熱或發熱或恚怒前症仍作用八珍散逍遙散兼服以清肝火養肝血而痊

妊娠尿血

妊娠尿血良方謂內熱乘於血分以致血熱流滲於脬名曰血淋用葵子一升研水五升煮二升分三服或生艾葉一斤酒五升煮二升分三服或生地一斤酒四升煮二升分三服亦治墮胎後下血

薛氏曰因怒動火者宜小柴胡加山梔因勞動火者補中益氣湯因厚味積熱宜加味清胃散若因肝經血熱宜加味逍遙散因脾氣下陷補中益氣湯若因脾虛血熱宜加味逍遙散

一妊婦因怒尿血內熱作渴寒熱往來胸乳間作脹飲食少思肝脉弦弱此肝經血虛而熱也用加味逍遙散六味丸兼服漸愈又用八珍湯加柴胡丹皮山梔而痊

續斷湯 治妊娠下血及尿血

當歸 生地各一兩 續斷半兩 赤芍半兩

為末每服二錢空心葱白湯調下

治妊娠尿血

阿膠炒 熟地各四兩 同擣為丸每服八十丸空心米飲下

又方

四苓散 加炒阿膠車前子茅草根水煎服

又方

白茅根 濃煎湯吞酒蒸黃連丸

加味清胃散 方見

妊娠胎水腫滿

產乳集云妊娠三月足腫至腿出水飲食不甘似水腫謂之子氣至分娩方消者此脾胃氣虛或衝經有血風亦有脾虛水氣流溢或因瀉痢臟

府虛寒或因瘧疾飲水脾虛濕漬或因水漬於胞不能分利皆致腿足腫肚腹腫也

薛氏曰若胸滿腹脹小便不通遍身浮腫用鯉魚湯脾胃虛弱佐以四君子若面目虛浮肢体如水氣用全生白朮散如未應用六君子湯脾虛濕熱下部作腫補中益氣湯加茯苓若飲食失宜嘔吐泄瀉六君子湯腿足發腫喘悶不安或指縫出水天仙藤散脾胃虛弱兼四君子湯如未應補中益氣湯若脾肺氣滞加味歸脾湯佐以加味逍遙散

一姙婦每至五月肢体倦怠飲食無味先兩足腫漸至遍身後及頭面此脾肺氣虛朝用補中益氣夕用六君子加蘇梗而愈○凡治姙婦毋泥月數但見其經症即用本藥為善

天仙藤散　婦人有水氣而成胎以致兩腿足浮腫

天仙藤洗畧炒　香附子炒　陳皮　烏藥軟白辣者佳　甘草各五分　右每服五錢生姜木瓜蘓葉各三片水煎日三服

澤瀉散　姙娠遍身浮腫上氣喘急大便不通小便赤澁

澤瀉　桑皮炒　木通　枳殻炒　赤茯苓　檳郎各五分　右姜水煎服

防已散　脾虛遍身浮腫腹脹喘促小便不利

防已三錢　桑皮炒　紫蘓莖葉　赤茯苓各五分　木香二分　右姜水煎服

千金鯉魚湯　姙娠腹大胎間有水氣

白朮五兩　茯苓四兩　當歸　芍藥各三兩

右㕮咀先以小鯉魚一尾如食法煮取汁二盞入藥五錢姜七片橘皮少許煎七分空心服

腎著湯　治姙娠腰脚腫

茯苓　白朮各八分　干姜炮　甘草各一錢　杏仁五分　右水煎服

五皮散　治胎水腫滿

大腹皮　桑白皮炒　生姜皮　茯苓皮　橘皮各一錢　木香二分　右水煎服

全生白朮散　姙娠面目浮腫四肢腫如水氣名曰胎氣又名胎腫

白朮一两　生姜皮　大腹皮　陳皮　白茯各五錢為末每服二錢米飲下

治姙娠脚浮腫因脾衰血化成水以生料平胃散姜棗水煎服或為末紫蘇葉湯調下二錢日二服以腫退為度

腹内鐘鳴

良方曰孕婦腹内鳴用鼠穴中土為末入射香酒調服二錢立愈或黄連煎濃汁常飲之

薛氏曰兒在腹中哭産寶方亦用空房中鼠穴土或黄連煎濃汁飲之即止又云臍帶上疙瘩兒含口中因産婦登高舉臂脱出兒口以此作声令姙婦曲腰就地如拾物状仍復原入兒口即止然黄連性寒麝香開竅當斟酌用之

龔彦德孕癰方

治孕癰用烏藥五錢水一鍾煎七分入牛皮膠一两煎化温服或薏苡仁煮汁飲之

薛氏曰按孕癰即是腹内患癰如前法治之倘不應宜用牡丹皮散或薏苡仁湯

薏苡仁湯　又名瓜子仁湯

治腸癰腹中疞痛煩毒不安或脹滿不食小便澁婦人産后虛熱多有此病縱非癰但疑似間便可服

瓜仁二錢　一方用冬瓜子仁無冬瓜子以括姜代之姚氏去瓜仁用杏仁崔氏加芒硝

薏苡仁　括蔞仁各三錢　牡丹皮二錢

右作一劑水煎服

牡丹皮散　治腸癰冷症腹濡而痛時時利膿

丹皮　人參　天麻　白茯　黄芪炒　白芷　苡仁　瓜仁去尖皮　當歸炒洗　川芎各一錢　炙甘草　官桂各五分　木香三分　右水煎服

臟躁悲傷

許學士云一婦無故數次悲泣是為臟躁用大棗湯而愈又程虎卿内姙娠五月慘慼悲傷亦投大棗湯而痊

薛氏曰或因寒水攻心或肺有風邪者治當審察
一婦無故自悲用大棗湯二劑而痊後又復患用前湯佐以四君子加山梔而安
一姙婦悲哀煩躁其夫詢之云我無故但自欲悲耳用淡竹茹湯為主佐以八珍湯而安

大棗湯
甘草三兩 小麥三兩 大棗十枚

淡竹茹湯 姙娠心虛驚悸臟躁悲傷或作虛煩
麥冬 小麥 半夏湯泡各一錢半 人參 白茯各一錢
甘草五分 加姜棗竹茹水煎服

又方 治臟躁悲哭
紅棗燒存性為末米飲調下二錢

姙娠十月宜服滑胎湯藥

滑胎枳殼散 入月服之令胎瘦易產昔湖陽公主每產累日不下南山道人進此方
枳殼麩炒二兩 炙甘草一兩
右為末每服二錢空心沸湯調下日三服
凡孕六七月宜服之温隱居加當歸木香等分

又方 治同上 兼治諸疾下氣寬膈
枳殼麩炒五兩 甘草一兩半 香附子炒三兩
右為末每服二錢白湯調下

又方 易產滑胎
車前子為末或酒或米飲調下一錢

神寢丸 臨月服之神効
通明乳香半兩另末 枳殼麩炒一兩為末
右蜜丸梧子大每空心酒服三十丸

榆白皮散 滑胎易生
榆白皮 甘草各二兩 葵子一兩

右為末每以五錢水煎服

保氣散 寬氣進食瘦胎易產或居處失宜頓仆胎動若胎痛胎漏兼服佛手散
香附 木香各四兩 山藥一兩 砂仁 粉草各一兩
益智 蘇葉各半兩 為末每服二錢白湯調下
薛氏云神寢丸枳殼散併此方入月宜常服

保產無憂散 姙娠身居安逸口厭甘肥憂樂不常食物不節致胞胎肥厚根蒂堅牢入月服

之易生

當歸　川芎　白芍　枳殼炒　乳香各三錢

木香　甘草　血餘即髮灰以豬心血和之各一錢半

右為末每服三錢水煎日二服神効

妊娠臨月以猪肚一具煮爛徐徐食盡令易產

一產論

一曰正產　懷胎十月滿足忽腰腹作陣疼痛相次胎氣頓陷至於臍腹痛極乃至腰間重痛谷道挺併繼之漿破血出兒乃遂生此名正產

二曰傷產　懷胎未產一月已前忽然臍腹疼痛有似欲產仍却無事是名試月非正產也又名曰弄痛凡產母未有正產之候切不可令人抱腰亦不可令產母妄亂用力若兒身未順緩方轉動便教產母空亂用力使子錯路忽橫忽倒不能正生皆由產母用力於未當用力之所致也直待兒身順適逼臨產戶始可用力一送令兒趁力生下

綱目曰右傷產一法最為切要勿輕忽也凡十月未足臨產腹痛或作或止或痛不甚者名曰弄痛非正產之候或腹雖痛甚而腰不甚者非正產之候胎高未陷下者非正產之候穀道未挺併者非正產之候水漿未破血未出者非正產之候漿血雖出而腹不痛非正產之候凡未有正產之候且令扶行耐忍如不能行或凭物坐之或安臥之或且服安胎藥一二帖即安得安即止慎勿妄服催生藥又勿愴惶致令產母憂恐而挫其志務要產母寬心存養調停令老誠練達穩母先說諭之如覺心中煩悶可取白蜜一匙新汲水調下切勿妄亂用力先困乏其母直待子逼門戶腰重痛極眼中如火穀道挺逆方是正產候也此時始可用力并服催生藥也予男婦于未產一月已前腰腹俱痛全似將產其痛至甚但遇巳時稍止如此十餘日計無所出因閱此條遂與安胎藥加參朮數服間與肉味養之由是平復不痛又二十餘日始產一男設若此際亂動亂用力并服催生等藥則立

見其危矣

三曰催產　若婦欲產漿破血下已見是為正產之候但郤未生即可服催生藥催之忽有經及數日產母困苦亦可服藥以助產母之正氣令兒速生也

四曰凍產　凡冬月天冷產母經血得冷則凝以致兒子不能生下此害最深但冬月產者下身不可脫去綿衣尤不可坐臥寒處當滿房著火常有煖氣令產母背身向火令臍下腿膝間常煖血得熱則流動使兒易生此名凍產

五曰熱產　凡盛夏之月產婦要溫涼得所不可恣意取涼傷損胎氣亦不令房中人多恐熱逼襲產母使產母血沸而有發熱頭痛面赤昏昏如醉乃至不知人事此名熱產

六曰橫產　凡兒先或露手或先露臂此乃產母未當用力而用之過也兒身未順用力一逼遂至身橫不能生下當令產母安然仰臥後令看生之人先推其手令入直上漸漸逼身以中指摩其肩推上而正之或以指攀其耳而正之須是產母仰臥然後推兒徐徐正之候其身正煎催生藥一盞飲之方可用力令送兒下此名橫產

七曰倒產　凡產母胎氣不足關鍵不牢用力太早致令兒子不能迴轉便直下先露其足當令產母仰臥令看生之人推其足入不可令產母用分毫力亦不得驚恐使兒自順去

八曰偏產　兒身未正產母用力一逼致令兒頭偏柱左腿或偏柱右腿故頭雖露偏柱一畔不能生下當令產母仰臥次令看生之人輕輕推兒近上以手正其頭令兒頭頂端正然後令產母用力一送即便生下若是小兒頭腦後骨偏柱穀道只露其額當令看生之人以綿衣炙溫裹手於穀道外方輕輕推兒頭令正便令產母用力送兒生也此名偏產

九曰礙產　兒身已順而露正頂不能生下蓋因兒身迴轉肚帶攀其肩以此露正頂而不能生下當令產母仰臥令看生之人輕輕推兒近上

徐徐引手以中指按兒肩下撥其肚帶仍須候兒身正順方令產母用力一送使兒生下此名礙產

右横產倒產偏產礙產四法若看生之人非精良妙手不可依用此法恐恣其愚以悞人命也按倒產者令時往往随其倒足生下並無後患子母双全不必依推足復上之法亦可又礙產者往往有肚帶纏在兒項上而兒頭自出在產門外看生之人以手撥其肚帶

從兒頭項過而下之者又有肚帶纏在項上一匝而兒與胞衣自然同下者皆無妨不必以此礙產法復入產門内撥下也

十曰坐產　臨產時高處繫一手巾令產母以手攀之輕輕屈足坐身令兒生下非坐在物上也此名坐產

十一曰盤腸產　趙都運恭人每產則大腸先出然後產子既產之後其腸不收甚以為苦名曰盤腸產醫不能料偶在建昌得一坐婆施一法而收之其法以醋半盞新汲水七分和匀噀產母面每噀一縮三噀收尽此良法也

丹溪治產後腸不收香油五斤煎熱盆盛俟温令產母坐油盆中約一頓食時以皂角末吹入鼻中嚏作立上

又方　蓖麻子十四粒去壳研如膏貼產母頭頂心上其腸上即揩去

又方　腸出盛以潔净漆器濃煎黄芪湯浸之即收

催生

催生柞木飲子　難產或胎爛腹中腹悶神効

生柞木 剉一尺　甘草 大者五寸

右水三鍾封罐口煎一鍾半候胎順產門徐徐温服即時分娩更無諸苦

催生如神散　治横生逆產其功甚大

百草霜　白芷 不見火 等分

右為末每服三錢至胎順產門以童便米醋和為膏加沸湯調下或童便酒煎進二服然血

得黒即止此藥大能固血而免血乾甚妙

如聖散　黃蜀葵花焙為末熱酒調下二錢○若漏血胎乾胞澁難産併進三服即産如無花用子半合末之温酒服尤妙○若打撲胎死紅花酒調下

順生丹　治同上

明乳香一兩另末　兎腦髓去皮膜研膏　母丁香二兩　麝香一錢

右以兎腦子丸鷄頭子大陰乾每服一丸温水下

又方　透明乳香一塊如皂子大為末腰痛時用冷水醋少許調服扶立令兩手握大石燕二枚口念醫靈藥聖三遍行數步用坐産法便生更無痛楚神効薛氏云其法士人視之似迂然用之者称驗甚

治逆産　蛇退一条順下完全者　蚕退帋一張

右共入新瓦罐内塩泥固濟煅存性為末煎榆白皮湯下一錢三服竟痛便生

又方　伏龍肝研末每服一錢酒調下兒戴土而下

又方　魚膠一尺許新瓦上煅灰陳醋調服立下

胞漿先乾胎澁不下急服大料四物湯滋其血氣并濃煎葱湯薰洗産户更用油蠟塗産户内却服前藥

神妙乳砂丹　明乳香為末以猪心血丸梧桐子大硃砂為衣陰乾每服二丸嚼碎冷酒下良久未生再服或以蓮葉蒂七個水煎化服二丸尤妙良久未生再服

交骨不開産門不閉

交骨不開産門不閉皆由元氣素弱胎前失於調攝以致血氣不能運達而然交骨不開陰氣虚也用加味芎歸湯補中益氣湯産門不閉氣血俱虚也用十全大補湯

一婦交骨不開兩日未生服加味芎歸湯一劑即時而産彼後以此方傳與人服應手而効

一婦生平分娩最易至四十歳妊娠下血甚多産門不開與前湯一劑又以無憂散斤許煎熟時時飲之以助其血而生

一産婦玉門不閉發熱惡寒十全大補加五味子

數劑而寒熱退又以補中益氣加五味子數劑而玉門歛○若初產腫脹或焮痛而不閉者用加味逍遙散若腫既消而不閉者用補中益氣湯切忌寒凉之劑

一婦脾胃素弱兼有肝火產後玉户腫痛寒熱作渴嘔吐不食敷大黄等藥服驅利之劑腫及於臂虚症蜂起此真氣虚也先用六君子以固脾胃乃以補中益氣湯升舉而消

一產婦失治腫潰不已形体消瘦飲食少思朝寒

暮熱自汗盗汗半年矣予用補中益氣加茯苓半夏以健脾胃膿水漸少飲食漸進用歸脾湯以解脾鬱共五十餘劑元氣復而瘡亦愈矣

一產婦玉門不閉小便淋瀝腹中一物攻動脇下或脹或痛用加味逍遥散加車前子而安

一產婦子宮腫大二日方收損落一片殊類猪肝面黄体倦飲食無味内熱晡熱自汗盗汗用十全大補湯二十餘劑諸症悉愈仍復生育

加味芎歸湯　治交骨不開不能生產

川芎　川歸各一兩　龜板一個炙　婦人頭髮一握燒存性

右為散每服一兩水煎服約人行五里即生縱死胎亦下

產难方論

郭稽中曰產难者因兒轉身將兒枕血塊破碎與胞中敗血壅滯兒身不能便利是以难產急以勝金散消散其血使兒易生陳無擇云多因兒未轉順坐草太早或努力太過以致胞衣破而血水乾產路澁而难下宜先服催生如神散以

固其血設或逆生横產當按法施治

勝金散　催生如神　麝香一錢　豆豉一兩

為末秤錘燒赤淬酒下

下死胎方

一穩婆之女勤苦負重妊娠腹中陰冷重墜口中甚穢予意其胎已死令視其舌青黑與朴硝一兩許服之化下穢水而安

一婦胎死腹中服朴硝下穢水肢体倦怠氣息奄奄用四君子為主佐以四物姜桂調補而安

又方　以利斧烧紅置酒中待温飲之其胎便下
又方　錫粉　水銀各一錢　棗肉爲丸豆許大水吞
立下
又方　平胃散五錢　酒水各一盞煎至一盞投朴硝
五錢再煎三五沸温服其胎即化水而去
寶慶方云凡欲斷臍帯先以繫物墜下後可斷之
否則胞衣上即冲心而死、

産难生死脉訣

欲産之婦脉離經沉細而滑也同名夜半覺痛應
分誕來日下午定知生身重体熱寒又頻舌
之脉黑復青反舌上冷定知死腹中須遣子婦宜
面赤舌青細尋看母活子死定應难唇口俱青沫
又出子母俱死總高判面青舌青沫出頻母死
子活是知真不信若能看應驗尋之賢哲不虛陳
新産之脉緩活吉實大弦急死來侵若得沉重小
者吉忽若堅牢命不停
寸口澁疾不調死沉細附骨不絶生審看此候分
明記長須念此向心經

八十二卷　四十一

胞衣不出

郭稽中曰胎衣不下者因氣疲憊不能努出或血
入衣中脹大而不能下以致心胸脹痛喘急速
服奪命丹血散脹消其衣自下牛膝散亦効
一婦胎衣不出胸腹脹痛手不敢近用滚酒下失
笑散一帖惡露胞衣並下
一婦胞衣不出腹痛手按之稍緩此氣虛不能送
出也用無憂散而下○前症常詢諸穩婆云宜
服益母丸或就以産婦頭髮入口作嘔其衣自
出不出者必死然前法甚効

八十二卷　四十二

奪命丹
大黄一兩　大附子炮半兩　牡丹皮一兩　乾漆一錢炒烟盡
爲末醋煎大黄成膏丸梧子大温酒
吞七丸
花蕊石散　治産后敗血不盡血迷血暈胎衣不
下至死心頭煖者急用一服即化水而出其効
如神
花蕊石一斤　上色硫黄四兩
右和匀以紙泥封固瓦礶内炭火煅赤次日取
出細研每服一錢童便熱酒下

牛膝散　治胎衣不出腹中脹痛急服此藥腐化而下緩則不救

川芎　朴硝　牛膝　蒲黃各三兩　川歸一兩半　桂心五錢　右每服五錢姜三片生地一錢水煎服

又方　紅花一两酒煮濃汁服

又方　鹿角鎊三錢為末葱湯調服

又方　取産母鞋底烘熱熨小腹上下二[illegible]次

產後血暈

良方曰産後血暈乃血入肝經甚至眼花昏悶用黑神散主之下血過多用清魂散補之或以醋湯細飲或預燒秤錘以醋沃之或醋塗口鼻或燒漆器熏之使産母鼻吸其氣庶無此患

薛氏曰若惡露上行用失笑散血下過多芎歸湯若過勞所傷補中益氣湯血虚極用清魂散大凡産後口眼喎斜等症當大補氣血為主而兼以治痰若脾胃虚弱用六君子湯爲於七月之前服安胎飲至八九月間加大腹皮黄楊頭元氣虚弱八珍湯臨産用無憂散則無前患

一婦八月胎下墜或動而黄躰倦飲食少思此脾氣虚弱用補中益氣湯倍白术加蘇梗三十餘劑而安産後眩暈胸滿咳嗽用四物加茯苓半夏桔梗而愈

一婦因飲酒惡露甚多患血暈口出酒氣此血得酒熱而妄行虚而作暈也以佛手散加煨甘葛二錢一劑而痊酒性慓悍入月及産後不宜飲恐致前症

奪命丹　治血暈腹痛　没藥　血竭　為末等分每服二錢熱童便冲酒下

清魂散　産後氣血暴損虚火妄動血隨火上以致心神昏乱口噤眼花甚至悶絶而甦

澤蘭葉　人参各一錢　荊芥三錢　川芎一錢　右各另為末每服一二錢熱湯和酒調灌之

一方　五靈脂半生半炒　為末每服二錢温酒灌入即甦

一方　荊芥為末童便調服

一方　神麯末每服二錢熱水調服

一方　韮菜切入瓶内注熱醋以瓶口對鼻薰之

一方　半夏為末丸荳大入鼻中即醒 亦治五絶

佛手散　治產後去血眩暈欲絶又治血崩不止又能治胎痛安生胎而落死胎神効

川芎 酒洗　當歸 酒浸各五錢

酒水各一鍾煎至一鍾服

產後顛狂

產後顛狂乃敗血上冲用大聖澤蘭散加砂仁末三分煎酸棗仁湯調下或硃砂為末二錢乳汁調和入紫項活地龍一条滚二三沸去之入酒再用重湯煮温分三服

薛氏曰乃血虛神不守舍非補養元氣不可

一產婦患前症或用大聖澤蘭湯而愈後又怔忡妄言其痰甚多用茯苓散補其心虛頓愈又用八珍湯加遠志茯神養其氣血而痊

一產婦亦患此用化痰安神等藥病益甚神思消爍余以為心脾血氣不足用大劑参术芎歸茯神酸棗仁四斤餘而安乃以歸脾湯五十餘劑而愈

茯苓散　治產後心虛忪悸言語錯乱健忘少睡或自汗盗汗

人參　炙甘草　芍藥 炒　當歸　生姜 各八分

遠志　茯苓 各一錢　桂心 六分　麥冬 五分　大棗 二枚

水煎温服

抱膽丸　治產後遇驚發狂或遇經行發狂

水銀 二兩　黑鉛 一兩五錢　硃砂　乳香 各一兩

右將黑鉛入銚内火熔化候稍冷下水銀攪成砂子再入乳香硃砂乘熱用栁木槌研匀丸鷄頭子大每服一丸薄荷湯下得睡勿驚覺来即安○妙香散亦善

此症属火者多不可槩視為瘀血及虛治也童便極好或冲入凉血藥中用之屢屢見効

產後狂言譫語

產後狂言譫語乃心血虛也用硃砂末酒調下龍虎丹参丸琥珀地黄丸亦可如驚悸歌哭顛狂等症當參治之

一産婦形体甚倦時發譫語用柏子仁散稍愈又用加味歸脾湯而愈又因怒仍狂言脇痛小便下血用加味逍遥散以清肝火養肝血頓瘥又佐以加味歸脾湯而安

治敗血上衝發熱狂走脉虚大者

乾荷葉　生地　丹皮各半分　濃煎湯調生蒲黄二錢服之即止

妙香散　治産後語言錯乱用生地當歸煎湯調服立効

八　廿二巻　四十七

炙甘草　人參　桔梗各五錢　茯苓　茯神

山薬姜汁炒　黄芪　遠志各一兩　辰砂三錢　射香二錢

木香二錢半　右為末每服二錢温酒調服

○又能治心氣不足精神恍惚虚煩少睡盜汗夢與鬼交等症

産後不語

産後不語因心氣虚而不能通津於舌則舌強不能言語者宜服七珍散餘當推其所因而治之可也

七珍散

人參　石菖蒲　生地　川芎各一兩　細辛一錢

防風　辰砂另研各五錢

為末每一錢薄荷湯調服

胡氏孤鳳散　治産後閉目不語用之即効

生白礬為末每服一錢熱酒調下

産後不語

人參　石蓮肉　石菖蒲等分

每以五錢水煎服

八　十二巻　四十八

赤水玄珠婦人門第二十三卷目錄

產後乍見鬼神　心神驚悸
中風恍惚　虛極生風
虛汗不止　汗多変痙
口噤腰背反張　產後中風
四肢筋攣　遍身疼痛
產後腰痛　產後腹痛兒枕痛
產後寒疝腹痛　產後兩脇脹痛
產後血瘕　虛煩發熱
產後血渴　產後乍寒乍熱
產後瘧疾　嘔吐腹脹
氣急喘促　口鼻黑臭衄
月水不通　四肢浮腫
腹痛泄瀉　赤白痢
大便秘澁　大小便不通
產後遺糞　產後諸淋
小便不禁　小便出血
玉門不閉　乳少或止　婦人繭唇

赤水玄珠婦人門第二十三卷

新安生生子孫一奎著輯

產後乍見鬼神

產後如見鬼神或言語讝妄皆由血氣虧損陰虛發熱或瘀血停滯以致心神煩躁而然也宜以調經散治之

薛氏曰若敗血停滯用調經散若血虛發熱用八珍加炮姜若心血虛損用柏子仁散大抵此証皆由心脾血少所致但調補胃氣則痰清而神自安矣若果係鬼祟所附即灸鬼哭穴可愈其或不起者多因豁痰降火攻伐之過也

一產婦患前症或用調經散愈而復作仍服前散益甚痰涎上湧朝寒暮熱乃早用八珍散夕用加味歸脾湯各五十餘劑而愈

調經散　治血虛經閉心神煩躁渾身疼痛或時見怪

沒藥　琥珀　桂心各一錢　白芍炒　當歸各七分　細辛五分　麝香少許　右為末每服半錢薑湯酒各少許調服

栢子仁散　治產後元氣虛弱瘀血停滯狂言亂語

栢子仁　遠志　人參　桑寄生　防風

當歸炒　生地　甘草炙各等分用白羊心壹個水三盞煮清汁七分入藥五錢煎服

產後心神驚悸

薛氏曰人之所主者心〻之所主者血心血一虛神氣不守此驚悸所由作也當補血氣為主

一產婦患前症二度服琥珀地黃丸局方妙香散隨效再患服之其症益甚而脈浮大按之如無發熱惡寒此血氣俱虛乃以十全大補加味歸脾二湯各百餘劑而愈後遇驚恐勞怒復作仍服前藥而安

琥珀地黃丸　治產婦惡露未盡胸腹作痛或小便不利

琥珀　延胡索糯米同炒去米　川歸各一兩

蒲黃四兩　生地研取汁留滓　生姜各二斤研取汁留滓生姜汁石銀器內炒地黃滓以地黃汁炒生姜滓各乾為度　右為末蜜丸如彈子大

每服一丸當歸煎湯化下

治血虛驚悸少寐及產後敗血停留少腹作痛

辰砂　琥珀　没藥　當歸等分　右為末每服二錢空心日午臨卧白湯調下

治產後驚悸亂語精神不定用好硃砂為細末每以酒調下一錢

產後中風恍惚

產後恍惚因元氣俱虛心經血少或外邪所侵以致心神恍惚怔忡不寧

薛氏曰當大補氣血為主而佐以後方為善盖風乃虛極之假象也固其本元諸病自退若專治其風則速其危矣

一產後患前症盜汗自汗發熱晡熱面色黃白四肢畏冷此氣血俱虛用八珍湯不應更用十全大補加味歸脾二湯始應後因勞怒發厥昏憒左目牽緊兩唇抽動小便自遺作肝火熾盛用十全大補加鈎藤山梔而安再用辰砂遠志丸而愈

辰砂遠志丸　產後中風驚狂起卧不安或痰涎上湧　石菖蒲　遠志去心甘草湯煮　人參　茯神

辰砂各三錢 川芎 山薬 鉄粉 麥冬 細辛
天麻 半夏 南星 白附子各一兩 為末
姜汁糊為丸菉荳大別以硃砂為衣每服三十
丸姜湯送下

産後極虚生風

産後生風因去血過多氣無所主以致唇青肉冷
汗出目眩神昏急服濟危上丹若投以風薬則
悞甚矣

薛氏曰若心脾氣血虚用十全大補湯如不應加
附子釣藤鈎若肝經血虚用逍遥散加釣藤經
云脾之榮在唇心之液為汗乃心脾二臓虚極
急用參附湯救之

一婦患前症或用諸補劑四肢逆冷自汗泄瀉腸
鳴腹疼以為陽氣虚寒用六君子姜附各加至
五錢不應以參附加至一兩始應良久不服仍
前腸鳴腹痛後灸関元穴百餘壮及服十全大
補湯方効

濟危上丹 乳香 五靈脂 硫黄 玄精石

阿膠 巻栢 桑寄生 陳皮各等分 将上四味
入石器微火炒再研入餘末用生地黄汁丸梧
子大每服二十丸食前温酒或當帰酒下

當帰建中湯 治産後腹痛拘急痛連腰背自汗
少食 當帰 桂心各三兩 白芍六兩 炙甘草二兩
每服五錢姜棗水煎入飴糖一匙以効為止

獨參湯 一切失血悪寒發熱作渇煩躁或口噤
痰鳴自汗盗汗氣虚脉脱手足逆冷蓋血生於
氣補氣者乃陽生而陰長也

産後虚汗不止

産後汗不止者皆陽氣頓虚腠理不密而津液妄
泄也若遇風則変痙縦虚之短氣則身體消痩
唇口乾燥久則經水断絶由津液竭故也

薛氏曰若血氣俱虚急用十全大補湯如不應參
附芪附湯恐汗多亡陽發痙尤當用之王好古
曰頭汗出至頸而還額上偏多蓋額為六陽之
所會也由虚熱薫蒸而出竊謂前症當以部位
分之額左属肝額右属肺鼻属脾頤属腎額属

心治者審之
一產婦略聞音响其汗如水而昏憒諸藥到口即嘔作脾氣虛憊用參附末為細丸時含三五粒液下乃漸加至錢許却服參附湯而痊
一產婦盜汗不止遂致瘀瘵神思疲甚口乾引飲乃血虛有熱用當歸補血湯以代茶又以當歸六黃湯內黃芩黃栢炒黑倍加人參五味子二劑而愈

麻黃根湯　產後虛汗不止身熱發渴驚悸不安

當歸　黃芪炒　麻黃根　牡蠣煅六　炙甘草
人參各等分水煎服

產後氣脫汗不止小便短少四肢難以屈伸
炙甘草一兩　附子炮五錢　桂心　白芍炒各一兩五錢
每服三五錢加姜棗水煎服以効為止

止汗散　牡蠣煅五錢　小麥麩炒八兩　右為細末
每服三五錢猪油汁調下

人參湯　產後諸虛不足發熱盜汗內熱晡熱等症　人參　當歸　等分為末猪腰子一枚切片水二鍾糯米半合葱白二根煮取汁八分入藥三錢煎服

當歸六黃湯　治氣血虛熱盜汗不止如不應加人參白术心血不足加炒酸棗仁
當歸　熟地　黃芪炒各二錢　生地　黃栢炒黑
黃芩炒黑　黃連炒黑各一錢　水煎服

參附湯　治陽氣虛寒自汗惡寒手足逆冷大便自利或臍腹疼痛吃逆不食或汗多發痙等症
人參一兩　大附子炮五錢　作一服加姜棗水煎徐徐飲下

當歸補血湯　治肌熱燥熱目赤面紅煩渴引飲晝夜不息脉洪大而虛重按全無者　當歸三錢
黃芪炙一兩　水煎服

芪附湯　治陽氣虛脫惡寒自汗或口噤痰湧四肢逆冷或吐瀉腹痛飲食不入及一切虛寒等症　黃芪一兩　附子炮五錢　作一服加姜棗水煎如不應倍加附子乃得全濟

汗多變痙

產後汗多變痙因氣血虧損肉理不密風邪所乘

口噤背強如癎或搖頭馬嘶不時舉發氣息如絶宜速灌小續命湯若汗出兩手拭不及者不治

薛氏曰此因去血過多元氣虧損或外邪相搏以致牙關緊急四肢痙強或陰火內動或腰背反張肢體抽搐若有汗而不惡寒者曰柔痙若無汗而惡寒者曰剛痙由亡血過多筋無所養故傷寒汗下過多及潰瘍而膿血大泄者多患此乃敗症也急以十全大補湯治之如不應急加大附子多有復甦者

一產婦牙關緊急腰背反張四肢抽搐兩目連劄此去血過多元氣虧損陰火熾盛用十全大補加炮姜一劑而甦數劑而安

小續命湯　治剛痙或腳氣痹弱不能轉舒行步欹側或口眼喎邪牙關緊急角弓反張

麻黄　桂心　甘草各五錢　防風　白芍炒

白术炒　人參　川芎　大附子炮　防已酒洗

黄芩炒各等分　每用五錢水煎入姜汁少許温服

若自汗爲柔痙者去麻黄有熱去附子減桂一半盛冬初春去黄芩

產後口噤腰背反張

產後口噤由血氣虛而風邪乘於手三陽經也蓋手三陽之筋循結於頷得風冷則筋急故致口噤腰背攣急角弓反張者是風邪入於諸陽之經也

薛氏曰若因血氣耗損腠理不密汗出過多而患之者乃虛象也宜固氣血爲主佐以本方丹溪謂產後當大補氣血爲先雖有它証以末治之如惡寒發熱等症乃氣血虛甚之極也宜大劑參芪歸术肉桂以培養之如不應急用炮附子再不應用人參一兩附子二三錢名參附湯倘猶不應乃藥力未能及也宜多用之

婦人產後不省人事吐涎瘈瘲

當歸　荆芥穗　等分三錢水一盞酒少許煎灌之下即甦倘未應者當改用大補氣血藥

張文仲治前症用白术四兩以酒濃煎頓服

產後中風

產後中風或氣血未復風寒所感以致筋攣拘急口眼歪斜或肢體緩弱入臟則恍惚驚悸郭稽中云產後強力下床或悞入房或憂怒內傷臟腑陳無擇曰當以脉辯而治之若努力下床月內入房憂怒者着艾非中風類乃蓐勞火邪之症

薛氏曰若果外邪所屬形氣不足病氣有餘當補元氣爲主稍佐以治病之藥若強力下床月內

入房屬形氣病氣俱不足當純補元氣多有復甦者若悞投風藥乃促其危也

治產後身背拘急妄言發熱四肢拘攣不時驚悸

川芎 羌活 羚羊角 酸棗仁炒 芍藥炒各四兩

桑白皮一兩五錢 防風一兩一錢五分 每服六七錢水煎服

治產後中風唇青鼻黑用小續命湯連進三服即愈

產後中風煩渴用紅花子五合炒 水煎徐徐呷之

產後四肢筋攣

產後中風四肢筋脉攣急乃氣血俱虛或風邪客於皮膚則頑痺羸乏若入於筋脉則四肢攣急皆由大經空虛風寒乘虛而漸入也

薛氏謂肝屬木而主筋若肝經風熱血燥用加味逍遙散如不應當用六味丸以補腎水

一產婦筋攣臂軟筋肉掣動此氣血俱虛而自熱也用十全大補湯而安

一產婦手麻服愈風丹遍身皆麻神思倦怠乃氣血虛弱以十全大補湯加炮姜數劑漸愈去姜繼服而安

產後遍身疼痛

產後遍身疼痛者由氣虛百節開張血流骨節以致肢體沉重不利筋脉引急發熱頭痛宜用趂痛散治之陳無擇云若兼感寒傷食宜用五積散若誤作傷寒發汗則筋脉抽搐手足厥冷則变爲痙當補氣血爲主

薛氏曰若以手按而痛益甚是血瘀滯也用四物炮姜紅花桃仁澤蘭補而散之若按而痛稍緩此是血虛也用四物炮姜人參白术補而養之

趁痛散 產後骨節疼痛發熱頭重四肢不舉
牛膝酒炒 甘草炙 薤白各一兩 當歸 桂心
白朮炒 黃芪炒 獨活 生姜各半兩
每用五錢水煎服
五積散 治風寒所傷遍身疼痛脚氣疼痛或寒
熱拘急嘔吐不食等症 當歸浸 白芍 川芎
桔梗各炒 厚朴姜炒 乾姜 人参 茯苓 陳皮
白芷 蒼朮 半夏姜制 肉桂 麻黃 炙甘草
各五分 入姜棗水煎服

產後腰痛

腎主腰脚產後腰痛者蓋腎為胞胎所繫此因產
勞傷腎以致風冷客之若連背脊痛久未已後
遇有孕必至損動
薛氏曰若真氣虛而邪乘之者當歸黃芪湯或十
全大補為主佐以寄生湯如不應須十全大補
加附子
一產婦腰痛腹脹善噫諸藥皆嘔乃脾虛血弱用
白朮一味炒黃每劑一兩米泔煎時飲一匙四
劑後漸安服百劑全愈
如神湯即生料五積散 加桃仁逐敗血去風濕
產後惡露不盡腰重痛或兩股痛如錐刺宜服桃
仁湯若作癰用五香連翹湯
桃仁湯 治產後惡露不盡腹中作痛或流注腿
股作痛急用此湯治之如未應多变作癰須用
五香連翹湯 桃仁去皮尖 蘇木 生地各半兩
䖟蟲去足翅炒 水蛭炒各三十枚 每服五錢姜
水煎空心熱服以惡露下為度
五香連翹湯 木香 丁香 沉香 射香
升麻 獨活 連翹 木通 桑寄生各二兩
每劑五錢水煎入竹瀝少許服
當歸黃芪湯 治腰痛不可轉側或汗出壯熱氣
短 黃芪炒 白芍藥各炒二兩 當歸三兩
每劑五錢水煎服

產後腰痛兒枕痛

產後腹痛或因外感內傷瘀血壅滯所致瘀血以
失笑散風寒外感以五積散內傷飲食以養胃

湯加山查治之

產後兒枕痛者乃母胎中宿血也其痛在小腹大抵小腹痛多由惡露凝滯或外寒相搏若久而不散必成血瘕月水因之而不調也

生生子曰誑以手按之痛甚者瘀血也按之而痛緩者或喜熱物熨之者此虛中有寒也當補而溫之

山查濃煎汁入砂糖少許服之極治兒枕痛以其能消瘀血故痛止也

隱居澤蘭湯 產後惡露腹痛或胸滿少氣

澤蘭 生地 當歸 芍藥炒 生姜各一錢 甘草炙五分 大棗四枚 水煎服

失笑散 治心腹痛產後瘀血上攻心腹疼痛而牙関緊急一服而愈 五靈脂 蒲黄各一錢

醋水煎服五灵脂一味尤妙

大岩蜜湯 治陽氣虛寒心腹作痛不食四肢厥冷 生地 當歸 獨活 吳茱萸 炮姜 白芍藥炒 甘草炙 桂心 小草各一兩 細辛半兩 每帖五錢水煎服

延胡索散 產後惡血凝滯臍下作痛或作寒熱

延胡索 桂心各半兩 當歸一兩 為末食前熱酒調下二錢 失笑散尤佳

當歸養血丸 產後瘀血心腹脹痛或腰脚疼痛

當歸 赤芍 丹皮 延胡索炒各二兩 桂心一兩 為末蜜丸梧子大每服五十丸溫酒下

金黄散 治惡露上冲肚腹作痛或發熱口渴

延胡索 蒲黄各一錢 桂心二分 為末酒調下

產後寒疝腹痛

良方曰產後臍腹作痛乃冷氣乘虛也用當歸建中湯治之陳無擇云若產當寒月人門臍下脹痛手不可近者用羊肉湯治之

生生子曰若驗其無瘀血而果為寒氣所侵蟠蔥散亦佳如小水短濇口渴内熱以龍胆瀉肝湯加青蒿徹其熱從小便出也亦有陽氣下陷者以補中益氣湯加芍藥桂心荔枝核

羊肉湯 產後脾虛寒邪所乘以致腹痛或頭眩

脇臍急痛　精羊肉四兩　當歸　川芎各半兩
生姜一兩　水十盞煎四盞分四次服

蟠葱散　方見

產後兩脇脹痛

良方曰此因惡露不盡或肝經血虛或肝經氣滯當分而治之宜與脇痛門參治

一產婦因怒兩脇脹痛吐血甚多發熱惡寒胸腹脹痛乃氣血俱虛用八珍加柴胡丹皮炮姜而血頓止又用十全大補湯而寒熱退此症苟非姜桂辛溫助脾胃以行藥勢不惟無以施其功而反助其脹耳

八　廿三卷　二六

經效方　治產後肝經氣滯不平脇肋腹痛或寒熱往來內熱晡熱　當歸一錢　芍藥炒　苦梗炒
檳榔　枳殼炒各八分　桂心　青木香　柴胡各六分
水煎服

當歸散　治產後陰血虛弱或氣滯血凝以致發熱腹痛或腹脇脹滿以當歸干姜等分每服三錢水煎服

產後血瘕

良方曰產後瘀血與氣相搏名曰瘕謂其痛而無定處此因夙有風冷而輕則否澁重則不通

薛氏曰前症乃寒邪乘客氣血壅滯此因氣病而血病也當補養胃氣調和月經寬緩靜養為善

難經云任脉為病男子內結七疝女子為瘕聚然當與瘕聚門參治

治血瘕作痛臍下脹滿或月經不行發熱体倦
當歸八分　桂心　芍藥炒　血竭　蒲黃炒各六分
延胡索炒四分　為末空心酒調分二次服

八　廿三卷　二七

蔔氏方　治前症桂心為末每服一錢空心酒調下

產後發熱

大全人參湯　治產後諸虛不足發熱盜汗
人參　當歸　等分為末以猪腰子一具去脂膜切小片子以水三升糯米半合葱白二條煮米熟取清汁一盞入藥末二錢煎至八分不拘時溫服

羅氏犀角飲子　治產後亡津液虛損時自汗出發熱困倦唇口乾燥　犀角　麥冬　白朮各半兩

柴胡一兩　枳殼麸炒　生地　地骨皮　炙甘草
當歸　人參　茯苓　黄芩　黄芪各一錢
右每服六錢入浮小麥七十粒姜三片水煎服
產後發熱多屬不足虛中有寒丹溪每以乾姜加入補藥中取効不可不知

產後虛煩發熱

薛氏曰虛煩發熱乃陽隨陰散氣血俱虛若惡寒發熱煩躁作渴急用十全大補湯若熱愈甚急加桂附若作渴面赤宜用當歸補血湯若誤認為火症投以凉劑禍在反掌王氷先生云大寒而甚熱之不熱是無火也熱來復去晝見夜伏夜發晝止不時而熱是無火也當治其心如大熱而甚寒之不寒是無水也熱動復止倏忽往來時動時止是無水也當助其腎故心盛則生熱腎盛則生寒腎虛則寒動於中心虛則熱收於内又熱不勝寒是無火也寒不勝熱是無水也　治法前症無水者六味丸無火者八味丸氣血俱虛者八珍湯或十全大補湯

人參當歸湯　治產後虛煩短氣發熱
人參　當歸　麥冬　桂心　生地各二錢　水煎服
大棗四枚　粳米一合　淡竹葉二錢　芍藥炒一錢
產後血弱虛煩四物加茯神遠志服之
產後餘血不盡奔心煩悶生藕汁飲一二盞甚効竹瀝亦佳

竹葉湯　產後短氣欲絶心中煩悶以此湯之
竹葉　麥冬　小麥各一升　甘草一兩　生薑二兩
大棗十四枚　水一斗煮小麥竹葉至八升去渣納餘藥煮取三升去渣温服　虛悸加人參二兩氣力少加糯米五合

產後血渴

薛氏曰若出血過多虛火上炎用童子小便四物白朮麥冬丹皮若胃氣虛而有熱用竹葉歸芪湯若血虛發熱用八珍加麥冬五味若血脫發熱煩躁用當歸補血湯若胃氣虛弱用補中益氣湯或七味白朮散

七味白朮散　治中氣虛弱津液短少口乾作渴

或因吐瀉所致　人參　白术炒　白茯苓
木香　炙甘草　藿香　葛根各一錢　水煎服

竹葉歸耆湯　治胃氣虛熱口乾作渴惡冷飲食
竹葉一錢半　當歸一錢　黃芪二錢　白术　人參各一錢　麥冬七分　炙甘草五分　水煎服

産後乍寒乍熱

産後乍寒乍熱由血氣虛損陰陽不和若陰勝則乍寒陽勝則乍熱宜用增損四物湯若因敗血不散腹内作痛宜用奪命丹後用增損四物湯隨病加減陳無擇云敗血流閉諸陰則寒流閉諸陽則熱用大調經散五積散

薛氏謂陽氣不足陰氣上入於陽中而惡寒者用補中益氣湯若因陰氣不足陽氣下陷於陰中而發熱者用六味丸若氣血不足而惡寒發熱者用八珍湯若病後寒熱倦怠者用補中益氣湯若肌熱大渴目赤面紅者用當歸補血湯

一産婦惡寒發熱此血氣虛寒用十全大補加炮姜而寒熱愈繼以補中益氣而肢体安

增損四物湯　人參　當歸　芍藥炒　川芎
乾姜炒各一兩　甘草四錢　每劑五錢姜水煎服

大調經散　治産後惡露未消寒熱自汗或肚腹作痛　大荳一兩半炒去皮　茯神一兩　真琥珀一錢
為末每服二錢空心濃煎烏荳紫蘇湯調下

産後瘧疾

郭稽中曰産後乍寒乍熱者多是敗血為害或陰陽不和若槩作瘧疾治之誤矣

陳無擇曰産後寒熱或一二日或二三日一發或先寒後熱或先熱後寒或寒多熱少或寒少熱多或純寒純熱者皆是瘧疾最難治療可用草果飲生熟飲四獸飲選而用之

薛氏曰此症當以補胃氣為主佐以草果飲之類若胃氣稍充以草果飲為主佐以補胃之劑大抵産後瘧疾因脾胃虛弱飲食停滯或外邪所感或鬱怒傷脾或暑邪所伏審係飲食用六君子加桔梗蒼术藿香如外邪多而飲少用藿香正氣散如外邪少而飲食多用人參養胃湯芳

後所傷用補中益氣湯氣血虛弱用十全大補加炮姜中氣虛寒用六君加姜桂元氣脫陷急加附子蓋氣虛則寒血虛則熱胃虛則惡寒胃氣下陷則寒熱交作或吐嘔不食腹痛煩渴發熱譫語或手足逆冷寒戰如慄雖見百症但溫補脾胃其病自退

增損柴胡湯　產後虛熱寒熱如瘧食少腹脹

柴胡　人參　甘草炙　半夏　陳皮　川芎

白芍炒　各等分每帖七錢入姜棗水煎

白茯苓散　產後蓐勞頭目四肢疼痛寒熱如瘧

白茯一两　當歸　川芎　桂心　白芍炒

黃芪炒　人參各半两　熟地四錢　右先以水三盞入猪腎一雙姜棗各三煎至二盞入前藥半两再煎至一盞許服之

猪腰子粥　產後蓐勞發熱用猪腰子一枚去膜切片用塩酒拌先用粳米一合入葱椒煮粥塩醋和將腰子鋪在碗底以熱粥傾蓋之如作盦生狀空心服

黃芪建中湯　產後諸虛不足發熱或惡寒腹痛

黃芪炒一两　白芍炒二两　甘草炒七錢　肉桂一两

每服五錢姜棗水煎日二三服虛甚者頭加附子鳥雯

藿香正氣散　治外感風寒內傷飲食頭痛寒熱或霍亂泄瀉或作瘧疾　藿香一錢半　桔梗炒

大腹皮　紫蘇　半夏曲　茯苓　白芷

陳皮　白朮炒　厚朴制各一錢　炙甘草五分

加姜棗水煎服

人參當歸散　治去血過多內熱短氣頭痛悶亂骨節作痛或虛煩咽燥有似瘧者　人參

當歸　生地　桂心　麥冬　白芍酒炒　各等分粳米一合竹葉十片水三鍾煎二鍾納前藥五錢棗二枚煎至八分服虛甚者用熟地

生生子曰按病机要云治胎產之病從厥陰經論之無犯胃氣及上中二焦謂之三禁不可汗不可下不可利小便發汗者同傷寒下之早証利大便則脈數而已動於脾利小便則內亡津液胃中枯燥治之方法能無犯此二禁則營衛

自和而寒熱自釋矣
又有惡露不盡或風邪乘虛陷入血室者則晝日清明夜則譫語寒熱或只發熱如見鬼狀此為熱入血室用小柴胡湯加生地丹皮或四物加柴胡桃仁

嘔吐腹脹及嘔逆不食

產後腹脹滿悶嘔吐者因敗血散於脾胃不能運化而致宜用抵聖湯治之

薛氏謂若飲食停於脾宜用六君厚朴若飲食傷於胃宜用六君子湯或加砂仁神曲之類大凡損其脾者當節其飲食為善

八十二卷　廿四

抵聖湯　赤芍藥　半夏　澤蘭葉　人參
陳皮　炙甘草各一錢　生姜炒乾半兩　水煎極効

胃為水穀之海以養臟府產後胃氣虛弱飲食所傷必致嘔逆不食也治法不過溫養脾胃審其所傷之物而推治之或有陽氣衰微火不生土者八味丸若嘔吐泄瀉手足俱冷或肚腹作痛乃虛寒極矣急用理中湯加附子桂心而甦者

一產婦朝吐痰夜發熱日夜無寐或用清痰降火肌體日瘦飲食日少前症愈甚詎思早吐痰脾氣虛夜發熱肝血虛晝夜無寐脾血耗也遂用六君子加逍遙散歸脾湯以次調補而痊

開胃散　治產後胃虛嘔吐胸滿不食
訶子肉一兩半　人參一兩　炙甘草半兩
每劑五錢姜水煎服

產後胃虛嘔逆　橘紅一兩　半夏　炙甘草各半兩
藿香三兩　每劑五錢姜水煎服

八十三卷　廿五

治產後嘔逆不食　白朮五錢　生姜六錢　水煎徐徐溫服

石蓮散　產後胃寒咳逆嘔吐不食或腹作脹
石蓮肉一兩半　茯苓一兩　丁香半兩
為末每二錢姜湯或米飲調下日三次

錢氏益黃散　脾土虛寒水反來侮以致嘔吐不食或肚腹作痛或大便不時手足逆冷等症
陳皮一兩　青皮　訶子肉　炙甘草　丁香各二錢
每服四五錢水煎服

人參養胃湯　治外感風寒內傷飲食寒熱頭痛

或変瘧疾　半夏　厚朴制　橘紅各八分　藿香葉
草果　茯苓　人参各五分　蒼朮一錢　炙甘草三分
右姜七片烏梅一箇水煎服

產後喉中氣急喘促　一

產後喉中氣急喘促因營血暴竭衛氣無主獨聚
於肺名曰孤陽絶為難治若因敗血停凝服奪
命丹若因營血暴絶服芎藭湯若因風寒所傷
服旋覆花湯因氣鬱結小調經散若傷飲食服
見現丸

〈十二禾　廿六

薛氏曰若脾胃氣虚用六君桔梗若兼外邪更加
紫蘇中氣虚寒補中益氣加炮姜肉桂若陽氣
虚脱更加附子若瘀血入肺急用二味参蘇飲
一產婦喘促自汗手足俱冷常以手護臍腹此陽
氣虚脱用参附湯四劑而愈

二味参蘇飲　治產後血入於肺面黒發喘欲死
人参一兩　蘇木二兩　水煎頓服

旋覆花湯　治傷風寒暑湿喘嗽太盛坐卧不寧
旋覆花　赤芍薬　半夏曲　前胡　甘草
荊芥穗　五味子　茯苓　麻黄　杏仁
各等分毎以五錢姜棗水煎服有汗者勿服

五味子湯　治產後喘促脉伏而厥　五味子炒杵
人参　杏仁各一錢　麦冬　陳皮各一錢
右姜三片棗二枚水煎服

芎藭湯　芎藭　當帰　白芍等分　毎五錢水煎服

產後口鼻黒衄

產後口鼻起黒氣及鼻衄者蓋陽明經脉之海起
於鼻交頞中還出頰口交人中左之右右之左

〈廿三來　廿七

此產後氣虚營血散乱胃絶肺敗之症也急取
緋線一条并產婦項心髪二根緊繋中指節更
無可療
薛氏曰按胃脉侠口繞承漿蓋鼻準屬脾土鼻孔
屬肺金誠胃虚肺損氣脱血死之症急用二味
参蘇飲加附子五錢亦有獲生者

產後月水不通

產後乳子周歳而經不行是其常也若半歳而經
行此血有餘也若一二歳不行而無疾不必服

藥若肢体倦怠食少內熱是血少也宜健脾胃

若以藥通之則誤矣

薛氏曰脾胃虛弱用六君子若鬱火傷脾用歸

脾湯加丹皮山梔若怒火傷血宜四物合小柴

胡氣血俱虛八珍湯加丹皮

產後四肢浮腫

產後四肢浮腫者乃敗血乘虛流注宜用小調經

散陳無擇云若風邪乘於氣分皮膚腫而浮虛

乃氣也若皮膚腫如熟李乃水也蓋氣腫者宜

發汗水腫者宜利小便

薛氏謂若寒水侮土宜養脾肺若氣虛浮腫宜益

脾胃若水氣浮腫宜補中氣仍參水分血分而治

一產婦飲食少思服消導之劑四肢浮腫乃中氣

不足朝用補中益氣湯夕用六君子而愈後因

怒腹脹誤服沉香化氣丸吐瀉不止飲食不進

小便不利肚腹四肢浮腫用金櫃加減腎氣丸

而愈

小調經散 沒藥 琥珀 桂心 芍藥 當歸

各錢一 為末每服五分姜汁溫酒調

大調經散 最治腫滿喘急煩渴小便不利

方具乍寒乍熱卷

治血虛氣腫水腫 澤蘭葉 防已 等分 為末每

以二錢溫酒調下或醋湯亦可

金櫃加減腎氣丸 治脾腎虛寒腰重脚腫濕飲

留積小便不利或肚腹脹腫四肢浮腫氣喘痰

甚或已成水症其効如神 白茯苓 三兩 牛膝

附子 五錢 桂心 車前子 山茱萸 肉 丹皮

山藥 澤瀉 各一兩 熟地黃 四兩 為末煉蜜丸梧

子大每服七八十丸空心米飲下

產後腹痛瀉利

產後腹痛瀉利因腸胃虛弱寒邪乘襲或水穀不

化洞泄腸鳴或手足逆冷用調中湯治之陳無

擇謂若六淫七情而致者當隨所感而治之

若胸膈飽脹或惡食吞酸此飲食停滯用六君

枳實山查以消導若食既消而仍痛更或頭痛

熱渴惡寒欬嘔此中氣被傷用補中益氣半夏

茯苓以益脾胃

調中湯 良姜 當歸 桂心 芍藥 附子炮 川芎各一兩 甘草炒五錢 每服五錢水煎

五味子散 產後泄瀉或腎泄在五更侵晨作瀉飲食不進或大便不實登厠無時

五味子炒三兩 吳茱萸炒五錢 共為末每以二錢白湯調下為丸尤妙

四神丸 治脾腎虛弱侵晨五更作瀉或全不思食或食而不化大便不實 破紙故炒四兩 肉荳蔻生用二兩 五味子二兩 吳茱萸炒四兩 為末用大紅棗四十九枚生姜四兩以水共煮爛去姜以棗肉和藥搗為丸梧子大空心塩湯下

二神丸 治同即前四神丸減去五味子吳茱萸

產後赤白痢

產後痢疾因飲食六淫七情傷於脾胃或滲大腸皆為難治若飲食不進謂之虛痢氣字不順謂之氣痢寒熱濕食升降調補各隨所宜而施治之○白屬氣分而赤屬血分也若米食所傷用六君加穀蘖若麵食所傷加麥蘖若肉食所傷加山查神曲凡兼嘔吐俱加霍香若兼嚥酸或嘔吐用前藥送越鞠丸若肝木尅脾土用六君加柴胡炮姜若寒水反來侮土用錢氏益黃散若久瀉或元氣下陷兼補中益氣湯以升發陽氣若瀉痢色黃乃脾土真色宜加木香肉荳蔻若屬脾土虛寒六君加木香姜桂若脾腎虛寒用補中益氣湯及四神丸若下元虛寒用八味丸以補土母若以小便澁滯肢体漸腫或兼喘咳用金櫃腎氣丸以補脾腎利水道若胃氣虛弱而四肢浮腫須補胃為主若久而不愈是氣虧損也必用四神丸六味丸八味丸三方以補足三陰若用分利導水之劑是虛其虛也

產後痢疾作渴者乃內亡津液或胃氣虛不生津液但止其渴其痢自瘥○若渴而不喜冷飲屬胃氣虛故無津液宜用七味白木散或錢氏白木散如夜間發熱口渴屬腎氣虛而不能潤宜六味丸並佐以益氣湯以滋化源

一産婦瀉痢發熱作渴吐痰肌躰消瘦飲食少思或胸膈痞滿或小腹脹墜年餘矣乃脾腎之瀉朝用二神丸夕用六君子三月餘而痊

一産婦患前症形躰倦怠飲食不進與死為鄰此脾胃俱虛也用四神丸十全大補湯而愈

産後大便秘澁

産後大便秘澁因腸胃虛弱津液不足若小腹悶脹宜服麻仁丸潤之若用寒藥則促其危矣

薛氏曰若計其日期飲食數多即用藥通之禍在反掌之間必待腹滿覺脹欲去不能者乃結在直腸宜用猪胆汁導而潤之若服苦寒疏通反傷中氣通而不止或成痞症若去血過多宜用十全大補血虛火燥用加味四物氣血而虛用八珍湯雖數日不通飲食如常腹中如故仍用八珍加杏仁麻仁治之若泥其日期飲食而強通之則誤矣

一産婦大便七日不通飲食如常腹中如故此腹未滿也用八珍加麻杏仁至二十一日腹滿欲行用猪胆汁潤去而安

一婦大便秘澁諸藥不應苦不可言飲人乳而安

麻仁丸　火麻仁研如泥　枳殼　人參各四分　大黃二分　右為末入麻仁煉蜜丸如梧子大每服二十丸空心溫酒下未通漸加不可過服

阿膠枳殼丸　治産後大便秘澁以阿膠枳殼二味等分為末蜜丸梧子大滑石末為衣白湯送下二十丸未行再服

産後大小便不通

良方曰此因腸胃虛弱津液枯竭故也宜參前秘結門詳治

一産婦大小便不通諸藥不應將危矣令飲牛乳一日稍通三日而痊人乳尤善

麻花散　治膀胱氣滯血澁大小便秘

麻仁　葵子　滑石　檳郎各等分為末每以三錢空心葱白煎湯調下

産後遺糞

良方取故燕窠中草燒為末或枯礬牡礪或白斂芍藥各等分為末俱用酒調服或用固腸亦可

薛氏曰若脾腎虚弱用還少丹仍以補中益氣湯為主虚寒加肉荳蔻補骨脂或四神丸若脾腎虚寒兼八味丸仍佐前二方

一産婦小便出糞名大小腸交乃氣血俱虚失行常道先用六君子湯二劑又用五苓散一劑而痊循常腸交亦可倣治

還少丹　治脾腎虚寒飲食少思發熱盗汗遺精白濁又治真氣虧損肌体瘦弱等症

肉蓯蓉　遠志去心　茴香　巴戟　山藥　牛膝　熟地　枸杞子　石菖蒲　山茱萸肉　楮實子　五味子　杜仲去皮姜炒　白茯苓各二兩　各另為末

棗肉百枚加煉蜜為丸如梧子大每服五七十丸空心酒下

〈廿二卷　卅四〉

産後諸淋

良方謂乃熱客於脬虚則頻數熱則澁痛氣虚兼熱血入胞中則血随小便出而為血淋也

薛氏云若膀胱虚熱用六味丸若陰虚而陽無以化用滋陰腎氣丸蓋土生金金生水當滋化源也與小便淋瀝頻數巻參治

滑石散治熱淋　滑石二分　通草　車前子　葵子各四分　右為細末漿水調服

治小腸有熱小便澁痛或為血淋

瞿麥　黄芩　冬葵子各二兩　通草二兩　大棗十二枚

右水六升煎二升半分二服

治脾氣不利小便不通

橘紅為末以二錢空心温酒下

治肺氣不利小便不通　杏仁十四枚去皮尖炒之食

〈廿二卷　卅五〉

治脬轉小便不利　滑石一錢半　寒水石一錢　煎服

一産婦小水淋瀝或時自出用分利降火之剤二年不愈此肺腎氣虚用補中益氣湯六味地黄丸而痊

凡産婦小便頻數者乃氣虚不能制故也

小便不禁

廣濟方治産后小便不禁用雞毛燒灰千金翼用白薇芍藥為末俱用温酒下日三服或桑螵蛸半兩龍骨一兩為末毎二錢粥飲調下

薛氏謂若脾肺氣虛用補中益氣湯若肝腎陰虛六味地黄丸若肝腎虛寒用八味丸

補脬飲　治胞破小便淋瀝　生絹黄色者一尺　白牡丹根皮用　白芨各一錢　水一碗煎至絹爛湯服服後忌言語否則無功

雞內金散　治氣虛溺床用雄雞肶胵并腸燒為末以溫酒調下

產後小便出血

此因虛熱血滲於脬也以亂髮洗淨燒為末米飲調服或滑石末一錢生地黄汁調下

一產婦尿血面黄脇脹少食此肝木乘脾土也用加味逍遙補中益氣兼服而愈後為懷抱不禁食少體倦驚悸無寐便血復出用加味歸脾湯二十餘劑將愈惑于衆論服犀角地黄湯諸症復作仍守前湯而愈

產後陰脫玉門不閉

此因坐產努力舉動房勞所致或脫肛陰挺逼迫腫痛小便淋瀝

薛氏謂氣血虛弱宜用十全大補湯若腫脹焮痛肝經虛熱也加味逍遙散若憂怒肝脾氣血傷也加味歸脾湯若暴怒肝火血傷也龍胆瀉肝散

一產婦玉門不閉發熱惡寒用十全大補湯加五味子數劑而寒熱退用補中益氣加五味子數劑而玉門閉矣

硫黄散　產後陰氣虛寒　硫黄　烏賊魚骨　五味子各半兩　為末摻患處　一方蛇床子一升炒熱帛包熨患處亦治陰腫

產後乳少或止

乳汁乃氣血所化若元氣虛弱則乳汁短少初產乳房焮脹此乳未通若暴怒乳出肝經風熱若累產無乳此內亡津液蓋乳汁資於衝任若婦人疾在衝任乳少而色黄生子則怯弱而多疾

薛氏云此氣血虛弱而不能化生宜壯脾胃怒動肝胆而乳腫汁出宜清肝火屢產無乳或大便涩滿當滋化源氣血旺則乳汁溢

一產婦因乳少服藥通之致乳房腫脹發熱作渴

此氣血虛以玉露散補之而愈
湧泉散　能通乳　王不留行　麥門冬　瞿麥
龍骨各二錢　右用猪蹄汁一碗酒一杯煎服良
久以木梳于乳房上梳下忌姜椒辛辣
玉露散　乳脉不通身躰壯熱頭目昏痛大便澁
滞　人參　茯苓　桔梗炒　芍藥各一錢　甘草炙五分
右㕮咀水煎服愈
凡未産而乳先出謂之乳泣生子多不育
産婦氣血方盛乳房作脹或無兒飲因而脹痛增

寒發熱用麥芽二三兩炒熟水煎服之立消
一産婦勞役或乳汁𣾰如湧泉昏昧吐痰此陽氣
虛而厥也灌以獨參湯而甦更以十全大補湯
數劑而安矣
一婦乳頭裂破以秋茄子裂開者陰乾燒存性為
末水調塗之而愈

婦人繭唇

內經曰脾氣開於口又曰脾之榮在唇蓋燥則乾
熱則裂風則瞤寒則揭若腫起白皮皺裂如蚕
繭名曰繭唇有腫重出如繭者有本細末大如
繭如瘤者其因或胎産經行而陰血損或七情
動火而榮血虧或心火傳授脾經或厚味積熱
傷脾大要審本症察兼症補腎水生脾血則燥
自潤火自除風自息腫自消若患者忽略治者
不察內用清熱消毒之藥外用追蝕線結之法
反為敗症慎哉
一婦懷抱久鬱或時胃口嘈辣胸膈不利月水不
調晡熱食少躰倦唇腫已年餘矣此脾經鬱火

傷血用歸脾湯加姜汁炒黃連山梔少佐吳茱
萸嘈辣頓去飲食少進乃去黃連加貝母遠志
胸膈通利飲食如常又用加味逍遙散歸脾湯
間服百餘劑月水調而唇瘡愈
一婦月經不調兩足發熱至年餘而身亦熱勞則
足腿痠疼又年餘唇腫裂痛又半年唇裂出血
形躰瘦倦飲食無味月水不通唇下腫如黑棗
此肝脾血虛火症也彼不信用通經藥而發
一婦口苦脇脹此肝火之症也用小柴胡加山梔

黃連少愈更以四君子加芍藥當歸柴胡調補
脾胃而痊
一婦每怒口苦發熱晡熱此肝火盛而血傷也以
小柴胡合四物二劑以清火而生血更以四物
加柴胡白朮茯苓丹皮生血健脾而安
一婦因怒齒痛寒熱作嘔用清胃等藥益甚乃肝
火傷胃寒凉復傷故也用六君子加芍藥柴胡
山梔而安
一婦胃中嘈辣甚則熱痛後患齒痛此胃中痰火

也以二陳加芩連吞越鞠丸而瘳
一婦因怒牙疼寒熱此肝火侮脾土用小柴胡加
芎歸苓朮山梔而疼痛止用加味逍遙散而寒
熱退
清胃散 治醇酒厚味唇齒作痛或齒齦潰爛或
連頭面頸項作痛 黃連(炒一錢半) 川歸 生地
丹皮(各一錢) 升麻(一錢) 右水煎服如寔熱便秘加
大黃
加味清胃散 即前方加犀角甘草連翹

凉膈散 治積熱煩渴面赤內熱頭昏咽痛便溺
赤澁狂言譫語寐卧不安 大黃 朴硝(各一錢)
甘草(一錢) 連翹(二錢) 梔子 黃芩 薄荷(各一錢) 水煎服
補黃散 治脾胃虛熱口舌生瘡畏冷飲食
人參 白朮(炒各一錢) 白芍(炒) 陳皮 甘草(炙各五分)
右姜棗水煎服
四順清凉飲 加山梔大力子名加味清凉飲
治臟腑寔熱秘結口舌生瘡 當歸 赤芍
甘草 大黃(各一錢) 右水煎服

人參安胃散 治服峻劑損脾胃口舌生瘡
人參 茯苓(各一錢) 黃耆(炒二錢) 生甘草
炙甘草 黃連(炒各五分) 白芍(七分) 水煎服
溫中丸 一名人參理中丸 治中氣虛熱口舌
生瘡不喜飲冷肢躰倦怠少思飲食
人參 炙甘草 白朮(炒各半分) 為末姜汁糊為
丸梧子大每服五十丸白湯送下
柳華散 治熱毒口瘡
黃栢(炒) 蒲黃 青黛 人中白(煆)

右等分為細末敷之

四物湯　治血熱口舌生瘡或牙齦腫潰發熱煩躁不安

加味四物湯　即四物加丹皮柴胡山梔

四物二連湯　治血熱口舌生瘡或夜發寒熱

當歸　熟地　白芍炒　川芎　胡黃連

川連炒各一錢　水煎服之

甘桔湯　治咽喉腫痛　甘草六錢　苦梗三錢

右水煎服

赤水玄珠婦人門第二十四卷

耳　結核方論

赤白遊風　婦人瘰癧

鶴膝風　足跟瘡腫

肺癰　腸癰

乳癰乳岩

赤水玄珠婦人門第二十四卷

新安生生子孫一奎著輯

耳

立齋曰耳瘡屬手少陽三焦及足厥陰肝經血虛風熱或怒動肝火而致若發熱焮痛屬三焦厥陰風熱用柴胡清肝散若寒熱作痛或作嘔吐乃肝火傷脾用益脾清肝散若口乾足熱為肝腎陰虛用益陰腎氣丸若月經先期為血熱用加味逍遥散過期為血虛用八珍湯食少體倦

為鬱火加味歸脾湯惡寒發熱肢體倦怠為氣血俱虛用十全大補湯慎不可專治其外復傷氣血也

一婦耳內外腫痛胸膈不利寒熱往來小便不調此肝火傷血先用龍胆瀉肝湯四劑諸症頓退又用加味逍遥散而痊又因怒復作用柴胡而安

一寡婦耳內外作痛不時寒熱脉上魚際此血盛之症用小柴胡加生地以抑其血而愈又項間結核如貫珠寒熱晡熱用加味歸脾湯加味逍遥散調補肝脾而愈

一女子耳下腫赤寒熱口苦月經不調小腹內結一塊此肝火氣滯而血凝也先用小柴胡加山梔川芎丹皮又用柴胡清肝散而痊

小柴胡湯　治肝胆經症寒熱往來晡熱潮熱身熱默默不欲飲食或怒火口苦耳聾咳嗽發熱脇下作痛甚者轉側不便兩脇痞悶或瀉痢咳嗽或吐酸食苦水皆用此藥主之

柴胡二錢　黃芩炒一錢　人參　半夏各七分

炙甘草五分　姜三片水煎服

加味小柴胡湯　治肝胆經風熱前後腫痛或結核焮痛或寒熱晡熱或經候不調等症

即前小柴胡湯加山梔丹皮

益脾清肝散　治肝經之症寒熱體痛脾胃虛弱

人參　白朮炒　茯苓各一錢

炙甘草　柴胡各五分　川芎　川歸

黃耆各一錢　丹皮七分　水煎服

梔子清肝散　治三焦及肝胆經風熱耳内作痒或生瘡出水或脇肋胸乳作痛寒熱往来
柴胡　山梔炒　丹皮各一錢　茯苓　川芎　芍藥　當歸　牛旁子炒各七分　白术炒　甘草各五分　水煎服

柴胡清肝散　治肝胆三焦風熱怒火以致項胸作痛或頭目不清或耳前後腫痛或寒熱躰痛　柴胡　黄芩炒　甘草各五分　人参　山梔炒　川芎各一錢　連喬　桔梗各八分　水煎服

入二四卷　三

犀角地黄湯　治上焦有熱口舌生瘡發熱或血妄行或吐衂或下血
犀角　生地　白芍藥　黄芩炒　牡丹皮　黄連炒各一錢　水煎服　因怒而患者加柴胡山梔

犀角升麻湯　治陽明經風熱牙疼或唇頰腫痛或手足少陽經風熱連耳作痛
犀角　升麻　防風　羌活各一錢　白附子五分　川芎　白芷　黄芩炒各七八

甘草五分　水煎服

當歸川芎散　治手足少陽經血虚瘡症或風熱耳内痒痛生瘡出水或頭目不清寒熱少食或經水不調胸膈不利腹脇痞痛小便不調
當歸　川芎　柴胡　白术炒　芍藥炒各一錢　山梔炒八一錢　丹皮　茯苓各八分　蔓荆子　甘草各五分　水煎服

雜方

加味地黄丸　治肝腎陰虚諸症或耳内痒痛出水或眼昏痰喘或熱渴便澁等症

入二四卷　四

乾山藥　山茱萸　牡丹皮　澤瀉　柴胡　白茯苓　熟地黄　生地　五味子各等分為末
右將煉蜜為丸梧子大每服百丸空心白湯下如不應用加減八味丸

人參養榮湯　治潰瘍寒熱四肢倦怠躰瘦少食面黄氣短不能收斂大瘡愈後多服之庶不變他症也
白芍藥一錢五分　人参　陳皮　黄耆炒

桂心　川歸　白朮炒　炙甘草各一錢

熟地　五味炒　茯苓各七分　遠志去心炒五分

入姜棗水煎服

瀉青丸　治肝經實火脇乳作痛或惡寒發熱大便秘結

川歸　龍胆草炒焦　川芎　山梔炒　大黃炒　羌活　防風各等分

右為末蜜丸梧子大每服三四丸白湯下○若陰血不足肝火血燥用四物加山梔柴胡或逍

遙散加丹皮山梔○若腎水虧損不能生肝木而筋攣結核或肢節攣搐或似中風涎痰上湧用六味丸料煎服

生地黃丸　治師尼寡婦室女乍寒乍熱或頸間結核肝脉弦長直出魚際

生地　秦艽　黃芩　硬柴胡各五分

赤芍藥一兩　右煉蜜為丸梧子大每服三十丸烏梅湯下

連翹飲子　治肝胆經氣滯瘰癧結核或乳內結核者

連翹　川芎　瓜蔞仁

橘葉　皂角刺炒　青皮　甘草節

桃仁各一錢　水煎服

散腫潰堅湯　治瘰癧堅硬氣血無虧者

升麻　連翹　川歸尾　白芍

葛根　三稜酒拌微炒　廣朮各三分　龍胆草

桔梗炒　昆布　知母酒炒　瓜蔞仁各五分

柴胡四分　黃芩酒炒五分　炙甘草二分

右水煎服

必効散　治瘰癧未成者消已潰者斂須元氣無虧者可服孕婦勿服

南蓬砂二錢半　輕粉一錢　斑猫四十枚去頭足同糯米炒去米　射香五分　巴豆五粒去殼心膜　白檳榔一枚

右為末每服一錢五更用滾湯調下如小水澁滯或微疼此癧毒欲下也進益元散一服即下　此方斑猫巴豆似為峻厉然用巴豆乃解斑猫巴豆用者勿畏也

益元散　滑石飛六錢　甘草

各為末每服一二錢白湯調下

琥珀膏　治頸項或腋下初結小核漸如連珠潰而膿水不絕或漏症者

琥珀一兩　丁香　桂心　硃砂　木香

松香俱為末　白芷　防風　當歸　木通

木別子肉各五錢　麻油二斤

將后五味入油煎熬藥焦濾去渣徐徐入黄丹再熬軟硬得所入前末藥即成膏矣

針頭散　治一切頑瘡內有瘀肉或癧核不化瘡口不合宜此藥腐之

赤石脂五錢　乳香　白丁香　砒霜生用

黄丹各一錢　輕粉　射香各五錢　蜈蚣一條

為末搽瘀肉上其肉自化若瘡口小用糊和作細条陰乾紝之凡瘡久不合者內有膿管必須用之

結核方論

婦人結核皆因鬱怒虧損肝脾或因胎產經行失於調護或因暴怒觸動肝火若結於項側耳前後或胸脇腫痛或發寒熱屬胆經風熱怒火宜用柴胡清肝散加鈎藤山梔以養血氣清肝火若結于肉理其色不变晡熱內熱屬肝火血虛宜加味逍遥散加龍胆草以養肝血清肝火或結于肢節或累累如貫珠其色不变亦肝火血燥而筋攣宜用柴芍參苓散加鈎藤以養血氣佐以六味丸以生腎水若時消時作此氣滯而痰結也用歸脾六君二湯以調和脾肺之氣並佐以海藻丸若潰而核不腐或肉不生或膿水

清稀肌寒肉冷自汗盜汗寒熱內熱面色痿黄食少體倦便利不調者五臟皆虛也但用補中益氣加味六君子二湯調補脾胃以滋諸臟則各症自退故經云形傷則痛氣傷則腫慎不可輕用行氣破血而復傷也

一婦項結核寒熱頭痛脇脹乳痛內熱口苦小便頻數屬肝火血虛用加味四物而愈又用加味逍遥散調補肝脾而安

一婦耳內耳後項側結核作痛寒熱口苦月經不

調失肝胆經火而傷脾胃也用四君柴胡丹皮
及六味丸而愈
一婦項患五核時常寒熱肝脉弦長而出寸口此
血盛無偶之症也用小柴胡湯加生地烏梅而
愈
加味逍遙散　治肝脾血虚有熱遍身搔痒或
口燥咽乾發熱盜汗食少嗜卧小便澁滞等症
又治瘰癧流注虚熱等瘡
炙甘草　當歸炒　芍藥酒炒　茯苓
白术炒各一錢　柴胡　牡丹皮　山梔炒五分
水煎服
逍遙散　即前方减丹皮山梔
歸脾湯　治脾經失血少寐發熱盜汗或思慮
傷脾不能攝血以致妄行或健忘怔忡驚悸不
寐或心脾傷痛嗜卧少食或憂思傷脾血虚發
熱或肢体作痛大便不調或經候不准晡熱内
熱或瘰癧流注不能消散潰歛
人参　白术炒　黄耆炒　茯苓　當歸

遠志　酸棗仁炒各一錢　木香　炙甘草各五分
龍眼肉三枚　姜棗水煎服
加味歸脾湯　即前方加山梔柴胡
柴术参苓湯　治肝火血熱遍身搔痒或起赤
暈或筋攣結核
白术　人参　茯苓各一錢　柴胡　川芎
山梔炒　芍藥炒　甘草炒各五分　熟地　當歸各八分
水煎服
柴芍参苓散　治肝胆經部分結核瘰癧瘤瘊
等症或肝血燥脾氣虚弱發熱少食
柴胡　芍藥炒　人参　茯苓　白术炒
山梔炒　陳皮　當歸各一錢　丹皮　甘草各五分
姜棗水煎服
清肝益榮湯　治肝胆經風熱血燥筋攣結核
或作瘊子　柴胡　薏苡仁　茯苓
木瓜　熟地各一錢　山梔　龍胆草
白术炒各五分　川芎　川歸　芍藥炒各一錢
甘草二分　水煎服

清熱涼血飲　治風熱血燥丹毒等症大便秘
結　當歸　川芎　大黄炒　芍藥炒
生地各一錢　水煎服
神効開挨散　消瘰塊甚効
沉香　木香各一錢　橘紅四兩　珍珠四十九粒入罐
封固煆存性出火毒　猪靨子四十九枚豚猪生項間如棗子大
為末每服一錢臨卧酒調徐徐嚥下輕者三
五服重者十服可愈切忌酸鹹油膩滯氣之
物須用除日于靜室修合
二十四卷　十一
海藻散堅丸　治肝經瘰癧
海藻　昆布各一兩　小麦四兩醋煮曬乾　柴胡二兩
龍胆酒拌炒一兩　為末蜜丸梧子大每服三十
丸臨卧白湯送下噙化嚥之尤妙○凡患瘰
癧服調治之藥未應宜佐以前二藥
益氣養榮湯　懷抱抑鬱瘰癧流注或四肢患
腫肉色不變或日晡發熱或潰而不歛
人参　茯苓　陳皮　貝母　香附
川歸　川芎　黄耆鹽水拌炒　熟地　芍藥

炒各一錢　炙甘草　桔梗炒各五分　白术炒二錢
入姜水煎服
木香餅　治氣滞結腫悶肭風寒所傷作痛
木香五錢為末　生地一兩　搗地黄膏和勻量患
大小作餅子置患處以熱熨斗熨之腫痛悉
退
當歸飲　治熱血癮疹痒痛膿水淋漓發熱等
症　當歸　白芍藥　川芎　生地
白芨藜炒　黄耆各一錢　防風　荊芥　何首
烏各一錢　甘草各五分　水煎服
二十四卷　十二
赤白遊風
婦人赤白遊風屬肝經鬱火血燥生風或脾經鬱
結血虚生熱或腠理不密風邪外襲其症或疙
瘩瘙痒或膿水淋漓白屬氣而赤屬血因得風
而遊行也若肝經血燥用柴胡清肝散肝經怒
火用梔子清肝散肝經血熱用加味四物湯肝
火血虚六味丸脾經鬱熱加味歸脾湯肝脾血
虚風熱加味逍遥散若因風邪鬱熱所致用荊

防敗毒散或專用袪風之劑肝血愈燥則血隨火化反為敗症矣

一婦身如丹毒搔破膿水淋漓熱渴頭暈晡時益甚用加味逍遥散而愈

一女赤暈如霞作痒發熱用加味小柴胡加生地連翹丹皮而愈○大凡女子天癸未至婦人月經不調受驚着惱多有此症

消風散　治風寒瘾疹痒痛或膿水淋漓頭皮腫痒

荆芥穗　炙甘草　陳皮

人参　茯苓　白殭蚕炒　防風　芎藭

藿香　羗活　蟬蜕各一錢　厚朴五分姜制

水煎服

大連翹飲　治風熱熱毒赤白遊風表裏皆受患者

連翹　瞿麦　荆芥　木通

蟬蜕　甘草　赤芍　防風　柴胡

滑石　山梔炒　黄芩炒　川帰各一錢

水煎服

婦人痃痃一名便癰　俗名痞子　一名便毒

婦人痃痃或肝経湿熱下注或欝怒傷損脾肝其外症或拗小腹腫痛或玉門焮腫作痛或寒熱往來增寒壯熱其内症或小便澁滞或腹内急痛或小腹痞悶或上攻两脇或晡熱重墜若两拗小腹腫痛肝経湿熱壅滞也用龍胆瀉肝湯玉門腫脹肝火血虚也用加味逍遥散及龍胆瀉肝湯加木香若槩投散血攻毒之剤則誤甚矣

一婦人拗中赤腫脹痛此膿内作用托裏消毒散加此数剤潰而膿清寒熱乃氣血凌虚用托裏散而寒熱止用十全大補湯百餘剤而歛

一婦人腹拗腫痛寒熱口苦或時帶下此肝経湿熱不利也用龍胆瀉肝湯而腫痛消用加味逍遥散而寒熱退

一婦人腹拗腫痛小水不利時或胸乳作痛脇腹作脹此肝火氣滞用四物柴胡青皮玄胡木香而愈

一婦人两拗腫痛腹内一塊不時上攻月経不調

小便不利余以為肝脾氣滯而血傷以四君子加芎歸柴胡山梔而愈後因鬱怒前症復作兼胸滿腹脹盜汗此肝木甚而傷脾土也用加味歸脾湯下蘆薈丸而痊

一婦人陰中如梗兩拗腫痛寒熱不食小便頻數小腹重墜余以為肝脾鬱怒所致先以補中益氣加茯苓山梔車前子青皮以清肝火升脾氣更以加味歸脾湯調理脾鬱而愈

龍胆瀉肝湯　治肝經濕熱兩拗腫痛或腹中疼痛或小水澁滯等症

龍胆草酒拌炒　澤瀉各一錢　車前子炒　生地黄酒拌　木通　山梔炒　黄芩　甘草各五分

右水煎服

九味柴胡湯　治肝經濕熱下注便毒腫痛或小腹脇肋結核凡肝胆經部分一切瘡瘍或風熱結核瘰癧

柴胡　黄芩炒各一錢　人參　山梔炒　半夏　龍胆草炒焦　川歸　芍藥炒　甘草各五分

右水煎服

蘆薈丸　治肝氣不和剋侮脾胃而患諸症或三焦肝胆經風熱目生雲翳或疳熱瘰癧耳內生瘡寒熱作痛肌躰消瘦發熱作渴飲食少思肚腹不調或牙齦蝕落頰腮腐爛下部生瘡等症

蘆薈五錢　胡黄連　當歸　芍藥炒　龍胆草酒浸炒焦　川芎　蕪荑各一兩　木香　甘草炒各三錢

右為末用米糊丸麻子大每服五十丸滾湯下

鶴膝風

婦人鶴膝風症因胎產經行失調或鬱怒虧損肝脾而為外邪所傷或先腿脚牽痛先或股躰筋攣既而膝漸大腿漸細如鶴膝之状而名之也若高腫赤痛者易治若漫腫不赤痛者難治二三月潰而膿稠者易治半載後潰而膿清者難治設先攻伐虧損元氣尤為難治也大要當固元氣為主而佐以大防風湯若食少躰倦者六

君子湯為主晡熱内䵷若逍遥散為主寒熱往来者八珍湯發熱惡寒者十全大補湯不寐而驚悸者歸脾湯月經過期者補中益氣為主月經先期者加味逍遥散為主凡潰後當大補脾胃若膿出反痛或寒熱煩渴等症皆屬氣血虧損一切主于補培庶保終吉

一婦患鶴膝兩拗中腿股筋牽作痛内熱寒熱此肝火氣滞之症先用加味小柴胡湯四劑後以加味逍遥為主佐以大防風湯而消又患痢後兩膝腫痛寒熱往来用十全大補湯為主佐以大防風湯而全消

公二四卷 十七

大防風湯 治陰虚邪襲腿膝腫痛等症

防風 附子炮 牛膝 白术炒 羌活 人参各一錢 川芎一錢五分 桂心 黄耆炒各一錢 芍藥炒 杜仲姜制各一錢 甘草五分 熟地一錢半

水煎服

黑丸子 一名和血定痛丸 治跌撲墜墮筋骨疼痛或瘀血壅腫或外感風寒肢躰作痛若流注膝風初結服之自消若潰而膿清與補氣血藥自斂孕婦勿服

百草霜 白芍各一兩 南星 川烏各三錢炮 白蘝 赤小豆各一兩半 白芨 川歸 骨碎補炒各八錢 牛膝六錢

右為末酒糊丸桐子大每服三十丸盐湯温酒任下

聖愈湯 治血虚心煩睡卧不寧或五心發熱

熟地黄 生地黄 黄耆炒 人参 川芎 川歸各一錢

水煎服

公二十四卷 十六

八味丸 治火衰不能生土以致脾胃虚寒而患流注鶴膝等症不能消潰收斂或飲食少思或食而不化或臍腹疼痛夜多漩溺盖火之原以消陰翳即此方也

熟地黄自製乃佳八兩 山茱萸肉 山藥各四兩 茯苓 牡丹皮 澤瀉各三兩 桂心去粗皮忌火能補腎引火下行歸原一兩 大附子用一兩五錢重者切四塊用童便浸數日火煨切晉無白星為度

右為末蜜丸桐子大每服七八十丸滚湯下

婦人足跟瘡腫

足跟足指腫痛足心發熱者皆因胎產經行失于調攝虧損足三陰經虛熱所致若腫痛或出膿用六味丸為主佐以八珍湯胃虛懶食佐以六君子湯寒熱内熱佐以逍遥散晡熱益甚頭目不清佐以補中益氣湯痰盛作渴或口舌生瘡亦用前二藥以滋化源大凡發熱内熱晡熱自汗盜汗等症皆因虛假熱也故丹溪謂火起九泉陰虛之極也蓋足跟乃腎脉發源之所腎一

△六十四卷　十九

經所過之地若不求其屬而泛用寒涼則悞甚矣然俗謂為兔嚙瘡者蓋獵人被兔咬足跟久而不歛氣血瀝盡其人必死男子酒色過度者亦多患此症

一婦兩足發熱足跟作痛日晡熱甚此腎肝血虛用逍遥散六味丸五十餘劑諸症悉退

六味丸　此壯水制火之劑治腎虛發熱作渴小便淋秘痰壅失音咳嗽吐血頭目暈眩眼花耳聾咽喉燥痛口舌瘡裂齒不堅固腰腿痿軟五臟虧損自汗盜汗便血諸血凡肝經不足之症尤當用之蓋水能生木故也此水泛為痰之聖藥血虛發熱之神劑又治肝腎精血不足虛熱不能起床即仲景八味丸去附子桂心

肺癰

婦人肺癰因外内蘊熱或七情鬱火誤行汗下重亡津液以致肺氣受傷而惡風咳嗽鼻塞項强胸膈脹滿呼吸不利吐痰臭濁膿血腥穢若咳嗽喘急寒邪在表也小青龍湯咳嗽胸脹寒邪

△二十四卷　二

内壅也葶藶大棗瀉肺湯脇脹咳唾腥臭膿已成也桔梗湯咳喘短氣或小便短少肺氣虛也佐以參耆補肺湯躰倦少食或喘嗽短氣脾肺虛也佐以參朮補脾湯作渴飲冷午前嗽甚胃火盛也竹葉石膏湯作渴内熱午後嗽甚陰血虛也六味丸四物湯口乾飲湯躰倦少食胃氣虛也補中益氣湯加五味麦冬口乾内熱咳嗽痰涎腎水虛也六味丸益氣湯黄昏熱或嗽甚陰火熾也六味丸四物湯加五味麦冬五更嗽

或瘀甚脾肺虛也六君子湯嗽而不得眠及兩脇疼肝火血虛也六味丸益氣湯大凡前症因外淫所侵當祛邪而實上因心火太過當伐木而補金若肺氣虛弱當補脾土而生肺金若陰火上炎當補脾肺以滋腎水然而發熱喘嗽咳唾膿血飲食不入皆脾土不能生肺金肺金不能生腎水之敗症苟能純補脾土而生諸臟多有復生者若用寒涼脾胃復傷則肺金失養腎水益涸虛火上炎薰蒸于肺吾未見其能生之

二十四卷 二二

者其唾膿血脈浮大面色赤者俱難治若陰火妄動或勞嗽吐膿血者尤難治若膿自止脈浮短濇及始萌者易治

一婦素血氣發熱咳嗽服痰火之劑後吐膿血面赤脉數其勢甚危此膿成而氣血虛也用八珍湯補元氣桔梗湯治肺癰而愈

青龍湯　肺受風邪咳嗽喘急

半夏　乾姜　細辛　麻黄去根節

肉桂　芍藥　炙甘草各一錢　五味子炒五分

大附子炮五分　水煎服

葶藶大棗瀉肺湯　治肺癰胸膈脹滿上氣喘急或身面浮腫鼻塞声重用葶藶炒黄研末每服三錢先用棗十枚水煎入藥再煎食後服

桔梗湯　治肺癰咳而胸膈隱痛胸次腫滿咽乾口燥煩悶作渴濁唾腥臭

桔梗　枳殼　以仁　桑皮各炒　當歸

貝母　瓜姜仁　甘草節　防巳去皮各一錢　黄耆鹽水炒

百合蒸各一錢半　五味子炒　甜葶藶炒

二十四卷 二二

地骨皮　知母炒　杏仁各五分　姜水煎服

人参補肺湯　治肺癰腎水不足虛火上炎咳唾膿血發熱作渴小便不調

人参　黄芪炒　白术　茯苓　陳皮

川歸各一錢　山茱萸　山藥各二錢　五味子　麦冬

炙甘草各七分　丹皮一錢　熟地一錢半　姜水煎服

參芪補脾湯　治肺症因脾氣虛弱咳唾膿涎中滿不食宜兼服此藥以補脾土生肺金

人参　白术各二錢　黄芪二錢半　茯苓

川芎　陳皮各一錢　升麻三分　五味子四分
炙甘草　姜水煎服
人參平肺散　治心火尅肺金患肺痿咳嗽喘嘔痰涎壅盛胸膈痞滿咽嗌不利　方見咳門

腸癰

婦人腸癰因經行產後瘀血或七情飲食所致其証小便如淋發熱悪風身皮甲錯腹皮腫急按之軟如腫狀或腹脹大轉側有水声或繞臍生瘡或大便出膿其脉遲緊者膿未成用活命飲　方二十五卷　二三
以解其毒脉滑數者膿巳成用雲母膏以下其膿若二年間過身微腫大便與臍出膿此息積之症也多致不救內經云腸癰為病不可驚〻則腸斷而死其坐臥轉側宜徐緩時常少飲稀粥靜養調理庶可保生
一婦人小腹腫痛小便如淋此毒結于內用神効瓜蔞散二劑少愈又以薏仁湯二劑乃瘥
一婦小腹痛而有塊脉芤而濇此瘀血為患以四物加玄胡索紅花桃仁牛膝木香二劑血下而愈
一婦小腹脹痛大便秘濇轉側有水聲脉洪數用薏苡梅仁湯一帖下去瘀血諸症頓退以薏苡仁湯二帖而瘥
一婦小腹脹痛小便不利脉滑數此膿巳成服太乙膏三錢膿大下脹痛悉退以瓜蔞散蠟凡丸托裏藥而安
一婦因經水多服薬止之致腹作痛以失笑散二帖而瘳又用加味逍遙散數劑而經調　方二十四卷　二四
一產婦惡露停滯小腹作痛服瓜仁湯下瘀血而痊凡瘀血停滯急宜行之緩則腐化為膿最為難治若流注關節則患骨疽多為敗症
瓜子仁湯　治惡露未盡或經行瘀血停滯小腹作疼或成腸癰等症　方在一十九卷
敗醬散　治脉數身無熱腹無積聚按之軟濡此為腸癰乃久積陰冷所成
以仁二兩　附子半兩泡　敗醬草一兩二錢半
每服四錢水煎服以小便利為度

牡丹湯即牡丹皮散　治腸癰腹軟而痛時下膿
血 方在孕癰卷
千金大黃牡丹湯　治腸癰小腹堅腫按之則
痛肉色如故或焮赤微腫小便頻數汗多增寒
脉遲緊未成膿者宜服之
梅仁湯　治腸癰壅痛大便秘澁 二方在外科腸癰門
神仙蠟礬丸　最解毒止痛 方在癰疽門
失笑散　産後心腹絞痛或血迷心竅不知
人事及尋常腹内瘀血積血作痛

五灵脂 炒　蒲黃 炒 等分
爲末每服二錢酒調下
乳癰乳岩
經云乳頭屬足厥陰肝經乳房屬足陽明胃經若
乳房忽壅腫痛結核色赤數日之外焮痛脹潰
稠膿湧出膿盡而愈此屬胆胃熱毒氣血壅滯
名曰乳癰爲易治若初起内結小核或如鱉棋
子不赤不痛積之歲月漸大巉岩崩破如熟榴
或内潰深洞血水滴瀝此屬肝脾鬱怒氣血虧

損名曰乳岩爲難療治法焮痛寒熱宜發表散
邪腫焮痛甚宜疎肝清胃或不作膿成不潰宜
用托裏或肌肉不生膿水清稀宜補脾胃或膿
出反痛惡寒發熱宜補氣血或腫焮作痛晡熱
内熱宜補陰血或飲食少思時作嘔吐宜補胃
氣或飲食難化泄瀉腹痛宜補脾氣或勞碌腫
痛宜補氣血怒氣腫痛宜養肝血甚不可用尅
伐之劑復傷脾胃也乳岩初患用益氣養榮湯
加味逍遥加味歸脾可以内消若用行氣破血

之劑則速其亡
一婦内熱脇脹兩乳不時作痛口内不時辛辣若
卧而起急則臍下牽痛此帶脉病也小柴胡加
青皮黃連山梔二劑而安
一婦先熱渴至夜尤甚後兩乳忽腫肝脉洪數乃
熱入血分用加味小柴胡湯而愈
一婦膿清腫硬面黃少食内熱晡熱自汗盜汗月
經不行此肝脾氣血俱虛也用十全大補加遠
志貝母及補中益氣各三十餘劑外用葱熨法

而消

一婦久鬱左乳内結核如杏三月不消心脉濇脾脉大按之無力此肝脾氣血虧損以八珍加貝母遠志香附柴胡青皮桔梗五十餘帖而消

一婦右乳内結三核年餘不消朝寒暮熱飲食不甘此肝脾氣血虧損内服益氣養榮湯外以木香餅熨之年餘血氣復而消

一婦乳内結核年餘晡熱食少此血氣不足欲用益氣養榮湯彼欲効速另服行破之劑潰出清膿而歿

〔八一十四本〕 三七

一婦乳内結核如栗亦服前藥大如覆碗堅硬如石出血水而歿

神効瓜蔞散　治乳癰及一切癰疽初起腫痛即消膿成即潰膿出則愈

瓜蔞（一箇爛研）　生粉草　當歸（酒洗各半兩）

乳香　沒藥（各一錢）　用酒煎服良久再服若肝經血虛結核久而不消佐以四物柴胡升麻白朮茯苓甘草若肝脾氣血虛弱佐以四君芎歸柴胡升麻若憂鬱傷脾氣血虧損佐以歸脾湯

玉露散　治産後乳脉不行或身體壯熱頭目昏痛大便澁滞等症

人參　茯苓　桔梗（炒）　川芎

白芷　當歸　芍藥（各一錢）　甘草（五分）

右水煎服

乳癰初發

貝母為末每服二錢熱酒下即以二手覆按卓上垂二乳向下良久自通

〔八二十四本〕 三六

赤水玄珠第二十五卷幼科目録

初誕門 | 甘草法
硃蜜法 | 秘法
断臍法 | 回氣法
戒灸 | 浴兒法
下地不啼哭 | 初生大小便不通
胎毒宜下 | 穀道不通
遍身無皮 | 遍身發泡
陰囊入腹不下 | 噤風
撮口 | 臍風
臍突光腫 | 臍汁不乾
腸癟 | 鵞口白屑
鼻風傷顖 | 潮熱
風熱 | 看形色声音脉息
診脉歌 | 看顱顖要畧
入門看証歌 | 變蒸
明驚風篇 | 急驚風
慢驚 | 夜啼

客忤 | 軀啼
丹毒 | 赤遊風毒
口瘡 | 重舌
木舌 | 腫腭
腫齦 | 語遲
断乳法 | 行遲
項軟 | 滞頤

目録終

赤水玄珠幼科第二十五卷

新安生生子孫一奎著輯

小兒門

諸雜症大方脉可以槩治者兹不復録所録惟異於大方脉者省繁瑣便應治也頋余不文然幼科但當闡明証候選擇良方俾婦人女子皆可通曉庶為法吉

初誕門

小兒初誕猶如嫩蘂嬌花切當調護得宜庶無不測之症古謂初離母體口有液毒啼声未出急用綿綿裹指拭去口中濁穢為妙此固良法然倉卒多不暇及且亦多有拭之而不見物古人有落地解毒法回氣法将護法種種森立蒐輯于左以為保生良式

甘草法　臨月預備甘草少許以綿裹之臨産時用沸湯浸盞内俟兒落地未出声時急取綿裹指頭蘸甘草汁拭其口次用硃蜜法

硃蜜法　用甘草湯飛過硃砂末三五分以蜂蜜拌匀旋抹口中使其嚥下不獨鎮心安神能解一切胎熱悪物之毒免瘡熱之患

又秘法　用本兒落下臍帶瓦上焙燥為末入辰砂黄連甘草各末五分和匀蜜拌做三五次塗乳母乳上俟兒吞之必使一日夜吞盡次日悪毒皆從大便而出日後不但瘡疹稀疎竟有不出瘡者俟臍帶落下即便製服在六七八日之間為妙其辰砂必須研極細末以甘草湯飛過任服無害此方一以解毒一以補養蓋臍帶乃有生初之河車也繋於母之命門兩腎之所主乃以腎補腎腎既充足即不受邪故無他日豆黒歸腎之症亦無顖門不合之疾生一兒即得一兒真保生最上一乗良法

斷臍法　千金論云凡結束所留臍帶大約六寸長則傷肌又断臍切不可用刀割蓋鉄器寒冷恐傷生氣只須隔單衣咬断後将暖氣呵七口庶無内吊之疾必先用熱湯浴過方断臍若断後浴之恐水氣入内令兒腹疼

回氣法　初生氣欲絕不能啼者必是難產或冒寒所致急以綿絮包裹抱懷中未可斷臍且置炭火上燒之仍作大紙撚蘸芝麻油點着于臍帶上往来遍燎之使火氣入臍則腹中溫煖更用熱醋湯盪洗臍帶須臾氣回啼哭如常方可浴洗斷臍切記

戒灸　北方誕後三日每用艾灸顖門以免驚風緣北方地土嚴寒故俗灸之以禦寒暑調護者何必令兒受此一翻痛苦也今南方每亦倣斆予屢見灸後發熱大小便秘因而驚搐遂致不救良切憫焉殆無事生事也詎思南方地熱䖏孕者又不斷慾食淡厚味是貪淫情肆意胎已受毒加之以灸是以油濟火也曷克當之

浴兒法　第三日浴兒予每用五枝湯極妙五枝湯者桑槐榆桃柳是也各取嫩枝三寸長者二三十節煎湯看冷熱入猪膽汁二箇浴之周歲内可免瘡疥丹毒又可以避邪惡　盖三日浴兒俗禮也倘兒生脆弱遲十数日或半月亦無害擇晴明吉日於無風房内浴之

兒生下地即不啼哭不能吞乳奄奄如死者急看喉間懸癰前腭上有一泡用指摘破以帛拭去惡血勿令嚥下即能通聲吞乳

初生大小便不通腹脹欲絕者急令人溫湯漱淨口吸咂兒之前後心臍下兩手足心共七處每處吸咂五七口取紅赤色氣透為度氣透則便自通

輕号散　初生大便不通

輕粉二錢　生蜜拌熱湯調點兒口中一二次立通

初生六七日不小便　葱白三四寸搗爛人乳拌入兒口內再與乳吮嚥下即通

楊氏曰小兒在胎受病非一大抵稟氣蘊結壅閉不通宜早取下胎毒

千金論曰小兒始生其氣尚盛若遇疾病即須下之下不及時必成别疕

凡下胎毒只宜用淡豆豉濃煎汁與三五口其毒自下又能助養脾氣消化乳食

初出胞胎而不吮乳者或由產母過度胎中受寒

則令兒腹痛故不吮乳亦有口中悪物拭之不
及臍下腹中致令嘔吐茯苓丸木香散治之

茯苓丸　治悪血入腹々脹氣短不能吮乳

赤茯苓　黄連　枳殼炒各等分　右為末煉蜜丸

梧子大每一丸乳汁磨下　冷者去黄連

木香散　治悪穢入腹嘔吐不止

木香　乾姜　茯苓　木瓜　甘草炙　丁香各等
分右為末每服一錢生姜一片水煎綿蘸捏入
口中効

奇方　治初生不乳及不小便葱號散

葱白一寸四界破之以乳汁砂銚內煎灌之立効

小兒初生穀道不通多致不救非藥石可治曾有
人以銀筋頭焼紅穿通其竅大便始出亦有用
玉簪穿通者

初生下遍身無皮俱是紅肉宜速取白秈米粉遍
身撲之其皮漸生一日撲三四次以皮遍為度

初生下遍身如魚泡或如水晶擦破則水滲流以
密陀僧研極細炒過乾摻仍服蘇合香丸

初生六七日後陰囊收縮入腹啼哭不止者受寒
所致蓋寒則收引也

硫黄　呉茱萸各五錢　為細末研大蒜調塗臍下
仍以蛇床子微炒帛包熨其囊即下

初生受風鼻塞不能吮乳不可輕易發散惟大天
南星為末生姜自然汁調成膏貼於顖門即愈

又方　草烏皂莢為末葱汁搗膏貼於顖門効

噤風撮口臍風三証一種病也

噤風者眼閉口噤啼声漸少舌上聚肉如粟米状

吮乳不得口吐白沫大小便皆通蓋由胎中感
受熱氣毒流心脾故形現於喉舌也或生下復為
風邪搏擊所致一百二十日已前見此皆名噤風

撮口者面目黄赤氣自喘急啼声不出蓋由胎氣
挾熱兼之風邪入臍流毒心脾之經故令舌強
唇青聚口撮面妨於吮乳若口出白沫四肢冷
者不可救也其或肚脹青筋吊腸卵疝內氣引
痛皆腸胃結滞不通治宜疎利蓋撮口最為悪
候月內見之尤急候也

臍風者非獨謂斷臍之時為水濕風邪所乘多因胎中受熱薰之風濕所激遂令肚脹臍腫身體重而四肢柔直啼而不乳甚則發為風搐若臍邊青黑薰之撮口乃是內搐不治爪甲黑者即死其或熱在胸堂伸引努氣亦令臍腫可與千金龍膽湯

此三症受病之源皆緣胎毒大槩裹氣壅滯總宜取下胎毒為好不可因循畏手畏足姑息悞事古方天麻丸定命丹朱銀丸可量與之須危多活每見臍風撮口七日內見之百難一生

凡見此三症急看口中齒齦上有小白點如粟米大即宜以溫水蘸帛裹指揩去或用銀簪挑去即能開口吮乳不必服藥此感之淺者也感之重者照後方按治

安臍散　治臍中汁出或赤腫

白石脂　研極細一日三度傅之　或用油頭髮燒灰傅　或當歸末傅亦佳

千金龍膽湯　治胎驚月內氣盛發熱臍風撮口壯熱四肢搐掣發熱大吐及變蒸不解中惡客忤鬼氣并諸驚癇悉皆治之十歲已下皆可服有鬼氣者加人參當歸兒大者一歲加五錢

龍胆草　鈎藤　柴胡　黃芩　桔梗　芍藥　茯苓　甘草各五錢　蜣螂二枚去足翅炙　大黃二錢半煨

右每服二錢水煎去半服之以漸加之候大便行即止　直指方加防風麦門冬以導心熱黃芩減半加北棗無蜣螂亦可

控痰散　治噤風先用此吐風涎次與益脾散和胃

蝎尾　銅青各五分　硃砂一錢　膩粉一字　射香一分　為細末每服一字茶清調下或用甘草湯吐痰亦可

甘草湯　治撮口取吐風痰

甘草三錢　水煎服令吐出痰涎却以猪乳點入口中即愈

益脾散　和胃進乳

白茯苓　人參　草果煨　木香濕紙包煨　甘草

陳皮　厚朴姜製　蘓子炒各等分

右每服二三錢看大小水煎服

辰砂膏　治眼閉口噤啼声不出吮乳不得口吐白沫大小便皆通

辰砂三錢　硼砂　牙硝各一錢半　玄明粉二錢　射香一字

全蝎　珍珠各一錢　右為細末𡰪油紙包封自成膏　每服一荳許粒薄荷金銀湯下

月内用乳汁調傅乳母妳上令兒吮下

天麻丸　斷臍後為水湿風冷所乘入臍流於心脾遂令肚脹臍腫四肢柔直日夜多啼不能吮

乳此藥利驚化痰丸釣腸鎖肚撮口並効

南星炮二錢　白附子炮　牙硝　天麻　五灵脂

全蝎炙各一錢　軽粉五分　巴霜一字　右為稀糊丸麻子大每服三丸薄荷生姜湯送下

定命丹　治急驚天釣撮口通利痰熱一方無氷片

全蝎七个　天麻　南星炮　白附子炮各二錢半　硃砂

青黛各一錢半　軽粉　射香各五分　氷片一字　右為末粟米糊為丸菉豆大每服一丸荊芥薄荷湯化下先研半分次入鼻中

僵蚕散　治撮口

僵蚕直者二条去觜水洗炒去　為末用蜜調傅唇口中立効

蝎梢散　治胎風撮口臍風及百日内急驚風并諸痰症

蝎梢四十九箇　姜蚕四十九条去觜洗去糸姜汁炒　氷片　射各一字

右蝎梢每一個用薄荷葉包線扎定砂銚内炒至薄荷乾為度仝姜蚕研細入氷射和匀用赤雄鷄肝二片煎湯調下一二分

牛黄散　治初生七日内口噤

牛黄一錢　為末以竹瀝調一字灌之更以猪乳點入口中

撮風散　治撮口

蜈蚣赤足者炙半条　釣藤　硃砂　蝎梢　僵蚕炒各一錢

射香一字　右為末每服一字用竹瀝調下

立聖散　治噤口

蝎梢七個　乾蜘蛛一个去嘴足以竹瀝浸一夜炙焦用膩粉少許

為末研匀每服一字乳汁調時時滴入口中

蜈蚣散　治口噤不開不能吮乳

赤脚蜈蚣（炙焦去頭足半条）為末入射香少許以猪乳一合分三服

蓋猪乳治小兒口禁最良凡取猪乳須令小猪兒吮嬰方其吃時將小猪後脚提起其口即開急將取之即得乳也非此法不能得

蜘蛛散（炙焦去皆足一枚）為末猪乳調灌神効　右亦治牙痹加射香神効

殊銀丸　治臍風壯熱痰盛翻眼口禁取下胎中蘊受之毒亦治驚積量病用之

全蝎（一錢）　白附子（炮半錢）　南星（炮）　殊砂（一字）　牛黄　芦會（各五分）　天漿子　射香（各五分）　氷片（一字）　僵蚕（十条炒）　水銀（一錢同黑鉛研如泥）　鉛霜（五分和水銀研）

右為末粟米糊為丸如芥子大每一丸薄荷湯下如未利加至二三丸

射香散　治臍風撮口

赤脚蜈蚣（酒炙半条）　川烏頭尖（三個）　射香（少許）

右為末每服半字金銀湯調下

立聖散　治臍風撮口

赤蜈蚣（酒炙一条）　蝎梢（七個）　瞿麥（五分）　姜蚕（炒七個）

右為末先用鵞毛管吹少許入鼻啼哭則可治仍用薄荷湯調服三五分

臍突光腫　臍汁不乾　附腸癰

生生子曰小兒月内旬日臍突光腫如吹捻動微响赤腫虛大可畏此由初生先斷其帶束縛不緊浴洗之時湿入所致用外消散敷之臍汁不乾者内有湿熱及血熱而然宜凉血收湿之藥掺之無不効者惟腸癰一症亦令臍中汁出小

腹腫硬按之則痛小便澁以淋時時汗出悪寒身皮甲錯肚皮紧如腫之狀按之濡或發熱無汗洒淅悪寒皆其候也甚者腹皮脹大轉側腹有水声或遶臍生瘡或膿從臍出或大便膿血必有一足不能步皆為惡候

山梔五苓散　治小兒臍突

梔子仁（炒）　白朮（炒）　茯苓　猪苓　澤瀉（各一錢）　肉桂（五分）

為細末每五七分茶湯或灯心湯調下

二荳散　治臍突

赤小荳　豆豉　天南星製　白歛各半分
為細末每以五分芭蕉自然汁調敷臍四傍
一日一次三日三次但得小便下白物即消
外消散　臍突光腫如泡
大黃　牡蠣各煅五錢　朴硝一錢
右末多用田螺浸水調一二錢敷臍上其水
從小便而下即消
封臍散　臍中汁出
紅綿灰　龍骨煅　髮灰　面粉炒各一錢　胭脂五分一

右末乾摻濕處
丹礬散　治同上
黃丹　枯礬　等分為細末敷上即乾
又方　蜜佗僧炒　貝母　桑螵蛸焙　為末摻之妙
又方　墻上多年白螺殼燒為末摻之佳
消癧蒼耳湯　但小腹作痛惡寒肚皮緊急一脚
不能舉步即是腸癧
蒼耳子二錢　甘草五分　杏仁　薄荷　瓜蔞各一錢
水酒各一鍾煎服其渣包敷臍上二服見効

有膿者加木香當歸各五分
四聖散　治腸癰乳癰一切癰疽便毒神効
黃瓜蔞一枚　甘草四錢　沒藥三錢　乳香二錢
酒煎分二次服大便微溏瀉下惡物為妙
薏以仁湯　腸癰腹中疼小便澁
苡仁　瓜蔞仁　丹皮　桃仁各三錢
水煎食前服
神仙蠟礬丸　治腸癰有膿者極効空心酒吞五
六十丸

太乙膏為丸梧子大每空心酒下六七十丸腸癰
頰瘻
鵝口白屑
初生百日口中生白點不計其數拭之則去少刻
復有口角流涎水日夜啼哭不乳是也亦由胎
熱或乳母嗜食煿炙酒麵貽熱於兒用甘草黃
連各一錢煎濃湯以帛裹指口中拭去再不復發
又方　桑樹枝條如煎竹瀝法煎汁洗之亦佳
又方　黃丹為極細末用竹瀝調塗口中洗之其

白點即落一日洗二三次再以辰砂益元散灯
心湯調下則不再作神妙

鼻風傷顋

凡乳母夜睡鼻孔切不可與兒頭相近恐呼吸鼻
風吹其顋門疾変百出慎之慎之

通関散　治鼻風吹顋令兒鼻塞不能吮乳
香附子炒 白姜蚕炒各三分 川芎七分 荆芥四分 細辛二分
牙皂一分 右末生葱白去鬚搗碎調藥塗顋上佳

潮熱

潮熱者今日發過明日復来如潮水之有信也有
一日一發二日一發三日一發或一日兩發似
瘧非瘧皆由調護失宜或冒風寒或傷乳食或
發瘡疥或陰陽不和或虚熱骨蒸皆當認証速
治亦有外感内傷以致臓腑壅滞而成實証當
從權下之

一傷寒之後餘热不解者宜脫甲散煎小柴胡湯
一内傷癖塊不消脾胃不和而成潮熱先服脫甲
散次搨氣下之後調胃氣

一営衛有熱陰陽不和發為潮熱
一瘄疹後餘毒不解蘊成潮熱宜大連翹飲更與
助胃氣則安

梨漿飲子　治潮熱及営熱衛熱両日一發三日
一發五臓蘊熱瘧熱夜發痺瘧獨熱
青蒿苗童便浸二次先浮晒乾 柴胡 人參 前胡
黄芩 秦艽 甘草 或加生地黄 右看大
小三五錢水煎入生藕生梨薄荷葉煎服

脫甲散　治傷寒體熱頭目昏沉不思飲食夾驚
夾食寒熱大小便閉煩躁作渴冷汗妄流萬満
腹急日夜大熱并傷風傷暑驚癎客忤瘡熱
柴胡 當歸 龍胆草 茯苓 知母 甘草
川芎各三錢 人參二錢 右看大小每服三五錢加
連鬚葱白三根水煎服此方散热扶表救裏
表虚若汗不妄出裏熱令不閉結外則通関
内則開渠経絡疎通臓腑無滞热在表裡之
間施無不可積傳驚癎之候用攻必効

地骨皮散　治虚熱潮熱傷寒壮熱

知母 柴胡 人参 甘草 茯苓 半夏
地骨皮 右水煎加姜 有驚熱加蟬蛻天麻
黄芩
秦艽飲子 治症如前
即上方加秦艽
鱉甲飲 治潮熱骨蒸盜汗咳嗽多渴心躁多驚
面色黄瘦 鱉甲炙 地骨皮 秦艽 柴胡
枳殼炒 知母 當歸各等分 每服三五錢加桃
柳枝各三寸烏梅一枚水煎服

犀角飲 治骨蒸潮熱盜汗肌瘦
犀角屑 鱉甲炙 柴胡 知母 地骨皮 胡
黄連各五分 大黄 桃枝各二錢半 右水煎服
靈犀飲 治小兒骨蒸潮熱盜汗咳嗽不食多渴
面黄消瘦、 犀角 秦艽 甘草 羌活
柴胡 地骨皮 胡黄連各五錢 茯苓 人参各乙
兩 右每服三五錢加烏梅竹葉煎服
柴胡散 骨蒸潮熱面黄瘦弱
柴胡 地骨皮 甘草各等分 水煎服

青蒿散 肌熱潮熱
青蒿三錢 甘草一錢 烏梅一枚 小麥五十粒
右水煎分三次服
大連翹飲 治胎熱大小便不利諸般瘡癤丹毒
臍風瘡疹壯熱 連翹 瞿麥 荊芥 木通
當歸 赤芍藥 防風 柴胡 滑石 炙甘
草 蟬蛻各一錢 山梔 黄芩各五分
右看大小每加紫草煎服熱甚加大黄
風熱

內素有熱或又冒風發熱咳嗽面赤氣粗大便秘
結者但宜平々和解使表裏疎通其熱即退疎
風枳殼湯極効
疎風枳殼湯 紫蘇 枳殼各三錢 杏仁去皮尖二錢
水煎頻々與服以大便通利熱退為度
熱甚者加黄芩 若大便仍不行用葱煎湯
洗其腰腹取熱葱以臍上下揩之使其氣透
則通利矣 或用生葱尖紝入糓道立通
清上散 治胎熱眼睛腫赤糞色稠黄肚熱啼哭

及身上紅腫或頭頂瘡癤耳出膿汁皆胎毒也
此方神驗
川鬱金　甘草　北桔梗　天花粉　乾葛
薄荷葉　各等分為末入蜜拌匀白湯下三五
七分或一錢仍用艾葉煎膿湯温浸足底以
引其熱下行

看小兒外証形色音声脉息

経云五臓有五色皆見於面素問曰神之変也其
華在向又云視其五色黄赤為熱白為寒青黒

為痛此所謂視而可見者也錢仲陽云左頬為
肝右頬為肺額上為心鼻上為脾下頦為腎赤
者熱隨証治之
眼上赤脉下貫瞳人顖門腫起兼及作坑鼻乾黒
燥肚大筋青目多直視覩不轉睛指甲黒色口
作鴉声虚舌出口嚙齒咬人魚口氣急啼不作
声細虫既出必是死形用藥速救十無一生
此吐蛔乃傷寒症故言凶若傷食吐蛔乃是常事
要知兒病生與死総观面上色音声唇青耳黒人
難救哭声不响赴陰君
声軽者氣清弱也重濁者痛也風也高喊者熱将
狂声急者神驚也声塞者痰也声戰者寒也声
噎者氣不順也喘者氣促也噴嚏者知其風呵
欠者知其倦亦主風陰陽相雜也

診脉訣

小兒有病須憑脉一指三関定真息浮洪風熱数
多驚虚冷沉遅實有積
左手浮洪風邪所感右手滑大乳食過傷数熱遅

寒以意推詳浮表沉裏看症投湯

看顖顋要畧

凡看嬰孩百日已後周歳已前視其顖而對其症
則補瀉用藥調治可断其吉凶矣
顖門青筋脉虚不禁顖門常陥滑泄便：顖門腫
起風痰不止顖門久冷吐利青：顖門虚軟顛
癎不免顖門扁潤暴泄易脱顖門歪長風作即
亡顖門連額驚風易得顱顖未充怕熱怕寒顱
顖緩收胎氣不周顱顖動数神氣昏弱顱顖寛

大受疾恐害顱顖未合筋骨柔弱

顱顖陷者始因臟腑有熱渴飲水漿致成泄痢久則氣虛用狗頭骨炙黃為末鷄子清調敷之

顖腫若乳哺不常致寒熱乘於脾家其氣上衝顖為之脹高如堆埠若寒氣上衝則堅硬熱氣上衝則柔軟寒則溫之熱則凉之

封顖散　防風　栢子仁　白芨各一兩

右末乳汁調塗顖上十日愈

凡解顱之症乃腎氣虛弱腦髓不實不能收斂急

用地黃丸補之外用大天南星微炮為末米醋調敷于絹帛上貼之

三辛散　治解顱

北細辛　桂心各五錢　乾薑七錢　為末乳汁調敷顖上乾則再塗俟兒面赤則愈

烏附膏　治顖門陷

川烏　大附子各去皮臍米五錢　雄黃二錢水飛

右極細末生葱搗爛調成膏貼顖上

地黃丸　治顱解不合腎元不充

人參二錢　懷熟地黃四錢　鹿茸酒炙　懷山藥　茯苓　丹皮　山茱萸肉各三錢

右末煉蜜丸芡實大每用人參湯化下一丸

傷乳

小兒吮乳過飽腹脹不乳者不必他藥只用大麥芽炒煎湯服之如惡吐加陳皮　發熱者加枳實　如大便不通加檳榔　蓋氣下則乳自消也不必用大黃巴豆霜之類

入門看証歌

五指梢頭冷驚來不可當若還中指熱必定是傷寒中指獨自冷麻痘症相傳女右男分左叮嚀仔細看

變蒸

生生子曰古謂三十二日一変生一臟六十四日一蒸生一腑三百二十日十変五蒸畢則臟腑完而人始全也大意謂人有三百六十五骨度而合周天之數以期歲該之云、也愚謂嬰孩離母則腑臟已自具足豈待变蒸完而後始生

哉觀其下地囫然一声便能呼吸飲乳大小便一如大人設臓不完啼声安出又安能飲乳而成大小便哉由是推之所謂変蒸者乃氣血按月交會煆煉使臓腑之精神志意魂魄逓長足覺漸生爾氣血有太過有不及故寒熱之發有輕重有晏早不然觀今之嬰孩未嘗月〻如其所云三十二日必一変六十四日又一蒸也發寒熱者百中僅一二耳間或有之亦不過將息失宜或傷風傷乳而偶與時會耳雖不服藥随

亦自愈茲姑採什数方以備参用若謂生臓生腑之助則其謬也不辯自知

清解湯　変蒸熱多寒少面赤息粗有似傷風表裏無汗或發癮疹咳嗽並皆治之

柴胡五分　前胡四分　酒芩五分　甘草炙三分　葛根三分　杏仁四分　枳殻三分　白芍藥七分　水煎服

柴胡湯　治変蒸骨熱心煩啼叫不已

人参　甘草炙　麥門冬去心各二錢　防風　龍胆草各錢　柴胡三錢　每服三錢水煎服

星〻散　治変蒸發熱或咳嗽痰涎鼻塞声重瘖疹發熱

人参　白朮　茯苓　甘草　芍藥　桔梗　細辛　麦芽各半分　每服一錢加姜煎服

當歸散　治變蒸有寒無熱

當歸二錢　木香　桂心　人参　甘草炙各一錢　每服二三錢姜棗水煎服

調氣散　変蒸吐瀉不乳多啼

木香　香附肖製　人参　橘紅　藿香　甘草各等分每服三錢姜二片棗一枚水煎服

明驚風篇

孫仲子泰来曰驚者病之名風者病之象言其抽搐有似於風之動而為名也

生生子曰小兒之疵莫大於驚風以其疾顧瞬間暴若雷迅而電逝也緣其致疾之由有二極須体認不可循俗只曰驚風驚風云耳何言之夫驚有因外因内外至者或耳聞異声目擊異物暮然作地者是也内生者由痰生熱〻生風也所得之由既殊療治之法必異治外須當養神

治内自宜清降予慨今之專門偶獲一方便大言曰治急慢驚風如神急慢二字漫無分別視之得無太易乎不思急屬陽陽為熱為實慢屬陰陰為虚為寒須治法實熱即當清當瀉虚寒即宜温宜補蓋治寒之劑不能治熱治熱之劑不能治寒聖哲莫能越其矩也世無大丹曷能以一藥概能治其寒熱虚實者乎急慢二字間有能言之者至於内外之因鮮有知之者矣予故揭而論之以補其畧

急驚風

生生子曰急驚風者乃有數種之殊須當細察現古人治法有云鎮驚者有云利驚者有云涼驚定驚截驚者究其法明是教人要知邪之入於何經識投劑有此數等之緩急也蓋邪之入心則面紅頰赤惕惕夜啼邪之入肝則面目俱青眼竄上視邪之入腎則面黑惡叫嚙齒咬牙邪之入肺面色淡白喘息氣乏邪之入脾面色淡黄嘔吐不食此亦大約言之耳仍當審其兼症

蓋此疾之發其始未有不由於痰熱者雖有五臟之殊尤重在心肝二臟内積痰熱外挾風邪風火交爭血亂氣併呼吸貴鬱閉竅壅塞面赤努氣百脉凝滯總由痰涎膠固而肝風心火無所疎泄故頭揺眉掣目斜上視搐掣不休名曰急驚症固暴烈乃為陽症陽盛則多動而症實熱故列已上數法非若慢驚陰症者所可比也急驚須當急治先宜通關通關後且與截風定搐設仍不定乃議下之痰熱既降又當養胃安

神若搐定而仍有微邪但用輕劑消痰清熱則破竹之勢自當迎刃而解也

孫季子朋来曰夫治急驚當下即下第不可過用寒凉及巴霜水銀芒硝輩蕩滌太驟蓋已上諸劑與腦射等藥醫家有所急而用之殆亦不得已也疾去即止若不當用而用或當用而過用慢驚之成率多由此可不慎哉凡欲下之際須當細問前師已下未下或曾經吐瀉否也設已經下及曾吐瀉者不敢再擬下劑只須驅風

化痰清熱令其自已不可峻攻重傷胃氣若体認未明不可孟浪施治先與通關嚏驚輩以開其竅次用人參羌活散定搐散在意選擇下劑亦有三等輕則利驚丸稍重則用踈風散柴胡加大黃湯重則用天麻丸牛黃涼膈丸下後和胃補氣用生氣散茯苓二陳湯蘇合香丸之類寧心定志丸全蝎散溫膽湯此等不寒不熱袪風鎮驚之餘酌而継之以防再發庶稱良師

凡急驚鼻衄者乃肰明經中熱壅將散從血而解 〔八二一五卷〕 廿七

此易治口中吐血者乃心血為熱迫妄行難治犀角湯加滑石牡丹皮黃連山梔

凡急驚抽搐聽其自發自止切不可令人緊抱束繫之恐他日有癇疾以氣不得流通故也

通關散　治驚風搐搦關竅不通

南星一錢炮　射一字　牙皂二條　赤蜈蚣一條炙　僵蚕一錢炒

右為末生姜汁拌擦牙或筋引涎入藥二三點吐出涎關自開

嚏驚散

半夏一錢　猪牙皂角末五分

右為末每用少許吹入鼻中嚏出立甦

全蝎散　治驚風不語通竅豁痰

全蝎七枚各用紫蘇包塗蜜炙去藥再換再炙

右末每服一字姜汁入蜜少許拌勻灌入口中

開牙散

細辛　南星　朴硝各一錢　全蝎五枚　麝香五分

右為末以少許用烏梅肉揉和擦牙外用細牙皂角荊芥為末吹入鼻中 〔八二一五卷〕 廿八

人參羌活散　治驚風熱涎潮牙關緊急或中風

柴胡五錢去芦　地骨皮　天麻酒炙　人參　芎藭　獨活　枳殼　茯苓　羌活　桔梗各五錢　甘草三分

右每服三五錢生姜薄荷湯調服　加蟬退治驚熱躰硬加麻黃乾葛苡仁

鈎藤飲　治一切驚風潮搐神思昏迷目瞪上視但是驚風変易皆効

麻黃去節　甘草　蟬退五枚去翅足　升麻　川芎　龍膽草各一錢　天竺黃　鈎藤　羌活　獨活

防風各三錢 右每三五錢加竹葉七片薄荷葉五片水煎服

琥珀散 急慢驚風涎潮昏冒目瞪抽搐内釣肚疼及和順痘瘡小可驚哭眠卧不安入口立効又治驚癎常服安心定志

辰砂 琥珀 牛黄 僵蚕炒 全蝎去毒 天麻 南星牛胆製 白附子炮 蟬退 代赭石 乳香各一錢 射香一字 右為末三歲半字薄荷金銀湯下慢驚加附子

天麻防風丸 治一切驚風壯熱痰盛恐怖

僵蚕炒五錢 天麻酒煨 防風 人参各一兩 牛黄一錢 全蝎五錢 辰砂 雄黄各二錢半 炙甘草一兩 射香一錢半 右末煉蜜丸桐子大每三五丸薄荷湯下

金箔鎮心丸 治風痰壅盛發熱心神恍惚急驚搐搦

雄黄 辰砂 天竺黄各一錢 膽南星 人参各二錢 山藥一錢半 牛黄 射香各五分 金箔五片 右末煉蜜為丸梧桐子大金箔為衣每服一丸灯心釣藤薄荷湯下常服定志安心

凉驚丸 治驚癎有熱發搐心神恍惚牙関緊急目作上視潮熱手足動揺

黄連 龍胆草 釣藤各二錢 牛黄 射香各一字 右細末麺糊丸粟米大每服五七丸至十五丸次大者三十丸金銀薄荷湯下

定心丸 温驚用此

茯神 白附子 南星炮各三錢 人参 全蝎 僵蚕炒十四枚 乳香三字 遠志去心各一錢 右為末牛膽汁丸梧桐子大每一二丸金銀薄荷湯化下

鎮心丸 治驚常服安心鎮驚

桔梗 山藥 山梔 甘草 各等分為末煉蜜丸櫻桃大金銀箔為衣每一丸薄荷湯下

利驚丸 治急驚身熱面赤引飲口中氣熱大小便黄赤

青黛 輕粉各一兩 黒豆生末五錢 天竺黄二錢 右末蜜丸小荳大一歲一丸薄荷湯下麺糊丸亦可

硃砂膏 驚風痰盛

硃砂炒 牙硝各二錢 五灵脂 芦會各一錢半 射香五分

氷片一字 右細末甘草膏丸菉豆大金箔為衣
每一丸薄苛湯下
疎風散 驚風痰熱俱盛
梹榔 陳皮 黒丑 大黄煨
各等分為末每服五七分生蜜少許調下
牛黄涼膈丸 治熱盛涎潮
牙硝 石膏 甘草各五錢 胆星二錢半 牛黄 紫
石英一錢 射香 氷片各五分 寒水石煆五錢
右為末甘草膏丸菉荳大每一丸陳皮湯下

二十五卷 廿一

柴胡加大黄湯 最利痰熱
柴胡一兩 黄芩 人参 半夏 生姜各三錢半 大黄
量虛實用 右為粗末每服一錢加棗子煎服
金星丸 風熱結聚喉内痰鳴喘粗咳嗽兩頰紅
頬顋赤腫咽隔壅塞目閉不開狂言發熱煩躁
多渴欲作驚風或大便不通小便如血
鬱金 雄黄各一分 軽粉五分 巴霜七粒 南星一個 蝎梢
一錢 右為末醋糊丸麻子大薄苛湯下三丸小者一丸
掲風湯 專利驚熱下痰

青黛 芦會 全蝎各一分 南星末五錢水調成餅包煎三味煨
熟研末入后藥 硃砂一錢半 軽粉 牙硝各三錢
右俱為細末每服一字薄苛湯下
奇方 鎮驚定搐安神
雄黄 大辰砂各一錢 為細末猪心血拌水調下
温膽湯 積痰驚悸
半夏 枳實 酸棗仁各二錢半 陳皮 甘草各一錢半
茯苓五錢 右每服三錢竹茹五分姜棗煎服
全蝎散 治驚搐

二十五卷 廿二

僵蚕炒三條 全蝎薄苛葉炙七枚 射香少許
右為末石榴皮湯下
和中湯 和胃氣止吐瀉
茯苓 蓮肉各二錢 藿香 天麻 人参 扁荳
炒木香 白术 甘草各一錢
每服二三錢姜棗煎服
定志丸 驚風已退神志未定
琥珀 茯神 遠志 人参 天麻 甘草
天門冬 白附子 酸棗仁 右末煉蜜丸皂

子大辰砂為衣灯心薄荷湯化下一二丸
酸棗仁散　驚心不寧恐怖恍惚
人参　麦冬各二錢　茯神五錢　粉艸一錢　辰砂五分　射一分
遠志　酸棗仁各一錢
右末釣藤湯調下如内釣加木香
防風散　風熱痰壅大便不通
羌活　防風　枳實　川芎　粉草　大黄煨
赤芍各等分　右每服二錢姜棗煎服
青金丹　疎風利痰

芦會　牙硝　青黛各一錢　史君子三枚　硼砂　輕
粉各五分　蝎梢十四個　右末麝香墨拌丸麻子大
每一二丸薄荷湯下
京墨丸　驚積痰熱　楚地王監以此藥而著名大利痰熱痾積
青黛　史君子煨　芦會　京墨　胆星各二錢
輕粉　射香各五分　氷片一字
右為末麵糊丸梧子大每服一丸薄荷湯下
鎮心丸　化痰鎮心治急驚　又一方無牛黄有胆星
硃砂　龍齒　牛黄各一錢　鉄華粉　琥珀

人参　防風各三錢　全蝎炙七枚
右末蜜丸梧子大每一丸薄荷湯化下
珍珠丸　急驚熱盛涎潮
滑石飛五錢　白附子一錢　輕粉一錢　巴霜十五粒
右末麵糊丸菉豆大三歲者一丸二丸葱白
湯下　一方有南星全蝎
犀角湯　心驚熱盛
犀角　防風　木通　甘草　桑白皮　茯苓
各等分　右每服三錢水煎服

清心丸　驚熱煩躁
人参　茯苓　防風　柴胡　辰砂各二錢　金箔
廿片　右末蜜丸梧子大竹瀝湯磨下一丸
五仙丹　身熱面赤口噤息粗抽搐易作易止
天麻酒浸四錢　全蝎洗去頭足新瓦焙乾四錢　白附子　辰砂
珍珠　青礞石煅各三錢　巴霜二十粒　金銀箔各十片
右為末姜三片蜜一匙煎湯調服一字
珍珠天麻丸　治急驚風請量用之以通為度此
方仍治吊腸鎖肚撮口至為妙絶功効無比丸

如麻子大每服一歲五丸二歲十丸隨大小加減薄荷湯點茶送下　凡治驚風先須截風定搐次以此劑下之切不可過利　初生患者三日三丸五日五丸七日七丸加青黛名青黛丸

天南星炮　天麻　白附子炮各一錢　巴霜一字　膩粉五分　蕪荑炒　全蝎炒麵　滑石各一錢半　右末水煮麵糊為丸

慢驚

慢驚屬陰為寒為虛多發于大病之後或先有吐瀉不善調理或尅伐過度損傷脾胃夫脾屬土

主四肢虛則四肢冷手指微動或口角掣動面色青二便利是其候也與急驚大不相同蓋急驚乃初病之症元氣未虛邪氣正盛故抽搐大作症雖急乃有餘之症治可攻擊使二便通利痰降熱散而愈也慢驚乃病後虛弱無氣以言無氣以動無力抽搐元氣大虛故也有似於風俗云慢脾風症雖緩實惡候也治惟温補使胃氣漸回大便結實其風自定切々不可攻擊症雖有痰只以六君子湯加天麻炮姜或烏蝎四君子湯所重只在保護脾胃上着工夫餘不及載

孫季子朋来曰慢驚須要審問前症根由按輕重而施治之不可槩稱慢候而遽投大温大熱之劑又不可不識緩急泛々然夾雜他藥失時悮事如從吐瀉後者即以理中湯治中湯甚者加大附子若水瀉輕者五苓散益黃散术附湯之類如從急驚漸々轉致於慢者全蝎觀音散風邪而得者桂枝湯若面青額汗舌短頭低眼合不開摇頭吐舌俗曰慢

脾風此土極似木之候逐風則無風可逐療驚則無驚可療乃脾間虛痰虛熱往来作祟眼合者係脾虛之極不能展開神志昏迷治之早者十全二三大要只在助胃回陽若眼半合半開手足不冷此雖屬慢驚而陽氣尚未全脫不必用硫黃附子輩只與截風調胃可冷可熱和調陰陽太乙保生丹聚寶丹鍾蝎散皆可選用所重只在保脾故所治無失

理中湯　吐瀉後脾胃虛弱四肢漸冷或面有浮

氣四肢虛腫眼合不開
人參 白术 甘草炙 炮姜
水煎服甚者加大附子
治中湯 即前方減炮姜加陳皮
太乙保生丹 治慢驚尚有陽症
防風 全蝎 白附子生 僵蚕炒 胆星
蟬退 琥珀 辰砂各一錢 麝香五分 右末粟米
糊為丸梧子大金箔為衣每一丸薄荷湯下
蟬蝎散 急未盡而慢將來
〔八二十五卷〕
全蝎七枚去毒 蟬退廿一枚 甘草二錢半炙 大南星一枚炮 三七
右末每服五分姜棗煎服
聚寶丹 初傳慢而未脫陽者
人參 茯神 琥珀 天麻 僵蚕炒 防風
南星炮 白附子生 全蝎炒 烏蛇肉酒浸焙各一錢 硃砂
五分 麝香一字 右末蜜丸梧子大每一丸石菖蒲湯下
神寶既濟丹 分陰陽平冷熱定吐瀉豁痰涎
硫黃 火硝 五靈脂 青皮 陳皮
半夏麯 右將硫黃火硝用磁礶熔化攪勻冷

定取下全諸藥各等分為末粟米糊為丸麻
子大每服五丸米飲下
惺惺散 吐瀉後脾弱內虛
人參 茯苓 木香 天麻 扁豆炒 全蝎炙
陳米炒各等分每服三錢姜棗煎服
大醒脾散 治吐瀉脾困不食
南星 茯苓 橘紅 全蝎炙 粉草 蓮肉
白附子 人參 木香 陳米炒
右每服三錢姜棗煎服
〔八二十五卷〕 三八
醒脾散 吐瀉脾困不思乳食
人參 全蝎 天麻 茯苓 木香 菖蒲
蓮肉 白术 甘草炙 白附子
右每服二三錢姜棗煎服
朮附湯 風濕相搏身體煩痛不能轉側不嘔不
渴大便實小便利虛風頭目眩重煩四肢補中
助陽氣止自汗
白术四兩 甘草二兩炙 大附子一兩半炮去皮臍
右每服三錢水姜棗煎服

烏沉湯 驅風助胃治慢驚

天麻 人參 川芎 全蝎炙 南星炮 木香

沉香各一錢 甘草炙 右每服一錢水姜煎服

星香全蝎散 治慢驚風昏迷痰搐

南星 木香 人參 橘紅各一錢 全蝎炙 甘草炙各五分 有熱加防風 每二錢紫蘇姜棗煎服

定命飲 慢驚吐瀉困沉欲傳慢脾通用

半夏 茯苓 木香 生姜末 天麻各三錢

白术 甘艸炙各一錢 右末姜棗湯調下五分

溫白丸 驅風豁痰

人參 防風 白附子 僵蚕 全蝎炙各一錢

南星炮 天麻各二錢

右末麪糊為丸梧子大每姜湯送下一丸

鈎藤散 吐利脾胃氣虛生慢風

鈎藤鈎七錢 蟬退 天麻 防風 蝎尾 人參各五錢 麻黃去節 僵蚕炒 甘草 川芎各二錢半 射香少許

右水煎寒多加白附子五分可與後蟬退鈎藤飲兼看對症用

蟬退鈎藤飲 肚痛驚啼

鈎藤 天麻 茯苓 川芎 芍藥各二錢

甘草 蟬退各一錢 右加灯心水煎服

礞石散又名奪命散 大能利痰不問陰陽慢脾風涎潮壅盛塞於咽間其嚮如潮百藥不能過其咽命在須臾但先用此藥入喉痰即墜下功有萬全起危篤之疾布幹旋之功

青礞石火硝煅通者 右為極細末若急驚風痰上壅身熱如火用薄荷自然汁入蜜調微溫服之良久其藥裹痰墜下痰涎與藥雜和稠粘而墜下也次服退風祛熱截驚等藥

又方 以稀糊丸菉豆大每服二丸急風薄荷剤茶湯下慢脾風木香湯磨下

慢驚慢脾虛風亦痰涎潮上塞住咽喉藥石俱不能下用此以青州白丸子再研為末稀糊為丸入熟蜜湯調下其涎即墜入腹次服治慢驚藥其痰立下不動臟腑不傷真氣惟見其藥裹痰而下始知此劑之神

烏蝎四君子湯　右即四君子湯加川烏全蝎爲
末每服五七分姜棗調下再服去川烏
星蘇散　慢脾風口噤不語痰熱及治諸驚風禁口
大南星炮一枚　爲末每服三字姜四片紫蘇五
葉同煎入雄猪胆汁少許温和服
凡不語者大小便須要調導
慢脾風不語只用南星以人參石菖蒲爲佐
異功散　温中和氣吐瀉不思飮食
即治中湯加木香　姜棗煎服

陰癇散　袪風豁痰回陽正胃
白附子生　黑附子生　南星生　半夏生
各等分剉散井水浸七日逐日換水浸去水
乾入全蝎末二錢同研爲末每服三分生姜湯下
至聖保命丹　驚風内釣肚腹堅硬夜多啼哭眼
目上視手足抽掣不省人事
全蝎去毒十四枚　防風　胆星　蟬退　僵蚕炒
天麻各二錢　白附子炒　辰砂各一錢　射香五分
右末糯米飮丸芡實大金箔十片爲衣每一
丸鈎藤灯心湯下　有熱加牛黄氷片硼砂
一方有羗活二錢此藥常服鎮心化痰

夜啼　客忤　軅啼

夜啼者臟寒也陰盛于夜則冷動而痛故夜啼不
休鈎藤散主之
又有心熱煩啼必面色赤舌胎小便赤澁鈎藤散
去木香當歸加辰砂末木通煎湯調下
客忤者嬰兒神氣脆嫩外邪易而觸之或眼見犬
畜異物耳聽異声或入神廟而見凶悪神像或

入暴喪之家觸而忤之故夜多驚悸睡臥中驚
跳啼哭因晝之所觸而有夜之所感也其候驚
啼口出青白黄沫面色変易喘急腹痛反側瘈
瘲有似驚癇但目不上竄耳視其口中懸癰左
右有小小腫核即以竹鍼刺破治惟辟邪散驚
安神爲上　凡客忤中悪急作醋炭或焚降香
皂角等薰之速服蘇合香丸立甦蓋心藏神神
安則五臟和而愈也
軅啼者兒在胎時母失將養傷於風冷既生之後

令氣停留復因乳哺不節邪與正搏故腹痛腹
脹壓氣而啼也牛黃丸主之冷甚者理中丸溫之
鈎藤散
鈎藤 茯神 茯苓 川芎 當歸 木香各一錢
甘草五分 右每三錢姜棗煎服
乳頭散 夜啼不止腹中疼痛
黄芪 當歸 甘草 赤芍 木香各等分
右為末每塗少許乳頭上令兒吮之
火花膏 治夜啼臟冷而痛也
八十五卷 四三
燈花三顆 硼砂 辰砂各少許
右為末熟蜜調成膏塗乳上令兒吮
蟬退膏
蟬退二十七枚去毒 辰砂少許 右為末煉蜜丸令兒吮
六神散 面青腹疼啼哭口中冷氣四肢冷曲腰
而啼大便泄瀉及不吮乳
人參 山藥 白朮各五錢 甘草炙二錢 茯苓
扁豆炒各一兩 右末每服二錢姜棗煎服
又方 當歸 白芍 人參各二錢半 甘草 桔梗

陳皮各一錢 每二三錢水煎時時服之
雄射散 治客忤腹痛危急
雄黃一錢 乳香五分 射香一字 右末每一字刺鷄冠血調灌
黄土散 治小兒客忤
伏龍肝 蚯蚓糞各等分
右水調塗兒頭上及五心上為良
龍齒散 治拗哭肚疼驚熱
龍齒 蟬退 鈎藤 羌活 茯苓 人參
天麻 防風 全蝎各等分 右末灯心湯調下
八十五卷 四四
雄黃散 中惡客忤
雄黃研水飛細末用桃樹枝煎湯調灌
又方 治仝上
蘇合香丸 并雄黃射香末用降真香煎湯化下立甦
丹毒赤遊風腫
孫仲子泰來曰小兒丹毒赤遊風者書謂半周一
歲之間不宜頻頻洗浴恐濕熱之氣鬱蒸不散
發為丹毒愚謂此固一說也總由妊母血熱漬
流于胎胎受熱毒蘊于腠理或乳母好食酒麵

煎炙辛熱等物皆能致之發于四肢者易為調治發于頭面胸背令兒煩躁脹悶身如火灼古謂入心者死以其毒劇火盛故也亦有濕熱滯于皮膚搏擊氣血發為丹毒入腹入囊總成凶兆良由包裹失宜復為風邪所襲發為白丹遊腫壯熱增寒鼻塞胸悶息氣喘急咳嗽嘔逆種種之緣一受于母之血熱為内因一為頻洗脫著失宜為外因知内外之因明合治之法庶幾有藉手焉

〈二十五卷 四五

大連翹湯 治胎毒丹毒赤遊 方見潮熱

清上散加升麻 治胎毒丹毒遊赤腫 方見風熱

防已散 丹毒赤遊風入腹入腎防其殺人

漢防已五錢 朴硝 犀角 黄芩 黄芪 升麻各七錢 右每服二三錢加竹葉五片煎服

一方無朴硝有澤瀉

葛根白朮散 治一切赤白丹毒

白朮 茯苓各二錢 木香 甘草各一錢 赤芍藥 葛根各三錢 枳殼二錢半 每三錢水煎服

惺芎散 治赤遊腫中氣弱不可服寒凉者

即四君子湯加桔梗 水煎服

氷黄散 赤遊腫毒

朴硝 大黄各一錢 為末新汲水調敷毒上

白玉散 赤遊丹毒

滑石 寒水石各一兩 右末醋調塗腫處或遊至外腎有破損者用水調塗

又方 赤遊丹毒

青黛 丹水入蜜調塗無青黛以靛塗之

〈二十五卷 四六

又方 治赤白丹毒或用寒凉塗之不効者用此良方

伏龍肝為極細末以熟鷄子黄熬為油調塗

升麻湯 治外因洗浴脫著失宜增寒壯熱丹毒遊腫并時行熱毒發班等症

升麻 乾葛 白芍各三錢 甘草一錢半

每服三四錢水煎服 熱盛加黄芩 咽痛加桔梗 發斑加玄參

敗毒散 治時行熱毒胃處冷丹 治噤口痢加陳倉米一撮 羌活 獨活 前胡 柴胡

人参　茯苓　川芎　甘草　桔梗　枳殼
右每三四錢生姜薄荷煎服
心紅散　治赤遊丹毒
心紅（即水銀异 之銀硃也）用馬齒莧搗汁調塗（乾則以汁潤之極妙）
又方　治一切胎毒赤丹
芭蕉根大塊者搗汁塗之乾則再塗畏寒者或
冬月則須稍溫塗之
口瘡
孫季子朋来曰口瘡或宿禀胎毒或乳母過食煿
炙熱蘊心脾不能發泄而然凡用服藥雖知是
熱亦不可過用寒涼恐上熱未除中寒復生也
惟輕清味薄之劑緩〻治之如權衡（在手輕重自如）
加減瀉黄散　治心脾熱盛口瘡
山梔子（一兩）防風（一兩）藿香（七錢）石膏（五錢）連翹　甘草（七錢半）
升麻（三錢）　右蜜酒微炒水煎服小便短澁
加滑石木通
青黛散　治鵞口〻瘡重腭不能吮乳（及治咽喉腫塞）
黄連　黄栢（各五錢）青黛（二錢）牙硝　辰砂（各一錢）

雄黄　牛黄　蓬砂（各五分）氷片（少許）　右為極細
末先以薄荷汁拭口後搽此末一二分
如搽寒涼藥不効口中一片白漫〻者此中焦虛
而熱不得下降內服四君子加炮姜葛根外以
熟雞子黄仝亂髮熬油用綿纏筯頭蘸油洗之
立能止痛取効
重舌（木舌 腫腭 弄舌 腫齗）
重舌亦為心脾蘊熱所致盖脾脉絡于舌底舌為
心苗心脾有熱則血氣沸騰火性炎上如風潮
之上壅故熱毒附于舌根而肉壅腫疊出短小
如舌者是也
着頰裏及上腭而腫者名腫腭
齒齗上腫者為腫齗此二者皆宜針破出血即
愈也
木舌者臟腑壅滯挾心脾之熱上衝故令舌尖
腫大塞滿口中或僵硬如木不能轉掉不能言
語若不急治必致殞命古方用蓖麻子肉搗研
以綿紙取油將紙拟成條點火復吹滅（以烟薰之即消）

弄舌者脾虛微熱津液不足時、舒舌此不可
用凉藥宜補中氣使生津液則愈矣

青黛散　治口瘡重舌不能吮乳重腭鵞口
方見口瘡

蓬砂散　舌上白胎舌上乾黑
蓬砂為末氷片少許摻之或用生蜜調塗舌上妙

千金方　治重舌
黄栢　用竹瀝浸一宿點舌上

瀉黄散　治心脾熱盛重舌重腭等症　方見口瘡

茱萸膏　心脾熱唇口生瘡重舌木舌等症用此
以引其熱下行或兼服連翹飲子仍與金絲膏
刷口内舌上立効　吴茱萸　為末米醋調塗
脚心更以厚帋貼之繫定

金絲膏　小兒口瘡大効
黄丹一錢　生蜜一兩　右和勻深甌盛甑内蒸黑為
度每用少許刷口内

語遲

小兒四五歲不能言者盖心之声為言皆由在胎
時其母卒有驚怖内動母之心氣不足則兒之
心氣不充故語遲也法當養心菖蒲丸佳

菖蒲丸　石菖蒲二錢　人參五錢　麦門冬　丹參
遠志去心姜汁炒　天門冬去心　赤石脂各三錢　直指方有
當歸　川芎　硃砂　右末煉蜜丸麻子大每服三十丸

又方　酸棗仁五錢　遠志去心甘草湯煮乾三錢　乾山藥五錢
人參　白茯神去心皮各五錢　歸身五錢　石菖蒲二錢　丹參
三錢　石斛去根酒蒸三錢　上右末員眼肉煎湯調下每服一錢

斷乳法

畫眉膏　梔子三枚炒存性　雄黄　辰砂各少許
右為末入輕粉少許麻油調勻候兒睡濃時塗
其兩眉上醒来自然不吃乳未効再塗則効

行遲

内經云足得血而能步設未經跌撲損傷及發驚
搐強被束縛者乃下元不足也盖腎主骨肝主
筋下元不足則筋骨痿弱不能行動宜當峻補
下元有虧弱而不能行者當從腎治

腎氣丸　治下元不足行遲

懷地黃酒蒸熟四兩 乾山藥 山茱萸肉各二兩 茯苓
澤瀉 牡丹皮去心各一兩半
右末煉蜜丸空心淡鹽湯下五十丸
地黃丸 峻補下元方見顱顖
虎骨丸 腳軟行遲
虎脛骨好酒炙 熟地 酸棗仁酒炒 茯苓 桂心
防風 川芎 牛膝 各等分為末蜜丸麻子
大木瓜湯下三十丸
牛膝散 三歲不能行走
二十五卷　五一
五加皮六錢 牛膝 木瓜各五錢 右末每一錢酒調下
項軟
項軟者乃督脈虛而筋骨不收斂也督脈係足太
陽膀胱經所主古方多從風治以其頭重頸軟
頭不得正而墜前墜後也愚謂但補督脈則其
氣血充盛自能收持也前虎骨丸地黃丸皆可任之
天柱丸 治項風氣起頸軟頭不得正或去前或去后
蛇含石醋煅七次一兩 川鬱金三錢 射香少許
搗飯為丸芡實大每一丸荊芥湯化下

五皮散 治項軟
五加皮 為末酒調塗數頸骨上再酬調服亦
治行遲
滯頤
滯頤者涎自口角流出而滯于頤間也此由脾冷
涎多脾虛不能攝其津液泛而溢出漬滯頤間
溫居紅赤性當溫脾益黃散溫脾散皆治之亦
有脾熱者但清其熱則涎自不泛上寒熱二字
在人看其面色審其兼症問其二便庶治不偏
二十五卷　五一
溫脾丹 治滯頤
半夏 丁香 木香各一兩 姜炮 白朮 青皮
陳皮各五錢 右末麵糊丸黍米大一歲十丸米湯下
溫脾丹 治仝上
半夏 人參 肉果 白朮 炮姜 甘草各五錢
丁香一兩 右二三錢水煎服
清脾散 治仝上 白朮 白滑石飛各五錢 甘草一錢
黃連酒炒二錢 扁豆炒 茯苓各三錢 葛根一錢半 石斛三錢
右末每服一錢灯心湯調下 二十五卷終

赤水玄珠幼科二十六卷目錄

脫肛門
哮喘門
咳嗽門
吐瀉門
癖門
淋門
遺尿門
外腎光腫門
痢門
瘄門
吃泥　吃生米門
耳門
龜胸龜背門
蟲門
痄門
癇門

赤水玄珠幼科二十六卷

新安生生子孫一奎著輯

脫肛門

脫肛乃腸胃有積滯以致濕熱之氣下流蘊於肛門而然也法當推逐其積又或貪坐冷地熱為寒凝結為內痔致每登廁肛即脫下此當從痔而治痔消而肛自收也有泄利日久中氣虛而下陷者宜大補中氣藥為升提從推從補從升皆當看症又有肛上生蟲者予友黃桂峯夫治一人肛出百方不應乃以生猪肚子一具刮下垢物用紗囊盛之罨於肛上一夜次早細蟲不計其數盡叢於囊垢上肛即收入此亦濕熱之所生也

致新湯　治食積腸胃脫肛不時用此消而推之

木香二分　檳榔五分　京三稜煨　山查　枳殼　桃仁各七分　滑石一錢五分　黃連吳茱萸製三分　右水煎食前服　積甚者遇仙丹下之方見

丹石散　治外痔脫肛如神

黃丹　滑石等分

為細末新汲水調塗日三五次愈
澁腸散　久痢大腸脫出不收　訶子肉(煨)
赤石脂　龍骨(各等分)　右末用茶調肛上絹帛
揉入　治痢久不止米飲調服
勝雪膏　翻花等痔熱痛不可忍或已成瘡
氷片　鉛霜　右末好酒研成膏塗上即愈
僧礬散　蜜陀僧(二錢)　枯礬(一錢)　氷片(少許)
為末敷上先用苦參湯或防風荊芥湯洗
苦參湯　脫肛并痔　枳殼　黃連　大黃

一八 廿六卷　二

甘草　荊芥　苦參　芍藥　黃芩(各等分)
右每五七錢加車前子茅草同煎薰洗
凡腸頭作癢多是有虫　用生艾　川楝根煎湯
薰洗
赤石脂散　瀉痢後肛門不收　赤石脂
伏龍肝(等分)　為細末敷肛上
蒲黃散　蒲黃(五錢)　熬猪脂一兩仝拌成膏塗(上肛)
五倍子湯　五倍子(一兩)　煎湯入皮硝薰洗
補中益氣湯加防風桔梗水煎食前服

蜘蛛散　大蜘蛛(塩泥包裹煨存性為末一錢)　鉄銹末(三分)
猪胆汁調敷肛妙
又方　鱉頭燒灰敷上

哮喘門

哮喘辯

孫仲子泰来曰哮之與喘極須分别疑似之間虛
實攸繁非細務也夫哮以聲响名喉中痰盛膠
塞肺竅氣道壅滞呼吸不暢喉中如水雞之聲
故氣高而喘心熱而煩擡其肩擷其項不能屈

一八 廿六卷　三

體而拾物貼席而伏枕也原其痰火内欝外被
風寒束其皮膝肺氣為之不利皆上壅胸喉斯
乃有餘之疾雖多日不食亦不死治惟調氣豁
痰解表盖痰出而聲自瘦也頋喘以氣息言喉
中無痰氣促不相接續有虛有實仲景云汗出
如油喘而不休者死故前人治法有補有瀉是
故不可與哮同日而語也

明治哮

哮於之原有三有因驚風之後而得者由治驚不

調氣故痰不盡徹去有感風寒而得者有食鹹酸搶喉而得者然皆不外乎利肺調氣豁痰六字也

麻黃杏子草膏湯　治傷寒發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者及下後而喘

麻黃二兩去節　杏仁去皮尖二十五粒　石膏四兩　甘草二兩

右每三四錢水煎服

蘇合香丸　治哮調氣豁痰極効治驚風後而得者尤佳

大効雄硃化痰丸　治因驚後哮喘逆觸心肺氣急口張虛煩神困

雄黃　硃砂　蟬退　全蝎炒　姜蚕炒　南星　白附子各一錢　輕粉五分　右不麵糊為丸麻子大每服二十九薄荷茶清任下

九寶湯　大人小兒素有喘急遇寒暄不常發則連綿不已哮喘咳嗽夜不得卧

桑白皮　橘紅　大腹皮　紫蘇　杏仁　薄荷　甘草　麻黃　官桂各等分　姜三片烏梅一枚水煎服

明治喘

喘之原有六有風寒傷肺而得者有厚味傷脾積痰上迫於肺々氣為之不利而得者有大病後被尅伐太過傷其脾胃而中氣虛弱者有火逼肺金々為火侮而氣不得下降者有水腫之疾水溢迫肺而喘者有破躰太早腎未完固而洩其真陰以致腎虛不能納氣歸原者故治法有疎風解表有清火保肺有清中化痰有利水滲

濕有峻補腎元有單補中氣較之於哮大不相侔茲特揭而明之俾認証循方不啻駕輕車就熟徑即夜行亦無顛躓之慮也矣

九寶湯　風寒哮喘咳嗽不能伏枕　方見哮

黃芩半夏湯　寒包熱哮喘咳嗽

半夏　枳殼　酒芩　桔梗　紫蘇　麻黃　杏仁　甘草　右姜棗水煎服　天寒加桂枝

桑白皮湯　肺氣有餘火炎痰盛作喘

桑白皮　半夏　蘇子　杏仁　貝母　山梔

黃芩 黃連 右姜水煎服

定喘湯 諸喘久不愈

白菓廿一枚去殼切炒 款冬花 桑白皮蜜炒 麻黃

法製半夏各三錢 蘇子二錢 杏仁 酒芩各一錢半

水煎作二次服

生脉湯 肺氣大虛氣促上喘汗出而息不續命

在須臾 麥門冬五分去心 人參三錢 五味子二十粒

水煎服

星半瓜蔞丸 八廿六張 清中化痰

南星 半夏 瓜蔞仁 香附子 六 橘紅

蘿蔔子炒 杏仁 皂角灰 右末神麯糊丸

梧子大每服二三十丸姜湯下

又方 治食積痰喘壅滯不利

半夏姜製 瓜蔞仁 山查 神麯炒 海石

蘿蔔子 青黛 右末用瓜蔞穰搗為丸竹瀝

生姜湯下每服三十丸

參朮調中湯 補中清热定喘除嗽

人參 白朮各五分 桑白皮蜜炒 炙甘草各三分

麥門冬 陳皮 茯苓各一錢 青皮三分 五味子

二十粒 水煎服

瀉玉丸 治胃火刑肺氣高而喘每至夏月必一

發者 軟石膏 寒水石各煅 右等分為

細末用甘草煎濃膏為丸芡荳大每夜白湯或

淡姜湯送下一錢

神秘湯 水氣作喘

橘紅 桔梗 紫蘇各五分 人參三分 五味子

七粒 桑白皮一錢 八廿六葉 半夏七分 檳榔五分 炙甘草二分

姜三片水煎服

椒目散 水泛於肺々浮水而浮故喘不得卧

川椒目 沉水者略炒為末每一錢姜湯調下

葶藶大棗瀉肺湯 上氣喘急身與面目俱浮鼻

塞聲重不聞香臭胸膈脹滿將成肺癰

葶藶炒研一丸彈子大 大棗十枚去核 水二盞先煎大

棗至一盞去棗入葶藶煎八分食後服 先服

仲景小青龍湯二帖再服此

八味丸 治下元真氣不足腎虛不能納氣歸原

而喘 懷熟地四錢 山藥 山茱萸肉各一錢
茯苓 澤瀉各一錢五分 大附子童便制 桂心各五分
右蜜丸赤豆大每服二三十丸白湯下
加減八味丸 治仝上 即前方去大附子加五
味子
人參胡桃湯 治下元不足喘不得卧
人參一錢五分 胡桃肉二枚 姜一片水煎服
杏仁煎 治喘嗽 杏仁去皮尖炒 胡桃肉去皮
等分研為膏加煉蜜丸彈子大臨卧嚼下
一方 胡桃肉三枚 姜三片臨卧嚼吃飲湯三四
口再嚼再飲止嗽化痰
千緡湯 治痰飲喘急不能卧人扶而坐一服即安
半夏七箇泡 炙甘草 皂角炙各一寸 生姜一片水
煎服
治哮喘欲成龜胸龜背者
甜葶藶四兩 五味子一兩 紫蘇子二兩 杏仁一兩五錢
桑白皮二兩蜜炒 右蜜丸黍米大每三五十丸淡
豆豉湯下 銅壁山人加鹽三分神効

八十七卷 八

咳嗽門

有傷風嗽有傷乳食嗽有痰嗽有火嗽有虛嗽
風者鼻塞或流清涕 乳食者胸腹飽悶發熱
日輕夜重 痰者一咳便有痰喉中常有痰声
火者發熱面赤小水短澁 虛者呼吸力微
大小便利躰倦而面色青白
三拗湯 治感冒風邪鼻塞声重語音不出頭痛
目眩四肢拘倦咳嗽多痰胸滿氣短 麻黄
杏仁不去皮尖 甘草 姜葱白煎温服取汁 有
热加前胡 有痰加半夏
華盖散 肺感寒邪咳嗽上氣胸膈煩悶項背拘
急声重鼻塞頭目昏眩痰氣不利
麻黄去節 蘇子炒 桑白皮蜜炒 杏仁 茯苓
陳皮各五錢 甘草二錢 右每三五錢水煎服
金佛草散 治傷風頭目昏痛往來寒熱肢疼煩
悶痰涎不利咳嗽喘涕唾稠粘壯热惡風
金佛草 荊芥各一兩半 前胡 麻黄去節各一兩
甘草五錢 赤芍藥 半夏各六錢 每三錢姜棗

八十六卷 九

煎服　嗽甚加杏仁五味子

茯苓厚朴湯　治傷乳食停痰咳嗽或吐白沫氣喘　白茯苓　半夏(各一錢半)　厚朴(制五分)　甘草(二分)　姜三片煎服

白餅子　傷乳食停痰咳嗽氣粗喘急及冷痰腹痛　滑石　輕粉　半夏　南星(各一錢)　巴豆(十四粒去殼水煮乾)　右研勻巴豆後入糯米飯搗為丸菉荳大捏作餅子三歲已上三五餅已下一二餅煎葱湯下　傷食麥芽湯下

新傷乳食咳嗽用二陳湯加蘿蔔子杏仁枳殼麥芽山查厚朴之類服之食消而嗽自止

瀉白散　化痰止嗽下氣進食瀉肺火　桑白皮(蜜炒)　地骨皮(各一兩)　甘草(二錢)　每三錢加粳米煎服

蔞玉丸　胃火食積痰火面赤氣粗喘嗽(方見喘門)

清化丸　火刑肺金咳嗽喘急　貝母　知母(各一兩)　巴荳(二十粒)　仝炒去巴豆只用二母為末煉蜜為丸菉荳大每服一二十丸白湯下

久嗽脾肺之氣不足用前諸劑不効者以六君子湯加苡仁桑白皮五味子服之即安

夏月咳嗽多汗喘咳無力生脉湯佳

雄黃丸　治癖積痰嗽嘔吐　雄黃(五錢)　半夏　神麴　白麵(各一兩)　巴霜(四十九粒另研)　右末滴水為丸菉荳大用米糠拌炒赤色每服七丸加至十丸嘔吐姜湯下痰嗽虀菜汁下

咳久連聲不已口鼻出血者茅根湯主之　陳皮(去白)　半夏麴　茯苓　甘草　天門冬　片芩　梔仁　貝母　知母　石膏　生地　杏仁　桔梗　瓜蔞根　水煎臨服加茅根汁一小酒盞仝服

吐瀉門

小兒吐瀉不異大人當於大人門擇治故不再論茲採數方以備不時之急但審諦寒熱躰認傷積証明則百投百効矣

凡吐乳直出而不停留者古謂之哯乳但以炒麥芽三錢橘紅一錢丁香三分水煎服之立止

凡霍亂吐不止者用蘆稷米炒黃煎湯飲之立止

又方　白扁荳嫩苗煎湯飲之立止如無嫩苗時月即用白扁荳炒過煎湯與之亦安

二香散　止吐如神　真藿香一錢二分　丁香一錢　白滑石五錢　右為末每服五七分米飲下

凡冷吐者乳不消化多吐而少出面白眼慢神昏額上汗出急宜溫中理中湯參香散若將傳慢脾者可用全蝎觀音散

參香散　治寒吐胃虛投諸劑不效者

八　廿六卷　十二

人參　沉香　丁香　藿香　木香各等分

為末每三五分米飲調下

全蝎觀音散　治吐瀉截風定志庶免傳變慢驚

黃耆炙　人參各二錢半　木香　炙甘草　蓮肉　扁豆炒　茯苓　白芷　全蝎　羌活　防風　天麻各一錢　右每服三五錢姜棗煎服

六神湯　脾胃虛吐瀉不進飲食

黃耆　扁荳　人參　白朮　茯苓　炙甘草　藿香各等分　每三四錢姜棗煎服

藿香散　治冷吐瀉臟腑不調瀉下青黃黑白色或如雞子清或腹疼微熱

橘紅　藿香　枳殼　厚朴製　炙甘草

右為末每服一錢米飲下　治瀉棗湯下

凡熱吐者面赤氣粗唇紅吐出之勢射而遠乳已化色黃小水短少二陳湯加姜汁炒黃連黃芩枇杷葉

濟生竹茹湯　治熱吐口渴煩躁

八　廿六卷　十二

橘紅　乾葛　甘草　麥門冬　竹茹　生姜

右水煎服　熱甚者加姜連

益元散　治熱吐面赤氣粗小水短少　傷暑作吐尤佳　滑石六錢　甘草一錢　為末姜汁調灯心湯下吐甚者井花水下

凡食傷而吐者吐出之物有餿餒氣眼胞浮面色黃足冷肚熱日輕夜重麦芽枳實青皮檳榔厚朴陳皮之類消而降之

治瀉之劑

凡冷瀉者面色青白小水清腸鳴漉漉腹中作疼

口不渴益黄散理中湯挾風邪者藿香正氣散
挾暑氣者六和湯
胃苓湯　治冷瀉小水不利
蒼朮　厚朴炒姜汁　陳皮　炙甘草　白朮
茯苓　猪苓　澤瀉　桂皮　姜三片水煎服
凡熱瀉者面赤唇紅小水短少口乾六一散燈心
湯調下立止
清六益元湯　治熱瀉小水短少口乾
白朮炒　滑石　炙甘草　黄連炒酒　麦芽炒

水煎服
四苓湯　治熱瀉小水短少腹中作疼
白朮炒　赤茯苓　澤瀉　猪苓白芍藥酒炒
酒芩　酒連　水煎服
凡食傷而瀉者腹中或疼或脹噯氣如敗卵詳其
所傷以對証之劑消而磨之如傷乳食以麦芽
糯米食以酒麴肉以山查荳腐以蘿蔔子荳粉
以杏仁諸菓子以射香肉桂傷魚以橄欖無於
理脾中倍加所以之藥為君則効也凡諸内傷

初未下膈之時只宜吐之如瓜蒂散或蘿蔔子
擂滚水取汁多飲之即吐若食已下膈入胃則
不可吐以香橘餅之類消之若腹中飽硬日數
已久而痛在臍腹則宜備急丸等下之然後調
補瀉始止也若補之太早恐食積不消久而變
為痢疾或為脾泄或為痞滿皆由執術者失先
後次第之宜盲對証之剤之所致也又按已上
諸剤不止者乃虫瀉也當從痢治
瓜蒂散　治食傷胸膈脹疼兀兀欲吐煩悶不安

瓜蒂一枚　赤小豆一錢　為末白湯調下五七分
少刻用鵝翎於喉中探之即吐
香橘餅　食積瀉冷瀉腹中脹冷
丁香　青皮　陳皮各二錢半　厚朴　神麴炒
麦芽各五錢　右為末煉蜜為餅紫蘇湯下米
飲亦可
消積丸　吐瀉大便酸臭
丁香九粒　砂仁十二粒　巴豆二粒　烏梅肉二枚
右為末麺糊為丸菉荳大温水送下一二丸

保安丸　傷食瀉
香附子(炒)　砂仁(炒，各一兩)　白姜(煨)　青皮(炒)
陳皮　京三稜　蓬朮(俱煨)　炙甘草(各五錢)
右為末麦芽麪糊為丸菉豆大每一二十丸姜
湯下
夏月作瀉或傷暑吐瀉以六和湯治之名六和者
以其能和六腑也
六和湯　治吐瀉霍亂
砂仁　半夏　杏仁　人參　炙甘草(各一兩)
赤茯苓　藿香　扁豆(炒)　木瓜(各二兩)　每三
五錢姜棗煎服
香橘膏　治吐瀉
砂仁(二錢)　白荳仁(一錢)　蓮肉　山藥　木香
青皮(炒，各五錢)　陳皮　厚朴(制，各一兩)　麦芽(炒)
神麴(炒，各二兩)　右為末蜜丸雞荳大每服一丸吐
用紫蘇湯下瀉荊芥湯下
保安四聖餅　治吐瀉驚癖吐瀉日久恐傳慢驚
人參　白朮　茯苓(各一兩)　炙甘草　南星(炮)

白附子(各五錢)　代赭石(醋煅，一兩)　蛇含石(煅，三錢)
右為末端陽日粽搗為餅計重一錢每服一餅
吐姜湯　瀉米飲　驚薄荷　癖米泔水下
荳蔻散　腹痛腸胃虛冷滑泄不禁
肉荳蔻一枚剜一小孔入乳香一塊湿麪包裹
煨熟為末每服三五分米飲下
睡驚太乙丹　治瀉後兼青鎮驚安神止夜啼
白朮　茯苓　桔梗(炒，一兩)　藿香(五錢)　川芎
白芷(各三錢)　扁豆(炒，五錢)　白芍藥(酒炒，五錢)　右為
末煉蜜為丸櫻桃大辰砂射香為衣每服半丸
薄荷湯或棗湯化下　夜啼燈心鈎藤湯化下
癖門
癖者血膜包水癖於脇傍時時作痛也惟癖能發
潮熱能生寒熱故癨家中脘多蓄黃水日久而
後成癖此盖小兒臟腑不和營衛不暢津液不
得流通冷氣搏之則結聚而成癖矣進食丸消
食丸可選而用之甚者白餅子下之治之不早
恐成癖積羸瘦肚脹則难治也

取癖丸　治腹脇痞結氣滿不得宣通、
甘遂（微炒）　芫花（炒）　黑丑（半生半炒研末）　辣桂
蓬术　青皮　木香　𦬁仁（去皮炒）　五靈脂（各錢）
巴霜　右為末飛麵糊為丸麻子大每服一二
丸姜棗煎湯灌下泄後用冷粥補之
燒丹丸　乳癖食癖午後寒熱咳嗽脇下結硬
玄精石（煆赤）　輕粉（各一兩）　粉霜　硇砂（各五分）
右為末入寒食麵一錢水和成餅外再用濕麵
包裹慢火煨黃色取出去麵將藥再研為細末

滴水為丸米粒大一歲五丸二歲十丸夜卧白
湯送下至天明取下惡物如不下漸加丸數如
妳癖未消尽隔三兩日再一服以癖消尽為度
紫丸子　嬰兒乳食失節宿食不化胸腹痞滿嘔
吐惡心便利不調乳食減少不消內挾冷痰大
便酸臭或变蒸發熱多日不解因食成癖先寒
後熱
代赭石（醋煆）　赤石脂（各煆一兩）　杏仁（去皮尖麸皮炒五十個）
巴霜（炒一錢）　右為末飪餅丸如黍米大月外兒

只服一丸米飲下微利即瘥
千金方云此方之妙無所不治雖為下藥並不
虛人
七聖丸　能令黃瘦子頓作化生兒
三稜　莪术　芫花（各醋浸同炒）　青皮　橘紅
川練子（去核）　杏仁（去皮尖）　右為末醋糊為丸
黍米大食遠白湯服日間所飡之食物盡行消
化永無積滯
消積丸　消積聚寬腹脹退面腫進飲食化滯物

木香　人参（各一錢半）　黃連（炒）　莪术（醋煨各三錢）
橘紅　青皮（炒）　檳榔（二枚）　右為末麵糊為丸
黍米大食後米飲下
萬金丸　磨積塊去黃胖神効
平胃散　加夜明沙（微炒）　針砂（醋淬炒）　皂礬（醋煮乾煨）
紅（各生分）　為末紅枣肉為丸菉荳大空心米飲下
忌一切血及蕎麦麵
靈仙丸　消一切癖
葳靈仙為末煉蜜丸彈子大紅絹袋盛藥一丸

用精猪肉四兩煮極爛去藥聽喫其積化從大
便而下以知為度

摑癖散　治癖立効

海蛤粉　黄丹　硫黄各等分　初伏日修合為
細末用好米醋調成膏於新烏瓮中晒乾為細
末一歲兒服一分空心米飲調下取下癖積如
藍汁為驗

鱉甲猪肚丸　小兒痞積發熱

柴胡一兩　黄連　鱉甲醋炙各七錢　枳實炒　木香

入廿六卷二　二

青皮各五錢　青蒿七錢　右為末入猪肚内蒸極
爛同搗為丸梧子大每服二十丸人参湯送下

赤茯苓六錢　赤芍藥　山梔子各三錢　當歸
甘草各五錢　每五錢燈心煎服

導赤散　血淋

生乾地黄　木通各二錢　黄芩　甘草生各一錢
右為末每服一錢井水入燈心煎湯服仍以米
飲調油髪灰空心灌下

車前子散　小便不利

茯苓　猪苓　香薷　車前子　人参各等分
右為末每服五錢燈心湯下

金砂益元散　小便淋瀝不通

欝金　海金砂　滑石　甘草各等分　右為末
每服三錢木通燈心煎湯下或冬瓜仁湯亦可

茯苓散　治白尿

京三稜　蓬朮各煨　砂仁　赤茯苓各半兩　青皮
陳皮　滑石　炙甘草　右為末每服一錢灯
心煎湯調下

入廿六卷　廿一

三稜散　小兒尿白久而成疳此藥實脾土消食
化積

三稜　蓬朮　益智仁　甘草　神麴　麦芽
陳皮各五錢　右水煎服痰嗽加製半夏口腥氣
加鹽調理諸痰加棗子

淋門

淋淋瀝也尿竅澁滯小便點滴而出艱澁而疼頻
而數起也由熱結膀胱不能滲洩下焦之氣鬱
滯而然其血淋者熱自小腸而来小腸與心[illegible]

裹心主血熱則妄行滲於膀胱而致之也
小兒尿出少頃如米泔狀者由乳哺失節傷於脾胃以致清白不分久則成癖而濁也尿初出時微赤良久變白乃熱癖之邪初出黃白良久變米泔者乃冷癖之候也冷者益黃散主之熱者牛黃丸冷而復挾熱者大蘆薈丸純白濁者厚朴丸諸失津液欲成癖而小便白濁者茯苓散

葵子散　小兒諸淋　八十七張
葵子　車前子　木通　桑白皮蜜炒　瞿麥
赤茯苓　山梔子　炙甘草各半分　水煎服

八正散　心經蘊熱口燥咽乾五淋小便澁眼目赤脉赤瘡
滑石　瞿麥　木通　大黃　萹蓄　車前子
梔子各五錢　甘草梢二錢半　每二三錢加燈心煎服

木通散　上焦熱小便閉煩躁生嗔及淋瀝諸瘡丹毒

八正散　加赤茯苓　黃芩

五淋散　膀胱有熱水道不通或尿如荳汁或如沙石或膏或血

血餘散　治血淋
髮灰二錢　生蒲黃　生地黃　赤茯苓　甘草各一錢　煎調髮灰空心服

分清飲　通心氣衛滿精小便餘瀝赤白濁
益智仁　川萆薢　石菖蒲　烏藥　灯心水煎服　一方加白芍藥茯苓　八廿六張

君朴丸　治諸癖小便白濁久則黃瘦不長肌肉
史君子肉煨　厚朴制　黃連各一兩　木香二錢同炒
右為末麵糊丸赤豆大米飲下三十丸

胃苓丸　治小便如米泔甚効分陰陽退潮熱消浮腫退黃疸調脾胃　此銅壁山人改湯為丸即胃苓湯加草菓米糊丸米飲下　嘔吐姜湯下　泄瀉車前子湯下　浮腫長流水五加皮燈心湯下　黃疸半方一料加茵陳五錢燈心湯下　白濁鹽湯下　疝氣茴香湯下

遺尿門　尿床附

遺尿者謂小便日夜時出多而不禁尿床者謂夜入床睡去乃小便出而不知也良由下元不足腎與膀胱虛冷所致故古方多用溫補下元之劑腎氣實則氣固而溺有統攝則不致遺失也劉守真又謂有熱客於腎部干於足厥陰之經乃廷孔欝結極甚而氣血不得宣通則痿痺而神無所用故夜滲入膀胱而旋溺遺失不能收禁也此又不可不知 八廿二卷

廿四

孫仲子泰來曰夫謂不禁者乃小便出多不計其遍數為下元大虛之症由陽氣虛憊不能收持此急症也不急治則死矣非大溫大升大補則莫能濟其虛而固其原彼尿床者嬰孩童稚常有之蓋男子十六而精通腎氣固即不為治至其時亦自止若治之早者則早止也亦有至老而不止者余目擊十數人矣余族且三人皆乏嗣總由下元虛冷良可徵矣劉守真謂有熱客腎部干於厥陰廷孔欝結極甚不能宣通故遺矣不能收禁愚謂既欝結極甚不能宣通則小便所出者僅點滴而已所出必短澁疼痛色必黃亦安能直遂長清不收不禁哉內經謂膀胱約而為癃不約為遺溺不禁由是參之守真之論只可言淋乃暫有之疾非遺失日久者可擬余不佞僭為辯

鷄腸散　小兒尿床遺溺不自知尭

鷄腸燒　牡蠣煅　白茯苓　真桑螵蛸炒各五錢

桂心　龍骨各二錢半　每服三錢姜棗煎服 八十六卷

廿五

鷄脞胵散　治遺尿

鷄脞胵一具　鷄腸燒　猪胞炙焦

右為末男用雌女用雄每服一二錢酒調下

破故紙散　下元虛冷遺尿

破故紙炒　為末一二錢白湯調服

益智仁散　治仝上亦治白濁

益智仁　白茯苓各等分　為末每服一錢空心米飲下

又方　五倍子一半生用一半燒存性　為末蒸糕為丸白湯下

補原丸 治下元虛憊小水不禁或如脂膏

桑螵蛸 益智仁 人參 仙茅 山茱萸肉

兎絲子 乾山藥 巴戟 右為末各照常製

芡實粉為丸蓮肉湯送下七八十丸

遺尿方 破故紙 益智仁 烏藥各三錢 白茯苓

茯神各一錢 右為末空心米飲下一錢

外腎光腫門

小兒陰腫多由甘肥不節濕熱下流或啼哭怒氣

不順或失坐冷地皆能致之

丹溪謂脫囊腫大墜下不收以紫蘇莖葉為末水

調荷葉包之又謂一人傳此方用野白紫蘇為

末濕則乾摻乾則香油調敷雖皮潰而核欲墜

悉有神功

桃仁丸 治怒氣不順啼哭鬱氣結於肝經發為

陰腫或為偏墜或水竇不通亦能發腫此方主

之 桃仁去皮微炒 桂心 黑荳微炒 白蒺藜炒去刺研

牡丹皮 大黃各等分 右為末煉蜜丸麻子大

每服五丸或七九丸青皮木香葱白煎湯入鹽

少許送下 或煎大流氣飲研青木香送下亦可

丹溪 用木通甘草黃連當歸黃芩煎服

牡蠣散 小兒外腎腫大莖物光明

牡蠣煅 為細末以津唾調塗腫處即消

又方 加地龍末一分 如外腎熱者以鷄子清調敷

又方 治小兒卵腫 桃仁研如泥津唾調敷

青木香丸 寬中快膈腹脇疼痛心下堅痞腸中

水聲陰腫偏墜

黑荳炒一兩五錢 青木香 補骨脂炒 蓽澄茄

檳榔各四兩 先將檳榔用粟米包外再以濕紙

裹煨令焦去飯取檳榔全前藥為末滴水丸菉

荳大每服二十丸白湯下

又方 治偏墜 防風 牡丹皮

為末酒調服一二錢立効 或白湯入鹽下

又方 治偏墜 五苓散內加防風牡丹皮極効

有熱者服三黃丸

三白散 膀胱蘊熱風濕相承發為陰腫小便不利

白荳炒二兩 桑白皮 白朮 木通 陳皮各五錢

右為末每二錢姜湯調服

蟬退散　陰囊忽腫或坐地多時感受風湿或為虫蟻所吹

用蟬退五錢水一碗煎湯薰洗腫處腫消痛止須洗二三次後服五苓散以燈心湯調服

又方　葱地上蚯蚓糞為末煎甘草汁調敷腫上或薄荷汁調亦妙

痢門

小兒痢疾外感少而內傷多故曰無積不成痢也

八廿六末　廿八

但當審諦新久虛實若新起而腹痛手不可近後重裏急日夜頻迸小水短少稠粘之物若膿若血不計遍数者急宜下之下後看輕重再為調補噤口者審其從時令之氣而来躰必發熱用人参敗毒散加陳倉米有熱毒薰蒸胃口虛而不納穀或乾噦嘔惡者以辰砂益元散用生姜汁調燈心湯送下若痢久而腸胃虛弱者但當補養氣血盖虛回而痢自止也脾胃健飲食進痢自旋止日數雖多而無誤於事也小便不利者當利之清六丸佳

人参敗毒散　治四時不正之氣發為寒熱瘧痢或遍身作痛嘔噦惡心噤口　方見丹毒赤遊

加陳皮姜枣

香脯　小兒刮腸下痢噤口不食閉口合眼至重危困　精猪肉一兩薄片批　膩粉　将猪肉於炭火上慢炙旋鋪膩粉令匀成脯每以少許與吃如未知吃且放鼻边自然要吃此方治胃口有毒食之神効

八十六末　十九

百一選方　治噤口痢

蓮肉去殼留心碾為末每服半錢陳米飲調下此是毒氣上衝心肺借此以通心氣便覺思食

山藥散　噤口痢

乾山藥一兩半炒熟半生用　為末白湯調二錢服之嘔噦立止

茅花湯　吐血下血鼻衄血痢黑痢

茅花一大把水煎服　無花用根代之

枳殼寬腸散　順氣治痢

甘草炙六錢 枳殼炒二兩四錢 為末每服一錢空心白湯調下

烏梅湯 治下痢津液少臟腑虛燥煩渴引飲及諸病後煩渴引飲無度

烏梅肉微炒五錢 白茯苓 木瓜各一兩 右每三錢姜一片水煎服

清六丸 治血痢小水短少及洩瀉 此方專清六府濕熱故名清六内用紅麯者以其能消食積而化淤血也

桂府白滑石飛過六兩 炙甘草一兩 紅麯炒五錢

右滴水為丸灯心湯下二三十丸

芍藥湯 治赤白膿血裏急後重腹中疼痛河守真云行血則便膿自愈調氣而後重自除此方是也 白芍藥二錢 當歸一錢 酒連 酒芩各八分

木香 梹榔各五分 肉桂四分 甘草二分 水煎服

小水短少日夜後重者加只壳升麻桃仁各一錢滑石三錢 若積滯重而熱盛者加大黄一錢

保和丸 食積痢腹疼不知餓用此消之

山查 神麯各二兩 陳皮 半夏各一兩 蘿蔔子 連翹炒各五錢 右末仍以神麯糊為丸菉荳大每服一錢白湯下

小香連丸 裏急後重腹疼赤白痢

黃連吳茱萸各二兩全炒只用連 木香二錢 訶子煨去核五錢

右為丸麯糊為丸菉荳大每三十丸米飲下

地榆散 治赤痢無査鮮紅點滴而下

地榆炒 訶肉煨 甘草各等分

為末每服一錢米飲調下

地榆飲 熱痢腹痛赤白頻併

地榆二錢 甘草 白芍藥 當歸各一錢 枳壳炒一錢半 黄連吳茱萸炒一錢 水煎服

茯苓白术散 治寒痢所下清白如魚凍者脾弱不思飲食

茯苓二錢 白术 人參 木通 只壳 甘草炒各一錢 肉果煨 桂心各一錢半 訶肉二錢 陳皮

每三五錢燈心煎服

朴附丸　治寒痢滑洩不禁
厚朴制　大附子炮　乾姜炮　陳皮各等分
為末粟米糊為丸每服五七分或一錢米飲下
又方 木香一錢　黃連吳茱萸炒三錢　粟殼去蒂萼蜜炒二錢
薑蚕炒一錢　甘草二錢　右剉以生姜三錢全炒
爆乾為末米飲調下　赤生地黃湯下　白烏
梅湯下　如有熱小柴胡湯解之
養臟湯　治冷熱不調下痢赤白或如膿血魚腦
裏急後重腹臍疞痛脫肛　如臟腑滑洩夜起

及日久虛寒加大附子三片
粟殼蜜炒二錢　人參　當歸　肉桂　肉果煨
白术　訶肉煨　炙甘草各一錢　木香　芍藥各一錢半
每三五錢水煎服忌酒麵生冷
胃風湯　風冷乘虛干於腸胃水穀不化泄瀉腹
脇虛滿腸鳴疞痛下如荳汁或純瘀血
白术　芍藥　川芎　人参　當歸　肉桂
茯苓各等分　每服三錢入粟米一錢水煎服
芍藥栢皮丸　一切膿血惡痢窘痛

白芍藥　黃栢各一兩　當歸　黃連　枳殼各五錢
為末滴水丸菉荳大白湯下
三黃熟艾湯　積熱下痢赤色及治傷寒四五日
大下熱利諸藥不効者
黃連　黃芩　黃栢各七錢　熟艾半鷄子大
每服三錢水煎服
噤口痢　人参　黃連各一錢　石蓮子三分
為末擦牙関二三次即能食　右丹溪用人参
黃連二味煎濃服之但得一呷入腹即愈此加

石蓮子亦有理
荳蔻散　嬰孩腸胃脆弱糟粕不聚瀉痢不止或
赤或白冷熱不調日夜頻併愈而又發神効
但忌葷腥生冷
肉荳蔻一個煨　胡粉二錢炒　龍骨一錢生　枯礬一錢
為末每服一錢米飲調下或以薄糊丸麻子大
每服五六十丸　謙曰胡粉即真鉛粉也出韶
州者名韶粉出定州者名定粉揔名光粉其性
滞故用以滞其腸令不虛滑荳蔻溫臟之藥安

和腸胃龍骨白礬澁腸止痢治虛滑日夜無度
者服之隨時痊愈

神効雞青丸　嬰孩一切痢疾不拘冷熱皆効
木香二錢　生黄連五分　肉荳蔻生大者一個
右為粗末取雞子青搜和作餅慢火炙黄色變
紅者稍乾擘破碾為末白麵糊為丸麻子大每
三五十丸米飲下　此方功在雞子青

大効至聖千金飲子　治先吐後瀉後又變痢臍
腹㽲痛脇肋脹滿受濕虛鳴腸血五色相雜或
一八 十六巻　廿四
如荳汁或如瘀血日夜無度食少肌羸
黄芪蜜炙　甘草　陳皮　粟殼蜜炙　木香
白芍藥　地榆蜜炒　黑荳炒　當歸　枳殼炒
烏梅　淮棗　白朮　訶肉煨　黄連各等分
每三五錢水煎服

大艾煎丸　小兒虛痢大渴不止
艾葉燒存性　乾葛粉　胡粉炒　海螵蛸
龍齒各等分　為末煉蜜為丸雞頭子大每服一
丸至二丸米飲下

朮蔻麵　噤口痢一粒飯不食宜此効
白朮五錢　肉果煨二枚　木香二錢　右為末白麵
一兩水搜作餅切作條子水煮熟用葱白生姜
鹽各少許和汁與吃看所入多少仍用雞青丸
調理

炒鷄子　治休息痢及痢瀉日久不愈
鷄子一枚先用黄臘如指大一塊銚內熔化入
鷄子拌炒熟空心食之大効

剪紅丸　治痢鮮血
一八 廿六巻　廿五
側栢葉　槐花　枳殼炒　荊芥穗各等分
醋糊丸糯米湯下

瘧門

小兒瘧痢治同大人惟劑輕小耳當於大人料參
治茲但收集數方以備緩急不重論也緣其症
不外於外感內傷二者而已外感有六經之形
症用和解六經之劑治之內傷有胸腹飽滿晝
輕夜重之標準只以二陳湯加健脾消導之劑
治之盡無痰不作瘧也數發之後乃為截之虛

弱者補之然初發二三日之間必須導痰運脾和解爲主切不可遽投補截設汗不過頭疼未徹則表邪未盡解也苟痰不清胸腹不暢則内傷未盡鎔也補之截之是閉其邪而塞其去路其變也曷勝言哉 和解六經之劑詳於大人科第八卷中

清脾飲 治瘴瘧熱而不寒或熱多寒少膈滿不能食口苦舌乾煩渴小便黄赤大便不利

青皮 厚朴制 白术 草果煨 柴胡

茯苓 半夏 黄芩 甘草各等分 生姜三片

水煎服

養胃湯 外感風寒内傷生冷温中快膈山嵐瘴氣寒瘧嘔逆

人參 蒼术 厚朴 半夏 藿香

草果煨去殼 茯苓各五分 陳皮七分 甘草二分 姜三片棗一枚烏梅一枚煎服

香葛飲 嬰孩夾食夾驚傷寒四時瘟疫瘴瘧

香附子炒 紫蘇葉各一兩 橘紅 青皮 葛根各五錢 炙甘草二錢五分 每三五錢姜葱白煎服

露星飲 治久瘧成痨以此截之

秦艽 柴胡 白术 茯苓 檳榔

常山酒炒一次醋炒一次 黄芩 甘草 半夏

麯 官桂各等分 右用酒醋水各半碗煎七分露一宿臨發五更服之

鬼哭飲 截瘧

常山制 大腹皮 白茯苓 鱉甲醋炙

甘草 桃柳枝各七條水煎臨發空心五更服

南斗散 痰瘧

常山制 白芷 南星各生等分 酒煎臨發五更服

白术截瘧飲 虛弱久瘧脾虛嘔吐不思飲食不拘寒熱極効

白术一兩生用一半炒用四錢 橘紅 麦芽各二錢 烏梅一枚 姜五片 水煎臨發日五更服

何首烏丸 治久瘧陰虛熱多寒少以此補而截之

何首烏　為末鱉血為丸黃苴大辰砂為衣臨
發五更白湯送下二丸
截法　不拘寒熱瘧端陽日製
菀葉尖（東南方者四十九片）　半夏（四十九粒為末）　擣桃葉
尖為丸雄黃為衣晒乾貯罐中封固臨用取一
丸綿裹塞鼻中男左女右
鱉甲飲子　瘧久不愈腹左有塊名曰瘧母
鱉甲（醋炙）　白朮　黃芩　草果　檳郎
芎藭　橘紅　甘草　厚朴　白芍藥（各等分）
八十六卷　廿八
姜棗煎服
青黃散　消瘧母如神　青黛（澄去灰土）　雄黃（研細飛過）
（各等分）　為極細末每一歲用一分空心及夜淡
醋湯調下塊消其八即止屢驗屢効
銅壁山人治瘧母用月礬丸
木香　人参　黃芪　當歸　桔梗
黃連　三稜（醋煨）　莪朮（仝上）　鱉甲（醋炙）　乾薑
（煨）　史君子　苦楝根皮　訶子肉
夜明沙　枳實　綠礬（醋煨各等分）　為末

醋糊丸陳米飲下
又截法　寒多熱少者俱以平胃散加常山草果
截之此內傷瘧　熱多寒少者俱以白虎湯加
常山草果截之　寒熱相半者俱以小柴胡湯
加常山草果截之　此外感瘧
吃泥門
小兒吃泥乃胃中熱丹溪用石膏黃芩陳皮茯苓
白朮煎服而愈徐氏用宜治一兒食泥土困睡
洩瀉遍身如疥此脾經內外疳也以六君子湯
八十六卷　廿九
肥兒丸而愈
吃生米門
吃生米者此胃中有虫亦宜健脾清熱肥兒丸佳
蓋吃泥吃米皆疳之漸當於疳門尋治大蘆薈
丸苛方酌而用之毋使臨期鞅掌也
蒼朮丸　治吃生米　蒼朮（米泔浸一日為末）
飯餅糊為丸梧子大每服五十丸米飲下一日
三服
耳門

生生子曰小兒耳疾多屬風熱上壅亦有因於沐浴水入耳中水濕停久搏於氣血醞而為熱化為膿汁

湯氏云耳有五般常出黃膿者為停耳出紅膿者為膿耳出白膿者為纏耳疳臭者為伍耳〻內虛鳴出青膿者為震耳症雖五般病源一也皆由風水入耳而因有積熱上壅而成若不早治久則成聾宜胭脂膏治之仍服化痰退熱等劑即愈也 大廿六卷 四一

孫季子朋來曰此五者不可謂全無分別詳其名觀其色其間必有說也愚僭剖之停耳者為水濕之氣久停耳中與氣血搏擊醞為熱膿蓋脾主濕又脾之色黃以始為停濕所致故曰停耳膿耳者心主血脉血熱化為紅膿心之色赤故曰膿耳纏耳者肺主氣肺之色白肺氣不利纏壅上焦化為白膿故曰纏耳伍耳者耳內疳臭蓋耳為腎之外候小兒腎未充足偶為氣忤逆於經隧心主臭心氣不得下降腎氣不得上通故醞而為疳臭也震耳者易曰震為雷或為雷聲震動故耳中虛鳴肝之色青故出青膿也此因五臟有所感觸隨臟為名故有此五色之相應也既有此五臟之因須推五臟之治庶為治本若謂症雖五般病源一也則予未敢首肯

蔓荊子湯 治內熱耳出膿汁

升麻 木通 麦門冬 赤芍藥 生地黃 前胡 甘菊 甘草 桑白皮 赤茯苓 蔓荊子各等分 姜棗煎 大廿六卷 四一 食後服

清上散 治上焦風熱耳出膿汁頭面瘡癤 方見風熱門

當歸龍會丸 治肝膽風熱耳中鳴出青膿名曰震耳大便秘小便黃常服宣通血氣調順陰陽

當歸 龍胆草 柴胡 青黛五錢 蘆會 梔子各一兩 胆星 射香五分 大黃各五錢 酒芩 黃栢 酒連各一兩 木香二錢五分 右煉蜜丸小荳大每二十丸姜湯送下

清黄散　治耳出黄膿名曰聤耳内有風熱外為
水湿所干醞久而成
防風　滑石飛五錢　甘草炙一錢　梔子酒炒三錢
藿香二錢　酒連二錢　右為末白湯調二錢食後服
清心丹　治耳出紅膿名曰膿耳及舌上生瘡如
楊梅狀者
黄連酒炒二錢　滑石飛六錢　甘草　辰砂飛各一錢
薄荷六分　犀角屑二錢　右為末每用一錢五分
蜜拌薄荷湯下夜再服
八廿六卷　四二
清白散　治肺熱痰火上壅耳出白膿名曰纏耳
兼治咳嗽
桑白皮蜜炒　地骨皮各三錢　甘草一錢
貝母一錢　寒水石煅三錢　天花粉
酒芩　天門冬各一錢五分　右為末以蜜水
調食後服或白通草煎湯下尤妙
交感丹　治耳中痛臭名曰伍耳或怒氣上逆上
下不得宣通遂成聾聵
香附子童便浸透炒三錢　茯神　黄連各二錢

桂心一錢　甘菊花一錢　右為末每一錢五分
燈心湯調下
禹粮丸　治聤耳出膿水
禹餘粮煅醋淬七次　海螵蛸去硬背上　百草霜
伏龍肝各二錢五分　大附子去皮臍生用一枚　右末
以綿裹如負眼核大安耳内日再易之如不瘥
乃有虫也
龍骨散　治諸膿耳
枯礬　龍骨　胭脂丕各一錢　射香少許
八廿六卷　四二
為細末先以棉裹枝子拭去耳中膿再吹一字
入耳中日再加海螵蛸一錢尤妙
羊角散　治耳内膿汁不乾
山羊角燒存性為末每吹二三分入内一日二
次三日全瘳
滋陰地黄丸　治耳虚鳴膿汁不乾腎陰不足
熟地黄一両　白茯苓四錢　山茱萸五錢　甘菊四錢
牡丹皮四錢　何首烏黑豆蒸二次　黄栢各四錢
煉蜜丸梧子大每三五十丸

龜胸龜背門

古方皆屬之於肺謂受邪喘久所致又乳母多食辛熱貽毒於兒感之於肺由肺脹大而胸高滿如龜狀也盖胸膺之上乃肺之分野又肺主皮毛若背受風邪客於脊骨故背高而傴僂又或兒坐太早亦能致之然此多成痼疾攻之古法惟有百合丹枳殼防風丸及灸肺俞膏俞二穴而已別無治法

百合丹　胸高脹滿其狀如龜

一八 廿六卷　四四

川大黃煨　天門冬　杏仁　百合
木通　桑白皮　甜葶藶　軟石膏

右為末煉蜜丸芡實大每服五丸白湯臨睡服

枳殼防風丸　治客風入背如龜高聳

枳殼　防風　獨活　前胡　麻黃
當歸　大黃煨各一錢　麺糊丸黍米大米飲下

松蕊丹　初生不暇護背為客風吹脊入於骨內或坐早所致

松花　枳殼　防風
獨活各一兩　麻黃　前胡　川大黃
桂枝各五錢　右末煉蜜丸黍米大每十丸米飲下

灸法　肺俞穴　第三椎下兩傍各一寸半
膏俞穴　第七椎下兩傍各一寸半　以小兒中指量中節為一寸　每灸艾炷如小麥粒大各灸三五壯

龜尿法　點背腫高處節間

取烏龜置於新荷葉上用鏡照之其尿自出鍼點脊俞中若龜尿不出用猪毛插入鼻中其尿即出

一八 廿六卷　四五

蟲門

小兒好食肥甘生冷傷於脾胃脾胃既傷則不能運化精微而生濕熱濕熱久則生蟲也發則腹中疼痛上下往來無有休止或亦攻心則合眼啼哭撲手仰身神思悶乱嘔噦涎沫或吐清水四肢羸困面色青黃飲食雖進不生肌膚或寒或熱沉沉嘿嘿不的知其病之所在不早療則腹中子母轉轉相生蟲長一尺足能殺人觀周

歲已前小兒鮮有此苦者良由飲乳不食肥甘
生冷虫無從而生也即是觀之虫之生於湿熱
肥甘也不亦明乎予故述此生虫之源以為令
之為乳母者姑息之戒
化虫丸　虫咬心痛来去不定不思飲食
鶴虱　梹榔　胡粉　苦楝根取東行小枝各
五錢　明礬半枯半生三錢五分　右末麺糊丸菉豆大
三歲者服三十丸白湯入香油二滴吞下食前
服如有小虫皆化為水大虫即從大便而下初
八　十六卷　四六
服甚効
史君子丸　小兒五疳脾胃不和心腹脹時或疼
痛不進飲食漸至羸瘦
厚朴　陳皮　史君子肉湯浸去黑衣各一兩　甘草
川芎各二錢五分　白芍藥五錢　右為末煉蜜丸
皂子大三歲已上一丸米飲下
烏梅丸　治蛔厥當吐令反靜而復煩此為臟寒
蛔上入其膈須臾復上得食而嘔又煩蛔聞食
當自吐及治久痢

烏梅三十三個　乾姜炮一兩二錢　黃連二兩　川椒
當帰各四錢　細辛　人参　大附子炮去皮臍
桂枝　黃栢各七錢　右末用酒浸烏梅肉一
宿蒸飯搗為丸麻子大每十丸日二次忌生冷
梹榔丸
梹榔　鶴虱　貫衆　乾漆炒焦存性
蕪荑　雷丸　雄黃飛　史君
子肉　川練子肉　木香　黃丹
錫灰　輕粉少許　巴霜二個　右為末酒
煮麺糊為丸黍米大五更早用猪肉葱油煎將
八　十六卷　四七
肉細嚼勿吞下但只引虫頭向上便將肉汁調
化虫散或吞梹榔丸至巳時取下虫方進飲食
化虫散　先將猪肝油炙令兒聞其香味引虫頭
向上則藥可行　雷丸　鶴虱　甘草
大黃各一錢　史君子肉十枚　右末用猪肉煮
汁調五更服
疳門
生生子曰小兒疳症最為重候頗疳字從甘明其
嗜食甘肥成積生虫損傷脾胃脾胃一虛百病

蜂起古稱五疳言五臟之疳也五疳之外其名甚都如曰疳氣曰疳虛曰疳熱曰丁奚曰哺露曰腦疳曰脊疳曰無辜之類不勝枚舉蓋脾胃虛則停積〻則生熱或瀉或痢或風或瘧生疳生虫二十已下其病為疳二十已上其病為癆症雖多種源一而派殊也而治總在脾胃為重五臟皆受氣於脾胃賴坤元以資生也又有乳毋未斷乳時先躭身孕兒飲孕乳久為魃病以其疳成肉消顱大髮穗腿枯形肖傀儡若魃然也又有毋躰虛弱氣血不足乳汁不充強餵粥飯耗傷形氣皆成疳兆楊錢二公治論極正採錄於左以為法眼

入廿六卷　四八

楊氏倓子曰疳之受病皆虛使然熱者虛中之熱冷者虛中之冷積者虛中之積治熱不可妄表過凉治冷不可峻溫驟補治積不可用霸峻取

錢氏仲陽曰小兒初病為肥熱疳熱則凉之久病為冷瘦疳冷則溫之小兒易虛易實過寒則生冷過溫則生熱峻取則重傷脾胃上醫慮其消積和胃滋血調氣隨順藥餌以扶持之病家調節乳食以裨养之使營衛調和臟腑充實若或過焉君子未保其往也積者疳之毋由積而虛謂之疳極凡有積者無不肚熱脚冷若積而虛甚則先扶胃使胃氣充實方與微利急以和胃之藥扶虛救裏如白荳蔻蘿蔔子砂仁蓬朮消積等劑疎利之藥也脇腹癖痛亦虛中之積先寒後熱飲水不食或飲水而致喘嗽凡熱疳以胡黃連丸冷疳以木香丸冷熱疳以通神丸主之疳在外耳鼻生瘡者以蘭香散諸瘡白粉散主之

入廿六卷　四九

銅壁山人曰凡治疳不必細分五疳但虛則補之熱則清之冷則溫之吐則治吐利則治利積則治積虫則治虫不出集聖丸一方加減用之屢試屢驗翊此方收聚藥品極為工緻誠醫中之王道疳門之火東也業幼科者則亦當知其所自哉

生熟地黃丸　治肝疳白膜遮睛合面而卧肉色

青黃髮穗筋青腦熱羸瘦生地黃　熟地黃各三錢
川芎　赤茯苓　黃連　杏仁
半夏　天麻　甘草　當歸　枳殼炒
地骨皮各二錢五分　右每三五錢姜三片黑豆
二十粒水煎服
地黃丸　腎疳極瘦遍身瘡疥發寒熱時頭熱脚
冷　熟地黃八錢　山藥　山茱萸各四錢
澤瀉　牡丹皮　白茯苓各三錢　右末蜜
丸梧子大每服十五丸白湯下　五十
〔入廿六卷〕
又方　治仝上　無山茱萸茯苓澤瀉加史君子
川練子
茯苓丸　茯神　蘆會　琥珀　黃連
赤茯苓各三錢　鈎藤鈎　遠志去心煮　乾蟾
煅　射香少許　石菖蒲各一錢　右粟米糊丸
麻子大每一二十丸薄荷湯下
神効換肌丸　脾疳肌瘦潮熱盜汗飲食易傷臟
腑糟粕飲食不化頭大腹急
黃連炒　鱉甲醋炙　肉果煨　訶肉煨各二錢五分

射香一分五厘　麦芽炒　神麴　史君子肉煨各五錢
右末麵糊丸麻子大米飲下看大小服
靈脂丸　脾疳食疳
白荳蔻　麦芽　五靈脂　砂仁
蓬朮煨　青皮　陳皮　史君子各二錢
乾蟾煅三錢　右末米糊丸麻子大米湯下
清肺湯　肺疳咳嗽氣逆多啼壯熱惡寒
桑白皮蜜炒五錢　紫蘇　前胡　黃芩
當歸　麦門冬　連翹　防風　桔梗
〔入廿六卷〕　五一
茯苓　生地　甘草各二錢五分　每五錢水
煎服
黃連肥兒丸　治一切疳及疳眼赤腫昏暗雀盲
或經月眼合不開
黃連一兩　蕪荑　麦芽　神麴各五錢
青皮　史君子肉各二錢五分　右各炒為末
猪胆汁丸麻子大每十五丸米湯下
大蘆會丸　治疳殺虫和胃止瀉
胡黃連　黃連　白蕪荑　蘆會

木香　青皮　雷丸白者　鶴虱炒各五錢
射香二錢　右末粟米飯丸菉荳大米飲下二三
十丸
香蔻丸　疳瀉　黄連姜汁炒三錢　肉果煨
木香　訶肉　砂仁　茯苓　右末飯丸
麻子大每二三十丸米飲下
加味肥兒丸　治諸疳身黄肚急痞塊洩瀉瘦弱
胡黄連　史君子肉　三棱　莪朮各煨
木香　香附　青皮炒　陳皮　檳榔
八　廿六卷　五二
麦芽炒　神麯炒各一兩　川黄連　蘆會各五錢
右末神麯糊為丸菉荳大米飲空心下三五十
丸　小兒無熱去胡黄連　泄瀉加人参茯苓
肉果
加味胡黄連丸　治疳疾一切虚痢諸藥無功此
方極効
胡黄連　蘆會　川黄連　肉果　桂心
人参　辰砂　史君子　木香　鈎藤
龍齒　茯苓各等分　射香少許　右末用獖猪
胆汁二枚取汁和藥令匀却裝入胆袋内以繩
扎之更入莨菪子二錢微炒黄丹一錢二味研
末入前藥和匀搗五百杵丸菉荳大米飲呑下
五七丸治一切十二種疳痢無辜疳亦佳
魺鮍丸　治無辜諸疳一服虚熱退二服渇止三
服瀉利住　蟾蜍一隻打死置桶中取糞蛆入
桶一日一夜將蛆取起以布袋盛安急流水中
一宿取出瓦上焙為末入射香一字飯為丸麻
子大每三五七丸米飲下　此方極驗
八　廿六卷　五三
木香丸　治疳痢冷熱不調五色雜下裏急後重
黄連二錢　木香　厚朴制　砂仁　夜明
沙　訶肉各一錢　右末粳米飯丸麻子大每
服二三十丸艾姜湯下
十全丹　治丁奚哺露
青皮　陳皮　莪朮煨　川芎　五灵脂
白荳仁　檳榔　蘆會各五錢　木香　史君
子　乾蟾灰各二錢　右末猪胆汁浸糕糊丸
麻子每服二三十丸米飲下有熱薄荷湯下

五疳良方　治疳

黃連　蕪荑　神麯　麦芽　陳皮

木香　乾蟾（各一兩煅存性）　檳榔（二枚）　史君子

肉果（二枚）　射香（一字）　右末以猪胆汁二枚入好

酒打糊為丸芥子大米飲下二三十丸

天麻丸　治肝疳風疳疳眼

青黛　黃連　天麻　五灵脂　川芎

夜明沙（炒）　蘆會（各二錢）　龍胆草　防風

蟬退（各一錢五分去足嘴）　全蝎（二枚炙）　射香（少許）

乾蟾頭（二錢炙）　右末猪胆汁浸糕丸麻子大每

二十丸薄荷湯下

地黃清肺飲　肺热疳䘌蝕為穿孔臭或生瘜肉

或臭生瘡

桑白皮（五錢蜜炒）　紫蘇　前胡　防風

赤茯苓　片苓　當帰　連翹　桔梗

天門冬　生地　甘草（各二錢）　水煎食後

服次服化䘌丸

化䘌丸　蕪荑　蘆會　青黛　川芎

蝦蟆灰　白芷　胡黃連（各等分）　右末猪

胆汁浸糕糊丸麻子大每服二三十丸食後卧

服以杏仁湯呑下其臭常用熊胆泡湯小筆蘸

洗俟前藥各進數服却用青黛川歸赤小荳瓜

蒂地榆黃連蘆會各等分雄黃少許為細末吹

入收功

下虫丸　治疳䘌諸虫

木香　桃仁（去皮尖）　蕪荑（炒）　檳榔（各一錢）

鶴虱（一錢炒）　輕粉（五錢）　乾蟾灰（三錢）　史君子肉（五十枚煨）

白苦練根皮（酒浸焙）　貫衆（各二錢）　右末麵糊丸

麻子大每三十丸空心清肉汁下　治疳勞眷

勞加川歸黃連各二錢五分

龍胆丸　治腦疳热餅瘡

龍胆草　升麻　苦練根皮　防風

赤茯苓　蘆會　油髮灰（各二錢）　青黛

黃連（各三錢）　右末猪胆汁浸糕丸麻子大每二

十丸薄荷湯下食後仍以蘆會末吹入鼻中

鼈血煎　治疳勞

蕪荑 柴胡 川芎各一兩 人參五錢 胡連
川連各二錢 史君子廿一枚 右用鰲血一盞與茱
萸一兩拌二連淹一宿次早炒乾去茱萸只用
二連俱為末粟米糊丸麻子大每二三十丸白
湯下
鱉甲丸 治無辜疳腹中毒起四肢瘦削
鱉甲醋炙 黃連 枳殻 夜明沙各五錢炒
訶肉一枚一生一熟 射香二分 蝎虎一錢炙 右末
蜜丸菉荳大每服五丸米湯下日三服
八十六卷 五六
梅肉丸 諸疳煩渴飲水不休
定粉 龍胆草 烏梅肉 黃連各炒等分
煉蜜丸黍米大每二三十丸白湯下
五疳消食丸 治五疳八痢殺腹臟虫療疳勞及
走馬牙疳唇爛肚大青筋此藥大能健脾進食
華顏色長肌肉
麦芽 史君子 黃連 蕪荑各炒
陳皮 龍胆草各等分 右末粟米糊丸如粟
米大每服二三十丸空心米飲下不拘時

蘭香散 治小兒走馬疳牙齶潰爛以至崩砂出
血齒落者
輕粉 蘭香子各一錢 密陀僧五錢醋淬炒
右末傅齒及齦立効
傅齒立効散 鴨嘴胆礬一錢紅匙上煆 射香少許
右研極細末以少許傅牙齒齦上
又方 用蟾酥一字加射香傅之
地骨皮散 治腎疳齦腭牙齒肉腐臭鮮血常出
生乾地黃五錢 真地骨皮 北細辛各二錢半
八十六卷 五七
五倍子二錢炒焦 右末每以少許傅之頻用効
亦可服
大効史君梹榔丸 嬰孩食肉太早損傷脾胃水
穀不分積滯不化傳為疳候
肉果 梹榔生 宣連 胡連
陳皮 青皮 川練肉炒 神麯
蕪荑去皮炒 麦芽炒 木香 夜明沙炒
蘆薈 川芎各一錢 射香一字 右末雄猪胆
汁薄荷汁為丸麻子大每三五十丸米飲下

肥肌丸　一切疳氣肌瘦躰弱神困乏力常服殺虫消疳開胃進食

黃連　香附炒　陳皮各二錢半　川練子肉炒　川芎各五錢　木香二錢　右末紅麹糊為丸麻子大每服三五十丸米飲下

通神丸　治冷熱疳

胡連　川連各二錢　木香　蕪荑炒　丁香　肉果生　史君子肉各一錢　大蟾蜍一隻剉水煮爛研膏　右末膏和丸麻子大每十五丸米飲下

取交妳一切疳毒

夜明沙五錢　精猪肉三兩碎切仝入瓶水煮爛與兒食之汁亦飲之取下腹中胎毒　次用生姜四兩和皮切炒黃色再用黃連一兩二味為細末煮麹糊為丸黍米大米飲下三五十丸

布袋丸　諸疳面黃腹大飲食不潤肌膚　此方予平日用加阿魏五錢極効

夜明沙　蕪荑　史君子肉各二兩　白朮

甘草炒各　茯苓　人參　蘆薈各五錢

右末飥餅為丸彈子大每一丸以生絹袋盛用精猪肉二兩仝入瓦罐煮極爛聽兒食肉飲汁其藥取起懸於風處次日再用

如聖丸　冷熱疳瀉極神効

胡連　川連　蕪荑　史君子肉各一兩　麝香五分　蟾蜍五隻酒煮成膏　右末以膏和為丸麻子大每三十丸人參湯下

肉棗散　肉疳而瘡侵入口鼻

棗肉二枚入青礬如棗大火煅存性為末入麝香少許香油調塗

煮肝散　疳眼翳膜羞明不見物

夜明沙　蛤粉　穀精草各一兩　右末每服一錢五七歲二錢用雄猪肝如匙大一塊批開摻藥在內攤勻麻扎定米泔水半碗煮肝熟撈肝將汁傾在碗内將目薰之其肝分作三次食之即將肝汁送下三次不拘時如大人省目空心食之至夜便能見物如患久不効再製服

即見効
黛連蘆會丸　小兒食甘甜飲食々則生蟲生疳
以此治之
胡連　蘆會　川連炒　史君子各五錢
神麹炒一兩　阿魏　青黛各一錢　射香少許
右末糊丸黍米大米飲下
四味肥兒丸　嘔吐不食腹脹成疳作瀉不止或
食積脾疳目生雲翳口舌生瘡牙齦腐爛發熱
瘦怯遍身生瘡小便澄白腹大青筋一切疳候
一八廿六卷　六二
川連　蕪荑　神麹　麦芽各等分
右末糊丸桐子大每二三十丸白湯下
銅壁山人黄公集聖丸　治一切疳症附加減法
於後屢試屢驗
蘆會　五靈脂　夜明砂炒　砂仁
橘紅　木香　莪朮煨　史君子肉各二錢
川連　川芎　乾蟾炙各三錢　當歸　青皮
各一錢半　因於虛者加人參二錢白朮三錢去
莪朮青皮　因於熱者加龍胆草三錢去砂仁
莪朮　因於吐瀉下痢者加白朮二錢肉果煨
訶肉各一錢五分去青皮莪朮　因於積痛者
加煨三稜川練子肉小茴香各二錢去當歸川
芎　因於瘧者加鱉甲醋炙三錢　因於蟲者
加白蕪荑一錢五分川練子肉二錢去當歸川
芎　因於渇者加人參白朮各二錢去莪朮砂
仁　右為細末用雄猪胆汁二個和麵糊為丸
看大小服米飲送下　予按此方乃十全丹去
梹榔白荳仁加黄連夜明砂砂仁也為有理方
一八廿六卷　六三
名十全功收十全也兹改集聖者集治疳之聖
品也此方不熱不寒補不致滞消不致耗至穏
至妥故有屢試屢驗之語云
又猪肝散　治疳積瘦而躰羸弱不經下者用此
補而下之下後再以參苓白朮散之類調理
雄猪肝不見水者四兩用竹刀批開將新荷葉
晒乾為末二錢摻入肝內重湯煮熟以肝與兒
食之空心服至巳午時取下惡物從大便而出
不動臟腑極佳極佳

癇門

錢仲陽云凡治五癇皆隨臟治之每臟各有一獸之形証並用五色丸治之此治小病者發而重者死病甚者亦死若反折上竄其声如犬症屬肝也目瞪吐舌其声如羊症屬心也目直腹痛其声如牛症屬脾也驚跳反折手縱其声如鷄症屬肺也肢躰如尸口吐涎沫其声如猪症屬腎也

生生子曰恭前論雖以五獸配屬五臟亦是以意測之耳觀其並用五色丸一槩治之且謂發重者及病甚者皆死再無别治法豈謂一五色丸悉能之耶抑謂此病為不治之症殆無可柰何耶特為畧之耶攷之上古未有五獸之分惟朱丹溪乃曰癇症大率屬痰與驚不必分五等尋火尋痰分多少而治無有不愈有熱者以凉藥清其心有痰者可用吐法吐後以東垣安神丸及平肝之藥青黛柴胡川芎之類丹溪此論亦極當理

癇病與急慢多相似而實非癇發時驀然仆地作声作搐或目上視醒吐涎沫急慢症則不然也蓋驚發後即止癇發或一年一度或一季一度或一月一度或三五日再發或受驚而再發或劳心劳力而再發驚則無此之頻也

癇有陰陽若病初作時先身熱開目瘈瘲驚啼叫喊而後發脉浮者為陽癇仆地多仰內在六府外在皮膚故易治若病先身冷目半開不驚瘈不啼叫而作脉沉者為陰癇驀然墜伏此內在五臟骨髓故難治

夫陽癇不因吐下由其內有痰熱客於心胸之間因聞大驚而作若熱盛雖不聞驚亦自作也陰癇其始也亦本於痰熱醫以寒凉藥攻下太過損傷脾胃乃变而為陰非癇本有陰寒症也

戴原禮曰癇有五無非痰涎壅塞迷悶孔竅發則頭旋顛倒手足搐搦口眼相引胷背僵直叫吼吐沫食頃乃甦宜星香散加全蝎

孫秊子朋来曰凡治驚風顛癇之症而辰砂雄

黃金泊水銀鉛粉等劑不可以久服也緣此皆治有餘之症驚搐初發胃氣尚壯痰邪方盛非此慓悍踈利之劑為之先鋒不可以袪去也稍久則不宜用蓋小兒臟府脆弱易致虛耳前劑皆傷脾者丹溪云氣虛之人有痰胃氣亦頗所养卒不可便攻攻尽反易生而多惟徤脾胃以全運化之職則新痰不生兼佐之以消痰之劑則風自定故不專以鎮心攻痰為仗且心者一身之主神明出焉智慧之所由生也鎮心之劑

〔八廿八卷〕　六四

過多則神志奪而聰明窒塞內經曰主不明則十二官危余往々見多服驚風鎮心之藥者驚定之後痴呆愚鈍寡言寡笑靈覺寂無憮然可憫詎思前藥之所誤哉幼々之心當知所慎又有食癇原從飲食過傷而得後復傷飲食則發其外症噯吐酸氣或大便饅臭治法先當吐其食俟定後宜以下積藥看輕重下之積去則不復發

五色丸　又名五癇丸

硃砂五錢　雄黃　珍珠各一兩　各為細末丹以鉛二兩入銚熔化投汞二錢五分攪硬研末和勻煉蜜為丸麻子大每服三四丸薄荷湯下

牛黃丸　治風癇因汗出解脫風邪乘虛迷悶搐掣涎潮屈指如筭數

胆星　全蝎炒　蟬退各二錢半　防風　白附子
天麻　射香　姜蚕炒各一錢五分　右末棗肉為丸水銀五分研細入藥丸如菉荳大每服二丸荊芥生姜湯下

〔八十六卷〕　六五

消風丸　治風癇先宜用此

胆星　羌活　獨活　防風　天麻
人參　荊芥　川芎　細辛各一錢
右末蜜丸梧子大每二丸薄荷紫蘇湯化下

比金丸　治驚癇先宜用此

人參　琥珀　茯苓　遠志去心姜汁炒
硃砂　天麻　石菖蒲　川芎　南星
青黛各一錢　射香　右末蜜丸梧子大每二丸薄荷湯下

化風丹　涼風化痰退热定搐
胆星　羌活　獨活　防風　天麻
人参　川芎　荆芥　粉草各一錢　全蝎
一枚　右末蜜丸皂角子大每一丸薄荷湯化下
妙聖丸　治食癇因驚而傷食吐乳發热大便酸臭
代赭石煅醋淬二錢半　巴霜三錢　雄黄　全蝎
辰砂　輕粉　射香各一錢　杏仁炒二錢
為末棗肉為丸梧子大每一二丸木賊湯下
斷癇丹　治癇瘥後復發症候多端連綿不止
〔八〕廿六卷　六六
黄芪蜜炙　鈎藤　細辛　甘草炙各五錢
蛇退酒炙二十　蟬退四個　牛黄一錢　右末棗肉為
丸麻子大人參湯下每服十數丸看兒大小
茯神湯　治胆氣虛寒頭疼目眩心神恐懼不能
獨處或是驚癇
茯神　酸棗仁炒　黄芪　柏子仁
白芍藥炒　五味子各一兩　桂心　熟地
人參　炙甘草各五錢　右每五錢水煎服
養心湯　治心血虛怯驚癇或驚悸怔忡盜汗無

寐發热煩躁
黄芪　茯苓　茯神　半夏麯　當歸
川芎　官桂　柏子仁　酸棗仁　五味
子　人參各三錢　炙甘草一錢五分　姜棗煎服
妙香散　治心氣不足驚癇或精神恍惚虛煩少
寐盜汗等症
辰砂三錢　射香一錢　木香煨二錢半　茯苓
山藥　茯神　遠志　黄芪炒各一兩　桔梗
炙甘草　人參各五錢　右末每服一錢溫酒
〔八〕廿六卷　六七
或白湯下
五癇丸得効方　露蜂房焙　石緑各一兩　桂心
遠志肉　人參各五錢　硃砂一錢　右末粥丸梧
桐子大每二三十丸白湯下
參星湯　虛而癇久不愈者　人參五錢　南星炮一兩
為末每服一錢看大小姜棗湯下日二次
銅壁山人治諸癇發歇無時
乾地龍焙五錢　虎睛一對　人參　天竺黄
代赭石煅醋淬　辰砂　鉄粉各二錢半　輕粉五分

雄黃一錢五分　金銀箔各三十片　牛黃一錢　琥珀三錢
腥星　遠志　石菖蒲　白附子各三錢　姜蚕一錢
右末蒸餅糊為丸菉荳大菖蒲紫蘇湯下

終

赤水玄珠第二十七卷痘疹

新安生生子孫一奎著輯

痘疹心印小引

生生子曰余考痘之為症上古軒岐秦越人淳于公輩皆未之論列也自東漢建武中南陽征虜染流中國時謂之虜瘡醫者以蜜煎升麻数数拭之然則痘盖肇于東漢也已顧柰何張仲景華元化王叔和皇甫謐褚澄孫真人王氷許學士諸名公亦未之置喙至宋錢仲陽而下陳文中李東垣王好古朱彥脩乃始言之迨劉昉之幼幼新書王實湖之幼科類萃徐用宣之袖珍慈衛之全幼心鑑湯衛之嬰童寶鑑高武痘疹正宗汪石山痘疹理辨魏直博愛心鑑李言聞痘疹証治痘疹要訣閩人規胡大卿八十一論李實痘疹淵源翁仲仁金鏡録萬菊軒痘疹心要俞東阜痘疹危言皆特以痘疹為言者不下数十家各相發明似無遺漏宜乎今之嬰童可無虞矣何邇年來痘疹一臨殤輒相踵十不保

五爲故哉屈敎前書不爲不多吐心露膽不爲不悉豈多岐而亡羊耶抑其術猶有未臻者耶嗟嗟書不盡言言不盡意明者當心得之已古謂用藥如用兵岳武穆云陣而後戰兵法之常運用之妙存乎一心書安能使人人必克勝哉矧今之業專門者以痘爲絕術爲禁方固不道其道心其心各師其見各顓其法而不思融洽衆理以契所歸故乃宗張喙李是甲非乙殆派紛而不會其源曷能齊其治哉余竊斯弊每爲痛心故節錄各家成法參以鄙意會而全之名曰痘疹心印庶好生君子得以窺其竅妙云爾

原痘

萬密齋曰上古之時未聞瘡痘之證素難之文鮮載及者豈其人淳龐於野積精全神虛邪苛毒莫之能害歟或云自建武擊虜遂染其毒流布中國謂之虜瘡或曰聖瘡言其變化莫測也或曰天瘡言爲天行疫癘也或曰百歲瘡言人自少至老必作一番也或曰豌豆瘡言其形之相似也故患此者如蛇蛻皮如龍蛻骨死生存於呼吸之間夫上古所無而季世有之抑時世異耶抑人將失之耶余思其繇天地之氣春夏生養之紀也其物熙熙秋冬殺戮之紀也其物黯黯時逮末世已非泰和之景不可謂非時世之異然人日習僞不知持滿御神之道七損八益之數務快其心以散其真不可謂非人自失之也有論穢毒者有論淫火者有論時行正病者靡有定論將謂穢毒淫火耶則一歲之中大而郡縣小而村落病者相似而死相繼未必人人若此之甚也將謂時行正病耶何以自少至老但作一次厥後再無傳染也蓋父母於子一軆而分精血之毒已畜於陽施陰化之始固不待誕生之頃嚥其血而後有是毒也況男子惜其氣以養其精女子調其氣以養其血苟失所養即胎他日之患子之受於父母者雖殊其爲毒則一也豈有男子淫火起於氣爲陽毒而易治女子淫火起於血爲陰毒而難治之理耶至於

天行正病亦有其時但觀夫年之所加及有四時不正之氣即知有是正病也然則待時而發者胎毒也或速而危或徐而持或暴而死者氣之微甚所使也發則其毒洩矣所以終身但作一度後有其氣不復傳染焉

孫季子朋來曰溪火即胎毒也天行即疫癘致痘之由端不外是二者蓋溪火肇於有生之初伏而不發必俟天行煅煉一番然後洩之雖百歲不免焉殆亦有生之後一刼也設非溪火胎毒

安得一生只發一次哉矧人之出疹出痘正如蚕之蛻殼一眠二眠三眠也若謂純是胎毒不假天行何臨作之年郡縣村鎮沿鄉接境莫不皆然即卵生如雞鴨胎生若猪犬且皆不免又槩可見至於生者死者實由所感天行之輕重非干所稟之厚薄也觀今之童稚軀盛神壯宜其稟氣之厚亦多死者形羸色瘁豈非所稟之薄且多生者迹此驗之死生輕重乃臨時所感天行之輕重也為父母者慎加保惜以膺天和不可純委於命而尤天也特筆此以告

萬菊軒曰昔人謂在胞中饑則飡母之血渴則飲母之血余獨謂其不然蓋兒始受氣之時一月胚二月胎不過一點精血凝結中涵生意也至三月以後其形漸成在胞之中譬諸禽鳥之雛在卵殼中渾渾然薰蒸滋養惟所受太和之氣漸自生長日月既足乃破其胎卵而出矣何以能飲食耶必謂有所飲食則胚胎之初形象未具何飲何食耶且血者渣滓之物有入必有出

十月之前所飲所食之血又從何道出耶若生下口含惡血乃母臨蓐之時血穢流溢入兒口中未必便是先在腹中所食之血也但云兒在胞中滋養形軀長育變化培植根蒂者則在母之血液也

或有問曰兒在胞中饑則食母之血渴則飲母之血萬菊軒以為必無此事驗今之初產之孩口有穢血少頃就有黑糞從便而下是其徵也安可遽謂必無之耶孫季子朋來對曰以物理格

之似無些事也兒之胞胎在腹猶瓜菓然瓜菓賴藤樹滋灌汁從蒂入日漸肥大成熟兒在胞胎混混沌沌懵然無知焉有饑餓蓋藉母之湮從胞蒂而灌入臍中十月充足胞分而出口中之穢間或有之實分娩時胞中之餘穢惡露也大便黑糞如瓜菓中之汁水耳此必有之物殆平時灌滲積於其中出懷之後各自立極陽升陰降陽升者啼声上出也陰降者大便下行也此必然之勢亦必然之理也出懷之後始有出有入在腹胞中安有出入之徑實者乎格物者自能辯之毋致疑也

痘不宜毒物酵發

生生子曰痘本火毒尤因天行故發熱之初看其熱盛便知毒重即宜解散使表裏疎通俾熱毒有門路出也全在頭着工夫胡大卿曰小熱宜解毒大熱宜利小便觀此可見前人慎重之意不輕易用大寒大毒之劑動其大便恐傷冲和壞脾胃也緣痘全藉脾胃充賴冲和始能灌漿

結靨所謂冲和者即胃中坤元之氣人賴之以養臟府而灌溉周身者也近覩西吳治痘用頭着工夫動輒便以鯽魚桑虫雞冠血硇蛇等毒物謂之酵痘習俗為常不思痘本火毒〻固宜發但當先門路未清小毒蘊成大毒茲又以毒攻毒不啻火熾添油則脾胃冲和若燎毛矣故毒發之後痘粒粗大膿何得滿或潰而爛或嘰而嘔或發癰毒或成外剥或致泄瀉種〻之禍变難悉舉豈知門路疎通則痘縱不起發不過補助氣血而或以大成散佐之自能行漿灌膿盖痘粒小則漿易滿亦無变症是曲突徙薪之法也舍此不為而徼彼焦頭爛額之功殆亦危矣戒之戒之

戒用天靈盖

生生子曰醫本仁術夫仁者無大無小無貴無賤無見無隱無處不然故啟蟄不殺方長不折皆所以体天地而愛物存仁也醫之治痘逆者不治險者宜治前人方法林林種種何莫非藥何

物非剿何適非宜故乃取人之骸骨而煅煉之嗟嗟其忍心亦劇矣乎不思痘之無膿者由氣虛而血不充也補氣以氣補血以味合取其氣味之純厚者以補之則得矣如人乳紫河車鹿角膠之類皆氣純味厚者庶可以補氣血而資精神彼遺久死骸迨氣血竭絶枯朽之物猶槁木死灰已且不能延生而又能資他人乎此必無之理也且痘古稱天花貴清潔而厭腥臭其不可用一也膿少由於血虛喜潤而惡燥兹犯

煅煉枯燥其不可用二也況律有禁條以無可取効之物而戕人之遺骸犯律之禁傷天之和噫操殺術也焉得仁

或曰有用之而痘立發者何謂也生生子對曰余非謂此物不能發特慨其發之後燥毒交煽烈若燎原正如灯庖油盡而又益之以灯心立見焦枯良可悼夫

腎無痘辯

生生子曰諸書皆言四臟俱有痘獨腎無痘故發熱之初單顯四臟之症驗耳之冷則知腎無痘也余謂此皆臆度之言非見道之語也緣痘稟於有生之初父母之淫火伏于子之命門為天行癘氣感觸而發觀銅人圖命門穴在兩腎俞之中與臍相對秦越人謂兩腎中間動氣者五臟六府之本十二經脉之根呼吸之門三焦之原臟府從此而生故人之所以得不死者賴此動氣以為生生不息之根有是動則生無是動則呼吸絶而物化矣夫以耳之冷熱驗痘出之

輕重則可若以耳之冷而遽謂腎之無痘則不可腎既曰無痘何前人又有變黑歸腎之說由其有出斯有歸也詳古人用四牙散一方亦可見矣蓋牙者骨之餘腎之標是亦以腎補腎之意惟腎之元氣充足則其痘始能盡出且又能制伏其火而使其氣血相依故化膿結痂而愈也腎虛則不能化漿而使之盡出結痂則色變黑黝至焦枯而告殂矣故曰歸腎者猶言痘本出於腎而仍還於腎也足為辯

首尾不可汗下辯

萬菊軒曰今之治痘者悉云首尾不可汗下听者和之曰痘宜溫補汗下不可也此亦喜補惡攻之遺弊殊不知治痘之法莫要於解毒或攻或補務使毒氣得解而已如其氣血和暢營衛流通表裏無邪其出則盡其發則透其收則時非但不可汗下雖溫補亦不可用也設使外感風寒約束皮膚腠理痘出不快此當汗之令陰陽和營衛通而痘易出毒得解散可也苟不汗之

則毒無從得出留伏于内未免閉門留寇之禍矣如大熱不退煩渴轉增譫妄昏沉便溺阻塞此毒留于腸胃之間與穀氣併宜急下之使臟府疏通陳莝滌去可也苟不下之則蔵垢畜毒煎熬于中寧無養虎遺患之悔乎故大要曰謹守病機各司其屬有者求之無者求之必先五勝疏其血氣令其條達而致和平此之謂也

審証

孫季子朋來曰治痘先須審証痘固胎毒必假天行令氣或内傷飲食激而發也發熱之初預當明其輕重蓋熱輕毒輕熱重毒重也設熱既重便宜察其表裏外感内傷内傷為裏夫痘全藉脾土以為依歸脾為倉廩五臟皆仰給於脾外主肌肉行漿灌膿結痂皆在肌肉脾既受傷則内熱蘊悶或腹疼嘔惡急宜消之重者下之使裏無壅遏則熱自退神自清也内傷不急治六七日後痘既外出腹中虛矣内傷之物因而瀉痢則不能灌膿而成内陷外感風邪即宜清解

若頭項痛腰脊強便知為太陽經表症若鼻乾不得眠口渴便知為陽明經太陽以防風羌活寒月麻黄桂枝陽明升麻葛根之類古人云必使一晝一夜汗出熱退為佳蓋腠理疏通則痘易出易壯遲則熱燒地盤腠理緻密熱無從出出必稠密或蘊成癡由解散不清縱然發出日後灌漿必咳嗽声啞嗆喉外剝可不謹之於始哉觀乎古人呼為痘瘡以其形圓而肖痘也蓋喜土鬆滋潤則易出易成熟初出最嫌土燥成

熱尤怕濕濕燥則難出濕則潰爛故治痘亦如之若熱盛毒重神昏足冷者即於前解散内消之中大加解毒故曰六日以前解毒為主六日以後補托為主過六日則大事已定救無及矣是以貴在審証勿失時也　右審症

總驗部位

内經曰諸瘡皆屬心火心之華在面痘瘡之候但以面之部位占之思過半矣痘本火毒火性上炎諸陽皆上聚於面吉凶善悪尤易見也額屬心火如印堂以上髮際以下横兩日月角部位先見紅點先作漿先結痂者此悪候也蓋心為君主毒發於心故先見於其位君危則十二官皆危死殆速矣左臉屬肝木右臉屬肺金如兩臉先見紅點磊落者吉如相聚作塊其肉腫硬者死蓋肝藏魂肺藏魄生意既絶魂魄相離故不治也頦屬腎水漿横抵兩頤先見紅點先發先痂者吉此位雖屬腎然三陰三陽之脉皆聚於此陰陽和故無虞也鼻雖為肺竅而準頭則屬脾土若準頭先出先痂者凶蓋四臟皆禀受於脾毒發於脾則四臟皆失所資殆土敗則四臟皆相隨而敗故延綿日久而後斃也腎之竅在耳又心之用亦在耳心者少陰君火也而少陽相火之脉行乎耳之前後凡在耳輪前後先見紅點者凶蓋君相二火互發燔灼之勢難以撲滅惟口唇四圍先出先起先痂者大吉緣陽明之脉俠口環唇胃與大腸主之無物不受殆猶海也乃多血多氣之經故曰大吉也

驗面

發熱之時面色明瑩者吉赤若塗胭脂者凶此邪氣怫鬱於陽明胃與大腸也陽明經上循於面熱盛故赤也宜清涼解毒稍通利之面垢慘黯者凶面垢者少陽候見也邪熱怫於少陽甚則面微塵宜表裏雙解蓋少陽從中治也

驗耳

腎通竅於耳故耳以候腎也腎臟屬北方天一所生之水受氣之初先生而腎如豆子窩妮兩邊

分開之辨也痘疹發熱耳獨凉者瘡疹屬火外邪不干於腎故也如耳熱是邪干於腎毒不發越則反有歸腎之変凡觀痘瘡先看耳後有紅縷者蓋少陽三焦之脉從膻中上出缺盆繫耳後直上出耳角紅者火色也此瘡疹之火發從少陽故色先見於其經也凡痘自耳先出未及成漿耳輪先靨者此漸萠歸腎之勢多凶

驗目

目者心之使也神所寓焉發熱之初觀其兩目神倦不欲開者痘也目中汪汪若水者疹也諸瘡皆發於心故候見于目也目赤者熱甚也心惡熱急解之經云肝開竅于目瘡疹發熱目連劄者肝有風也風入于目上下左右如風吹不輕不重兒不能任故目連劄也目直視者肝有熱也熱入于目牽其筋脉兩眥俱緊不能轉眄故目直也得心熱則搐者風火相搏也痘疹發搐此其常候但瀉心肝二經之火搐止則吉不止則凶五臟精華皆上注于目痘瘡之毒發于五

臟毒之甚者目必受之故前人註有護眼之法良有深意凡兩眼常出淚者肝熱也此時眼中無痘宜服瀉肝火之藥蓋眼中之毒常在收靨不齊之後方有如痘入目成膚翳者切不可用點藥恐損睛破瞳成廢人矣痘瘡收後目不開者肝熱則目澁不敢開明暗皆然心熱見明則合見暗則開謂之羞明此有餘熱在心肝也如瘡未成膿腫消目開者瘡已過期收靨不齊目閉不開者瘡壞欲变目上竄者心絕也直視不轉者腎絕也非泣而淚自出者肝絕也微瞋者氣敗也血貫瞳子者火勝水竭皆死候也

驗鼻

鼻爲肺之竅痘疹發熱之初噴嚏者火邪上干於肺外應於鼻而痒則嚏鼻乾黑燥者火刑於金金躰本燥得火反甚急宜清金瀉火以解其毒鼻衂者血得熱而妄行故衂出於鼻急以凉血瀉火以解其毒鼻流清涕者疹也疹發於心心肺相連以火煉金熱極而反化爲水也痘出之

後鼻塞不通者熱也痘已成漿收靨之時鼻塞不得息者此鼻內有瘀膿涕粘結可用金銀小簪子以通之如痘未成漿鼻端先乾者凶內經曰臟真高於肺以行營衛陰陽也邪火刑肺肺敗不能輸精於皮毛故皮毛焦枯先見於鼻營衛不行陰陽不續以漸遍身皆乾枯而死矣凡瘡变壞鼻中血出者鼻孔開張喘急者肺絶之候皆死証也

驗唇口

脾之竅開於口其華在唇四白發熱之初口中和唇色紅潤者吉如口燥唇裂其毒必甚急解之痘出稠密唇口痘子相粘諸痘未發此處先已戴漿諸痘未收此處先已焦黑者凶面痘腫灌唇上痘裂成塊乾溅者重如痘出太密口中氣臭者臟府敗壞故臭出於口也痘欲变壞唇上縮者脾絶也唇下自呷者魚口也口中涎如膠粘者脾津竭也皆不可治

驗手足

四肢者諸陽之本痘出欲疎其發欲透其靨欲齊如應出不出應發不發應收不收此脾胃氣虛不能旁達四肢也發熱手尋衣領亂捻物者肝熱也手掐眉目鼻口者肺熱也手足搐搦者心肝風火相搏也各隨其臟而瀉之足涼者此常候也足冷手亦冷者脾臟虛也四肢皆禀氣於胃而不得至經必因於脾乃能至也脾虛不能為胃行其津液故冷耳宜溫之痘已出手足多水泡者此肝勝脾衰為鬼賊宜急治之不久便生痒瘍也如遍身皆發手足不透是室穀者此脾胃虛弱津液耗竭營衛凝澁故其毒亦欝而不發也不能食者死能食者必發癰疽痘勢太甚手足冷者不治痘未成漿手足皮脫者必死痘已正靨惟足不收者足為純陰無陽相濟所以收遲如痘始成漿他處未收手足心先靨者其後必生惟疾也痘靨之後手足關節腫痛者必發癰也痘痒手足搔亂者凶

夾斑

班者血之餘有色點而無頭粒隨出隨沒者也册則成片赤如雲頭而突皆血太過而氣不及營衛失護致血任三焦浮遊之火散漫於皮膚之間耳宜以輕劑散其火和氣活血解毒之藥治之並用玄參升麻湯加石膏黃芩荊芥芍藥芎歸或升麻湯加紫草蟬退多磨犀角汁化下烏金丸又或結痂之後而發者餘熱煎熬肉分其班必爛宜解毒湯加歸芍黃芩石膏甚則大連翹飲爛處以生肌散敷之無不瘥矣至若青黑

紫班乃毒氣不能發泄之故死生一反掌間耳急與四順清凉飲利之其班既退即以四君子湯加黃蓍姜棗煎服如不止再加肉果須要預煎候之俟班退血附即服庶可免其內陷也大抵班在發熱放標起脹時多用表散在灌膿收靨時多用解利遍身通紅者治同

發班有二陽毒發班者壯熱渴躁兩目如火脉洪有力其色紅赤者胃熱也紫黑者胃爛也一則下之早故熱乘虛入胃一則下之晚故胃熱不得泄皆內外挾熱而發班也當服玄參升麻白虎等湯陰症發班者身無大熱手足指甲俱青脉沉細而急其色微紅或暗晦此無根失守之火聚于胃薰于肺傳于皮膚而為班也若妄投以凉劑則誤矣當與升麻鱉甲湯調中溫胃而班自退

夾疹 疹即麻也

痘毒出於陰疹毒出於陽陰主血故痘有形而灌膿結痂陽主氣故疹有色而不膿痂此皆有主

初之淫火伏於命門之間本非尋常並發者惟痘出之時或天行所激觸動其毒故並出耳此亦不順之症也故急宜清散先服升麻葛根湯如不解則犀角地黃湯內既清凉則疹亦隨之而解矣

錢氏云痘疹只出一樣者善凡痘已見形其間碎密若瘡子者此夾疹也由火毒薰灼於中故使疹挾出於外也急宜解毒使疹消散痘得單成可也宜荊防解毒湯主之若服後而疹不退者

凶之兆也夾班治同
膚疹者熱毒之氣發越而然也暴出之時點如麻
狀但色鮮赤成片耳用敗毒散毒當隨散越數
日而痘出痘反稀疎
劉宗厚云癮疹多屬脾隱〻然在皮膚間而名之
也發則多痒或麻木不仁者是兼痰兼湿之殊
也色紅者兼火化也用解毒防風湯若内傷外
感而發者用調中湯
夾沙（赤麻顆粒頭瑁渾吳地呼為沙子其狀如夏月膚膝之痱子）
沙之形如粟一般尖員而硬中含清水夾痘而出
者亦熱毒之所發也用四苓散加防風黄芩分
利陰陽而痧自退矣
夾疥瘡
痘夾疥瘡而出則血氣為瘡所奪痘多不能起發
成漿須連服内托散庶無坐陷之患也
乾枯黑陷紫陷（朋來曰凡黑如烏羽者生以其熱雖熾而血尚活治以涼血解毒可愈也黑如焦煤者死無生氣也故不治）
痘色初見深紅者必变紫紫必变黑紫黑必至於

〈二七卷　二

乾枯皆血熱乾滞而氣不能運行一定之理固
如此也治須以涼血清熱為主看其微甚或利
大便或利小便或為解散頂雖平陷不可以氣
虛而例用参芪補剤蓋補氣則熱愈甚而血愈
涸也宜以絲瓜化毒湯加當歸紅花連翹牛蒡
更以麻黄解毒湯發散其毒或以紫草湯化下
小靈丹或灯心湯化下大靈丹有黑疔者針挑
破去其毒血兼用扶脾實土之藥古方有燒人
屎者有用四聖散者有用人牙散獨聖散者有
用雞冠血酒漿灌之者有用胡荽酒塗其遍身
并衣服薰之者有用壁間蟢蛛如荳大者研爛
入雄黄每歲一厘同研勻酒調服者有用黄連
犀角清心火者已上皆可擇用如宣風散百祥
丸牛李膏内有大戟等牽牛峻利之藥元氣盛
尚可虧損況痘後之兒尤當慎之
黑陷二種因氣虛而毒不能盡出者酒炒黄蓍紫
草人参黑陷甚者亦用燒人屎
白陷灰陷（朋來曰乳食少進二便清利者為寒法從溫補）

〈二七卷　二

痘色白者必变為灰㣚灰㣚者必变為平伏倒塌此雖氣虚而血不榮色血亦虚也故當氣血兼補使血活氣行則白色可變為紅底或可救若單用補氣之藥則氣燥血虚必致發痒抓破灰㣚平伏倒塌為不治之症矣治宜補中益氣湯合四物湯有内熱者加解毒藥白陷抓破皮薄乾燥而極痒者皆由失於補血以致氣虚則燥然也

内潰

〈二十七卷〉　三

心鑑曰内潰者胃爛也蓋因風寒所中腠理固密陰陽二分壅塞不通其毒内攻而臟腑之間毒火炮熾則潰而成膿口舌皆白是其驗也識者於痘未出之時或有風寒阻隔氣粗熱甚身必戰動肚腹急痛謹防此患以敗毒散或升麻葛根湯逐散寒邪開泄腠理縱毒外出必無是症

痒塌

痘瘡痒塌今人總歸之氣血虚寒殊不知亦有氣盛血熱而然者須從形色及他証辯之如痘色淡白精神虚怯小便利大便頻至夜痒甚者此脾氣弱而氣血均虚也參芪内托散及四君子湯加黄芪肉桂川芎白芷蟬退主之甚則陳氏木香散佐之　如瘡色紅紫煩躁大小便不利渴欲飲湯水甚至抓破血流者此氣虚血熱毒盛血行氣分血味醎醃螫皮肉而痒也四物湯加參蓍連翹蟬退白芷甘草及三味消毒飲加紫草連翹生地之血流者敗草散蕎麥麵炒黄土摻之　又遍身痒甚抓破者不問前後皆服蝉

〈二十七卷〉　三

花散外以乳香或敗荷葉茵陳燒烟薰之　若穢氣衝觸作痒抓破者宜服内托散外以辟穢散薫之然發痒精神清爽自知其慎欲人搯摸者吉若悶亂不寧者揺頭扭項手足舞乱言不听禁不止者凶也

群玉曰痘疹發痒如能食而大便堅結者此邪氣内實正氣外虚也加味四聖解毒湯治之外用升麻蒼术麻黄槐枊桑皮煎熱拭之　如泄瀉者此正氣内虚邪氣外實調元托裏治之外用

山茵陳白芷二味為末燃火薰之如用上二法
而痒即止者吉痒不止而反甚者凶也
心書曰痘瘡作痒者火邪傳於肌膚之間不能即
出或血方流行而為風寒外束故欝滞而作痒
與傷寒汗不出而作痒相同法以荆芥穗束之
以紙而刺痒痘之項以散欝邪其痒即止驗之
如神内服消風火化毒湯以解之　以上痒症
痘家之悪候兹録各家治法驗甚者以備緩急
叅用

目睛露白

人之一身必元氣固則精血為之凝聚而瞻視有
常也若元氣虛損則衛氣受虧是以晢脉縮促
致睛上吊而露白也若謂之風則謬矣遇此候
則無他証者可以保元湯加陳黄米主之無魂
失志不省人事者不治雖無他証而或見於七
日之前則毒尚未解而氣血已離必不可治之
症也

声啞

心之氣舉擊於肺而為音肺清則音清肺熱則音
啞此必氣喉有痘熱毒閉塞肺竅而然也須分
順逆為治如七日之後失音者乃内痘先熟而
先靨則咽喉漸寛毒氣漸消声音自亮為順症
也若七日之前失音者此毒氣薰蒸失於調解
致肺竅不通閉塞管籥毒無從洩内痘糜爛舌
齦成坑咽門腐壊馴至呼吸俱廢為不治之症
矣或有内本無痘因食辛熱之物或多服熱藥
所致者急用甘桔湯射干牛旁湯加玄参連翹

犀角治之或能言声不清者此火乗於肺也瀉
白散加天花粉桔梗石膏片芩茯苓麥冬山梔
治之或感風寒閉塞而声不清者参蘇飲加桑
白皮杏仁石膏主之如法治之而効者吉否則
凶

水嗆

喉之竅若管籥然痘之初出細小不竟及肌表之
痘成漿則内痘亦成漿而其毒壅於會厭然是
乃飲食所進之處故欲湯水不易進納則溢入

氣喉而發嗆也若穀食有渣自能咽之從食喉
而下非如水溢以犯氣道矣七日後見者不藥
而愈何也外痘靨而內自痊矣若七日前見則
為逆痘由熱毒壅塞不能發於肌表故耳治用
甘桔湯合解毒湯加牛子玄參荊芥麥冬若預
以甘桔湯清其氣道安致有此患哉

驚搐 附癲癇

心者神之舍也痘毒本熱熱氣擊動心神肝不能
制故神不安而發驚搐治宜瀉肝利小便蓋瀉

肝則風去利小便則熱除風熱既退則痘出而
驚自愈矣故痘未出而見此症者則升麻湯合
消毒飲主之或紫草膏或蟬酥丸不可竟投涼
劑蓋心一涼則氣血隨飲毒無從出也痘既見
而有此症由熱毒之未解耳四苓散合消毒飲
或紫苓湯或導赤散若風火相搏喉中痰鳴目
睛上視面赤引飲喜居冷處者紫苓湯或抱龍
丸若痘後胃弱飲食不化謂之食蒸發搐必面
黃潮熱大便酸臭秘泄不調或吐利腹痛宜紫

霜丸下之大便秘者四順飲痘後毒當盡解而
又發驚則心氣已絕神無所依必不可治　發
癲癇者粉紅丸治之
痘後手足麻木無汗者參附湯若手足難動常出
汗者芪附湯　卒然驚仆不省人事者用皂角
為末吹入鼻中即甦古謂先痘後驚者不治痘
正發而有此症能不為之可悼哉
又痘未出毒氣內逼目上竄驚叫如驚風者乃痘
欲出之候也若誤認為驚而治之則毒氣內蓄

邪熱不洩而反危矣

煩躁

心經有熱則煩躁蓋痘毒之熱擊動心火脾少津
液不能濟之此所以發為煩躁不寧悶乱狂言
等症也治當觀其虛實何如痰實壯熱者梔子
仁湯或解毒湯或辰砂益元散二便秘則通利
之虛煩而渴者保元湯加麥冬五味或麥門冬
湯夏月暑甚煩渴而痘出不快宜辰砂五苓散
靨後發熱煩渴麥門冬飲子此症似輕而重若

服藥而久不愈則心脾二經皆為熱毒所傷矣煩則必渴渴則必瀉瀉則必咬牙寒戰而痒塌之患立至也慎之慎之

秋傳曰痘瘡以安靜為貴但有煩躁者必毒氣壅併表裏不寧宜審諦之如搔爬不停者痘痒也不寧者裏熱也呻唫者痛也非折肱之妙手安能識其病而起其痾耶

發渴

渴者胃中熱也胃中津液為熱所耗故渴而飲水也始終固有用白虎湯加天花粉乾葛甘草然有汗加人參或辰砂六一散小水不利者四苓散氣虛保元湯加麥冬五味至於陰虛火動而發渴者固為難治之症理辯則謂六味地黃丸加桂心五味子乃治虛渴之聖藥也不可不知

痘疹心書曰毒氣萃于陽明此時多發熱渴熱溜于内而外不得宣通故發渴也宜神功散服後猶渴者宜紅花子一味煎湯飲之如無子即用紅花湯加牛旁子服之此藥神妙能散胃口之瘀血故也切不用荔枝黑棗椒姜等湯以助陽經之熱

噯氣

熱毒鬱於胃中欲發而不得發故噯氣治用半夏生姜湯加陳皮黃芩或四苓散加陳皮竹茹以利之

不食

痘瘡始終以脾胃為主若飲食如常者此臟府充實脾胃完固不消服藥若不喜飲食者必須辯別而治之如泄瀉痘色灰白而不食者此脾胃虛而元氣弱也宜四君子湯或人參養胃湯七珍散治之如大便秘瘡掀腫不食者此毒盛而血熱也宜四物湯加解毒藥熱甚者加姜炒芩連便秘者下之萬氏云痘瘡不怕稠密只要能食

汗多

汗乃心之液由熱氣内蒸腠理開泄故液隨氣而出也自汗盜汗俱能虛人未漿之時恐不能灌

既灌恐不能醫既醫恐血脫陽虛變為他症最宜調理自汗宜保元湯加桂枝白芍浮小麥以歛之有熱加酒芩盜汗宜當歸六黄湯或當歸湯丹溪曰自汗不妨蓋湿熱薰蒸而然也然特為汗少出者言耳若汗大出身冷惡寒寧不早為之治乎然宜異功散救之寒不已者死　汗綴如珠者死　汗而昏沉者死　汗流煩渴者死不可不察

諸失血

夫血熱則妄行蓋熱毒之氣滛佚無歸則血亦隨之而走泄也始終用犀角地黄湯加芩連梔子白芍但血之妄行或吐或下或從陽瘡痘毒而出者悉皆不治何謂也吐便者有傷于内也濕膿血如死肝荳汁者胃爛也從瘡毒而出者肉分空虛而元氣為之走泄也鼻衂者生蓋血隨毒行傳注督脉斬関而出不犯其内故耳至于女人失血不止尤當急治嘗有一男子口鼻出血數碗以韮菜汁半碗頓服而愈

陰囊發腫

痘症陰囊腫痛如瓠瓜者乃膀胱熱甚毒氣流於小腸而然也急宜清利退火滑石木通車前牛膝梔子瞿麥灯心甘草水煎服或紫草飲子小便不利者加木通外以石燕子醋磨濃汁敷之

痘後浮腫

痘靨之後失於調理或傷飲食或感風湿致傷脾土湿勝而為腫也傷於食以健脾加山查麥芽平胃之類虛者加人參俱以淡滲之劑佐之傷風湿者平胃散加防風羌活汗之水腫者以五皮飲消之一方用蘿蔔子殻蒲蘆煎湯洗之立消又法柏樹葉桑樹葉煎湯洗亦消

驗動靜

凡痘以靜為貴內有不和則動凡靜屬陰而動屬陽痘之為症陰陽俱病但息欲其勻語欲其少寐欲其安寤欲其寧觸其瘡則吟拂其欲則鳴飲食二便如時然平人之候是謂靜而吉也如呻者身有苦也自語者神不清也喘粗者內熱

也腸鳴者泄也坐卧不寧者心煩也啼叫不止者痛也搖頭者風也指歆搔者痒也嚙物難者咽痛也咬牙者心肝熱也若悶亂躁擾譫妄昏眩如見鬼狀搖頭扭項手舞足擲目睛上視寒戰咬牙語音不出皆為死候如病向靜忽然擾動者異也須細察之痘色變而無他候者炭氣觸之也痘色不变又無他症必有因但俟自定其有目瞑息微四肢僵直口噤痘壞昏睡不省者此真氣將脫魂魄散離之兆又不可作靜看也

稀痘仙方

牛黃一錢 蟾酥三分 辰砂七分 絲瓜蒂近蒂取五寸燒存性五錢

為末每一歲服一分砂糖湯調下

兎紅丸 服此可免出痘

辰砂 甘草 六安茶 各等分臘八日午時取生兎子血為丸梧桐子大逢三六九與兒食之

鼠肉方

取雄鼠肥大者去皮毛腸雜用塩醋爛煮與兒食之痘出稀少切不可使兒聞見亦不可對他言知但只可自設法取用不可用他人取討者恐防毒藥死的慎之或只用砂仁白水煮不用椒葱蒜韭并油煎芥辛辣熱物若未食葷兒與食尤妙此屢試屢驗者

四脫丹

蟬退 蛇退 鳳凰退即哺出雞子殼 神仙退即父母底甲

右各等分焙為末每服一錢煉蜜為丸菉豆大每年除夜服服三年永不出痘

玄兎丹

玄參五兩酒洗 兎絲子水淘淨酒煑研爛為末 右二味俱不犯鉄器為末黑砂糖為丸彈子大每日與兒服三丸沙糖湯下

葫芦花湯

八月採葫芦花不拘多少陰乾入除夜蒸籠湯浴兒或不出痘縱出亦稀少

苦楝子湯

若楝子不拘多少煎湯浴兒或痘瘡不出出亦
稀少
三花丹 將出之時用之能稀少
梅花 桃花 梨花 取已開未開盛開者陰
乾為末等分取兔腦為丸雄黃為衣用赤小
荳蘘荳黑大荳三荳湯下
六味稀痘飲 將發痘預服之
山查 紫草 牛旁子各一錢 防風 荆芥各一錢二
分 甘草五分 姜三片水煎服
輕斑散 治痘未見点時服之
絲瓜子近蒂三寸連皮燒存性為末 硃砂五分 二味和匀沙糖
調下痘出必稀多者少少者無
稀痘如神散
絲瓜 升麻 芍藥酒炒 甘草 山查 黑豆
赤荳 犀角磨用 各等分每服三錢水煎服不
拘時看大小加減
預服萬靈丹 初發治一服即輕百發百中
一麻小者三錢 葛根三錢 甘草三分 紫草茸一兩 蟬退

姜蚕洗 連翹 白附子炒各三錢 山荳根五錢 全蝎去毒
十枚 雄黃一錢半 射香一錢 蟾酥一錢好酒者化
右十二味和丼為丸皂角子大每服一丸紫
草湯下
發熱有数種
生生子曰凡痘疹發熱與傷寒傷風傷食驚風等
相似先當辨明傷寒之熱手足梢微冷無汗悪
寒面色青慘不舒左額有青紋 傷風熱手足
梢微温自汗悪風面赤而光二者皆太陽症俱
頭項痛腰脊强 傷食熱目胞腫右額有青紋
身熱而額腹最甚夜熱晝凉面色黃或吐利腹
痛 驚風熱面色青紅額正中有青紋手心有
汗時發驚悸 痘子之熱必顯四臟之症耳尻
冷中指冷尻冷面燥腮赤呵欠頓悶乍凉乍熱
多睡咳嗽噴嚏驚悸吐利○夫發熱者瘡疹常
候也但熱微毒微熱甚毒甚微者勿藥甚者必
宜及早清解原痘無逆險只在發熱之初調治
之早覩其熱重神昏則以清解之劑投之或發

表或攻裏法在不避必使一晝一夜表裏通和
熱退為佳蓋毒解則熱始退熱退痘出自然稀
疎明朗若不早為疎通表裏則毒無出路雖小
毒穫成大毒迨及出齊則順逆險已定順者幸
而無虞逆者無所措手矣古無順逆險之名稱
順逆險者自魏桂岩始也

初發熱三朝証治活法

凡發熱疑似之間宜投人參敗毒散一劑發之是
與不是一發便見萬菊軒曰大抵痘疹只宜發
盡勿使留伏于中

凡用發表之劑務察天時不可固執只宜平和之
說極為誤事設遇冬寒及春行冬令之候腠理
緻密血氣凝澁痘必出遲遲則蘊熱熱不得汗
毒莫能洩必多壅遏之变急宜辛熱之劑發之
桂枝葛根湯或五積散去乾姜
如天時熱則腠理疎豁氣血淖泽防其發洩太
急恐罹潰爛之变必以辛凉之劑解之宜升麻
葛根湯凴解散之類　如春秋天時温和不寒
不熱只以人參敗毒散最佳

保嬰丹　熱甚者用之捷効或就於前解散藥化
下一丸能令重者輕輕者少以其極能解毒也

初發熱時飲食二便如常精神清爽痘必稀少不
須藥

初發熱時渾身壯熱熇熇然不渴清便自調此邪
欝在肌膚之間宜輕揚之劑發之升麻葛根湯
甚者羌活湯

初發熱時其熱烙手目赤鼻乾唇燥小便赤大便
秘煩悶不安此表裏俱熱毒氣壅遏宜發表通
裏凴解散主之

初發熱時表不甚熱煩躁不安口渴小便赤澁熱
在裏用紫草膏保嬰丹辰砂六一散犀角山荳
根之類清解之甚者三黄丸微利之

初發熱時腹中痛者此痘毒與穀氣相併急以麦
芽山查紫蘇枳實砂仁陳皮温而消之若腹脹
硬痛大便秘者備急丸下之

初發熱時咳嗽鼻流清涕參蘇飲主之

初發熱大便秘結急宜潤之恐熱毒內蓄宜紫草
飲必使大便通利為好
初發熱嘔吐者要明外感內傷　外感者二陳加
紫胡藿香生姜枳殼和而解之　內傷者二陳
加藿香砂仁麥芽山查枳實藕梗白芷消之
胃弱而吐者六君子湯有毒氣上衝大吐不止
者辰砂六一散甚者加石膏芦根湯亦佳
初發熱作瀉腹中不痛原無內傷者此痘內動與
外邪搏激所致不必治瀉但以輕揚之劑升發
之痘出而瀉自止
初發熱自汗自吐自瀉者乃毒從上中下而出皆
為吉兆但只在三日內裏不可多日恐元氣虛
脫也
瀉有冷熱熱瀉者口渴小水少而身大熱四苓散
加木通若乾嘔加姜炒黃連或六一散　冷瀉
口不渴小水清重者理中湯輕者參苓白朮散
久瀉者豆蔻丸
初發熱二三日間有驚搐者導赤散羌活湯辰砂

散○大便秘者三黃丸微利之　小便赤澁者
導赤散　渴甚者葛根解毒湯　腹中痛者桂
枝大黃湯　腰痛者人參敗毒散　自利者黃
芩湯　吐利者黃芩加半夏湯　如脾胃素弱
自利清白者理中湯丸或四君子湯豆蔻丸合
而服之
凡發熱及初見標時須問咽喉疼否但有微疼急
清解之甘桔湯加牛旁子　大抵痘要解咽喉
為急務不早防以致失声乾嘔水穀不入搶喉
噴吐治無及矣
管氏曰發熱之初痘之吉凶皆兆於此故急宜表
汗使臟府胎毒及感不正之氣盡從汗散則痘
出自然稀少蓋熱甚毒甚熱微毒微不必治妄
汗則表氣一虛痘不能起發反為害也盛者汗
之要在身熱盡退為佳其有一切雜症皆由毒
氣欲出不能故耳一表散則毒氣盡洩諸症自
退矣或有當解者解之當下者下之切不可执
一也胡氏曰表熱壅盛非微汗則表不解裏熱

壅盛非微利則裏不解正此之謂耳失此不治則毒氣漸盛而逆症隨見世人多忽於此及見逆症而後治之將何及哉

大抵治痘之訣妙在三法曰發表曰和中曰解毒知此三者於發熱見標之際預為之地則多可少重可輕自無以後变症故發表最先盖痘疹只要發得毒盡不使留伏于内凡發表必兼解毒非發表之外另行解毒也痘既已出不渴不熱表裏無邪不須服藥如痘多毒盛裏實能食者可兼用解毒如裏氣不和或吐或利於和中法内畧兼解毒若毒輕痘少惟裏不和胃氣虛者只用和中則不必解毒也每發表須辛甘清陽之劑羌活防風升麻白芷桂枝之類和中須甘溫之品如人參當歸甘草芍藥之倂盖中不足甘以補之解毒須苦寒之輩如牛旁連翹葛根芩連梔栢紫草之類盖毒者火也凡用苦寒之劑必要酒炒可以活血達表且不犯胃氣切宜識之

痘宜依期施治治貴通变

翁仲仁曰夫痘由中以達外用藥因期而变通以其尚未見標必發熱三日然後見標出齊三日而後起脹蒸發三日而後灌膿漿滿三日而後收靨發熱之初耳尻中指俱冷耳後起紅絲呵欠噴嚏眼目困倦兩顴之間有花紋見者預知其為痘也發熱三日當托裏解表使其易出亦有氣弱而不能出者當微補其氣氣和則出快初不可用芪恐腠理密而難出也四五六日以清涼解毒為主清涼則無血熱燥毒之患解毒則無壅滯黑陷之害七八九日以貫膿為主治法當溫補氣血氣血流行而成漿自易也十與十一二日以收斂為主大和氣血補脾利水則自然結靨此特語其常也盖常者可必而变者不可必當隨候参詳安可執藥以應無窮之变哉言見紅點之時如痘輕少不可過表在後恐成斑爛或乾紅紫色急宜踈利不然在後必成黑陷四五日之内痘出至足心為齊茍未盡出

於解毒之中宜兼發散若專於寒凉則痘遲滯不出七八日之間毒未盡解於溫補之中又兼解毒若偏於燥剌則毒盛不能化漿也十一二日之間漿未滿足必大補氣血畧兼解餘毒不然恐有癰毒溫疤之患此変通之妙要在隨時制宜也

人參敗毒散

羌活 獨活 前胡 柴胡 川芎 枳殼 桔梗 白茯苓 人參(各等分) 甘草(減半) 生姜

八十七 四二

三片水煎服 一方加薄荷少許

參蘇飲

人參(三分) 紫蘇葉 桔梗 乾葛 前胡(各四分) 陳皮 茯苓(各五分) 枳殼(三分) 半夏(二分) 木香(一分半) 生姜二片水煎服

升麻葛根湯

葛根 升麻 白芍藥 甘草(各等分) 水煎服

雙解散 即防風通聖散益元散二方也

防風 川芎 當歸 白芍藥 薄荷葉

大黃 連翹(各五分) 石膏 桔梗 黃芩(各八分) 白朮 桂枝 荊芥穗(各二分) 滑石(二錢半) 甘草(一錢) 生姜三片水煎服

桂枝葛根湯

葛根 桂枝 赤芍藥 升麻 防風 甘草(各一錢) 生姜三片淡豉一錢水煎服

保嬰丹

紫草茸(酒洗四兩) 纏豆藤(燒存性四兩) 荊芥穗 防風 升麻 大力子(炒各二兩) 天竺黃(一錢二分如無真者以雄

八十八 四三

黃一錢二分代之) 牛黃(一錢半) 辰砂(用麻黃荔枝殼紫草煮過再飛) 蟾酥(自取真正者一錢二分) 赤小荳 菉荳 黑荳(各四十粒炒香) 甘草梢(去皮二兩) 加紫草三兩水熬成膏半碗沙糖半碗前藥俱製淨末和為丸圓眼核大辰砂飛過為衣未出之先濃煎甘草湯每服一丸大兒加一丸凡遇發熱之時生姜葱白湯化下厚蓋表汗乃解毒之神藥

心要羌活湯

羌活 川芎 防風 山梔子 龍胆草

當歸各等分 甘草炙半 薄荷葉三片 淡竹葉五片 水煎服

紫草膏 治紅紫黑陷熱毒

紫草茸 白附子 麻黃去節 甘草各五錢 全蝎八枚

炒 右為細末用蜂蜜一兩酒半盞 入紫草煎

熬成膏旋入各藥丸如皂角子大每服一丸

仍用紫草湯化下 如治驚搐用金銀箔為衣

薄荷湯下

六一散

桂府滑石飛淨六兩 大甘草去皮一兩 每用一錢灯心

八二七表 四四

薄荷湯下 內加制辰砂三錢名辰砂六一

散 治狂言妄語驚搐用防風荊芥薄荷天

麻煎湯候冷調下 本方加鬱金名牛黃六

一治痘後瘡瘍瘡毒及天行瘟疫冷水調下

多服大効

退火丹 治痘初出標大熱不退或稠密成片者

神効

六一散一料加雄黃飛過三錢 經霜荳藤燒存性一

錢外用紫草木通蟬退地骨皮紅花大力子

羌活片芩灯心煎湯候冷調下極能解毒稀

痘

四苓散

白朮 赤茯苓 泽瀉 豬苓

右為細末每服一錢

三黃丸

黃芩五錢 黃連 大黃各二錢半 為細末雪水搗丸

萊菔大辰砂為衣每服五七十丸灯心湯下

備急丸

木香二錢半 大黃 黑丑頭末各五錢 為細末神麯

八二七末 四五

糊丸萊菔大每服五七丸山查湯下

甘桔湯

甘草二錢 桔梗一錢 水煎服

三荳湯

赤小荳 黑荳 菉荳各一升 甘草三兩 三荳用水

淘淨用水八升入甘草同煮荳熟為度逐日

空心面東任意食荳飲汁服七日永不出

代天宣化丸 即韓氏五瘟丹也

甘草甲己年君土 黄芩乙庚年君金 黄柏丙辛年君水 山梔丁壬
年君木 黄連戊癸年君火 連翹佐 山荳根佐 牛旁子佐
先視其年所屬者為君次四味為臣君藥加
一倍臣減半佐又減半共為末冬至日修合
取雪水煮升麻汁打麵糊為丸辰砂為衣竹
葉湯下

五積散

白芷 川芎各二分 桔梗一分半 芍藥 茯苓
炙甘草 當歸 桂枝 半夏各二分 陳皮

枳殻 麻黄各五分 蒼朮一錢 厚朴四分 右除桂枳
殻二味為粗末外十二味為末慢火炒令轉
色攤冷次入二味末令勻水一盞半生姜三
片煎一盞溫服

辰砂散

辰砂一錢 絲瓜近蔕三寸連子燒灰存性為末
蜜水調服多者可少少者全無絲瓜解痘最
妙 紫草甘草湯調服尤佳

連翹湯 總解諸毒散風清熱痘後一切發熱瘡
毒赤腫 連翹 防風 瞿麥 荊芥穗 木
通 車前子 當歸 柴胡 赤芍 滑石
蟬退 黄芩 山梔子 甘草各五分 紫草五分
水煎服

連翹升麻湯

連翹一錢 升麻 葛根 桔梗 甘草各七分 木通
八分 牛旁子一錢 白芍藥五分 薄荷葉少許 淡竹葉 灯心
水煎服

消毒飲 治咽喉腫痛上膈熱盛 一方加升麻

牛旁子二錢炒 荊芥一錢 甘草 防風各五分 水煎服

翁仲仁十神解毒湯 專治身發壯熱腮紅臉赤
毛焦色枯已出未出三日已前痘點煩紅燥渴
欲飲睡卧不寧小便赤澁此熱盛也並皆治之
歸尾 生地 紅花 丹皮 赤芍 桔梗
木通 大腹皮 連翹 川芎 此方治血熱
痘疹以涼血活血為主佐以桔梗川芎有開
提發散之功引以大腹皮木通有疎利熱毒
之効臣以連翹丹皮有解毒之良用此以治

血熱痘疹則能內外分消熱毒雖盛庶幾解散表裏自然和平矣古人用黃連解毒湯恐驟用寒凉不惟氷伏熱毒及出不快抑且熱毒為其所抑則鬱於臟府或肚痛腹脹內潰而死者有之豈若此方用之為穩當若不得已而用黃連芩栢亦須酒炒一以製其寒凉之性二以助其上行之勢借連栢以解毒耳

加減法

身熱壯盛加葛根前胡　毒盛綿密加荊芥

鼠粘子　渴加天花粉竹葉滑石　小便血加犀角山梔

大便黑加犀角黃連或桃仁　吐血乾嘔加黃連犀角

發紅斑加犀角黃芩黃栢山梔玄參　小便赤加山梔

小便短澁加猪苓澤瀉　小便秘加滑石瞿麥

大便秘加枳殼前胡　嘔加橘紅　泄瀉加猪苓澤瀉防風

大便秘喘加枳殼前胡大黃　煩躁加麥門冬天花粉

煩渴狂亂譫語加知母門冬石膏　嘔吐加猪苓澤瀉黃連

咽喉痛加甘草鼠粘荊芥

以上並用灯心十四根水煎服

羌活散鬱湯　專治實熱擁盛鬱遏不得達表氣粗喘滿腹脹煩躁狂言譫語睡臥不寧大小便秘毛竪面浮眼張若怒並有神効并為風寒外搏出不快者同治

防風　羌活　白芷　荊芥　桔梗　地骨皮

川芎　連翹　甘草　紫草　大腹皮　鼠粘子

右為粗散水一鍾燈心十四根煎六分溫服

身初發熱及見點之際毒氣壯盛外為風寒所抑或肌肉粗厚腠理堅閉肌竅不通經絡阻塞使清氣不得引毒達表循竅而出則熱毒擁遏於內為腹脹為喘急為秘結為狂煩為驚搐為失血皮燥毛直面急眼脹睡臥不寧驚啼多哭此熱毒擁遏之症辨認不差急宜用發散開提之劑佐以和解透肌之法則熱毒不擁而其出自易矣羌活白芷防風有升提發散解毒之長桔梗有開提勻氣之能荊芥連翹鼠粘善解鬱熱地骨皮消擁熱於筋骨之間且能肅清臟府

紫草滑肌通竅大腹皮引熱下行使內外有所分消用此以治熱擁之症效大而功用極妙若驟用寒涼如芩連升麻之類則熱為寒氣所抑不得伸越逗遛經絡為疽為癤者有之氷伏硬閉者有之至於人參黃芪白术茯苓溫補之劑誤用則其擁盛禍不旋踵他如丁桂木香姜附之類以熱攻熱殺人立至尤宜戒慎故發熱之初至見點之後並宜以本方處治依後法而加減之

加減法　初發熱壯熱腮赤面赤毛焦皮燥咳嗽喘急加升麻　煩渴加天花粉乾葛　腹脹喘急鼻塞面赤若怒毛直加麻黃　便秘加當歸枳殼　甚則加大黃　嘔吐加猪苓澤瀉陳皮　禁用生姜丁香半夏木香　洞瀉加升麻　禁用白术茯苓葶藶蘢背宰剤　喘嗽惡風加紫蘇桑皮　失血加犀角地黃二連　搐加青皮　發斑加黃連黃芩山梔　鼻衄加黃芩犀角　小便赤澀加滑石山梔地黃芍藥　驚悸加木通山梔　不思食加山查　傷食加神麯山查麥芽　煩紅赤色加生地紅花丹皮白芷防風　見標二三日間出不快利加大力子山查蟬退名透肌散

皮急肉緊身壯熱甚加葛根前胡　見標三日之內並依本方加減及三日後痘瘡出齊血包已成而前症悉平不得復用此方恐發散太過雖於行漿另有方藥在後其禁用藥劑並從血熱痘症法而裁治之

太乙保和湯又名紫草透肌湯　專治血熱痘症服十神解毒湯後熱症悉去內外和平見點三日之後不易長大粗肥者用之則能保和元氣活血解毒助痘成漿易痂易落也

桔梗　紫草　川芎　山查　木通　人參
紅花　生地　甘草　糯米五十粒

右用燈心七根姜一片水一鍾煎至六分溫服

便澀腹脹加大腹皮　繁紅不潤加當歸蟬退　出不快者加鼠粘子　陷塌加黃芪　痛加白芷　不勻加防風　水泡加白术芍藥　嗽加五味子麥門冬　渴加麥門冬　癢加白术芍藥

七八日後漿足身復壯熱便秘煩渴腹脹喘急

前胡枳殼湯漿足禁用此方另立湯飲在後

益元透肌散　專治擁熱痘症服羌活散鬱湯後擁症悉開氣血和平見點三四日後不肥大者不成漿者用之則能匀氣解毒透肌達表領出元陽助痘成漿而易結膿窠也加減以保和湯同論漿足之後另有保嬰百補湯在後　按此即太乙保和湯去生地紅花加蟬退鼠粘陳皮水一鍾加燈心十四根棗二枚煎六分温服

血熱痘症禁忌

血熱痘症熱毒彌盛然毒氣無所分消只宜重用升提發散使毒得以達表而從外解引以滲泄使熱得以潤下而從内消佐以清涼消毒行血涼血之劑則痘雖稠密亦能消散而易出易化漿也所謂輕其表而涼其内十神解毒湯蓋得安表和中解毒三法盡善誠痘科之神方也冊溪曰熱者清之實者平之其此方之謂歟是故發熱至見點之後三日以前毒氣未盡達表内外彌盛血熱之症悉具辯症不差並只以本方處治之切不得用參芪白术茯苓補氣之藥於熱症未漿之前如誤而用之是謂實其實腹脹氣喘狂亂譫語咽喉腫痛口舌生瘡变症百出所謂邪得補而愈盛也嘔吐泄瀉慎不得用半夏丁桂乾姜木香藿香訶子肉果如誤而用之則是以熱助熱氣得熱而愈亢也燥症必至咽疼狂亂失血便秘無所不至矣至於龍骨枯礬澁滯之物且能使氣道阻塞是欲其出而反閉其門也腹脹之患生而喘急之勢至矣尤宜戒之及至血包已成氣血定位頭頂白光勢將行漿又宜易方另行別議

三仁膏　治痘疹大便堅實不宜下者服此潤通

火麻仁一兩炒去殼　松子去殼去皮七錢　桃仁去皮炒五錢

右研爛加芝麻一合微炒研細入蜜水研極爛以帛濾去殼同前三仁蜜湯調下看大小用之

見標三日證治活法

發熱三日後退涼見標飲食二便如常形色淡紅

疎朗扶過碍手者上吉不須藥

發熱一日便出者凶乃表虛毒盛也急用羌活散加紫草牛蒡蟬退煎調紫草膏或保嬰丹若治之早十救二三　若服後熱盛不退宜羌活散調退火丹若無保嬰丹用經驗蘇另加辰砂者大小一歲三至十歲三分隨歲增加代之矣

報痘時煩躁不寧腰腹痛不止口氣大臭痘見紫色者死

標色白皮薄而光根窠全無紅色或根帶一線紅三五日即長如菉荳大此痘決不能灌漿久後成一包清水擦破而死不可因其好看妄與下藥

標出全不起頂如湯泡灯火燒者一樣十日後痒塌而死

標出時一片紅斑如錦紋者六日死遍身如蛇皮者死黑斑如痣狀肌肉成塊黑者立時死

凡見標疎少則毒輕不必妄治密則毒盛但要磊落大小分明不相粘連成片可用前藥進之或托裏解毒之劑快斑湯消毒飲主之使其易發易靨　如出太密粘連模糊其毒尤甚托裏解毒之劑宜多飲之以防痒塌黑陷之變更察外症可治則治不可治則勿治

凡痘子初出最要唇口潤澤其毒則輕如唇焦裂舌燥有芒為毒火熾盛表裏鬱遏急宜解之黃連解毒湯加大力子　標後身熱未退清地退火湯

凡見標先要頭面稀疎磊落頸項胸前稀少其毒則輕如面上一片模糊未發壅腫蒙頭纏項胸前布密此毒盛也慎勿治之

凡頭面未見標而手足先出他處未起而手足先起他處未收而手足先收者此陽火太旺宜早解毒抑陽扶陰之劑四物湯合黃連解毒湯主之　如他處俱起而手足起遲他處俱收而手足不收者此脾胃虛弱不能行其氣血達於手足宜補脾胃十全大補湯桂枝芍藥湯

凡初見標之時磊磊落落似稀疎之狀其後漸加

日多一日毒伏於裏〻氣虛弱不能使之即出須大補而兼解毒庶可十救二三也十宣散加無價散

石谷程氏曰凡發熱見標密無毫縫空地稠若蚕種者急用三元秘方救之每一歲兒用茜根芫荽子各三錢荔枝四枚若不起加葡萄一錢半好酒一鍾煎至五分候冷每用半盞挽熱水半盞時〻慢〻喂之一日服盡次日再用水煎如前慢〻喂之但服此藥之後不可雜食他物以

傷胃氣小者只許食乳大者只吃粥若口渴即以此藥水飲之一以止渴又能清熱解毒切忌油膩煎炒恐滯腸作瀉〻則悞矣或十歲二十歲藥從一歲加起依數增加作一劑服之如年多劑大不能盡煎可分作二三礶煎之　按前藥用酒煎者活血也後用水者清熱也熱盛必作渴代茶飲之足可解毒盖前症不可補〻則助毒又不得不補〻則不起發宜當解毒解毒又作瀉不解毒又攻內茲用三味代之既能解毒又可溫脾活血誠為千金良劑

凡痘發熱一二日便出或一齊擁出密如蚕種紅紫無縫急宜服之此時切忌保元恐溫補助毒以其血未活而漿不能化故用此三元解之俟其色淡血活熱勢已退然後進補庶為萬全

凡皮肉間纍〻然紅點稠密急用纏荳藤加製過辰砂末連進二三服或薄荷湯調退火丹仍以牛旁為末敷顖門上以散熱毒非惟能使痘疎又且免使侵眼　又方生地黃牛旁子搗成膏

貼面頰額角能退痘毒

一已出未出之時口鼻出血此血熱錯經妄行不可妄投熱劑宜用生犀薄酒磨服　如鼻血不止胎髮灰吹入鼻中即止　口鼻既血又大小便下血恐胃為熱毒所傷腐壞而然不可不知

一出與地皮相平無異起之意乃是紅斑急用涼血解毒羌活散加酒炒芍藥紅花紫草蟬退木通占米連進二三劑退之　疹同此治治之遲則紅變黑〻則逆而難治

大凡用紫草必用占米以制其冷性俾不損胃無洩瀉之患惟大熱大便燥者不必占米

大凡用當歸活血須以芍藥收之免辛散助熱

一標出他處未見獨出数粒於山根之上為毒盛氣虚犯上或發三五粒一塊者皆不吉之兆也急宜涼血解毒以防危急若腮頤地角之間踈踈朗々淡紅潤澤三四次出者為氣正道尊上吉症也

一出皮膚乾燥枯澁必難起壯用溪中白色石子数枚燒紅以井水淬之使薫蒸痘上或置被下薫之頃刻潤澤痘即起發又能解穢

一色淡不紅活者血虚也以四物湯加减服之但地黄大能滞血不可輕用不得已須姜汁炒過人乳補血甚捷加酒少許佐之且血非氣不行又加四物於保元之中為陽生陰長之義

一痘正出好飲水者然乃脾胃虚弱津液枯涸故也如恣飲則必傷脾洩瀉及發泡難靨之患保元湯加麦冬五味子止之

一痘未起壯而頭面先腫者乃陰虚陽盛大下四物湯加人乳好酒服之以補陰與陽齊然陽易補陰難補宜急々勿遲否則悞事

一出即变黒者然為悪候如有起與急用托裏解毒之劑必用保元大加紫草紅花服之外用四聖散點之然早能凉血解毒必無此患亦多因脾胃衰弱血熱所致凡紅变白白变黄者生紅变紫紫变黒者死

一痘全藉氣勻血活腠理踈通則出快而稀踈亦無餘症倘遇寒凍及勞役瘦弱之人血凝氣滞出則不快蓄於皮膚之間肌肉之上進退两難日久变成黒紫搦不旋踵凡有此候當按令急與和劑（如羌活散之類）以踈利之其毒氣隨痘而出庶無变症保合太和之兆也　如頭面出不快然太陽經當用荊芥甘草羌活防風天麻湯　如胸腹出不快然少陽經當用升麻紫草木通紫蘇羌活湯　如四肢出不快當用芍藥紫蘓葛根甘草葱白連鬚羌活湯各加生姜連進二服

痘眼出快

賊痘

凡賊痘與好痘一般但撓先起壯皮嫩嬌軟內係淡膿當用保元湯加占米煎服亦能回漿

一出其色撤赤抹過皮軟不碍指此係賊痘過三日変成水泡甚至紫泡黑泡者危症也若未成紫黑宜少進保元大加紫草蟬退紅花解之或灯草木通湯調六一散利去心経蘊熱而紅紫自退如已成水泡白泡或灰白色則保元中大下四苓利之此千金妙法也不然則遍身抓破黑爛而死

八三十本　三

起壯三日認治活法

凡四五日来起壯活動一線紅暈而有根窠此為上吉蓋有根窠方見氣勻血活血活則毒化成漿收功結痂全藉此也若無根窠必是氣凝血滞按法速治

凡起壯肥滿乳食如常不必服藥

一四五日来起壯肥大中有一小孔自項直下至脚不黑不白與痘色相並此名蛀痘由表虗腠踈而然若不早治大洩元氣不能起發灌膿急用保元湯大加占米川芎肉桂提起內膿以實其孔庶為佳兆三二劑後孔自塞滿若孔色黑乃疔也以疔法治之

一頂陥色白皮薄光洞者氣虛也（大照內外光明者是）大進保元倍加酒炒黃芪肉桂川芎丁香人乳酒漿和服

一根窠淡枯澁不澤血虛也宜保元加酒炒紅花川芎當歸芍藥加山查以消參芪之滞再加木香一二分調氣氣調而血自活矣

八三十七本　三

四五日痘色不宜紅紫乃熱毒不化若血熱仍當凉血解毒蕪氣虛者保元加紫草木通紅花生地之類解之

一地紅血散乃血不附氣保元加當歸大加白芍藥以收歛之蓋芍藥味酸用之為君使血得以附氣且又能活血化漿此最上一乘之法切記切記

一泄瀉按寒熱急治至𡴭再不宜瀉
若起壯遅緩根脚不紅活者以無價散一歲二𡊬看大
小用之好酒調服或保元加人乳好酒丁香占
米山查血虛者加當歸鹿角膠
一黑陷及痘疔外用四聖散以油胭脂調點之内
以涼血解毒如紫草紅花木通茜根少加保元
進之其疔自退疔退看其虛實仍以保元補之
一煩躁者内必有熱可用木通以引其火下行或
以六一散灯心湯調侯冷服之　譫語者加三

制辰砂夏月井泉水服
如飲食不進看痘色何如未可輙投藥劑盖其間
有毒氣未盡者且山查紅花子紫草等藥清而
解之　如脾胃虛弱痘色淡白宜保元加山查
扁豆神麹　嘔吐加霍香
一倒痘頭面上未出從足底出起逆而上之継起
壯灌膿囲至心窩下則毒攻入内大叫一声昏
迷而死雖踈快亦不免死乃逆症也候其出齊
至頭面遂早丢去下身不治只將保元大加川

芎以升提之漸漸使其自上而下起壯灌膿自
上而下收歛結痂如常痘一般此鮮有知其妙
者宜謹誌之　𡴭逆痘若治之早以黄連解毒
湯一帖以護其心可十全三五遅則百無二三
矣
翁仲仁曰三日四日痘當出齊點至足心勢方安
定猶有陸續不出之状或隱隱於皮膚之内不
見不起者古名不快若非風寒欝遏之因必有
氣虛不振之過是以四日已前痘毒方出身表

宜涼四日已後毒出已定身宜温涼則氣血和
平痘色必然潤澤温則腠理開通其毒易以成
漿故至𡴭而身不微熱雖未必至於氷伏而痘
瘡断手不長四五日来血包已成候當肥大而
粗頂宜發光而白故根紅而頂白者已具行漿
之勢若還赤色過頭雖見嬌紅可愛延綿六日
依然到頭空殼虛花皮薄而光亮如灯内含是
水頂尖而根脚不紅行漿勿實是以毒熱盛而
未觧則為紫為黒壅而不起則為陷為癟滞而

不榮則為乾為枯為青為灰怯而不振則為不快為停漿或有内先腫脹而痘反不起者漿則滯而不行面已虛浮而痘反退伏者毒則遏而不進故身不熱而痘不起已成氷硬之形赤色若還不変温之可與氣血弱而不振逐成不快之狀紅潤依然如舊補之可生紫色乾枯切忌温中帯補只宜活血鬆肌為壅為滞烈藥雖然可發透肌尤是良方溏洩惟於温補瀉甚佐以升提

一〈二十七条〉六四

凡起壯時痘之根脚全然不起其頭面皮肉紅腫如瓜之狀者死○起壯時腰腹或疼或止遍身紫黙如蚊蚤咬全不起發者死○起壯時痘伏陥不起腹中膨脹不能飲食氣促神昏者死畧能飲食用消膨藥治之○起壯時遍身黒陥悶亂不寧神昏氣潰者死○起壯時根窠紫色乾燥不活全然不起發者死

頂陥不起須看年壽上痘起則不必憂如年壽上不起急與升天散一二服

痘半起忽然平陥而色白者急與内托散或補中益氣湯

痘色紅鮮反乾燥而不充肥者此火盛而血不足也宜退火涼血輕清之劑四物快斑湯主之

痘充肥而帯湿者此脾中有湿而氣不足也宜瀉湿補氣兼風藥治之蓋風能勝湿也四君快斑湯主之

一痘不起發不拘五陥用獨聖散或胡荽酒　若黒陥腹脹用豬尾膏

〈一一七条〉六二

一痘乾紅不起者外用水楊湯洗之内服補中益氣湯

一起脹時手足見而復隠起而復塌者死此根本已摧枝葉先萎之象也

凡假壯之痘（其中有數粒起壯者是也）至十二三日决不能回漿結靨内攻而死矣　白痘者可急進保元加川芎丁香生占米提氣灌膿而愈此内托治也（内托散即保元加川芎便是不必千金内托散）正壯之時痘雖起發而皮膚不碍手按之水漿就出内色不暗是也

灌膿三朝症治活法

灌膿時根窠紅潤肥滿如黃蠟色飲食二便如常者上吉不須服藥

灌膿時皮白而薄純是清水與水泡相似者三四日後遍身抓破而死

灌膿時吐利不止或二便下血乳食不化痘爛無膿者死若二便不下血猶可用止瀉及消食之藥

灌膿時二便閉目合声啞腹中脹滿肌肉黑者死

一頂陷無膿為逆（火照之內外光潤手按之軟陷者無膿也火照之內暗不光潤按之如皷者有膿也）急用保元加歸芍肉桂木香占米煎成入人乳好酒温服

有一等肥白痘其色白不作膿俗名木痘以其人原有痰也用二陳四物湯合而服之一消一補仍將小麥粉作麵調與食之立時膿起紅活但不可妄投人參占米而助胃中痰火恐防口瘡

寒戰咬牙乃陰盛陽虛也大用保元加川芎肉桂丁香主之甚者加鹿茸

〈今七卷〉 六六

痘灌膿痛不止者氣滯也少用保元加山查木香以行滯氣如膿血已滿可大用四苓以利之而痛自止

凡灌膿三朝之內身涼痘灰白色或不進飲食寒氣逆上嘔吐或腹脹或瀉清水手足厥冷無陽症也急用二神加入保元連進數服溫而補之

痒塌不止者血盛也少用保元大加何首烏牛旁子蟬退芍藥木香紅花　若將靨時微痒者不必治　有氣血虛而痒者十全大補湯加何首烏虛甚者加鹿角膠

一發白泡如彈子大者用棗針挑破去水以活石末敷之仍服保元加白朮留皮茯苓以利皮膚之水如前後發紫泡是毒盛溢於皮膚之上必死

夫膿者血之化也有血方有膿無血則無膿痘至灌膿大勢已定故此時必以有膿為主有膿則生無膿則死痘至七日若頂陷不能灌膿者必由先失調治故也急看根窠血聚別無雜症速

〈今七卷〉 六七

宜大補氣血以充其頂頂滿膿足猶可回生若
頂陷而色灰白此氣血俱離無能為矣
一頂陷無膿服內托藥而暫起不久又陷者膿未
充足故也宜內托散倍加參芪當歸煎和人乳
占米好酒服　若色灰白欲成倒塌皮薄易破
者用滛羊補漿湯保元湯加芎歸升麻人乳好
酒
一痘色紅紫漿不滿足欲成乾枯黑陷者當歸活
血散合解毒湯加升麻石膏乾葛
一遍身灌膿忽然一日变白变紅变紫者不可不
察白者為虚宜內托散　变紅紫為熱宜當歸
活血散合解毒湯
一痘起壮灌膿俱好至八日大便忽秘常欲去而
不能去急用歸尾枳殼芝麻各三錢紫草生地
黃芩各一錢煎服即通若失治至靨時忽然發
熱而死　翁仲仁三仁膏尤妙
一頂平脚濶漿不滿足十全大補湯加木香乾姜
一遍身無皮膿水流沾衣蓆不能轉動者用秘傳
茶葉方或敗草散內服內托散去桂加荊芥穗
一痘發痒滿面抓去而面上瘡痕隱然點點有起
發之勢此猶可治急以托裏發毒止痒之藥用
內托散加蟬退立驗
一痘抓破而出血者此陽瘡出血也宜當歸涼血
湯主之
一灰白慘黯皮薄擦破無膿血者不治
二便不通目閉声啞腹中脹滿肌肉黎黑者不治
一瘡爛無膿吐利不止二便下血乳食不化者不
治
一痘未起頂但脚漸濶至七八日乾枯瘡皮皺起
誤認結痂收靨者多不可救急與補血解毒之
劑庶可回生
一灌膿時眉心鼻準耳輪唇口及兩頰先有焦枯
黑靨者此名倒陷不治

收靨三朝証治活法

凡收靨自上而下者順自下而上者逆
痘至收靨大勢已定亦有膿不滿足似靨而非真

靨者此時極宜明辯若七日之間面目腫惟覺退痘雖似乾而痂薄如麩或有內症未除此痘極險時也失治則凶变立至急以補血凉解之劑庶或轉移

一痘至十日血盡毒解其膿漸乾如蒼蠅色或如葡萄色從口鼻兩傍或面部收起至胸腹而下然後頷上與脚背一齊結靨逐漸剝落內症全無身漸輕快飲食二便如常者吉或手足心或手指尖或陰上先收者俱吉

一人中者任督二脉交會之衝也凡痘自初出至收靨俱要在此部位先見者佳謂陰陽和暢也

一痘收靨自人中平分上下髮際以上陽中之陽也謂之孤陽足膝以下陰中之陰也謂之孤陰孤陽寡陰所以痘瘡之收至此二處每遲靨而後靨也不必施治

一鼻梁上痘先焦者任是凶逆亦不死

一痘當靨而流漿不已者因表散太過則斑爛流水或飲水多則漂蕩流水俱服保元湯加防風白芷白术或除濕湯外以敗草散敷之

一當靨不靨而膿充足服回漿散或象牙散

一痘有靨至頭或至腰而下身數日不靨者此乃熱毒太盛不能收靨故也治當有熱則清之若小便不利者四苓散加芩連滑石木通大便秘結者當歸解毒湯利之

一痘當靨不靨忽然变動灰白頂陷吐瀉腹脹寒戰咬牙者急與內助丹　若痒塌氣促足冷者加附子有水泡者大加白术行去惡水而膿自乾矣

一血盡漿足溫潤不歛者內虛也保元加苓术以助收歛結痂或六君子湯

一當靨不靨發熱譫語目閉口喘手足大亂小水不利者此熱毒乘於肺経無陰氣以收之然也急用清金導赤飲主之

一漿未稠濃頂未飽滿面腫忽退目閉忽開瘡脚散潤色白皮皺乾燥似靨非靨此因津液枯竭血氣虛少內証未除之故此症之極險者也急

用四君子加麥門冬牛蒡子荊芥連翹桔梗救
之若誤認作結痂無事致成危殆悲哉
一膿後不能結痂反成腐爛和皮脫去者此倒靨
也係中氣不足急用保元湯加當歸牛子連翹
薄桂木香治之其頭面瘡已破者復加腫灌手
足遍身原無瘡處又復出一層謂之補空若治
之頭面不腫空處不補不旋踵而告變矣
一收靨時忽泄膿血痂皮者此亦倒靨之症乃脾
強腎弱為順利盡自愈不必施治如利下水穀
不分者此腎強脾弱也急用陳氏木香散送下
荳蔻丸
一痘因冬月嚴寒被寒氣鬱遏而不能靨者以桂
枝解毒湯治之
一痘因夏月炎暑熱氣薰蒸而不能靨者甘露解
毒湯微利之
一遍身俱收惟頭與足不收者此陰陽不和故也
以四物湯去地黃加牛膝升麻牛蒡紅花荊芥
之類

一多服熱藥以致熱毒猖狂痘爛不靨者小柴胡
湯合四苓散或天水散或豬尾膏外以黃連輕
粉為末和油調敷或用豬膽汁研芒硝如膏塗
之　古人用豬尾膏獲效神速者蓋以熱毒蘊
併於心經致熱毒內外灌注而不結痂用此方
者以血歸心引龍腦以凉之而行營衛況營衛
得香則行遇臭則止也
一收靨時有臭氣帶腥者佳全無氣息尚有餘毒
未發也若臭氣如爛肉不可近雖似結痂未可
為真急以清熱活血緩則無濟
一瘡欲收而唇口乾紫連結查滓頰紅者將成肺
癰也宜解毒湯麥冬知母百合甚則大連翹飲
一凡痘係危症氣血本虛多服補劑而漸有膿色
將收靨雖有熱者只可於補劑中加凉藥可也
若謂將靨而去補劑竟與凉藥更加下利藥欲
令速靨是速其斃也蓋虛者復虛毒反內攻而
死此必然之理又已然之驗也
逆症不治　痘當靨遍身未見青膿黃色之漿而

口唇上下痘先黄熟者毒氣内攻於脾也不治
一痘收靨時不喫飲食口唇常如食物而動不止者不治

落痂症及靨後餘症

一痘瘡收後痂厚落遲離肉不粘者吉
一痂落疤帶紅色而不凹凸更無他症飲食二便如常者吉
一自食痘痂者雖有他症不死
一痘已結痂而不焦落者餘熱為害也大連翹飲去紫草加地骨皮
一痘痂至半月或一月不落或發痒者必因表發太過致肌肉不密無力收斂故也宜人参固肌湯
一痂不落反見昏迷沉睡不省人事者必脾胃大虛也宜人參清神湯
一痂雖乾好但半邊掀起半邊粘着不能脱落者必過用辛熱之藥熱留肌表也宜升麻葛根湯加防風荊芥蟬退連翹以去肌表之熱即落矣

一疤紅紫者乃血熱毒盛也當涼血解毒
一疤白者血不足也不治雖過四十日還死必因漿水淡故疤白急用保元湯合四物湯加白术陳皮紅花老米
一痂後身熱不退或寒熱往來用小柴胡湯虛則補中益氣湯俱加黄芩
一痂後唇乾口渴熱甚不解者大連翹飲主之
一痂後虛煩不眠者竹葉石膏湯　煩渴譫語者辰砂益元散
一痂後口噤殭直腹痛遶臍冷汗如雨痛定汗止而脉弦緊者因疤受風寒也宜散風養血用鈎藤湯加紅花木香川芎芍藥當歸甘草白术青皮官桂生姜
一痂落肌肉尚嫩出見風早遂成癜癬有膿汁出者燒牛糞灰敷之　痂不落掐搯抓搔致成瘡風瘡者宜消毒飲加苦參當歸外用金華散或乳香韶粉散　遺毒生瘡不已者活血當歸湯宜灸風池曲池三里則永不發

一痂後遍身青紫癜痓口噤痰响者由氣血虛弱而受不正之氣也用蟬退一錢姜汁薄荷汁入酒一盞調服得汗即愈

一痂後手足忽然拘攣不能屈伸轉動者由血少不能養筋或因風寒濕三氣使之然耳不可輕用發散反耗其血只補脾養血則瘥當歸桂枝湯治之

一痂後赤火丹毒惡候也從頭上起者過心即死從足下起者過心腎即死內服玄參化毒湯

一痂後牙齦生瘡時時出血謂之牙宣呼吸息謂之息露此走馬疳也由熱在陽明急用蚕退散敷之　如唇腫面浮穿鼻破頰潰喉腐肉飲食不入者死

一痂後發癮者皮膚間隱隱起成疙瘩此由毒氣未得發盡藏於皮膚或發痒搔之而成者或因受風風火相持而成者此吉兆也欲發出無使停留以变他疾如發太甚不已者內服防風葛根湯外用蜆子水洗之如無用六一散拂拭之

一痂後兩目不開惡見明者謂之羞明惟向暗處敢開也凉肝明目散主之　若暗中亦不敢開者此即防目中有瘡以望月沙散治之

赤水玄珠第二十八卷痘疹心印

新安生生子孫一奎著輯

異痘須知

夫痘有似凶而吉有似吉而凶者不可不知

天根痘 諸痘不起壯而天庭或曉星起灌者乃精氣不外生故曰天根十有九生

天空痘 諸痘壯氣而天庭或曉星不壯者乃血不灌項也故曰天空十無一生

明朗痘 諸痘不起而太陽太陰獨起者吉日月為明太陰太陽之謂也

明餘痘 諸痘起壯而太陽太陰不起者凶

海溢痘 諸痘不起而耳後方員一寸獨起者名曰宿海溢是腎經旺也可治

海枯痘 諸痘尽起而耳後方員一寸獨不起泛者腎敗也名曰星宿海枯不治

又云 頭面遍身四肢耳上俱已起泛灌膿惟左耳下外有二三粒不起灌日後唇裂齒乾如不急救必然內攻而死

有根痘 凡痘出頭面多四肢密者十分危險若地角方員窠有數粒團如珠者十有十生蓋腎為根本也痘腎旺故曰有根

無根痘 諸痘俱好而地角方員陷伏乾枯或灰白不起者腎水絕也不治

抱鼻痘 面部俱稀而鼻梁左右密如蚕種者此毒聚於脾胃也名曰抱鼻痘其危矣

單瑣口 面部俱稀而口角有一粒黑痘較諸痘獨大者名曰單瑣口

雙瑣口 若口角兩边各有一粒者名曰雙瑣口皆惡候也

瑣項托顋 痘出遍身稀踈惟項下顋塞一片以至於頸名項托顋亦為不治之症

猪頭痘 出而頭頸窩太多者急用山豆根玄參桔梗甘草生地芎歸山查木通荊芥牛子水煎逆則毒結于喉而死

逆痘 上身少下身多者名曰逆痘然無大害

兩頭痘 初標時看自胷而上自臍而下俱有而中間一截全無者是也七日內急用人參歸茸湯去桂加藿葉桔梗山查白芷厚朴紫草防風木通再加黄蓋三十粒水煎救之出七日則難救矣

鬼捏痘 痘出遍身全無點粒其斑成片恰如打傷痕一般故名鬼捏不治

鬼痘 痘標限定手足胷背俱多而頭面全無者名曰鬼痘又曰無頭痘五日之內可救五日之外難救蓋氣血下行不能上升急用升麻川芎白芷荷葉前胡甘草桔梗防風當歸笋尖姜水煎服如不治曲池生毒一月見骨而死若身上四肢稀少者不可遂作鬼痘看

賊痘 痘初出便如綠豆過一日使如黃豆大再一日又如員眼大名曰賊痘其痘根窠與頂全無血色形雖起脹按至處軟至四五日上下出血而死但比諸痘獨大其大甚速者就是不必大如員眼也

蛇皮痘 頭面遍身再無空地平塌而色白者俗名蛇皮其必乾枯不能作漿至十一二日必死

藥患痘 初標紅潤至四五日忽變陷伏不起將至裏虛其名為藥患急用扶表裏為上

九焦痘 當額地閣顴骨胸背耳後手足皆有二箇黑陷者名曰九焦痘不治

伏陰痘 痘不貫膿而瀉膿血故名伏陰急宜溫裏

空倉痘 痘雖肥滿而內实乾枯全無血水乃空倉也決死之症

石臼痘 痘中有四而四弦特起明亮好看內实漿核不化以手摸之其硬如石因形號石臼故名之此症斷不可治

茱萸痘 痘不甚起而中亦有四四弦皆有紛紋以其形似茱萸故名之也若得根窠紅活者服內托散去防風白芷項中發黑點者保元湯加芎桂身壯熱者入酒炒黃芩

蛆痘 痘瘡痒甚者不必夏月中蠅生蛆雖寒月亦有用鞣挑去而愈或謂用柳條鋪

〈子全〉 二

下令兒眠於上則蛆自出此蓋毒留於皮膚延綿日久腐膚熟腐故耳譬之腐草為螢朽木生蠹其理一也

血疱痘 血疱痘者血協熱毒而自漿也刺疱血挑紅者尚可治急與犀角地黃湯加白芍以制血解毒血黑者不治身熱者小柴胡湯加生地血漿不能收靨者紫草煎湯調下龍腦膏

血靨痘 痘出稀少四五日胖如豌豆六七日血靨而乾亦似丹砂九日而痂落此氣血充足毒少故随出随痂不及釀膿也此痘極佳百無一二

白漿痘 痘初起發瘡頭便帶白漿者此皮膚痘也但有此便不可治五七日死

四圍痘 若瘡起發根窠四畔又旋出小痘攢簇本瘡或發似粟米不待養漿即加搔痒

而死

漏瘡痘 瘡出頭有孔膿水漏出堆聚乾結其色如天疱瘡及癩頭之形者或清水非膿無事自破水去而乾黑者此皆屬氣所為傳染相似俗名漏瘡未有能治者矣

蛀痘 起腫時痘上有小孔不黑不白名曰蛀痘皆腠理不密而有是痘大泄元氣急用保元湯加丁香肉桂其孔一密而痘自起矣

隱血班 其形如豆殼灰白全無血色擦破而後血出亦無膿血故曰隱血班也不治

赤萍瘡 痘已出齊或未齊如赤浮萍微微高起若隱出有血急以解毒升發藥救之如成爛痘則無妨矣

紫萍瘡 痘已出齊紫色不起不灌漿如浮萍貼在內上者不治

〈二八〉 四

白萍瘡 同上

草尾珠 其痘遍身俱陷惟頭骨一團飽滿如珠此症可治補托灌膿即痊矣

黑痘 盧扁夫曰黑痘多屬血熱黑痘本為惡証世醫恒棄而不治然形狀多端猶可解救須當辨而治之但血不活者則難救矣

一痘紫黑或黑點子隱在皮膚之間者無比散或人牙散用猪尾血三五滴酒調下小兒三分大人五分

一初出便是黑點急用紫草茸二三錢醇酒半盞煎至三分濾查與服為妙

一其形如痣皮膚發青紫紋者服透肌散或
加防風荊芥
一形如牽牛而色痳敗又黑痕併黑靨者並
用蟬退二十五箇紫草茸一錢水煎服
一痘黑如煤炭血不紅活者用活血散一錢
酒煎紫草湯下
一痘黑而皮膚皆黑成片者化毒湯加蟬退
地骨皮酒炒黄芩
一痘黑大而軟者氣弱而熱毒盛也用保元

加紫草
一痘焦黑潮熱煩躁者小無比散并水磨犀
角調下一錢
氣血兩敗痘近看枕如水蓼花遠望胭脂紫可誇臨漿清水不成膿古聖神農無治法
復出痘先見標一二點于面部或口唇上下如常起脹貫漿收靨不知者以為痘本稀少故也然以火照之紅點隱隱然藏于皮膚之内急用内托解散則痘復出不然頓下決發一毒不急散其毒而發其痘即死
雲翼子二十八般異痘姑錄于后以備參看

一形雲繞頂遍身痘好但頭頂一片紅赤者乃熱毒盛于膀胱也須清利之
一紫雲灌頂遍身痘好但頭頂紫乾陷伏不起者不治
一烏紗霞頂其症必咽喉啞塞臭氣大粗乃血衰氣敗而元陽脱也不治
一梨花漫頂用保元湯加天雄猶或可救
一雲掩天庭遍身磊落光澤惟額上一片血疱如雲者乃心家客熱甚也急磨犀紙服之
一紫萍鋪額其症熱甚咽痛悶亂發狂用小無比散加玄參升麻犀角
一烏紗落額不治
一灰撲印堂其症心家少血也若兼腹脹咽乾用保元湯加白芍凉血解毒湯好

一楊花撲面用内托散加天雄
一赤珠繞唇此乃脾經極熱也用小比散加雄黄
一烏飯沾唇此証必声啞神昏目精不轉四肢厥冷喉响如鋸三朝七日乃死期也
一霞錦穿胷此因火毒深盛不治之症
一紫雲佈胷此症血枯氣滯毒來攻胷也其症必咬牙戰掉口唇焦裂項刺命傾矣
一黑棋排胷三朝決死

一柳絮飛背此乃血氣枯弱也保元湯加芎歸附主之

一桃花映背此症清火解毒可生

一紫萍浮背不治

一黑砂落背不治

一雪鋪魚背此血已枯盡也不治

一赤鱗穿腹此症必大便秘小便淋瀝乃胃家熱甚也用五苓甘露以和解

一黑叚纏腹此症必肚內膨脹声音啞二日終矣

一白梨墮腹氣血衰敗也半月之間發驚而死

一葡萄落地臂間紅紫一片若葡萄者兩日命終

一爛粟居臂遍身俱好惟臂上一片如粟殼臭爛者托補下元可轉

一榴花散野諸痘俱好惟四肢紅赤而唇口崩裂者乃心脾肺三經熱也須涼血清大解毒

一黑珠遍躰四肢枯黑如火燒瓶頸口中涎出氣冷朝夕死矣

一楊花墮枝手足獨灰白者氣凝血滯也八珍湯加附子治之

婦女痘

童女出痘與童男相同無以議也但天癸通者則治法不能不異且夫發熱之初適遇經水如期而至則熱隨血解痘出亦輕不須服藥若過三四日而熱不止痘不出者此熱入血室血必妄行為內動中虛之患宜涼血地黃湯加人參治之

一非經行之期於發熱之際而經忽至者此毒火內熾逼血妄行之故必痘多而毒盛急用涼血解毒湯倍加連翹牛旁使熱得清毒得解痘得出經得止始無他变遲則內虛痘必陷矣柳花散佳

一正當起發灌漿之時適遇經行過三日不止痘

應起發而不起發應灌漿而不灌漿頂平形塌或灰白或黑陷此為經血去多陰血虧耗必為陷伏壞症矣急以八物湯去地黃加黃蓍木香熟附子以調元氣或葫荽酒噴之使痘起發灌漿或出增痘者為吉若寒戰咬牙喘急腫滿手足厥冷者為內脫不治之症矣

一起發灌漿之時經水適来忽口瘖而不能言者乃血入少陰不能上榮於口也宜先以當歸養心湯主之俟其能言後以大補湯治之或猪心

血調服亦可

一經水不斷之時適逢出痘身發壯熱神思昏沉言語狂妄如見鬼神尋衣撮空此行經之後血室空虛天行邪熱乘虛而入犯於衝脉蓋肝藏血開竅於目神思昏者魂乱也目妄見者視乱也妄言者肝移熱于心也宜瀉肝散或小柴胡湯加生地丹皮

一正直崩漏不止氣血俱虛之後適逢出痘此必不能勝任宜大補其氣血以十全大補湯八物湯加木香黃芪官桂主之使裏氣充足毒無留停更能飲食則可保全否則倒塌不治矣

一向來經閉不通血海乾涸適逢出痘毒氣怫鬱於衝任之間二陽之併發其熱必甚若攻擊之則血妄行不止痘亦不出為喘急為腫脹為陷伏矣須調其心脾使毒得發洩庶可以保其生以歸脾湯逍遙散治之脾和食進然亦方可收功

一痘瘡起發至泡漿數日最宜表裏無病飲食如常若當此時忽然行經者人但知厭穢以觸正痘殊不知此乃本身之血不為之厭但恐血去裏虛防生陷伏之变急宜救裏解毒大補湯主之

一姙婦最忌出痘蓋熱能動胎胎落則血氣衰敗痘必不能起發灌漿命其危矣故孕婦出痘深為可慮蓋痘之用藥多主溫補如半夏肉桂之類皆姙婦所忌而烏附又非痘家所宜凡遇此疹者不問輕重悉以清熱安胎為主不可觸動其胎宜安胎散加黃芩芍藥主之血動者四物湯加芩連治之及草胎散佐之身熱足冷腹脹者八物湯加木香脾氣虛不進飲食毒發不出者四君子湯加木香糯米紫草胎動不安者安胎散加砂仁痘出稠密者參芪內托散加紫草芍藥當歸單身熱有外邪無內疹者參蘇飲加木香更以如聖散為主隨症加减如初發熱加升麻葛根連翹痘出太甚加酒炒黃芩大力子山查連翹不起發加大力子白芍藥口渴加麥

冬知母天花粉痰多加半夏所謂可攖而攖似乎無攖故雖有胎不忌半夏也

一痘正在起發灌漿之時忽遇坐草分娩之期此氣血俱虛之候宜大補湯加熟附子主之以補氣血固表裏若産後小腹急痛者此血未盡也黑神散畧與行之不必拘泥若寒戰咬牙腹脹作渴足冷身熱者此脾胃内虛外作假熱也大補湯加熟附一二劑更用四君子湯加黄芪當歸陳皮木香多服止者吉不止者凶

一疹後十日或半月之間適逢出痘此無胎孕繫累只以大補氣血為主以大補湯或八物湯去芍藥痘出多加連翹大力子大便自利者加肉荳蔻只照常一躰用藥施治不必妄為而多疑之反致誤事

一痘疹要訣曰姙婦出痘收靨之時胎落者多無事若發熱初出之時胎落者猶或可救若時當起脹灌膿而有犯此者多死盖血氣衰敗無以逐其毒也

一痘已出未出不起不發隱在皮膚并治麻痘斑症用梅花一兩桃仁二錢絲瓜五錢辰砂二錢甘草二錢為末每服五分参蘓湯下

一痘不問前後凡黑陷咬牙寒戰用梅花六錢川山甲一兩仙灵脾五錢射香一錢為末每服三五分咬牙寒戰加人牙二三厘内托散送下

快斑散

貫衆 赤芍藥各一兩 甘草 升麻 枳殼炒各五錢

右為末每服一錢水一盞竹葉七片煎至五

分温服看大小與之按貫衆主腹中諸熱邪毒其性微寒凡痘瘡煩渴咽燥喘急大便秘小便赤澁目赤皆裏熱也急宜服之

西来甘露飲

清熱解毒如神凡發熱之初五日已前而熱不退痘色紅紫口渴大便結燥服之即能紅潤亦治疹家煩熱口乾咳嗽疹色枯燥或譫語喘急睡卧不安

絲瓜藤 霜降後三日近根二尺剪斷將根頭

一節倒挿入新甕瓶中上以物掩之勿使灰塵飛入次日以好新罈一隻将瓶中之汁傾在罈中仍将藤照前挿入瓶内三日後汁收尽将罈封固收蔵听後取用○若發熱煩躁口渴未見紅點将茜根一两水煎濃汁二酒盃攙絲瓜藤汁二酒盃相和服之立安痘出亦輕○若已見標顔色紅紫及稠密者用紫草煎濃湯冲服便見紅潤○若夾斑者犀角紫草茜根煎湯冲服寒月用酒煎冲服○盖此汁極能解毒清熱尤

治天行時疫每以生姜汁少許加蜂蜜調匀服之有神功

渾元汁　即紫河車不拘男女初胎者尤妙入新甕埋内封固其口上以碗覆埋於土中久則化而為水是也

専治氣虚血熱痘色紅紫乾枯黒陥等症以此汁清而補之其効立見氣虚甚者人参紫草煎濃湯冲入服之　已上二方有力之家可多收貯愈久愈佳臨症極便勝如積金寳造浮屠也

李氏敗毒散　治初熱壮盛等症

即前敗毒散加升麻荊芥牛蒡子蟬退山查地骨皮薄荷紫蘇紫草　减獨活柴胡茯苓人参

右姜一片水煎臨服加葱白汁五茶匙　如熱甚加紫胡黄芩　夏加香薷　冬加麻黄瀉加猪苓澤瀉

蘇解散　治痘初壮熱頭疼腰疼腹疼作服一切熱毒甚者

紫蘇　葛根　防風　荊芥　白芷　蟬退
紫草　升麻　牛子　木通　甘草　各等分

加灯心葱白各七根水煎熱服

升麻葛根湯　治初熱壮盛疑似未明服此或痘已出而表熱甚不退　李氏加紫蘇五分笋尖山查牛子各一錢冬月加麻黄一錢令痘易出易飲

和解湯　解表和中

升麻　乾葛各一錢半　白芍一錢　人参　防風各七分
川芎八分　甘草五分　姜一片水煎服

解毒疎痘湯　預服解熱去毒已出解熱毒斑疹又治紅紫口乾壮熱譫語

防風 荊芥 羌活 柴胡 川芎 白芷
當歸 連翹 黄芩 黄連 麻黄 紫草
蟬退 右姜葱水煎服

加味葛根湯 治痘失表發熱譫語
升麻 葛根 赤芍 甘草 桔梗 柴胡
荊芥 防風 連翹 牛旁子 木通
右水煎服

大灵丹 治壯熱顛狂驚搐譫語紅紫斑焦乾陷一切悪疱
白滑石(飛過三兩) 雄黄(飛過) 犀角(各三錢) 辰砂(飛過三錢) 牛黄(半) 水片(各一錢) 射香(五分)
右研極細和勻用升麻甘草防風薄荷灯草牛子紅花紫草黄連各三錢水二碗煎至半碗細絹濾去渣加蜜四兩同熬滴水成珠和前藥丸如小龍眼大金箔為衣每用一丸灯心湯下暑月冷水化下

無比散 初熱服之甚能稀痘 又治痘夾黑點子 及黑陷黒痘等症
辰砂(一錢) 氷片 射香 牛黄(各五分如無牛黄用牛胆南星代之) 膩粉(二錢) 一方有蟾酥
右研細末一歳兒服一字大者五分刺猪尾血三兩點新汲水調和送下取下悪毒如爛魚腸葡萄穗狀即愈

小無比散 治痘壯熱口渴小水澁大便秘口氣熱煩躁不寧或焦紫或紅斑自發熱至起壯時有熱者皆可用痘後餘熱亦可用
桂府滑石(飛過六兩) 石膏(飛過一兩) 粉草 寒水石 鬱金(各五錢 蟬肚小者甘草湯煮乾為末七錢) 右俱製淨末和勻每五歳者服二錢大人再加 冬月灯心湯下 夏月井水調下 熱甚不解者井水磨犀角汁調下 若紅紫頂陷不起加川山甲末一分射香半分紫草煎湯加酒一二匙調下即起

大無比散 治熱毒大甚驚狂譫語引飲痘瘡紅紫黒陷
桂府滑石(飛過六兩) 粉草(一兩) 辰砂(飛三錢) 雄黄(飛一錢)

右末每三五歲服一錢十歲服二錢發熱之
初用敗毒散調下亦能稀痘　若報痘後用
灯心湯下
退火回生散　治痘熱甚發渴紅紫黑陷
滑石一錢　辰砂一分　氷片三厘　右末冷水調下
得睡少時神安氣靜痘轉紅活
龍腦膏　痘毒出不透心煩狂乱如見鬼神或已
出未出番伏黑悪毒等症
氷片　研末新宰猪心血和丸員眼核大　小
兒服半丸　大人服一丸　凡狂妄煩躁者
心經毒盛也紫草湯下　昏昏不醒者伏熱
在心經也井花水下　血疱漿不回者紫草
湯下　漿坐疱陷者溫酒化下
天真膏　治黑陷乾枯紅紫及斑不退用此救之
十全四五
初生小兒解下黑糞用磁確收貯加水銀二両
射香一錢黃蠟封口埋於土中愈久愈妙久
則化而為水每遇前症　看見大小熱毒盛者
量與二三茶匙酒煎紫草湯對半和勻服之
立時紅潤活澤真秘方也較之天灵蓋枯臭
無益之物萬〻矣緣此糞原係母之真血所
化蓋以血補血且入土日久又得陰氣多故
能解毒　百日內小兒熱而煩躁啼哭不止
用少許點入眼角二三次便能神安氣和而
睡蓋又能清心熱也
猪尾膏　治仝龍腦膏但此二方俱以龍腦為劑
虛寒者不可用惟實熱則有功
凡痘過服熱藥昏昧不知人事者取猪尾血以
龍腦和為丸員眼核大溫酒化下　按猪尾乃動物取其血用之使毒活動化漿而達於外也
一凡痘倒靨心神不安者片腦五分辰砂一錢猪
尾血爛研膏用木香磨湯化下
一凡痘不化漿倒靨者片腦一分猪尾血一錢同
研新汲水調下
蔵璽龍腦散　治痘黑陷
蔵灵仙一錢炒為末　片腦一分　右用溫水調下取下

瘡瘕爲劾

獨聖散　痘不起頂或紫黑陷倒靨服此即時紅活起發有起死回生之功又名奪命丹

川山甲 酒炒成珠一錢取前足及嘴角者佳　麝香 一分

右末每小兒三分大者五分用木香煎湯入少酒調下　熱甚者紫草湯下

宋杏庄方內加炒紅麴川烏炒焦各五分名曰一七金葱湯下

大成散　治痘出不快或頂陷或灰白黑陷一切不起發之症俱可用之

川山甲 一兩酒炒　甘草末 三錢　雄黃　硃砂 各一錢半

紫草 三錢　射香 二分　右每五歲兒用二分冷症熱酒調下　熱症紫草湯下　寒者加入治中散內用　熱症加入小無比散內

人牙散　治痘不起發黑陷或紅紫黑斑咬牙寒戰　人牙 自落者不拘多少火煆存性淬入韭菜汁內大牙二次小牙二次研極細末入射香一分或加紅麴二分　右用雞冠血調成膏好酒半盞人乳半盞入葱白一撮煎湯送下

凡服牙齒不可過多每服止三分多則陽氣盡出於表恐痘斑爛無血色陰氣內盛必裏寒而濡泄急以四君子加芎歸服之

無憂散　治臨危痘症寒戰咬牙

人牙 如上製一錢　雄黃　珍珠 各五分　一方有牛黃五分　右末每服三五分多則一錢荔枝煎湯下

無價散　治黑陷欲死者　一方加射香冰片 少許

用無病小兒糞臘月將傾銀礶二箇上下合定鹽泥固濟火煆通紅取出爲末蜜水調服一錢

烏金膏　治發熱至七日已前或因風寒痘不起發或紅紫或驚搐俱可用

姜蚕 酒洗　全蝎 去足尾酒洗　甘草　紫草　白附子 味苦內白者眞洗淨二錢　麻黃 各五錢　川山甲 炒末二錢半　蟬退 去頭足酒

右爲末將紅花紫草各一兩好酒二鍾熬去大半去渣入蜜五兩慢火同熬滴水成珠爲度丸如龍眼核大每服一丸灯心湯化下

紫金散　治出不快及倒靨　亦治遠年不愈惡

瘡　紫草　蛇退焦炒　牛旁子各炒五錢

右爲細末每服一錢水半鍾煎減半温服

連翹升麻湯　治痘一發密如針頭形勢重者當輕其表而凉其内　連翹　升麻　黄芩　葛根各一錢　麥門冬去心二錢　右水煎服

清地退火湯　治痘帶熱而出名爲火裏苗急用此方以退其熱則後無青黑變陷之候　地骨皮　地膚子各一錢　牛旁子　紫草　葛根各八分　連翹六分　當歸五分　木通三分　蝉退二分

右加姜一片水煎服　如熱不退再服一劑

或爲末灯心湯服

紫草透肌湯　治痘熱而出不快及項陷者

紫草一錢　升麻五分　牛子　防風　荆芥　黄耆各八分　甘草三分　木香五分　右姜水煎服　如色紫腹痛加蝉退一錢

化毒湯　治痘已出而熱毒未解宜清熱凉血毒一解不致黑陷血一凉不致紅紫

紫草　升麻　甘草　蝉退　地骨皮　黄芩　酒炒木通　各等分水煎服

解毒散　治毒先發脛者名爲痘母後發者十有九死先發者吉　金銀花五兩　甘草一兩　木通　防風　荆芥　連翹　牛子各三錢

右用酒水各一鍾煎服　如泄加訶子荳蔻　痘紅者加炒黄芩芍藥　瘙痒者加歸身生地或加何首烏尤佳　疼痛者加赤藥

透骨解毒湯　治寒戰咬牙

紫草　甘草　當歸　防風　陳皮　赤芍

右等分水煎服

消毒飲　痘已出上焦熱胸膈不快及痘後癰毒麻疹熱毒　荆芥　牛子各二錢　甘草一錢

右姜二片水煎服

如聖湯　痘已出身熱如火

紫草　升麻　葛根　白芍　甘草　木通　猴梨　各等分加姜一片葱白三莖水煎熱服　心煩加麥冬赤茯苓煩渴加生脉散　七八九日身如火者加酒炒黄芩地骨皮

四聖散　黒陷倒靨不起發不紅活小便不利

紫草　黃耆　甘草　木通　右水煎服　熱
甚色紫倍加紫草芩連紅花大便秘加枳壳
如常加糯米
加味四聖散　痘出不快及変陥倒靨小便赤身
熱未退或復冒風者
紫草　黃耆　人參　甘草　川芎　蟬退
木通　木香　大便秘加枳殻　不秘加糯米
百粒水煎服
涼血解毒湯　痘出熱不退紅不分地或痘苗乾枯黒陥急用此方可起壯灌漿

紫草一錢　生地　紫胡各八分　牡丹皮七分　赤芍
蘓木　防風　荊芥　黃連　木通各三分　牛子
四分　天麻　紅花　甘草各二分　姜一片　灯心二十
根糯米百粒水煎服
惺惺散　治痘頭痛壯熱喘急此攻毒散熱之劑
人參　白朮　茯苓　甘草　桔梗　細辛
川芎各五分　薄荷　一方無川芎加天花粉
姜三片棗一枚水煎服
内托散　痘不起發根窠不紅或灰白色咬牙寒戰等症

人參　黃著　甘草　川芎　當帰　防風
白芷　桔梗　白芍　厚朴　木香　肉桂
右姜一片棗一枚水煎服　色紅紫者去肉
桂木香加紫草蟬退　漿不滿水酒各半煎
服　色淡白者去防風白芷加糯米　大便
燥加人乳
蟬退膏
蟬退酒洗去頭足　當歸　防風　甘草　川芎
荊芥穗　升麻　白芍各等分　右為末煉蜜丸

芡實大每服一丸薄荷湯化下
粉紅丸　又名溫驚丸　治痘後癲癇症
牛膽南星四兩　辰砂一錢半　天竺黃五錢　氷片五分
胭脂丕一錢　右為末牛膽汁和為丸雞荳子大
每服一丸小者半丸沙糖溫水化下
大保元湯　治頂陥根窠雖紅而皮軟薄血有餘
而氣不足　黃芪三錢　人參一錢半　甘草　川芎各一
錢　官桂一分　加姜棗水煎服　如氣不行加木
香減去桂　若不食加人乳半鍾　又方加

白何首烏黑荳蒸過用

生脉健脾湯 治漿既成皮軟色白乃氣不足也氣不足當補氣血不足宜養脾脾旺則血生是固其本也

黃芪一錢半 人參一錢 炙甘草 官桂各三分 當歸 川芎 白芍 白朮各八分 茯苓五分 紫草四分 姜一片 紅棗一枚 糯米五十粒 或加酒洗紅花三分

通天散 治痘發熱不出或已出而色不紅活

人參 陳皮 桂枝各八分 川芎 熟地 芍藥各一錢 當歸 紫草各一錢半 紅花 木香各三分 甘草六分 知母八分 荔枝殼十箇 右用鷄汁一鍾 棗三枚 糯米一撮煎服 初服到項 再服到臍 三服到脚神効

升天散 即灌膿起頂散 治痘灰白或紅紫黑陷乾枯或清水不成漿 八九日十日皆可服

人參六分 黃芪 山查各八分 白朮土炒 當歸 川芎 橘紅各五分 甘草三分 淫羊藿 川山甲土炒 黃各二分 肉桂二重要引經之藥多則痒 木香二分 姜一片 棗一枚 水煎服 或為末服亦可 如嘔吐生姜湯下 瀉米飲下 肚痛神麴煎湯下 煩躁麥門冬湯下 渴用麥冬五味煎湯下 吐瀉藿香陳皮湯下 痘不成漿多服数帖無妨

補漿湯 痘灰白不起壯或漿清

淫羊藿三分多則發痒 人參八分 川山甲土炒二分 黃芪一錢半 枸杞子一錢 川芎五分 當歸八分 甘草五分 木香二分 白朮土炒六分 山查八分 陳皮五分 官桂三厘 黃荳三十粒 笋尖二箇 加姜棗糯米水煎服 一方有白芷防風

補元湯 治痘頂充满而根盤不聚色不紅活乃氣有餘而血不足也

川芎 當歸 白芍酒炒 熟地各一錢 紫草 紅花酒洗各七分 陳皮 甘草各三分 白朮土炒一錢半 酒水各半盞 糯米五十粒 棗二枚 煎服

活血散 治痘色淡白

當歸 赤芍酒炒 紫草 川芎 紅花各五錢 血竭一錢 木香二錢 右為末每五歲者服一錢

十歲已上者服二錢好酒調下　熱極血焦
不紅活者酒煎紫草湯調下
保生散　治氣血俱虛灰白色不灌膿囬漿者
紫河車（一具焙為末）　龜板（五錢酥炙）　一方有鹿茸五錢
右末每服五七分或一錢氣虛者保元湯下
血虛芎歸紫草煎湯下
渾元散　治仝上
紫河車（一具分作五七丸煨）　用白糯米三合水淘淨入
無油銚內同炒以米黃色為度同為末每用
五七分兒大者一錢極補氣血能助灌漿如
神緣糯米性温得紫河車之氣純化為河車
故其補功最速譬之造酒米從麴化意也極
妙絕
異功散　此方調順陰陽充實表裏凡痘灰白痒
塌寒戰泄瀉腹脹並宜服之非虛寒者不可輕
用　人參　白术　茯苓　當歸　陳皮
半夏　厚朴（姜制）　木香　丁香　肉果　大附
子　官桂　右姜棗水煎服

肉助丹
黄蓍（酒炒）　人參（酒炒）　白术　茯苓　當歸　陳皮
半夏　厚朴　肉桂　山查　姜三片棗一枚
糯米五十粒水煎服　如不食加人乳一盃
痒甚加大附子　寒戰不止加附子防風
渴加麥冬　瀉加澤瀉猪苓不止加訶子肉
果
助陽丹　痒塌不起根窠不紅
黄蓍　人參　白芍（各一錢酒炒）　甘草（三分）　川芎
當歸（各一錢）　紅花（五分）　陳皮（八分）　官桂（二分）　姜棗水煎
服　如食少加山查厚朴各五分餘加仝煎
囬生起死丹　治痘灰白寒氣逆上不食腹脹嘔
吐肚痛泄瀉清水手足俱冷
丁香（九枚）　乾姜（一錢）　水煎熱服被盖片時令脾胃
温煖陰退陽囬痘自紅活
治中散　虛寒瀉利不進飲食
黄芪　人參　茯苓　白术　川芎　當歸
肉桂（各五錢）　肉果（麵包煨熟取去油）　丁香（一錢半）　木香（三錢）

右末每五歲用五分好熱酒調下衣被盖煖
少頃痘变紅活而起

和中湯 虛吐不止即鎮胃止吐湯加人參
人參 茯苓 甘草各五分 白术 半夏各八分
陳皮 藿香 砂仁各一錢 生姜水煎服

藿香正氣散 治初熱乾嘔
藿香 紫蘇 大腹皮 陳皮 桔梗 甘草
茯苓 半夏 厚朴 白芷
右姜棗煎服

定痛散 傷寒肚痛及冷氣痛
神麯 香附各一錢 山查一錢 良姜 當歸
甘草各五分 姜三棗二水煎服 手足逆冷加
大附子二分

桂枝芍藥湯 治腹痛
桂枝 炙甘草各一錢 白芍藥酒炒二錢 姜三片棗
二枚水煎服

黃連湯 治熱毒在胃腹痛時或欲吐此藥能升
降陰陽 黃連 炙甘草 乾姜 桂枝各二錢

半夏 人參各八分 棗二枚水煎服

益黃散 胃冷嘔吐而利
陳皮 青皮各二錢 丁香五分 木香三分 訶子七分
右水煎服 一方無木香有荳蔻一錢

堅腸湯 治痘泄瀉不止
黃芪 白术 肉果炮去油各一錢 山查七分 川芎
陳皮各五分 升麻三分
加芽棗三枚水煎服

豆蔻丸 治痘灰白泄瀉清水不止 又方止用
龍骨訶子肉蔻三味治同
木香 砂仁 龍骨 訶子肉 肉果麪煨各五錢
赤石脂 枯礬各七錢半 右末麪糊丸黍米大每
服三十丸米飲下

加味犀角飲 痘已出不匀心煩壯熱口舌生瘡
犀角 牛子 荊芥 甘草 防風 升麻
桔梗 麥冬 水煎服

犀角地黃湯 治諸失血
犀角磨汁入 赤芍藥 生地 丹皮 各等分水

煎服

二寶散 治痘紫色發熱鼻衄小便如血口渴乱
語 犀角 玳瑁 二味磨汁頓服即愈

斬関散 痘紫發熱鼻紅不止
地黄 丹皮 黄芩各五分 升麻三分 藕節
茅根各一錢 菉荳四十九粒 水煎服

梔子仁湯 煩躁譫語驚狂發斑
梔仁 黄芩 石膏各二錢 知母 杏仁各一錢半
大青 柴胡 荳豉 赤芍各一錢 升麻八分
甘草五分 水煎服

人參白虎湯 暑盛煩渴痘出不快又解麻痘斑
疱等熱毒 人參五分 石膏四錢 知母一錢半 炙甘
草三分 加粳米一撮水煎服

竹葉石膏湯 治痘不惡寒壯熱煩渴小水赤澁
石膏 知母 甘草 麥冬 竹葉
右水煎服

麥門冬湯 治斑疹煩渴吐瀉及痂後餘熱
麥冬 人參 甘菊 赤芍 赤茯苓 升麻
各一錢 甘草五分 石膏三錢 水煎服

生脉散 止煩渴首尾通用
人參 五味子 麥冬 水煎當茶飲

參苓白术散 治痘已痂未痂身熱不退煩渴不
止此藥極能清神生津乃治脾虚之聖藥也
人參 白术 茯苓 甘草 乾葛 木香
麥冬 霍香 各等分水煎服

柴胡麥門冬湯 治痘壯熱經日不退
柴胡 麥門冬 甘草 人參 玄參 龍胆
草 水煎服熱退即止 一方無人參

凉膈散 上焦積熱口舌生瘡煩渴
連翹 薄荷 黄芩 梔子 甘草 大黄
朴硝 各等分水煎服 如痰火嗽加桔梗竹
葉蜜一匙

四順飲 治大便秘
大黄 當歸 芍藥 甘草 各等分水煎服

通幽湯 大便秘結
當歸 紅花 生地 熟地 桃仁 升麻

甘草　火麻子　水煎服

通腸散　大便秘結

枳殼　當歸　大黃各二錢　芝麻三錢　牛膝八分

水煎服

葱白湯　治頭疼

連鬚葱白　生姜不拘多少水煎帶温服

當歸六黃湯　治自汗盜汗

當歸　黃芪　黃芩　黃連　黃栢　生地

熟地　各等分水煎服

甘露飲　治牙根腫痛腐爛口臭牙疳出血喉舌

生地　天冬　麥冬　生地　熟地　黃芩

枳殼　石斛　茵陳　枇杷葉去毛炙　甘草

各等分水煎服

吹口丹　治口疳

黃連　青黛　孩兒茶　冰片　為末吹之

赴筵散　口瘡神効

薄荷　黃栢　等分為末入青黛少許搽之

牙疳方　痘後餘毒攻牙根疳腐內宜服甘露飲

人中白煅三錢　枯礬二錢　鹽梅七箇燒存性　麝香一分

白𣰆子灰一錢　五穀虫焙乾二錢　為細末先將葱

茶洗去腐肉須見鮮血然後搽藥

鈎藤湯　痘後口噤僵直遶臍腹痛

鈎藤　紅花　木香　川芎　當歸　白芍

甘草　白朮　青皮　黃連　官桂　生姜

各等分水煎不拘時服

消風散　治痰盛驚搐譫語狂急口張目作上視

羌活　獨活　姜蚕　藿香　枳殼　防風

天麻　地骨皮　蟬退各八分　前胡一錢　柴胡

黃芩　天花粉　桔梗　茯苓　荊芥　紫草

牛子各一錢　人參　川芎各七分　甘草四分

姜棗水煎服

瓜蔞散　治痘熱極生風發搐

瓜蔞根二錢　白姜蚕一錢　慢火全炒老黃色為

末每服二三分薄荷湯下

保命丹　一切驚風發熱

天麻　鬱金　全蝎去尾各五錢　防風　甘草三錢

青黛三錢 白附子炒 姜蚕姜汁炒 薄荷五錢 大半夏炒泳湯浸晒乾又用姜汁浸晒乾又炒 南星製仝上各一兩 辰砂飛五錢為衣

射香五分 鈎藤 牛黃二錢 蟬退 茯神

桔梗各五錢 右末煉蜜為丸芡實大每服一丸

灯心湯下

蟬花散 治痘發熱發痒抓破

蟬退 地骨皮各一兩 為末每服二三匙白酒

服二三次

回漿散 治痘不收漿結痂

何首烏 白芍 黃耆 人參 甘草 白朮

白茯苓 姜水煎服

象牙散 治同上

人參 黃芪 白朮各一錢 甘草七分 茯苓一錢半

何首烏二錢 右加糯米二錢棗二枚水煎調下

象牙末一錢

玄參升麻湯 治溫毒發斑

玄參 升麻 甘草 水煎服

陽毒升麻湯 面赤狂言煩躁腰背疼下利脉浮

喉痛 升麻五錢 犀角 射干 黃芩 人參

甘草各二錢半 右水煎服

陰毒升麻湯 治陰斑

升麻 當歸 川椒 鱉甲 雄黃 甘草

右水煎服

四聖膏 治痘疔挑破以此點之

七粒珍珠火上燒 豌荳七七鍋內炒 男髮

不拘灰多少 加入胭脂真筒好

二聖散 治同上

雄黃二錢 紫草三錢 右研末用油胭脂調下

敷方 痂後痘疔潰爛成坑內見筋骨以此敷之

赤石脂 膩粉 黃柏 杭粉炒 血竭各一錢

飛丹炒分 入髮灰五分 乳香 沒藥各三分 水片三重

伏龍肝一錢 蜜陀僧飛過二錢 有臭氣加阿魏三

四分 右為細末綿帋篩過敷之外用膏藥貼

內服人參敗毒散加川山甲蟬退連翹

人參敗毒散 治餘毒癰腫

人參 赤茯苓 羌活 獨活 前胡 薄荷

柴胡 枳殼 川芎 桔梗各等分 甘草減半
牛旁子 防風 荊芥 連翹 金銀花即荊防敗毒散
頭上加白芷升麻 上身倍加桔梗
手加薄桂 腰加杜仲 腿足加牛膝木瓜
金花散 痘後肥府疥癬等瘡此能收水解毒
黄丹 黄栢 黄芪 黄連 大黄 輕粉
射香 右為細末湿瘡乾掺燥用臘猪油熬化
調敷
必勝膏 治腫毒
馬齒莧搗汁 猪脂膏 石蜜 三味熬膏塗
之即消
三荳散
痘後癰毒初起紅腫 黑豆 赤荳 菉荳用
醋浸研漿時時以鵝翎刷上随手可消
敗草散 治斑爛不止
爛茅草 不拘多少用多年蓋墻屋者經露風
霜年久感天地陰陽之氣善觧瘡毒其功不
能盡述取来晒乾或焙乾為極細末敷瘡上

或攤在蓆上令兒坐卧於上即愈
又方 荔枝殼微燒存性 草紙燒灰存性 多
年敗茅 三味共為細末或搽或掺自能收水
結痂
又方 黄荳壳燒白灰為末掺之 如痘風癬以
荳殼煎湯洗
綿繭散 治爛瘡 治身及肢節疳蝕瘡膿水不
絶 繭子不拘多少將生明礬末裝入満火上
燒令汁乾枯為末掺之
秘傳茶葉方 痘爛遍身無皮膿水流出粘枯衣
被 茶葉要多揀去粗梗入滾水一渫即撈起
再揀去梗湿鋪床上用草紙隔一層令兒睡
上一夜則膿皆乾
乳香韶粉散 痂欲落不落用此薄塗當減瘢痕
又治熱痘瘋遍身膿水不絶
乳香三錢 韶粉一兩 輕粉一錢 右末猪油拌鵝
翎敷上
地黄散 痘毒入眼腫痛赤縷或白膜遮睛

熟地　當歸　防風　蟬退　羌活　白蒺藜
炒去刺　穀精草　木賊各一錢　玄參五分　犀角末一錢
黃連　大黃　炙甘草　木通各一錢半　為細末
小兒每服一字大人二字羊肝湯食後調服
日三夜一忌口將息
蜜蒙花散　治痘入目翳膜遮睛
蜜蒙花　菊花　石决明　白蒺藜　木賊
羌活　右末每服二三錢茶清調下
兎糞散　治痘入眼　亦可煉蜜為丸酒送下三
五十丸　兎糞炒黃為末用蟬退木通甘草煎
湯頓服
兎糞丸　治痘入眼或生翳障
兎糞炒四兩　石決明煅　草决明　木賊去節
白芍　防風各一兩　當歸五錢　穀精草二錢
右末蜜丸菉豆大每服三五十丸荊芥湯送
下
吹耳丹
輕粉　飛丹　為細末左眼翳吹右耳右眼吹

左耳只吹一二次
又方　加雄黃射香少許　外用石燕子一對檳
郎一對二味磨水常服
罩胎散　治姙婦出痘　一方有陳皮枳殼大熱
加欝金
川芎　川歸　芍藥　人參　白朮　茯苓
甘草　柴胡　條芩　防風　荊芥　白芷
葛根　砂仁　紫草　阿膠　桔梗　糯米
水煎服
安胎散
川芎　當歸　白芍　人參　白朮　白茯
甘草　條芩　陳皮　紫蘇　砂仁炒　阿膠炒
香附　艾葉　紫草
各等分加姜棗水煎服
安胎飲
大腹皮酒洗　人參　陳皮　白茯　白芍
紫蘇　砂仁　香附　甘草　加糯米水煎服
胎漏加阿膠百草霜

柳花散　室女發熱經行
柳花五七錢　紫草一兩二錢　升麻九錢　歸身七錢半
右末每服七錢葡萄煎湯調下
鉄箍散　治痘後癰毒
鳳凰退燒灰醋調圍四畔留頭出毒氣甚佳
蕎麥粉法　痘瘡破者用此敷之潰爛者以此遍
撲之極佳　蕎麥粉以絹袋盛撲於瘡上或以
此襯於床褥上
温粉撲法　治汗出不止

黄連　牡礪粉　貝母各末五錢　粳米粉一升　和勻
絹袋盛周身撲之
蟬花散　治爛痘生疽虫及夏月諸虫咬傷臭惡
不可近者服之虫皆化而為水蒼蠅亦不敢近
蟬退洗淨焙　青黛澄去灰土各五錢　北細辛二錢半　蛇退一兩
燒存性　右為細末每服三錢酒調下仍以生寒
水石細末掺之
青黛散　治痘未作膿痛甚心鬲煩躁睡卧不安
並宜服之　真青黛如棗核大水調服之即安

樺皮散　治痘瘡及乳癰并一切腫毒　若治乳
癰取樺皮燒存性為末酒調服之立消
獨勝散　治早晨微熱晚發大熱目黄脇動身熱
手冷瘛甚如驚者又名牛旁姜蚕散
牛旁子五錢　白姜蚕二錢　紫草二七寸　水煎服速
進三四服其痘便出盖姜蚕治遍身癮疹疼
痛牛旁發痘透肌紫草利竅要知痘疹無虛
寒証者服此痘立出也

蘿蔔湯　治痘疹出不快者
右用開花蘿蔔煎汁時時飲之　盖痘疹氣勻
即出快蘿蔔治嗽定喘下氣消脹解毒
紫河車散　治小兒痘瘡毒氣不解上攻咽喉声
音不出舌頰生瘡過逆煩悶潮熱面赤
紫河車即金線重樓　茜根　貫衆各三錢　白芍藥
甘草炙各五錢　右每服三錢生姜一片水煎服
一方有牛旁子
野通散　治痘瘡出不快及傷寒不語

乾野人糞(即猳糞火燒存性)　氷片　真麝香(各等分)
右為細末每服五分看大小用新汲水入蜜調下十歲以上者服一錢　按野人糞治蜘蛛咬瘡此治痘出不快大効盖蜘蛛咬瘡久而不愈其絲生皮膚延蔓遍身不愈者加雄黃青黛水調以蜘蛛試之立化為水屢驗盖此三味是治瘡疹當用之藥取山中者若人家所養之猴食物味雜即不効失其本真也

南金散　治痘巳出而復㿈其勢甚危諸藥不効者萬無一失本家印貼此方施人全活甚衆

紫背荷葉(霜後搭水紫背者)　白姜蚕(洗去系炒乾)
右為末等分每服看大小大者一錢小者五分研芜荽汁和酒𣲖米飲亦可　治此痘多有用龍腦人牙者李難措辦惟此無毒而効且速但紫背者甚難得可於藍舖內尋之

橄欖飲　治倒黶
橄欖從中截断水服少許服之立發

乳香猪血膏　治痘不起發
乳香(研末)　猪心血搗為丸櫻桃大每服一丸水磨化下

鈎藤紫草散　治痘疹不快
鈎藤鈎子　紫草茸　等分為細末每服三五分温酒調下盖紫草滑竅利小便散十二經毒氣鈎藤治小兒寒熱十二驚癇縁驚癇出於心肝瘡疹亦心所主也

鵶片散　治痘當起脹灌膿時泄瀉不止諸藥不効者如神　真鵶片(一錢)　蓮肉(炒一錢)
右每服半分或一分米飲調下立止

葛根黃芩湯　治喘有汗發熱咳嗽
乾葛　黃芩(各二錢)　黃連　芍藥　石膏(各一錢)
五味子(十一粒)　甘草(五分)　水煎服

五味子湯　治喘促而厥
五味子(一錢半)　人參(一錢)　麥冬　杏仁(各二錢)
右姜三片棗三枚水煎服

清肺飲　治咽乾声啞
麻黄(一錢半)　麥冬(二錢)　知母　天花粉　荊芥

各一錢 訶子 菖蒲各八分 桔梗二錢
水煎入竹瀝姜汁服

天花散 治痘後失音
天花粉 桔梗 茯苓 訶子 石菖蒲
甘草 各等分竹葉七片荊芥一寸水煎服

補肺散 治痘未出声啞
阿膠一錢半蛤粉炒成珠 牛子炒三分 杏仁去皮尖三粒
甘草十二分 馬兜鈴 黃芪各五分 糯米炒一錢
水煎食後時時嚥之

利咽解毒湯 治痘咽喉痛首尾皆可用
山荳根 麥冬各一錢 牛子炒 玄參 桔梗各七分
甘草二分 防風五分 菉荳四十九粒
右水煎服

三黃熟艾湯 痘後咽寒喉痺
黃連 黃芩 黃柏 艾葉 各等分水煎服

玉鎖匙 咽喉腫痛或帝鍾拖下不收及喉舌攝
硬 硼砂一錢 朴硝五分 姜蚕一條 氷片半分
為末吹入

羌活當歸湯 治腰背痛初發熱時便宜服之
羌活 當歸 獨活各一錢 柴胡一錢五分 桂枝七分
防風 川芎 黃柏各一錢 桃仁 紅花各八分
酒水各半煎服 又方治腰痛有蒼朮漢防
已

如神湯 治腰痛
當歸 桂皮 玄胡索 各等分為末酒下二
三錢

活血解毒湯 治餘毒

防風 荊芥 生地 赤芍 當歸 連翹
牛子 黃連 紫草 甘草 蒼朮 薄荷
川芎 木通 各等分水煎服

胎元散 痘不起發不紅潤是血氣俱虛
胎元焙乾為末加射香少許酒調服三五分

水楊湯 治痘乾魁不起者
水楊柳 春冬用枝秋夏用枝葉生水边細葉紅梗枝上有圓葉滿葉有白鬚放出俗名水楊梅
右以枝葉切碎水煎七八沸先將一分
置盆內手拭不寒不熱令痘兒先服內托之

剃然後浴洗漸漸添湯不致太冷浴洗久許乃以帋撚火照之纍纍然有起勢起處覔有暈暈肉系乃漿影也如漿不滿再浴若弱者只浴頭面手足可也既不赤躰不厭多洗灯照如無起勢乃氣血敗無生意矣

温膽湯　治痘血寒顏色灰慘血凝不活腹脇脹滿面青筋縮嘔清水或瀉青菜色

白茯苓　橘紅　半夏　甘草　枳实(麸炒)

各等分竹茹一錢姜棗水煎服

陳氏木香散　治痘氣寒臭流清涕咳嗽悪風白汗身躰寒戰瘡色慘白

木香(臨時磨服)　大腹皮(黑豆汁洗净)　人参(各三錢)　赤茯苓

前胡　青皮(去穰炒)　半夏(泡七次)　丁香　訶子肉

炙甘草(各二錢半)　灯心(一錢半)　每服三錢姜棗水煎服看大小加減

中和湯　治仝上

人参　黄蓍　厚朴(姜汁炒)　白芷　川芎

當歸　粉草　桔梗　白芍(酒炒)　肉桂(去粗皮)

防風　霍香　各等分酒水各半姜棗煎服

瀉肺散　治痘氣熱臭乾燥皮毛枯槁咳嗽瘡色焦紫即瀉白散

桑白皮(蜜炙)　地骨皮　甘草　各等分加竹葉二十片灯心水煎服

清肺飲　治症仝前

麥冬　桔梗(各二錢)　知母　荊芥　天花粉(各一錢)

石菖蒲　訶子肉(各八分)　水煎服

清金湯　治口氣臭

知母　黄芩　石膏　桔梗　甘草　天門冬

麥冬　馬兜鈴　木通　山梔　天花粉　各等分水煎服

解毒托裏散　治痘稠密

桔梗　牛旁子　人中黄　防風　荊芥穗

酒紅花　歸尾　蟬退　升麻　乾葛　赤芍

連翹(去心)　各等分水煎入燒人屎調服

四物快斑湯　治痘火盛乾燥

當歸　川芎　赤芍　生地　荊芥穗　牛子

升麻　葛根　連翹　紫草　地骨皮　水煎
入燒人屎服
四君快斑湯　治痘氣虛滛湿
人參　黃耆　白朮土炒　茯苓　甘草　桂心
白芷　荊芥穗　防風　陳皮　白芍酒炒
各等分水煎服
大補保命湯　治痘皮嫩易破者
人參　黃耆　當歸　生地　川芎　赤芍
甘草　牛蒡子　防風　荊芥穗　連翹

二八卷　四九

官桂　水煎入燒人屎服
清金導赤飲　治痘熱乘肺金當痂不痂作喘煩
躁譫語小水不利甚危
當歸　白芍　陳皮　貝母　軟石膏　白茯
苓　甘草　黃芩酒炒　黃連酒炒　杏仁　桑白
皮蜜炒　枳殼炒　木通　滑石　麥冬　車前子
人參　玄參　各等分水煎服
人參固肌湯　治痘表發太過致肌肉不斂痘痂
粘肉久不落者

人參　黃耆　甘草　當歸　蟬退
各等分入糯米一撮水煎服
人參清神湯　治痘痂不落昏迷沉睡者
人參　黃耆　甘草　當歸　白朮土炒　麥冬
陳皮　酸棗仁　黃連酒炒　茯苓　各等分加
棗糯米水煎服
馬齒莧散　治痘痂不落成斑痕者
馬齒莧搗汁猪脂膏石蜜共熬膏塗腫處
當歸桂枝湯　治痘後手足不能屈伸

二八卷　五十

當歸　川芎　黃耆　甘草　薄桂　黃柏
蒼朮炒　各等分水煎　如氣虛少加川烏以
行經加人參為主　如感風寒以致骨節疼
痛加羌活防風
玄參化毒湯　治痘後赤遊丹毒
玄參　歸尾　紅花　連翹　軟石膏　赤芍
防風　地骨皮　木通　荊芥穗
各等分加竹葉水煎服
蠶退散　敷牙疳

枯礬 塗（即尿桶中垢也火煅白色） 五倍子（各二錢） 蚕退（燒存性）一 為細末先以米泔水用蟒蟷虫翻轉蘸

水洗浄瘀血以藥敷之

黃連陰慝丸 治狐惑瘡

黃連（二錢） 芦會 乾蟾（煅各一錢二分） 史君子肉（二錢）

蕪荑（一錢五分） 川楝子肉（一錢）

右末烏梅洗浄去核搗膏和丸米飲下

蜆子湯 治痘後發癒

蜆子不拘多少活者以水養五七日旋取其水洗之蜆衣煮湯亦佳

十三味敗毒散 治痘毒

當歸 白芷 川山甲（土炒） 金銀花 防風

乳香（製） 甘草 陳皮 赤芍 皂角刺

貝母 没藥（製） 天花粉 各等分酒水各半

煎服

涼肝明目散 痘後羞明

當歸 龍胆草 密蒙花 川芎 柴胡

防風 酒洗 各等分雄猪肝煮湯煎服

望月沙散 痘後暗室中不能開者

穀精草 密蒙花（酒洗） 蟬退（去翅足各五錢） 望月沙（一兩）

右為末雄猪肝一兩竹刀批破用藥一錢摻入肝内水煮熟飲汁食肝効

羊髑骨髓 治痘痂欲落不落瘢痕

羊髑骨髓（一兩） 煉入輕粉一錢研成膏塗之

小靈丹 解毒發痘之聖藥治紅斑黑陷不起一切危悪如服此而不見効者决無可生之理矣

硃砂 雄黃（各二錢） 乳香 没藥（各製一錢半）

大蟾蜍（取心肝尾上焙乾五錢） 射香（三分） 為細末取猪心血雞冠血丸皂子大每服一丸 身無大熱生酒化下 熱甚不飲酒紫草灯心湯下即時紅活而起

神効散 治痘作渴

人参 黃芪 甘草 牛蒡子 紅花 生地

前胡 紫草 白芍 水煎服

紅花湯 治仝上

紅花子隨意煎湯飲其渴即止縱口中如烟

飲之即止 加牛旁子尤妙

加味鼠粘子 治咽中有瘡作嘔

桔梗 射干 山荳根 防風 乾葛 陳皮

荊芥 連翹 水煎細細呷之

灯心竹葉湯 治乾嘔

竹葉三十片 灯心三十根 水煎服

潤腸湯 治虛秘

歸梢 甘草 生地 火麻仁 桃仁泥

水煎服

拔毒膏 治痘疔

雄黃研 胭脂重浸水令濃調雄黃點疔痘上立時紅活亦神法也盖雄黃能拔毒胭脂能活血也

涼血地黃湯 室女出痘遇經不止熱入血室

當歸 川芎 白芍 生地 白朮 升麻

黃連 甘草 人参 山梔仁 玄参

水煎服

涼血解毒湯 治女人出痘非經期於發熱時而血忽至

當歸一錢二分 白芷五分 升麻四分 紫草一錢半

紅花一錢 赤芍一錢 桔梗八分 連翹三分

灯心二十根水煎服

當歸養心湯 治女人出血口瘖不能言者

人参 當歸 麥冬 甘草 升麻 生地

各等分加灯心水煎服

瀉肝散 女人經水不断適逢出痘發熱昏沉言語狂妄 羌活 川芎 防風各八分 當歸一錢

山梔仁 龍胆草各五分 大黃酒蒸三次一錢

水煎服 一方有木通柴胡黃芩

歸脾湯 女人經閉不通血海乾涸適逢出痘以此調其心脾不使血妄行加柴胡山梔名加味歸脾湯 人参 白朮 茯神 黃耆 遠志

地骨皮各一錢二分 甘草二分 木香五分 酸棗仁一錢

姜棗煎服

逍遙散 女人出痘寒熱不時經水不調服此其血不致妄動 白朮 茯苓 當歸 芍藥

甘草　柴胡　各等分加棗一枚水煎服　加
丹皮山梔名加味逍遙散
如聖散　姙婦出痘安胎
白朮　黄芩　當歸　枳殼　黑荳　大腹皮
砂仁　甘草　桑上羊兒藤即桑寄生　各等
分水煎服
黑神散　婦人出痘分娩後瘀血作痛
當歸　川芎　熟地　炮姜　桂心　蒲黄炒
香附童便炒　木香　青皮　黑荳　酒水各半

煎服
原疹
生生子曰麻疹浙地呼為瘖子又曰沙子吳地呼為疹子新安呼為麻總由有生初之溪火伏於命門之間命門具太極之理而陰陽五行繫焉臟腑之所由生也蓋五行一陰陽陰陽一太極也天之與人咸相感通由其通故天寒而人身寒天熱而人身熱也天之癘氣一動則所禀之毒隨感而發陽感之則疹出焉陰感之則痘出焉陽浮而淺故疹易出易歛陰凝而深故痘難出難痂陰陽二切之毒盡出則向安矣余故曰人之出疹出痘猶蚕之一眠二眠三眠也痘雖出於陰而實成於陽以氣為之固也疹雖出於陽而實藉於陰以血為之資也何見之痘非氣行則血不附安得結痂疹非血濟則氣失依焉能收歛斯陰陽升降之理一闢必一闔血之附氣氣之依血陰根於陽陽根於陰陰陽互為其根也前人謂痘出於臟不知指何臟疹出於腑

不知指何腑而云之也又謂疹出心肺故鼻涕而咳嗽余謂此皆臆度套詞而非有真知一定之見也既曰疹出於腑心肺獨非臟乎按內經鼻為肺之門戶通天氣陽毒上發熱毒薰蒸蓋心肺位尊高上又肺主毛竅毒從竅出是干於肺而非出於肺也要知痘之與疹皆出於命門之陰陽也　右釋麻疹
一發熱之初彔似傷寒惟疹則嗽咳噴嚏鼻流清涕眼泡腫其淚汪汪面浮腮赤悪心乾嘔為異

耳但見此候便宜謹避風寒戒葷腥厚味急表散之使皮膚通暢腠理開豁而疹毒易出也

一疹痘之發雖曰胎毒未有不由天行疠氣故用藥必先明歲氣兼之時令如溫煖時月以辛涼發之如防風解毒湯暄熱時月以辛寒發之黃連解毒湯大寒月以辛溫熱劑發之桂枝解毒湯時寒時煖以辛平之藥發之升麻葛根湯此因時投劑不可悞作傷寒妄施汗下而伐天和也又須看人虛實如大便秘結煩熱甚而發不出者以酒大黃微利之吐利不止以參苓之類補之

一用前藥發散而疹隨見為美若發不出再加發之如加味麻黃散之類外以芫荽酒糟蒸熱擦之看其疹自頭至足為之出齊頭面愈多為佳若遲延日久而不出則腹脹氣喘昏眩悶亂煩躁而死矣

一看疹之法多於耳後項上腰腿先見其頂尖而不長其形小而均淨淡紅為吉若色紅甚兼火化也化斑湯主之人參白虎湯佐之如色白者此血不足也養榮湯如色紫赤乾燥暗晦乃火盛毒熾宜六一散解之四物湯加柴胡黃芩乾葛紅花牛旁子連翹之類滋陰涼血而熱自除所謂養陰退陽之義也此亦五死一生之症外大青湯玄參解毒湯皆可選而用之若黑色者則熱毒尤甚為十死一生之症須明察之勿妄施治

一表後看疹隱隱然見於肌膚成片切忌風寒生冷如一犯之則皮膚閉塞毒氣壅滞遂变為渾身青紫而毒反內攻煩躁腹痛氣喘悶亂諸症作矣欲出不出危亡立至

一疹已出而忽沒者乃風寒所遏而然也若不早治毒成內攻必致痒溺而死急用消毒飲合升麻湯熱服則復出而安矣

一發熱之時遍身汗出者此毒從汗散玄府開疹易出也有鼻中血出者此毒從血解也俱不可遽止之若汗出太多血出不止者此又火甚逼

迫太過致液妄流妄行矣急宜當歸六黄湯加浮小麥以止汗茅花湯加玄参百草霜以止血遲則汗出多而元氣虛血出多而精神散為不治之症矣

一發熱之時或嘔吐或自利或滯下者蚪火邪内逼毒氣上行則吐下行則利毒甚則裏急後重而為滯下也吐者竹茹石膏湯利者升麻澤瀉湯滯下黄芩芍藥湯加黄連生地木通人参枳殼或少加大黄微下之

一發熱之時未有不口渴者但宜以菉荳灯心炒米湯飲之人参白虎湯佐之取生津解毒而已若恣飲冷水恐生水畜之症故水入於肺為喘為咳宜用葶藶子以洩肺中之水水入於脾為腫為脹為自利水入於胃為嘔為利宜用猪苓澤瀉茯苓以瀉脾胃之水水入於心為悸為驚宜赤茯苓灯心湯以洩心下之水水入於肝為脇痛用芫花以洩之水入腎與膀胱為小便不利為陰囊腫用車前子木通以洩之皆當隨症而治

一疹出之時咽喉腫痛不能飲食者蚪毒火拂鬱上薰也宜甘桔湯加玄参牛旁連翹更以十全散玉鎖匙吹之不可妄用鍼出血也

一疹出之際咳嗽口渴心煩者蚪毒在心肺發未盡也瀉白散加天花粉連翹玄参黄連以瀉之或黄連杏仁湯

一疹出之時自利不止或瀉稀水頻數者有吉有凶但要看其疹若遍身稠密太盛或紫色或紅色蚪則為吉盖毒在大腸非瀉則毒不解惟用平胃散加葛根連翹以解之而已疹一發透依期而收瀉自止也若疹已收而瀉尤未止者驗其躰熱疹必未盡再用前藥加連翹黄連牛旁木通澤瀉以分利之六一散亦妙絶若用訶子肉果等澁滯之劑則变喘急腹滿痞脹不治之症矣若疹色淡而躰不熱口不渴大小便利飲食少進蚪為凶乃虛寒之症方可温補或兼收澁

一疹出常以六時辰即收為率如子時為陽午後收午後為陰子後即收乃陽生陰成陰生陽成造化自然之妙也故漸出而漸收者其勢輕可若一出之後熱不退連綿三四日而不收者此毒火太盛外發未尽内有餘邪所致須以化班湯三味消毒飲加玄參石膏桔梗為治

一疹出後自然熱退若遍身既出而猶拂拂煩熱頰作嘔吐者此毒尚未尽畱連於肺胃之間宜化班湯如大便秘少加大黄微利之

一疹已收去渾身反發熱日夜不退此毒未尽解邪火欝於肌肉之間久則毛髮焦乾皮膚枯槁肌肉消瘦為骨蒸癆瘵之症宜芦會肥兒丸加龍胆草當歸連翹等治之遅則有变睡則露睛口鼻氣冷手足厥逆瘈瘲慢脾風為不治之症矣

一疹收之後身雖不見羸瘦但時發壯熱煩躁不寧搐掣驚悸神昏悶乱者此陰血衰耗致餘毒入肝而傳於心也宜養血安神四物湯加麥門冬酸棗仁淡竹葉灯心甘草石菖蒲龍胆草茯神黄連辰砂為治或以前藥為末用飥餅猪心血為丸服亦可

一疹毒入胃久而不散致成牙齦黒爛血出為走馬疳傳於兩頰浮腫久而穿頰破腮缺唇破鼻為崩砂狐惑等危症矣外用文蛤散雄黄散搽之内用人中白芦會史君子龍胆草黄連五灵脂飥餅為丸滚水服之以清胃火亦或有得生者但不多見也

一疹出之時曾作瀉痢未經清解至疹退之後变為休息痢不問赤白裏急後重日夜無度此餘毒在大腸也須分虚實治之實者三黄丸利之或香連丸和之後用黄芩湯虚者從補

一疹退之後微〻咳嗽者此餘毒未尽也用清肺飲加消毒飲主之若咳甚氣喘連声不住名為頓嗽甚至飲食湯水俱嗆出或咳出血者此熱毒乘肺而然也宜多服麥門清肺飲加連翹若見胸高如龜背作喘血從口鼻出摇首插頭面

色或白或青或紅或枯黯者乃不治之症然亦有肺氣為毒所遏而發喘連声不已但無嗽咳血出飧食之症者宜用清肺飲倍加人参治之尤不可拘於肺熱之一端而純用清肺解毒之藥

一疹退之餘声唖不出或咳或喘或身熱不退以致日久而不愈者此熱毒未尽肺金受尅故也宜清金降火湯加竹瀝姜汁主之

一疹退之後飲食如常動止如故而卒然心腹絞痛遍身汗出如水者此因元氣虛弱失於補養外雖無病裏實虛損偶然為悪氣所中謂之中悪此朝發夕死之症間有用蘓合香丸而甦者

一疹退之後有餘熱未尽或發癰毒肢節疼痛者以羌活散微汗微利

一疹退之後有餘熱未尽或熱甚而失血者犀角地黄湯合解毒湯或四物湯加茵陳木通犀角之類以利小便使熱氣下行而愈

一疹收之後餘熱未尽日夜煩躁譫語狂乱者辰砂益元散灯心湯下或辰砂五苓散加芩連治之若初起煩躁譫語者升麻葛根湯調辰砂益元散主之

一麻疹一症比之出痘似輕然調治失宜其禍反不旋踵蓋痘由胎毒而發其形勢多少輕重吉凶自可預斷至疹之出則雖由感受邪氣而發然其輕者可重重者可輕皆在於調治有方故其飲食禁忌比痘尤甚若誤食雞魚則終身皮膚粟起如雞皮之狀但遇天行出疹之時又令重出誤食猪肉則每歳出疹之月必然下痢膿血誤食塩醋致令咳嗽則每臨出疹之月必復咳嗽誤食五辛之物則生驚熱不時必待四十九日或百日後方無禁忌也

一孕婦麻疹但當以四物湯倍加白术條芩艾葉安胎清熱為主使胎無虞而疹易没也如胎氣上衝急用苧蔴根艾葉煎湯磨枳椥并服之更多服上藥為妙

一熱毒薫胎胎多受傷而母實無恙也蓋疹與痘

不同痘宜內實故胎落而母亡疹宜內虛故胎下而母安雖與其胎去而母存孰若子母而全之為愈也

麻疹輕重不治三症要訣

或熱或退五六日而後出輕　發透三日而暫沒者輕　頭面多而匀淨色澤者輕　頭面不出者重　紅紫暗燥者重　咽喉腫痛不食者重　冒風沒早者重　移熱大腸变痢者重　黑暗乾枯一出即沒者不治　鼻扇口張目無神者不治　鼻清糞黑者不治　心前吸氣喘者不治

水痘症

夫水痘亦類傷寒之狀身熱二三日而出或咳嗽面赤眼光如或噴嚏或唾涕與正痘不同易出易靨不宜燥濕藥或燥之恐結痂多变成瘡之症

麥湯散　古本只此一方或作湯服亦可

地骨皮　活石　甘草各五分　甜葶藶　麻黄　大黄　知母　羌活　人参各一錢　右為末每服五分用小麥七粒煎湯調下

防風葛根湯治痘發癮疹　及疹麻發熱

防風　葛根　升麻　赤芍　甘草

各等分水煎服

防風解毒湯　治麻痘初發熱如時令温煖用此辛凉之藥發之

防風　薄荷　荊芥　石膏　知母　桔梗　牛子　甘草　連翹　木通　枳殼　竹葉　灯心各等分水煎服

黄連解毒湯　治麻痘初發熱如時令暄熱用此辛寒之劑發之

黄連　黄芩　黄栢　山梔　牛旁子　甘草　防風　荊芥　知母　石膏　桔梗　玄參　木通　姜三片水煎服

桂枝解毒湯　治麻痘初熱如時令大寒用此辛温熱之劑發之

桂枝　麻黄酒炒　赤芍　防風　荊芥　羌活

甘草 桔梗 人參 川芎 牛子
生姜水煎服
升麻解毒湯 治麻痘初熱如時煖時寒用此辛
平之劑發之
升麻 葛根 羌活 人參 紫胡 前胡
甘草 桔梗 防風 荊芥 牛旁子 赤芍
連翹 竹葉 水煎服
加味麻黃散 麻痘發不出以此發之
升麻酒洗 麻黃酒炒 人中黃 牛旁子 蟬退

各等分水煎服
化班湯 治麻痘色紅
人參 知母 石膏 甘草 牛旁子 連翹
升麻 地骨皮 竹葉 糯米 水煎服
養榮湯 治麻痘色白
人參 當歸 紅花 赤芍桂水炒 甘草
水煎服
大青湯 麻痘紫赤暗晦乾燥
玄參 大青 桔梗 人中黃 知母 升麻

石膏 木通 梔子仁 水煎入燒人屎服
如大便秘加酒大黃
茅花湯 治麻痘鼻衄
茅花 歸頭 丹皮 生地 甘草 各等分
水煎服
竹茹石膏湯 治麻痘嘔吐
橘紅 半夏 石膏 白茯苓 竹茹 甘草
右水煎服
升麻澤瀉湯 治麻痘自利

猪苓 澤瀉 滑石 赤茯苓 甘草 黃連
酒炒 升麻 各等分水煎服
黃芩芍藥湯 治麻痘滯下
條芩三錢 白芍 升麻各一錢 甘草一錢
水煎服
十全散 麻疪咽喉腫痛
黃芩 黃連 黃栢 苦參各一錢酒炒 玄胡索
三分 硼砂 乳香各二分製 孩兒茶 雄黃各五分
共為細末每用少許吹入

芦會肥兒丸　麻後發熱日夜不退肌肉消瘦骨蒸癆瘵

芦會　龍胆草　木香　蚵皮　人参　麦芽炒　使君子肉各二錢　檳榔　黄連酒炒　白蕪荑各三錢　胡黄連五錢

右末猪胆汁糊為丸黍米大每服五六十丸米飲下

文蛤散　麻毒入胃牙肉黒爛出血走馬疳症

雄黄五錢　五棓子二錢　枯凡五分　蚕退帋燒存性一錢　右細末米泔水洗净以藥搽之

雄黄散　治仝上

雄黄一錢　黄栢二錢　射香一分　先用艾湯净洗後搽藥

麥冬清肺飲　麻後咳嗽出血或嗆湯水

知母　貝母　天門冬　桔梗　甘草　杏仁　牛旁　石膏煅　馬兜鈴蜜水炒　糯米　右水煎服

清火降火湯　麻後熱乘肺金声唖不出或咳或喘　當歸　白芍　生地　陳皮　貝母

瓜蔞仁　甘草　白苓　枯芩酒炒　山梔炒

玄参　天冬　麥冬　杏仁　桑白皮　石膏

紫蘇梗　酒連　右各等分姜一片水煎服

生生子曰麻疹咳嗽喘急每用瘂門中大小無比散每服五七分大者一錢即刻喘定而睡醒後神安氣和而愈屢用屢騐乃熱毒從小便出也

加减四味升麻湯　此升發之劑但一二帖則止不可過表　升麻　葛根　赤芍　甘草

防風　桔梗　紫蘇　蒼朮　陳皮　枳殼

紫胡　姜枣煎服

水痘赤痘即妙一服而愈不必他方雜治

終

赤水玄珠第二十九卷目録

外科小引
五發癰疽論
背疽其源有五
疔瘡
雜瘡
癬
瘡科總論
華佗癰疽瘡腫論
五發癰疽通治方
反花瘡
婦人陰瘡
臁瘡

赤水玄珠第二十九卷

新安生生子孫一奎著輯

外科門小引

生生子曰外科最重者莫如癰疽最急者莫如喉風疔腫患之者生死立見其餘瘡瘍皆可緩圖非若上三証急若風火也究其受病之源經曰營氣不從逆于肉理乃生癰腫又曰膏粱之変足生大疔又曰六府不從畱結為癰又曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火大抵皆氣血虛弱藴欝熱毒調養失宜之所致也予固非專門外科盖常咨訪推究頗知治法大躰兹採前人所論癰疽証治載列卷首疔瘡腫瘍次之陶節庵癰疽經薛立齋外科精要二書實外科權輿業是者不可不使之隨囊檢視能熟此二書鮮有敗事予固特舉歷試有功者揭出以告同志云

瘡科總論

夫癰疽瘡癤者皆由氣血不和喜怒不時飲食不節寒暑不調使五臟六腑之氣怫欝于內以致陰

陽乖錯氣血凝滯而發也亦有久服丹石燥熱之藥熱毒結深而為癰疽也夫癰疽之疾多生於膏粱富貴之人以其平昔所食肥膩炙煿安坐不勞嗜慾無節以致虛邪熱毒內攻煎熬氣血而成也癰者壅也大而高起屬乎陽其脉浮數疽者沮也平而內發屬乎陰其脉沉數瘡者總名也癤者有頭小瘡也經云諸痛痒瘡皆屬心火蓋心主血而行氣若氣血凝滯挾心火之熱而生癰疽之類也然所感有淺深故所發有輕重大小之不同也六

八十九卷　二

府積熱騰出於外肌肉之間其發暴甚皮腫光軟侵裹廣大者癰也五臟風毒積熱攻注於肌骨其發猛惡初生一頭如㾦瘟白色焦枯觸之而痛應心者疽也熱發於皮膚之間浮腫根小不過二三寸者癤也夫癰發於六府若燎原之火外潰肌肉疽生於五臟沉澁難療若陶室之燧內消骨髓癰則易療惟難將息而遲瘥疽則難療而易痊夫諸癰之中惟背疽疔瘡最為急症其次莫如腦疽腸癰喉癰之類亦其急者也至若瘰癧懸癰痔漏諸

瘡之類其証可緩而治也又有疥癬癮瘮風府之類雖云俱屬瘡類而其輕重緩急自有不同也夫癰疽之疾要須察其是虛是實是冷是熱或重或輕對証用藥無失先後次序凡人年四十以上頭項鬢顖背膂腰脅或筋骨之上所視不見之處稍有瘡癤便不可輕易待之若視之怠慢以為常疾每見至微至著喪命者多矣便宜速急治之庶幾得救譬之救火初起則易救至于燎原之勢不可撲滅矣其理亦由是也凡瘡未破毒攻臟府一毫

八十九卷　三

熱藥斷不可用此是先後次第之妙訣也夫瘡有五善七惡不可不辨若動息自寧飲食知味一善也便利調勻二善也膿潰腫消色鮮不臭三善也神彩精明語声清亮四善也脉氣和平五善也如煩躁時嗽腹痛渴甚泄利無度小便如淋一惡也膿血大泄焮痛尤甚臭惡难近二惡也喘粗短氣恍惚嗜卧三惡也未潰先黑久陷面青唇黯便汚者四惡也肩項不便四肢沉重五惡也不能下食服藥而嘔食不知味六惡也声嘶色脫唇鼻青黑

面目四肢浮腫七悪也更有氣噫痞塞欬逆身冷自汗無時目瞪耳聾恍惚驚悸語言頻錯皆悪證也五善見三則差七悪見四必危若五善并至則吉而安七悪全見必危而死矣已上所論大綱其諸証候治法列論于後

五發癰疽論

夫五發癰疽者謂發背發腦發鬢發眉發頤是也人之一身血氣周流而無間稍有壅聚莫不隨所至而發焉又豈特五者哉夫發背者乃五臟風熱

六府邪毒灌于筋骨之間發于經絡之内榮衛虚損氣血衰殘所致也其發初如粟米大最不可輕忽後必大發也若初起紅腫高起者後必不為害故曰外形如粟中可容谷外貌如錢裏可着拳如悪毒深淵膿血交粘用藥可痊若膿臭穢無絲此血敗氣衰陽絶陰盛必难療理治初起或陰塌不起便可用艾多灸或隔蒜灸之如痛灸至痒如痒灸至痛此最妙法也若疽瘡已成亦可用火針烙開瘡口則易治也若瘡高起為癰則易治平陷為

疽則难治癰疽形症已具前總論中茲不復論至如發腦發眉發鬢發鬚發頤地位不同然皆由内臟伏陽結滞邪毒上壅隨其經絡地分而發也其諸發癰初起皆宜宣散熱毒要須看人元氣虚實而治之庶不悞矣若元氣實者亦可用大黄之劑泄去毒氣或用漏芦五香連翹之類皆可用内托十宣之類補之亦有陰瘡寒塌不起雖云用灸然亦不可服寒凉之劑亦宜以煖藥温之全在活法不可執一也其敷貼洗藥具方于下隨症用焉

外科精要曰癰疽既灸即服藥以護腑臓如護心散凡有疽疾早進数服使毒氣外出而無嘔吐之患否則咽喉口舌生瘡或黒爛如菌若瘡發四五日之後宜間用別藥治之

又曰護心散乃解金石發疽之藥若發熱焮腫作渴飲冷而嘔者宜之若發熱焮腫作渴飲湯而嘔者不宜用之蓋脾虚停痰或寒邪内侵或痛傷脾胃宜用六君子湯若喉舌生瘡或口乾作渴或小便頻数宜用六味丸大凡諸瘡作嘔若飲冷便秘

是熱毒也黄連消毒散解之飲冷便和是胃火也竹葉石膏湯清之懶食飲湯是胃虚也補中益氣湯補之大便不實喜飲熱湯是脾胃虚寒也六君子加炮姜以温之常見脾胃虚弱者用護心散反致胃寒嘔惡其喉舌生瘡乃腎水枯涸虚火炎上其証甚悪急用加減八味丸多有得生者

又曰癰疽嘔逆是毒氣冲心非脾胃之冷當服内托散楊氏云臭䘐初愈不曾表汗毒在經絡則背大疽自肩下連腰脇腫硬如石其色紫黑以凉藥投之終夜大嘔連進托裏散嘔止瘡潰赤水淋漓四十日而愈又有患瘰者痛過輙嘔服托裏即止今有疽病不服此藥者故引楊氏之言以解世人之惑

華佗癰疽瘡腫論

夫癰疽瘡腫之作皆五臟六府蓄毒不流非獨因榮衛壅塞而發也其行也有處其止也有歸假令發於喉舌者心之毒發於皮毛者肺之毒發於肌肉者脾之毒發於骨髓者腎之毒發於下者陰中之毒發於上者陽中之毒發於外者六府之毒發於内者五臟之毒故内曰壞外曰潰上曰從下曰逆發於上者得之速發於下者得之緩感於六府則易治感於五臟則难瘳又近骨者多冷近膚者多熱近骨者久不愈則化成血蠱近膚者久不愈則傳氣成漏成虫則多痒少痛或先痒後痛成漏則多痛少痒或不痛不痒内虚外實者多痛少痒血不止則多死潰膿則多生或嘔逆無度飲食無時皆癰疽使然症候多端要當詳治

薛立齋曰瘡瘍生虫乃肝經風熱其成漏乃元氣虚弱其出血乃脾虚有火其潰膿乃元氣充實至於嘔逆等証屬脾胃虧損所致當調補元氣庶保無虞

背疽其源有五

一天行二瘦弱氣滞三怒氣四腎氣虚五飲冷酒食炙煿服丹藥

治癰疽用藥大綱

一初患癰疽便服内托散以免後来口舌生瘡仍

用騎竹馬或隔蒜灸
一服五香連翹湯如大便祕快即止仍量人虛實
一癰疽潰後宜服排膿內補散若嘔逆木香湯下
一癰疽初作便宜灼艾及麥飯石膏塗四圍中留
口出毒如瘡小通傳之既潰用神異膏帖之
一癰疽已潰日用猪蹄湯淋洗將愈之際三日一
次
一癰疽將歛宜用神異膏如壽木不可遽用生
肌之劑
一癰疽將安宜用加味十全湯補其氣血庶肌肉
易生
一背疽多先渴而後發或先疽而後渴不救者多
矣若服加减八味丸非特杜絕渴疾抑亦大滋
氣血生長肌肉
一癰疽嘔逆有二一因初發不服內托散伏熱在
心一因脾氣不正伏熱在心者則心煩身熱嫩
腫作痛宜用內托散三兩服之脾氣不正者則
不煩熱或聞穢氣作嘔宜用嘉禾散如有寒熱

用不換金正氣散五更初兼服山藥丸以補腎

癰疽用香藥調治論

伍氏曰氣血聞香則行聞臭則逆大抵瘡瘍多因營氣不從逆於肉理鬱結為膿得香則氣血流行故服五香連翹湯萬金散金粉散凡瘡本腥穢又聞臭觸則愈甚若毒入胃則咳逆古人用之可謂有理且如飲食調令香美以益脾土養其真元可保無虞矣

五發癰疽通治方

漏芦湯　治一切惡瘡毒腫丹瘤瘰癧疔腫魚臍五發癰疽初覺一二日便如傷寒頭疼煩渴拘急惡寒肢体疼痛四肢沉重恍惚悶乱坐卧不寧皮膚壯熱大便閉澁小便赤黃並皆服之
姙婦勿服　漏芦　白歛　黃芩　麻黃去節
枳實炒去白　升麻　芍藥　炙甘草　朴硝各兩
大黃二兩　右每服三五錢看虛實用水煎空心
熱服

五香連翹湯　治諸瘡腫初覺一二日便厥喉咽

塞發寒熱　乳香　木香　木通　大黃各一錢半
連翹　沉香　獨活　桑寄生　丁香　射干
升麻　射香一錢另研　各　甘草五分　姜三片水煎
不拘時服
托裏護心散　治諸疔腫發背曾經汗下毒氣攻
心迷悶嘔吐而痛可服二三服　乳香一兩
菉荳粉四兩　和勻每服三錢甘草湯調服
神仙礬蠟丸　此藥不問老幼皆可服之服至一
兩已上無不取効最止疼痛不動臟府委是神

効活人不可勝数　白礬一兩明亮者研　黃蠟七錢溶化
提起待少冷入礬末不住手攪勻　右衆手丸如梧桐子大倘
蠟冷不能丸以滾湯頓之便軟每服二十丸漸
加至三四十丸白湯或酒吞下　如未破即內
消已破即便合如服金石發動致疾更用白礬
末一兩匙頭溫酒調下亦三五服見効有人遍
身生瘡狀如蛇頭服此亦効諸書皆称神奇但
一日之中服近百粒則方有功此藥能防毒氣
內攻蓋能護膜也切不可欺其淺近而忽之始

終服過半斤必能萬全瘡愈後服之尤佳
一方治蛇咬只熔化白礬乘熱滴傷處痛即止毒
氣即赶出立見効驗要知白礬大能解毒也
千金托裏散　治一切瘡腫發背疔毒若氣血虛
而不能作膿或潰後膿清痛仍不減最宜服此
便能排膿止痛　黃蓍一兩半　厚朴　防風
桔梗各二兩　連翹二兩二錢　木香　沒藥各三錢
乳香二錢　當歸五錢　川芎　白芷　芍藥
官桂　人參　甘草各一兩　右為細末每服三

錢酒一大盞煎三二沸溫服
十六味流氣飲　治無名惡瘡癰疽等症　川芎
當歸　芍藥　防風　人參　木香　黃芪
官桂　桔梗　白芷　梹郎　厚朴　烏藥
紫蘇　只壳　甘草各一錢　右作一帖水煎食遠服
內托羌活湯　治尻臀生癰堅硬腫痛大作
羌活　黃栢酒製各二錢　防風　歸尾　藁本
連翹　蒼朮　陳皮　炙甘草各一錢　肉桂三分
黃芪一錢半　水一鍾酒半鍾煎八分食前服

清心内固金粉散　一名金花散　專治惡瘡熱
盛焮痛煩躁作渴(此藥解毒)　辰砂(另研)　白茯苓
人參　甘草(各三錢)　菉荳粉(四兩)　雄黃(一錢)　冰片
白荳仁　朴硝(各五錢)　射香(與冰片各一錢另研)　右以參
苓荳蔻為末入研藥和勻每服一錢半蜜湯(調下)
麥飯石膏方又名鹿角膏　白麥飯石(其石顏色黃白像麥
飯圓者研細末所用)　鹿角(要生者自解者不用截作二三寸長炭火内煅令烟尽為度研
為細末)　白歛(為細末)　右將麥飯石用炭火煅紅以好
米醋淬之如此煅淬十次研為極細末每用二

八十九矢　三

兩白歛末二兩鹿角灰末四兩同入乳鉢乳令
無声方有効驗若研不細敷上作痛若研得極
細如眼藥一般極能止痛排膿收口暈藥末多
寡用經年好米醋入銀石器内煎令魚眼沸却
旋〻入前三味藥末在内用竹篦子不住手攪
熬一二時久令稀稠得所傾出磁盆候冷以紙
蓋密勿惹塵灰每用時先用猪蹄湯洗去瘡痞
上膿血至凈以故帛挹乾以鵝翎拂藥膏塗敷
四圍凡有赤處尽塗之但留中心一竅如錢大

以出毒氣膿血如瘡未潰能令内消如已潰則
排膿如湍水逐日見瘡口收歛如患瘡久肌肉
腐爛筋骨出露用舊布片塗藥以貼瘡上但肉
膜纔穿亦能取安洗瘡勿以手觸動嫩肉仍忌
口氣及有腋氣之人并月婦皆令忌之　此方
但得好帶蓋鹿角好麦飯石精虔修合勝用他
藥多矣仍可熬取好米醋一大碗候逐日用藥
於瘡上俟乾便以鵝毛蘸醋拂潤勿令緊也初
用須一日一洗換十日後兩日一換

八十九矢　三

排膿内補十宣散(一名十奇散一名内補散)治癰疽瘡癤未成
者速散已成速潰敗膿自出無用手擠惡肉自
去不用刀針服藥後其痛頓減効驗如神
人參　當歸　黃蓍(各二兩)　甘草　川芎　防風
厚朴(姜汁炒)　苦梗　白芷　薄桂(各一兩)　右為末每
服三錢酒調下日夜各數服以多為妙服至瘡
口潰更服為嘉不飲酒人濃煎木香湯調下然
終不若酒力之勝或飲酒不多能勉強以木香
湯熏酒調下亦可

乳香黃耆散　治一切惡瘡癰疽發背疔瘡疼痛疼不可忍者或未成者速散已成者速潰不假刀砭其惡自下　又打撲傷損筋骨疼痛並皆治之

黃耆　當歸　川芎　麻黃去根節　甘草　人參

芍藥各一兩　罌粟殼蜜炙　陳皮各一兩　乳香　沒藥各五錢　每服五六錢水煎服

黃耆湯　治一切瘡腫癰疽並宜服之

黃耆　川歸酒洗各一兩　大黃　芍藥　陳皮

炙甘草各五錢　右加生姜三片水煎服

托裏內補散　專治一切惡瘡潰爛出膿之後宜服之

人參　川歸　川芎　白芍　甘草　白芷

防風　白术　茯苓　官桂　黃耆　金銀花

各等分水煎服

護心散　治癰氣冲心嘔吐又名不二散　炙甘草

硃砂飛各一錢　菉荳粉炒二錢　為細末作一帖白湯調下

當歸連翹散　清熱解毒通潤大小便　當歸

連翹　梔子仁　芍藥　金銀花各一兩　黃芩五錢

右每服五錢水二鍾煎七分空心溫服如欲通大便加大黃二錢待藥煎將熟入之再煎一二沸服之

托裏散　治一切惡瘡發背疔疽便毒始發脉洪絃實數腫甚欲作膿者　當歸　括蔞根一錢半

大黃三錢　皂角刺　牡蠣　朴硝　連翹各一錢半

金銀花　赤芍藥　黃芩各一錢　水酒各一鍾煎服

乳香止痛散　治一切瘡腫疼痛不止

乳香　沒藥各一錢　丁香五分　粟殼　白芷

陳皮　炙甘草　水煎服

加味當歸飲子　古云諸瘡皆屬心火火鬱則發之　當歸　生地　升麻各五錢　防風二錢半

荊芥穗　何首烏各一錢　柴胡　白芍藥　川芎

羌活　黃耆各一錢　紅花　蘇木　甘草各一錢

每服五錢生姜三片煎或沐浴取微汗効速使血氣通暢服藥應効

托裏溫中湯　治瘡為寒變而內陷者膿出清解皮膚涼心下痞滿腸鳴切痛大便微溏食則嘔氣短促吃逆不絕不得安卧時有昏憒

丁香 沉香 茴香 陳皮 益智仁各一錢
木香一錢半 羌活 良姜炮三錢 黑附子炮去皮臍四錢
炙甘草二錢 姜三片水煎服 忌生冷

猪蹄湯 治一切癰疽并諸腫毒消毒氣去惡肉
凡瘡有口便須用此湯洗 黄芩 白芷
赤芍藥 川歸 羌活 生甘草 露蜂房有蜂兒者各等分
先將猜猪前蹄兩隻重一斤只用白
水三升煮軟將汁分作二次澄去面上油并下
肉渣每次用藥一兩投于汁中再用文武火煎
十數沸去渣以故帛蘸湯溫溫徐揩瘡上死肉
惡血隨湯而下洗凈訖以帛拭乾仍避風忌人
口氣吹之有狐臭人及月婦猫犬並不宜入病
人房中洗瘡切忌手觸洗疽之方甚多惟此方
極効其用露蜂此甚有理蓋以毒攻毒也

麥門冬湯 癰疽潰後膿水不絶 麥門冬
黄耆 五味子 人参 官桂 當歸 遠志
白苓 芎藭各一兩 炙甘草三錢
姜一片棗二枚水煎

四虎散 治㿈疽腫硬厚如牛皮按之痛
天南星 草烏頭 半夏生用 狼毒
各等分為細末醋蜜調敷留頭出氣

內托散 諸腫毒惡瘡一服立愈便毒尤妙 大黄
牡蠣各五錢 甘草三錢 括蔞仁二兩如無用山梔子亦可
右分三帖水煎服

鉄井攔 治無名腫毒背疽以此圍之留口出氣
芙蓉葉重陽前收 蒼耳端午前收燒存性 為末以蜜水調上

五香湯 諸瘡入腹托裏 丁香 木香 沉香
乳香各一兩 人参一兩另加 射香三錢嘔惡者去之加藿香
右為細末每服三錢水一盞煎六分空心熱服
總録聖惠千金外臺治諸瘡腫方中皆載此方
大同小異大抵專治毒氣入腹煩悶氣不通者
其餘熱結昏昧口燥咽乾大便硬小便澁者未
可與服

止痛當歸湯 治腦疽發背穿潰疼痛
當歸 黄耆 人参 官桂 芍藥 炙甘草
生地各一兩 每服五錢水煎服

金銀花散　發背惡瘡托裏止痛排膿　金銀花無花藤葉代之四兩　甘草八錢　分爲三帖酒水各半煎服

拔毒散　治熱毒丹腫遊走不定　寒水石生用　石膏生用各四兩　黃柏　甘草各一兩　爲細末新汲水調掃之或油調塗之或芭蕉花上攤貼以涼水潤之

寸金丹　二名返魂丹三名再生丸四名追命丹六名來甦丹七名知命丹八名得道丸非人勿示若有人患癰身未爛者與三丸服之嚥下便

活如口噤斡開研化灌之下喉立生治發背腦疽癰腫遍身附骨腫痛先覺時飲水口中煩渴發熱四肢沉重身躰壯熱　射香一分　乳香　輕粉　烏金石　雄黃　狗寶　沒藥各一錢　蟾酥二錢　粉霜　黃蠟各三錢　硇砂五錢　鯉魚胆乾用　狗膽各一枚　頭男胎乳一盞　金頭蜈蚣七條酥炙全用　右俱爲細末以黃蠟熬成膏子和勻爲丸菉荳大小兒丸如芥子大每服一丸病重者加三丸白丁香七枚研爛新汲水調送下被蓋出汗勿令透風凡服藥後喫白粥瓜虀就睡大妙頭瘡腫痛不過三服

定痛托裏散　一切瘡腫疼痛不可忍如年少氣實先用疎利後服此藥　川芎　川歸　乳香　白芍藥　沒藥與乳香各一錢半　官桂一錢　御米殼去筋膜炒二錢　水煎服

柞木飲子　發背癰疽已成未成並宜服之　乾柞木葉四兩　乾荷葉心蒂　萱草根　甘草節　地榆各一兩　右爲末每服五錢水煎服早晚各進一服

內托千金散　癰疽發背腦疽乳癰諸瘡癤未成者自散已成者即潰　人參　川歸　黃芪　川芎　防風　白芍　官桂　桔梗　白芷　甘草　括蔞　金銀花　各等分　痛甚者加當歸乳香沒藥芍藥　每服七八錢水煎臨服加好酒半盞溫服日進二三服若瘡口有黑血出及有汗出者此藥之功也

牛膠飲　截癰疽惡瘡發險處服之使毒氣不攻

於內不傳悪証　牛皮膠（通明好者淨洗乾秤四兩為則）
右用酒一碗入膠納重湯頓令膠撓匀傾出更
浸酒随意飲尽若善飲者以醉為度亦用酒煎
却淩以白湯飲尽為佳此法活人甚多

國老膏　一切癰疽俱發預期服之能消腫逐毒
使毒氣不内攻功効不具述　大甘草（二斤有粉者）
搥令碎河水浸一宿揉令漿汁濃去渣再用綿
濾過銀石器内慢火熬成膏以磁罐收之每服
一二匙無灰酒侵入或白湯亦可不拘時服曾

服丹劑燥藥亦解之或微利無妨

遠志酒　一切癰疽發背悪毒有死血陰毒在中
則不痛敷之則痛有憂怒等氣積而内攻則痛
不可忍敷之則不痛或熱蘊在内熱逼人手不
可近敷之即清凉或氣虚血冷潰而不斂敷之
即斂　此乃韓大夫宅用以救人極驗若七情
内鬱不問虚實治之必愈　遠志（米泔浸洗去心苗）
右為細末酒一盞調藥末三錢遲頃澄清飲之
以渣敷病處

忍冬酒　癰疽發背初起時便當服此不拘疽發
何處及婦人乳癰服之皆有奇効外以麥飯石
膏及神異膏塗之其効若神　忍冬藤生取一
大握以葉入砂盆内爛研入好酒或生酒尤佳
調和稀稠得所塗敷四圍中心留一大竅出氣
仍用忍冬藤（五兩用木槌微搗不可碎）甘草節（一兩）
右入砂瓶内水二碗文武火慢々煎至一碗入
無灰好酒一大碗再煎十数沸去渣分為三次
服一日服尽如病勢重一日夜再進一劑服至

大小腸通利藥力乃到　若無生者用乾者終
不及生者力大而効速其功勝於紅内消

神仙截法　癰疽發背一切悪毒預服此藥毒氣
不内攻可保無虞　真麻油（一斤銀石器煎数沸傾出冷用）
右以無灰酒両碗侵入油重湯温稍熱通口急
服一日尽之為妙或疾發数日者亦宜急服之
佳此法乃呉侍御家云三代用之無不驗又聞
獵者云凡悮中藥箭急飲麻油則藥毒不行後
於西山親見一人被虎箭穿股叫號不忍急以

此灌之良久遂定又聞鄭學諭曾用之効

黄蓍丸　治因用針砭傷其經絡白濃赤汁逗流不止　生黄蓍八錢　川歸二錢　木香　沉香　肉桂　乳香各一錢　右諸香並不見火為細末用菉荳粉生姜汁煮糊為丸梧桐子大温水吞四五十丸

忍冬丸　療渴疾既愈之後須預防發癰疽大宜服此　忍冬藤根莖花葉皆可用以無灰好酒浸以糠火煨一宿取出晒乾入甘草少許研為

細末以所浸酒打麵糊為丸梧桐子大每服五十丸至百丸不拘時酒飲任下　此藥不特治癰疽大能止渴并治五痔諸瘻等疾

援生膏　治諸般惡瘡及瘰癧鼠瘻纔起者點破即愈　血竭　乳香　没藥各一錢　蟾酥　輕粉各三錢　雄黄五錢　射香五分　右用蕎麥稭灰或真炭灰一斗二升淋灰湯八九碗用粟柴或桑柴文武火煎作三碗取一碗收留二碗感於好磁器内候温將前七味藥研為極細末入灰湯内用鉄瓢或桑柳枝攪再以好風化石灰一升入藥灰湯内攪勻取出候冷過宿成于小白磁礶内凡遇諸惡瘡點在當頭一日二次次日又一次瘡頭食破約五分血水出為妙恐日久藥乾將前收留灰湯入之

烏龍膏一名烏金散　一切腫毒癰疽收赤暈

木別子去壳　半夏各二兩　小粉四兩　草烏五錢

右於鉄銚内慢火炒令轉焦為細末出火毒再研以水調稀稠得所敷毒四圍留頂出氣或以

醋調亦得

透膿散　諸癰疽瘡及貼骨癰不破者不必刀針以此點之不移時其膿自透累驗

蛾口繭子出蛾有口者　右燒存性以酒調服切記只用一枚不可多用如用二三枚即有二三口也慎之此方絶驗勿忽

通門散　一切瘡疽無頭腫痛　山梔子二錢

大黄二錢　牡蠣炒五錢　地龍去土二錢　炙甘草五錢

每服六七錢水煎服以利為度

乳香拔毒散　一切瘡腫癰疽消毒　黃芩(各二兩)
黃栢　地骨皮　乳香　沒藥(各二錢)
為末凉水調攤貼腫處効

立効散　發背諸癰癤瘰癧乳癰與前方間服神効　皂角刺(不用枯者對面火炒)　生粉草(二兩)
乳香(五錢)　沒藥(一兩)　栝蔞(五枚取肉炒)
右為末每服二錢無灰酒調下

灸法　癰疽初發小點一二日間急以大蒜頭横切如錢貼其中心以小艾炷灸之五壯而止若形狀稍大以黃稈紙蘸酒全貼看先乾處為筋脚於脚處灸之或兩處先乾皆灸但五七壯而止　又法屈指從四圍尋按遇痛處是根就此處重按深入自覺輕快即此灸之更於別處灸若腫大即擣蒜餅焙乾蘸法醋灸熱更換頻罨或以熨斗火於蒜上熨之逐次更換熱餅頻熨如覺患處走散以綿帛覆蓋勿令氣泄俟少間敷藥凡癰疽腫大如鱉之形須看頭向上下井灸其前兩脚次灸其尾或紅筋走緊而長從盡

八　廿五卷　廿四

處灸之須留頭并後兩脚勿灸誤盡灸之不惟火氣壅聚彼毒無所走散反攻入裏也倘辯認不明以白芷三分　漢椒　桑白皮(各一錢)
連根葱白十根　新水煎入酸醋半盞淋洗必須其筋自見可以辯認頭尾

萬病解毒丸　癰疽發背魚臍毒瘡藥毒草毒挑生蛇毒獸毒諸惡瘡病　五倍子(五錢)　山荳根
山慈姑(一兩)　全蝎(五錢)　紅牙大戟(七錢)　射香(一錢)
續隨子(取仁去油取霜各半兩)　硃砂　雄黃(各二錢)

八　廿六卷　廿五

右件先以前五味入木臼擣羅為細末次研後四味夾和糯米糊丸分作三十五丸端午七夕重陽臘日净室修合每服一丸生姜蜜水磨下井水浸研敷患處解毒收瘡救病神妙硃砂雄黃乃瘍醫五毒散乃瘍中物也

加味八味丸　降心火生腎水治諸渴疾癰疽未發前已癒後渴症通用　熟地黃(焙二兩)　山藥(微火)
山茱萸(蒸取肉焙各一兩)　辣桂(去粗皮五錢)　澤瀉(截作塊酒蘸蒸焙盛)
(龍內蒸文剉焙五)　牡丹皮(焙)　白茯苓(各八錢)　五味子(慢火焙乾)

研兩半右為細末煉蜜候冷和丸如梧桐子大每
服三十丸空心鹽湯下
神仙太乙膏　治癰疽及一切惡瘡軟癤不問年
月深淺已未成膿並宜治之蛇虎傷蜈蚣犬咬
傷湯火刀斧所傷皆可內服外貼如發背先以
溫水洗瘡淨軟綿拭乾却用緋帛攤膏藥貼瘡
即用冷水下血氣不通溫酒送下赤白帶下當
歸酒下咳嗽及喉閉纏喉風並用新綿裹膏藥
置口中含化一切風赤眼用膏捏作小餅貼太

陽穴後服以山梔子湯送下打撲傷損外貼內
服橘皮湯腰膝痛者患處貼之內服鹽湯送下
唾血者桑白皮湯下諸痛先以鹽湯洗淨諸血
量大小以紙攤貼每服一丸如櫻桃大蛤粉為
衣其膏可收十年不壞愈久愈烈一方久遠瘰
癧同上瘰癧鹽湯洗淨貼酒下一丸婦人血脉
不通甘草湯下一切瘡癤并腫痛及疥癩別煉
油少許和膏塗之　玄參　白芷　當歸
赤芍藥　肉桂去粗皮　大黃　生地黃各一兩

右剉碎用麻油二斤浸春五夏三秋七冬十火
熬黑色濾去滓入黃丹一斤青柳枝不住手攪
候滴水中成珠不粘手為度傾入磁器中以磚
蓋口掘子窨埋陰樹下以土覆三日出火毒欲
服丸如鷄頭子大
神異膏　治發背癰疽諸般惡瘡癤其効如神治
疽疾先以麥飯石膏塗敷候其瘡根脚漸收放
徑寸大脚用神異膏貼之收口此藥隨其人病
深淺取効合時不可與婦人鷄犬猫厭穢物見

之　玄參半兩　杏仁去皮尖切一兩　露蜂房淨炒一兩用有蜂兒
者炒焦　男子亂髮洗淨焙乾五錢　綿黃芪三分　全蛇退塩水洗焙
五錢　黃丹飛細五兩　右用真麻油一斤用髮入銀
銚中文武火熬候髮焦鎔盡以杏仁投入候變
黑色用好綿濾去滓再將所熬清油入銚內然
後入玄參黃芪慢火熬一二時取出銚子安冷
炉上半時久火力稍息旋入露蜂房蛇退二味
將柳枝急攪却移銚放火上不住手攪慢火熬
至紫黃色用綿濾過復入清油在銚內柔冷投

黄丹急攪片時又移銚于火上以文武火慢火熬不住手柳枝攪千餘轉候藥油变黑色滴水中凝結成珠則是膏成就若珠子稀再熬少時必候其得所然後磁器内收封待用或恐偶然火熬太過稍硬难用却少將臘熬麻油在内以磁器盛封盖於甑上蒸乗热攪調收用膏藥熬成了須連所盛磁器置浄水中出火毒一昼夜歇三日方可用日換二次夜換一次熬此膏藥極难於火候須耐看火緊慢火猛則藥中火發不特失藥性又傷人面目救助不及千萬謹戒膏藥方甚多不下数十治疽之神無出此方千金不換枝瘡尤妙

萬金膏 治癰疽發背諸般瘡癤徒高墜堕打撲傷損脚膝生瘡遠年臁瘡痔漏一切悪瘡又云專治發背神妙不可具言或初覺着做瘡用牛皮膠令稀稠得所如藥化攤在毛頭上於初覺處或有做瘡處貼次用軟布帕子二条於釅米醋内煮令熱漉出互相於熬紙上乗熱蒸熨不可令布帕冷布帕二条不可都齊漉出常留一条于醋内煮候蒸熨浔一条冷時却取醋内煮者熨之候冷却又於醋内取熱布蒸熨庶幾常浔熱布替換即易見効若瘡痒乃是藥攻其病須忍痒不止直候膿出將尽即濃煎貫衆湯候温洗去膠紙次日依前更洗若上有膿又如前法蒸熨雖連数日蒸熨不妨但要瘡中膿尽瘡乾為度然後用生肌紅玉散掺在瘡上即以萬金膏貼每日一上或兩上毎用再蒸熨並如前先鋪膠帋于瘡上了亦如前用貫衆湯洗入膠紙

龍骨 鱉甲 玄参 黄柏 草烏
黄連 烏賊魚骨 黄芩 白芨 白蘞
猪牙皂角 木別子 當帰 白芷 川芎
厚朴去粗皮 槐枝 柳枝各四寸長二十一条 乳香另研
沒藥另研各半两 黄丹水飛浄炒過一斤八两 清麻油四斤入前皂熬赤色去粗浄油三斤

右除乳沒丹外餘藥入油内慢火煎候白帋焦色去粗入黄丹一半不住手攪令微黑色更入黄丹仍攪待滴入水中成珠不粘

手爲度攪溫下乳沒末攪勻磁器盛用時量瘡
大小攤紙貼之治諸惡瘡加自然銅内挂各一
分一方無當歸

磨風膏　治頭面五發瘡腫疥癬等疾及湯泡傷
磨風止痛滅瘢痕　白附子　白芍藥　白茯
苓零令香　白芨　白斂　白芷　白檀
藿香　升麻　細辛　黄芪　甘草　杏仁去皮
尖各一兩　脑子　括蔞根一兩　大栝蔞二兩去皮　黄腊
芝麻油　右前十四味剉油内浸百日於臘日

八 艽卷 廿

木火炭上銀石器内煎至白芷微黄色離火入
括蔞二味看内煎百沸重綿濾去粗再慢火上
煉油香下削净黄腊熔開爲度傾在磁器内收
貯上掺脑子密封旋用磨風塗之

金絲萬應膏　治撲損傷損手足肩背并寒濕脚
氣疼痛不可忍小兒脾疳瀉痢咳嗽不肯服藥
者　瀝清半二斤　威灵仙二兩　草麻子二百枚去皮殻　黄腊
二兩　木別子二十八枚去殻切片　沒藥　乳香各一兩
麻油夏二兩春秋冬四兩

右先將瀝清同威灵仙下鍋熬化以槐柳枝攪
候焦黄色重綿濾過以瀝清入水盆候冷成塊
取出秤二斤净再下鍋熔開下麻油黄腊草麻
子泥不住手槐柳枝攪勻須慢火滴入水中不
粘手扯拔如金絲狀方可如硬旋再加油少許
如軟加瀝清試得如法却下乳香沒藥末起鍋
在炭火上再用槐柳枝攪數百次又以粗布濾
下水盆内扯拔如金絲頻換水却用小鈚盛頓
如落馬墜車被傷疼痛處穴上灸熱貼透骨肉

八 艽卷 廿一

爲驗連換熱水數次浴之則熱血聚處自消小
兒脾疳瀉痢貼肚上咳嗽貼背心上

洗藥神硝散　專治癰疽潰爛臭穢　朴硝一兩
蛇床子二兩研破　右二味和勻每用三錢水一碗煎
三五沸通手洗瘡上用後藥掺之

聖効散　收斂瘡口　黄柏一兩去粗皮炒赤色　穿山甲一兩
炒黄色　檳榔　木香各半兩炒黄色　右爲末每用少許
候大膿出尽洗净方可乾掺瘡上

阿膠飲　一切癰疽癤毒　牛膠剉蛤粉炒成珠　粉草各一兩

橘紅五錢　分三帖水煎服

家藏神驗血竭膏　當歸酒洗　白芷　大黃　黃連
黃栢　木別子去殼　皂角　杏仁　露蜂房各一兩
乳香　沒藥　血竭各三兩　血余一兩　飛丹一斤
麻油二斤　右除乳沒血竭餘藥入油熬焦去渣熬
至滴水成珠下丹將柳樹棍不住手攪軟硬適
中入乳香等攪勻即成膏矣　薛立齋云血竭
取其以毒攻毒也若惡瘀已去毒氣既消宜用
神效當歸膏以其生肌續筋也

李氏云癰疽不服內托散及失宜通內毒以致咽
喉口舌生瘡甚則生紅黑菌害人甚速當用琥
珀犀角膏治之向有患此症者諸法不效與此
藥一日而安

琥珀犀角膏　真琥珀　犀角　辰砂飛　茯苓各一錢
氷片二分　人參三錢　酸棗仁炒二錢　右為末煉蜜丸
彈子大每服一丸麥門冬湯化下

李氏云癰疽不服托裏之藥熱毒內攻喉舌生瘡
甚至黑爛當服犀角散以解其毒

犀角屑　玄參　升麻　黃芪　赤芍
麥門冬去心　生粉草　當歸各一兩　大黃微炒三兩
右為粗末每服三錢水煎

薛氏云前方破血降火內疏之劑也若其脉沉寒
大便秘結發熱作渴喜飲冷者屬熱蓄於內方
可用之若其脉虛浮大便不結發熱作渴畏飲
冷者乃屬血虛於外可用當歸補血湯若尺脉
洪數而無力發熱作渴小便頻數者屬腎水不
足虛火上炎宜用加減八味丸蓋此症多因腎

水虧虛火上炎故也

內托黃芪丸　治針砭所傷惡寒發熱膿水不止
肌肉不生瘡口不歛　黃芪八兩　川歸三兩酒洗
肉桂心　木香　沉香　乳香各一兩　菉豆末四兩
右為末以薑汁打菉豆末糊為丸白湯吞

薛氏云若肌肉傷而瘡口不歛用六君子湯以補
脾胃　若氣虛惡寒而瘡口不歛用補中益氣
湯以補脾肺若血虛發熱而瘡口不歛用四物
參朮以滋肝脾　若膿多而瘡口不歛用八珍

湯或十全大補湯以養血氣經云脾主肌肉加
前藥未應但用四君歸耆以補脾胃更不應乃
下元陽虛急用八味丸以壯火生土若脉数發
渴者难治此真氣虛而邪氣實也
李氏云近有數人病背疽或先寒後熱先熱後寒
或連日或間日必嘔痰大汗而止皆用柴胡恒
山不應乃脾氣不正復感寒邪痰盛而作遂先
用不換金正氣散次用排膿內補散木香湯三
日而愈　若外邪既去而仍嘔不止宜用六君
八十六卷　廿四
子湯以補脾胃○大凡胃氣虛而作嘔者必喜
溫熱毒內攻而作嘔者必喜冷治當辯之
家傳不換金正氣散　治感冒風寒或傷生冷或
瘴癘或疫癘　蒼朮米泔浸炒四兩　厚朴姜汁炒四兩
炙粉草二兩　橘紅三兩　藿香葉　半夏姜製二兩　木香[illegible]
人參　白茯苓各一兩　右每服五錢加姜棗水煎服
凡疽愈後忽發渴而不救者十有八九或先渴而
患疽者尤為难治急用加減八味丸可免前患
如能久服永不作渴亦無疽症且氣血皆壯有

神劑也
薛氏云前症屬腎水枯涸虛火上炎口乾作渴飲
水無度或舌黃作裂小便頻數或痰氣上壅頰
腮不寧或二三年先作渴飲水或口舌生瘡兩
足發熱多痰或瘡愈三年而口乾作渴小便頻
數急用前藥多有復生者能逆知其因預服前
丸可免此患若兼手足厥冷真陽虛也宜服八
味丸大凡瘡後審其腎水不足用加減八味丸
中氣虛弱用補中益氣湯氣血虛弱用十全大
八十九卷　廿五
補湯陽氣虛寒加姜桂如不應用八味丸
加減八味丸　熟地黃八兩　乾山藥　山茱萸去核
五味子炒各四兩　肉桂一兩　牡丹皮　白茯苓各三兩
澤瀉切片蒸五火焙三兩　右煉蜜為丸梧子大每服八十
丸五更未言語前白湯下
黃耆六一散　黃耆六兩　粉草半生半炙一兩
右為末每服二錢空心日午白湯調下不應作
大劑水煎服
薛氏云忍冬丸解熱毒消渴之藥也六一湯補氣

虛作渴之藥用之無有不驗

五味子湯　腎水枯涸口燥舌乾　五味子
麥門冬(各一兩)　黄蓍(炒三兩)　人參(二兩)　炙甘草(五錢)
右每服五錢水煎服
此方乃滋其化元之劑設腎水既涸虛火上炎
燥渴須佐以加減八味丸
李氏云瘡疾將安每日常服十全大補湯以補氣
血宜與排膿內補十宣散相間服
薛氏云潰瘍屬氣血俱虛補之固當若患腫瘍而
氣血虛弱者尤宜預補否則潰而不斂凡大病
之後氣血未復多致再發若不調補必變為他
症而危或誤以為瘡毒復發反行攻伐速其斃
也深可戒諸

神效托裏散　治一切癰疽發背腸癰
黄芪(鹽水炙)　忍冬葉　當歸(各五錢)　粉草(二錢)
右酒煎服渣敷患處　此乃托裏消毒之良劑也

神效瓜蔞散　治乳癰瘰癧與立效散相間服
黄瓜蔞(一枚杵碎)　當歸尾　甘草節(五錢)　沒藥(一錢另研)

右用酒三碗煎一碗分三次服未成即消已成
即潰

立效散　治癰疽瘰癧　皂角刺(半斤炒赤)　粉草(二兩)
乳香　沒藥(另末各二兩)　黄瓜蔞(五個連皮研碎)
右每服一兩好酒煎服
薛氏云二方治癰疽瘰癧解毒止痛通用之良劑
也若瘰癧寒熱焮痛腫赤乃肝經氣病當清肝
火以養肝血若寒熱既止而核不消乃肝經之
血亦病也當養肝血以清肝火若初如豆粒著
於筋肉色不變內熱口乾精神倦怠久不消潰
乃脾肝虧損當健脾土培肝木外臺秘要云肝
腎虛熱則生癧矣病机云瘰癧不係膏粱丹毒
因虛勞氣鬱所致補形氣調經脉其瘡自消若
悞下之必犯病禁經禁矣

綠雲散　治五發毒瘡於背腦或手足(此方治金石發疽果有神効)
鳳尾草(金星形如鳳尾葉背有星炙乾一兩)　粉草(一錢)
用酒一碗煎三五沸入冷酒一碗飲之以醉為
度立效

清涼膏　治一切瘡瘍膿去後用之　當歸二兩
白芷　白芨　木鼈子去殼　黃栢　乳香
白歛　白膠各五錢　黃丹淨五兩　麻油十二兩
右入油煎黑去粗入黃丹以槐柳枝不住手順
攪再煎成膏乃下乳香等藥
碧油膏　止痛排膿灸後用此　桃枝　柳枝
桑枝　槐枝　乳香　血竭各五錢　黃丹淨四兩
右用麻油十兩照常法煎成膏入乳香等任貼
神効酒煎散　治一切瘡瘍其効如神　人參
沒藥　當歸尾各一兩　甘草　括蔞一枚半生半炒
一八　廿六卷　廿八
右以酒三碗煎二碗分四服粗焙乾加當歸末
一兩酒糊丸桐子大每服五十丸以酒下[illegible]
消毒活血
經驗方　治金石發癰　黑鉛一斤　甘草三兩
右用酒一斗置磁器內先以甘草置在一邊另
將鉛熔投酒一邊取鉛再熔仍投九度取酒飲
醉寢即愈
治癰疽用生甘草為末酒調二錢服連進數服自

消　前方乃清熱消毒之劑若因膏粱積熱金
石蓄毒血氣壅滯者最宜如脾胃虛血氣痞滯
者不宜槩用恐胃寒故也
升麻湯　肺癰胸乳間作痛嘔吐膿血腥穢
升麻　苦梗　以仁　地榆　黃芩　赤芍
丹皮　甘草　各等分水煎服
穀道前後生癰謂之懸癰　粉草一兩截斷以澗
水浸潤炙令透內細剉無灰酒煎服有人患此
已破服兩劑瘡即愈
一八　廿六卷　廿九
崔氏云治手足甲疽或因修甲傷肉或因損足成
瘡潰爛上脚用汞丸置鉄板上煅色赤如金者
為真沸定取出研末以塩湯洗搽之
薛氏云前症即脫疽也此方固有良驗尤當調元
氣為善大抵此症先醇酒炙煿膏粱厚味傷脾
或房勞虧損腎水故有先渴而後患有先患而
後渴者若色赤作痛自潰可治色黑不潰不治
色赤作痛者先用隔蒜灸活命飲托裏散再用
十全大補湯加減八味丸色黯不痛者隔蒜灸

桑枝灸亦用十全大補湯加減八味丸則毒氣不致上侵元氣不致虧損庶可保生亦有因修手足口咬等傷者若元氣怯弱或犯勞事外塗寒凉内服克伐損傷脾胃患處不潰色黯上延亦多致死重者須解去當以脚力轉解周髎輕拽使筋隨骨出而毒得洩否則毒筋内斷仍上潰雖云無益且偏僻之處氣血罕到藥難導達況攻毒之劑先傷脾胃反損元氣不若灸法為良重者須解毒為善故孫真人云在肉則剜在

指則截雖親之遺躰不忍毁傷然不如是則勢必至于夭殁非体親之心也況患處已壞雖解不痛又何憚而不為乎女子亦有此患多因鬱怒虧損肝脾所致治法與前同

疔瘡（多生於腹發黄疱中或紫黑已先痒后痛先寒后熱也）

夫疔瘡者皆臟腑積受熱毒邪氣相搏於經絡之間以致血凝滯注于毛孔手足頭面各隨五臟部分而發也其形如粟米或疼或痒以致遍身麻木頭眩寒熱時生嘔逆甚則四肢沉重心驚眼花盖疔腫初發時突起如疔盖故謂之疔含蓄毒氣突出寸許痛痒異常一二日間害人甚速是尤在癰疽之上也内經以白疔發于右鼻赤疔發於舌根黄疔發于口唇黑疔發于耳前青疔發於目下盖取五色之應五臟各有所屬部位而已然或肩或腰或足發無定處如在手足頭面及骨節間者最急其餘猶可緩也凡疔瘡皆宜刺瘡中心至痛處又刺四邊十餘刺令悪血出乃敷藥〻力方得入于針孔中則佳若

不刺破藥力不能入又看口中頰邊舌上有赤黒如珠子者是也諸疔名目雖多其治法畧同初起宜以針刺出毒血將蟾酥丸或廻疔錠子之類從針孔紝入之上用膏藥貼之仍服飛龍奪命丹發汗及五香連翹漏芦湯之類并清心之劑盖諸瘡皆屬心火心清則毒氣消散而易愈矣

追毒丹　取黄去疔頭追膿毒立効

蟾酥（用酒化）　蜈蚣（酒炙）　硇砂　白丁香（各一錢無此味加巴豆）

雄黃二錢 輕粉一錢 硃砂二錢為衣 巴豆七粒去殼不去油
右為末用酒打糊為丸麥子大兩頭尖入於針
破口內用水沉膏貼之後用膏藥及生肌藥追
出膿血毒物又有如黑陷漏瘡者四圍死敗肉
不去不生肌者不可治也亦用此藥追毒去死
肌敗肉生新肉愈矣小者用一粒大者加用之
病輕者不必用針只以手指甲爬動於瘡頂上
安此藥水沉膏貼之其瘡即時紅腫為度去其
敗肉為妙用之神驗

水沉膏 將白芨末放在盞內用水沉下去用帋
貼之如用膏不可用生肌藥 凡用拈点之藥
用此膏圍貼則不傷好肉

追疔奪命丹 能立取効驗使腫內消
羌活 獨活 青皮君 防風君 黃連 赤芍
細辛 甘草節 蟬退 姜蚕 金線重樓
澤蘭 金銀花各等分
有膿加 何首烏 白芷 要通利加 青木香
大黃 梔子 牽牛 毒在下加 木瓜各等分

右每服五錢先將一貼加澤蘭金銀花各一兩
生姜十片同藥擂爛好酒鏇之熱服不善酒者
水煎仍以酒水各一盞半生姜十片煎至熱服
之汗出為度病退再加大黃二錢煎熱取利一
兩次去餘毒為妙
此方以藥味觀之甚若不切然効速如神方不
失一百發百中如有別証再出宜隨加減治之
若心煩嘔吐加 甘草節一錢 菉荳粉一錢 酸漿
水下 嘔逆悪心加乳香荳粉甘草湯下

飛龍奪命丹 治疔瘡發背腦疽乳癰附骨疽一
切無頭腫毒悪瘡服之便有頭不痛者服之便
痛已成者服之立愈此乃悪症藥中至寶病危
者服之立安萬無失一係神人之秘方不可輕
忽 血竭一錢 蟾酥二錢乾者酒化 乳香 沒藥
銅綠 硃砂二錢為衣 雄黃三錢 輕粉五分 膽礬
寒水石各一錢 射香 冰片各五分 海羊二十一條即蝸牛
蜈蚣一條去頭足酒炙 右為末先將海羊連殼研如泥
和前藥為丸菉荳大或加酒打麵糊每服二丸

先用葱白三寸爛嚼吐于手心男左女右将藥包在葱内無灰酒三四盏送下避風處被盖出汗約人行五里許再以熱酒数盃催之以汗出為度

服前藥二丸即消如汗不出重者再服二丸汗出即効(三)五日重者再進二丸即愈 如疔走黄過心者难治汗出冷者亦死 如病人不能嚼葱擂碎裹藥以熱酒吞下 服此藥後忌服冷水冷物黄瓜茄子猪魚鷄鵝羊湿麺一切發毒動風之物不可食之及月婦孤臭人見之此藥活人萬〻誠外科匙鑰

拔黄藥 用真取蟾酥飛羅麺為丸梧子大可将一丸放在面前舌下即時黄出

百二散(又名護心散) 治發疔煩躁手足不住發狂者急宜服之(方在疔門)

蟾酥膏 治疔 新蟾酥以白麺黄丹搜作劑圓如麥顆大用指甲爬動瘡上插入重者針破瘡頭用一粒内之仍以小沉膏貼

回瘡錠子 治疔瘡大妙 草烏頭(一両) 蟾酥 巴豆(七箇去皮) 射香(一字) 右為細末麺糊和就捏作錠子如有悪瘡透疔不痛無血者用針深刺至痛處有血出以此捱之上用膏貼疔瘡四畔捱之其疔二三日自然拔出此藥最宜緊用 此証大抵與傷寒頗類其中亦有可針鎌砭射出血者亦有乆而敗爛出膿者其間变異百端不可不慎也

内托連翹散 疔瘡出時皮色不变不疼痛按揺不動身發寒熱便是此瘡有水疔魚臍疔紫燕疔火疔諸般疔瘡如瘡黄于黄上用針刺仍服内托散自然消散 連翹 生地 白芷 赤芍(各一両) 大黄 山梔(去顚) 薄苛(各七銭) 朴硝(二両) 黄芩(五銭) 甘草(半両) 每服一両灯心竹葉各十莖水煎服其人喘加人参少許大病只三四服愈如服下心煩嘔者以護心散止之

護心散 甘草(五銭) 菉荳粉(一両) 為末分作二次酸虀水下

破棺丹　治疔走黄不止　川帰　赤芍藥
山梔仁　牽牛（各二两半）　連翹　牡蛎　金銀花
紫花地丁（各一两半）　京三稜　甘草（各二两）　大黄（二两半）
右為末煉蜜丸弾子大毎服一丸童便化開服
忌飲酒及生冷
治疔走了黄打滾将死者　牡蛎　大黄　木通
山梔子　金銀花　連翹　牛旁子　地骨皮
乳香　没藥　栝蔞　皂角刺　毎服五銭壮
實者加朴硝用水一盞酒半盞煎服　此乃救

命仙方也
鐵粉散　治冷疔瘡經久不効用此大妙
多年生鐵（三銭炒過）　松脂（一銭）　黄丹　輕粉（各五分）
射香（一分）　右為細末清油調塗瘡口立効
走馬赴筵丹　治疔瘡　没藥　乳香　蓬砂
硇砂　雄黄　輕粉（各三銭）　氷片（一分）　射香（一分）
右為細末蟾酥汁和為丸黄米大毎服一丸温
酒送下立効
金砂散　取疔瘡　道人頭（微炒一两即蒼耳子）　硇砂（三銭半）

雄黄（三銭）　蟾酥（以多為妙）　右將瘡四圍刺破以少
油調藥末置於瘡内緋帛封之数日疔自出
蒼耳散　治一切疔腫神効
蒼耳草根莖苗子但取一色便可用燒存性研
細末用好米醋米泔澄淀和如泥随瘡大小塗
上厚二分乾即易之不過十度即拔根出須針
破塗之加雄黄尤妙
蒼耳與白蚕研爛貼疔上拔去根　毒氣入腹嘔
吐者搗蒼耳汁飲之立効

治疔最有効用蝉退僵蚕為末醋調塗四圍留瘡
口俟根出稍長然後拔去再用藥塗　海藏方
單用姜蚕為末津調塗亦佳
治疔危篤者二服即愈輕者一服立効
土蜂窩（一小窠今此物能利大小便）　蛇蛻（一条全）　用瓦器盛
塩泥固濟火煅存性研為細末毎服一銭空心
好酒調下少頃腹中大痛〻止其瘡已化黄水
矣仍服后方
五聖散　大黄（一两）　生姜　皂角刺　金銀花（各二两）

瓜蔞一枚 甘草一兩 用好酒二升煎八分不拘
時服
治疔瘡最驗 蒼耳 臭牡丹 各一大握搗爛
新汲水調服瀉下黑水即愈 單用蒼耳葉搗
汁和童便服一日三次立効
肘後方 疔腫垂死者一服立効 菊花葉紫莖者根莖葉花皆可用
一握搗取汁一升入口即活此神驗
蒼耳散 治疔瘡累用神効 蒼耳根三兩五錢
烏梅五箇帶鬚葱三根用酒二鍾煎至一鍾熱
服出汗後不散然後用勝金散 「八十九卷 卌八
勝金散 取鐵秀炒為末每服四錢或三五六錢
用籌水滾過停冷調服不吐為佳
反花瘡 瘡有努肉乃出者是也
聖惠方治諸瘡努肉如蛇頭出數寸者硫黄末敷
之即縮
肘後方 治瘡有肉突出烏梅燒灰敷立消
又方 白梅肉杵細入蜜捏成餅貼之妙
又方 馬齒莧燒灰研末猪脂調敷

瘡突出寸許根如小荳或大如梅者用花脚蜘蛛
絲纏其根則漸乾而自脫落
又方 甘草半生半炒 枯凡 人中白 密佗僧各等分
右為細末以童便半盞用無灰酒和熬竹篦攪
成膏塗瘡上日三五次
經驗方 胭脂巫 貝母各三錢 胡粉二錢半 白硼砂
後藥各二錢為末先用温漿水洗後服藥
雜瘡
諸惡瘡入心腹嘔逆藥食不下 菉荳粉半兩 四十九
乾胭脂三錢 定粉二錢 為細末新水調下効 「八十七卷
天泡瘡通聖散及蚯蚓泥畧炒蜜調敷妙若從肚
皮起者裏熱發外速服通聖散
天行斑瘡須臾遍身皆戴白漿此惡毒氣永徽四
年此瘡自西域東流於海內但煮葵菜葉以蒜
虀啖之即止
人面瘡 昔有人左膊有瘡如面歷試諸方惟淺
以貝母為末水調灌之數日乃結痂遂愈
足指內生鷄眼子 用鷄胃中食指之餘者以石

屢之立驗

天泡瘡小麥炒焦為末以生桐油調敷効若神速

治一切瘡疥神異膏　全虫去尾洗七枚　蛇床子取末三錢　皂角一錠　巴豆去殼七粒　麻油一兩　黃臘半兩　雄黃另研末三錢　輕粉另研五分　右先用全蝎皂角巴豆煎油黑色去柤入蠟化開取出候冷入雄黃輕粉蛇床子末攪勻成膏每用少許搽瘡上須先以苦參湯洗過絕妙

苦參湯　苦參　蛇床子　白礬　荊芥　各等分煎湯溫洗

治漏瘡不收口　五倍子末　血竭末填塞之効

治一切瘡葵花散　葵花　梔子　黃連　黃柏各等分　為末冷水調貼痛處

百合散　治順頰瘡一名獨骨瘡　百合　黃柏各一兩　白芨一錢　萆麻子五十粒　為末朴硝水和餅貼日三五次

面上耳邊生浸淫瘡久不愈出黃水名香瓣瘡

羖羊鬚　荊芥　乾棗去核各二錢

俱燒存性研末入膩粉半錢每用少許清油調搽先以溫湯淨洗拭乾塗藥二三次効

亦治大人小兒兩胯生瘡

附子散　治冷瘡日夜發歇疼痛　附子半兩炮去皮臍　川椒去目　雄黃研末各二錢半　枯凡七錢半　右為末麻油調敷瘡上日二次

白蒺藜散　熱毒瘡癢痒心神壅躁　白鮮皮　白蒺藜炒去刺　防風去苗　川大黃炒　赤芍藥　梔子　麥冬　条芩　玄參　桔梗　前胡

炙甘草各一兩　為末每服二錢食後薄荷湯調服

七寶散　熱汗浸漬成瘡痒痛不止　黃蓍　川歸　防風　荊芥穗　地骨皮　木通各二兩　明礬一兩　每用一兩水煎五六沸去柤稍熱淋患處拭乾避風　東垣此方曾治推車客皮膚皺裂不任痛兩手不能執轅足不能履地因製此藥與之即効明日遂行自是屢用屢効

玉女英　治瘡痒痛　滑石五分　菉荳粉微炒四兩

右末之用綿包撲上妙　一方加棗葉一兩
連翹飲　治諸惡瘡紅赤痛痒心煩口乾及婦人
血風赤斑圓點開爛成瘡痒痛流黃水
連翹　生地　川歸　括蔞根　荊芥　黃芩
赤芍　麦冬　瞿麦　木通　大力子炒　防風
山梔　川芎　甘草各等分　每服五六錢水煎
加灯心二十莖不拘時服
紫花地丁散　諸惡毒瘡腫痛如神
川歸　紫花地丁　大黃　赤芍藥　金銀花

黃耆各半兩　甘草根二錢　每服一兩水酒各一碗煎服
水銀膏　月蝕瘡多在兩耳及竅邊隨月盈虛
水銀二錢半　黃連末　胡粉　松脂各半兩　猪脂四兩
右先熬猪脂令沸入松脂諸藥及水銀攪令匀
磁器收先以鹽湯洗淨塗上日三五度
治甲疽瘡礬散　綠礬燒赤五錢　盧會一錢半
射香二分半　俱為末以絹袋盛包患指扎定以差
為度
漆瘡　生蟹取黃塗之効

又方　湯浸芒硝冷洗之効　明礬湯洗亦妙
又方　生紫蘇擦之累効　又人乳汁敷之好
又方　乾荷葉一斤水一斗煮濃汁洗瘡上日三瘥
又方　無名異末水調服
代指　手指甲頭腫痛
烏蛇肉并仁　研爛醋調稀入指浸之愈
升麻和氣飲　治瘡腫癧疥痒痛
升麻　桔梗　蒼术　乾葛　甘草　大黃煨各
一錢　陳皮二錢　當歸　半夏　茯苓　白芷　乾姜

只殼各五分　白芍一錢半　右作一服水煎服
當歸飲子　治瘡痒疥癬濕毒風燥
當歸　川芎　防風　白芍　生地　蒺藜
荊芥各一錢半　何首烏　黃耆　甘草各一錢　右作
一帖水煎食遠服為末亦可
除湿散　大治一切風毒疥癬癩痒狀如癩風
苦參　何首烏　荊芥穗　蔓荊子　薄荷各一兩
白芷　烏蛇酒浸一宿焙乾　天麻　川芎　防風各半兩
右為末每服三錢酒調下日進三次六日一浴

令汗出血氣宜通一月膚澤如故

一掃散　一切瘡疥但相對而生者便是不問乾溼痒痛日近年深用之立效

藜芦皮二兩　雄黃五錢　輕粉十帖　砒粉　水粉各一兩　為末用大鯽魚一對入麻油煎熟去魚攤冷調藥搽瘡。若効遲加信末少許研杏仁十粒近陰處勿加

消毒飲 丹溪云消毒散氣表藥也

荊芥穗三兩　大力子四兩　防風一兩　甘草二兩　每服五錢水煎服

一八 十九卷　五四

治皮膚風熱遍身生癮疹　大力子　浮萍等分　為末薄荷湯調下二錢日再

東垣云　每風瘡大風病相似好棗葉洗蒸一宿日乾為末白湯調服二錢

姜蚕散　治風遍身癮疹痛痒成瘡

白姜蚕洗焙黃　為末每服一錢酒調服一日三次立瘥

衍義方　有人病遍身風熱細疹痒痛不可任連腦脛臍腹及近陰處皆然涎痰多夜不得卧

苦參末一兩皂角二兩水一大升揉取汁銀石器熬成膏和苦參為丸如梧桐子大每服二十丸溫水吞次日便愈

小兒面瘡通面爛無完膚膿水流漓百藥不効陳年臘猪脂不入鹽者敷之若神

治諸般瘡疥加減法　腫多加白芷開鬱　痛多加白芷方解石　痒多加枯凡　陰囊瘡加呉茱萸溼多香油調　乾痒出血加大黃〻連猪脂調　虫多加蕪荑錫灰檳郎藜芦斑猫　紅色加黃丹　青色加青黛在上加通聖散　在下部多用濬川丸下之　脚腫多出血加血分溼熱藥

不廿九卷　三五

膿胞瘡　治熱為主帶燥溼　黃芩　黃連　大黃各三錢　蛇床子　寒水石二錢　黃丹五分　白礬一錢　輕粉　白芷　無名異各少許　木香少許　痛者加　為細末麻油調搽

虫瘡如癬狀退熱殺虫為主　乾疥瘡開鬱為主

加呉茱萸　蕪荑　黑狗脊五錢　樟腦一錢

松栢(頭上多加之) 白礬 雄黄 硫黄 水銀(殺虫) 黄連 方觧石(一分) 蛇床子(陰囊痒多加) 松皮灰(膿多加之) 及柏油調搽 濕多加之

疥癩瘡春天發焦疥開鬱為主不宜抓破

枯凡 呉茱萸(各二錢) 樟腦(五分) 輕粉(十帖) 寒水石(二錢半) 蛇床子(二錢) 黄栢 大黄(各錢) 硫黄(一錢) 檳榔(一錢) 右為末猪脂調搽

治癘疥濕瘡浸淫日久痒不可忍搔之黄水出瘥后復發取羊蹄根去皮細切熬熟以大酢和先洗淨傳上一時再以冷水洗之日一傳瘥若為末傳尤妙

外臺秘要治疥取羊蹄根和猪脂塗上或著鹽少許即結痂愈

千金翼 治遍身風痒生瘡疥茵陳煎濃洗立効

衍義云有人患遍身生热毒瘡痛而不痒手足尤甚至頸而止粘着衣被曉夕不得睡痛不可忍以菖蒲三斗剉日乾之為末布席上使恣卧其間仍以衣被覆之既不粘衣被又復得睡不五七日其瘡如失應手神驗

浸淫瘡痛不可忍者發寒热大薊末水敷瘡上乾則易之

外臺秘要 治卒發疥秘驗方 風化石灰和醋漿水調塗隨手即瘥 一法用石灰炒紅出火氣香油調敷 千金方淋石灰汁洗之

木香散 一切悪瘡多時不歛此能生肌肉止痛

木香 檳郎 黄連(各半兩) 白芷(三錢) 為末先洗每日一次乾摻有水出勿訝未効再摻 又方加地骨皮先于瘡上用温漿水洗温拭乾上藥妙不可言緊治下疳瘡如神

洗諸瘡疥 取冬瓜藤或皮煎湯洗妙

治風癩瘡黄水瘡此方神効

用新竹筒十箇内裝黑豆一層頭髮一層數層至滿以稻糠皮火煨之於大盆内週圍同火煨竹筒内汁滴出以盞接之鵝翎蘸掃於瘡上數日即愈

神仙活命飲 治一切悪瘡癰疽腫毒

川山甲蛤粉炒黃色爭六分 貝母去心八分 甘草節六分
防風去又尹五分 没藥六分 赤芍藥六分 白芷五分
當歸尾一錢 乳香一錢 天花粉八分 金銀花一錢
陳皮三錢 右作一服用無灰酒一大碗慢火煎
令出氣量上下食前後服如患人能飲酒者服
藥後隨意飲三兩杯為妙詩曰
真人妙訣世間稀 一切癰疽總可醫
消腫如同湯沃雪 化膿立見肉生肌
消毒散 治一切悪瘡赤腫疼痛掃之如神
八 廿九巻 五八
黃連五錢 地骨皮一兩 朴硝三兩
右為末每用三五分水一盞煎至七分去渣停
冷用雞翎掃之立効
婦人陰瘡
仲景云少陰脉滑而数者陰中即生瘡狼牙湯洗
之狼牙二兩水濃煎以綿纏筯頭浸湯瀝洗陰
中一日三度
治陰蝕瘡 洗搨散
甘草一兩 乾漆一兩 黃芩 地黃 當歸

芍藥各二兩 龜甲五兩 右細切以水七升煑取
一半去柤以綿帛納湯中用搨瘡處良久即易
日二度每搨湯可作十里許即挹乾捻取甘湿
散薄敷瘡上使徧可經半日又以湯搨々訖如
前敷藥 有一婢此疾蝕處作兩瘡深半寸用
此湯并後甘湿散不經七日平復甚効
甘湿散 蚺蛇胆 青木香 硫黃 鉄精
射香臨時加入緑碎蛇毒若入早則蛇胆無力也 右等分為末每
取一錢井花水調日再服先令便利了即以後
八 十九卷一 五九
方莸枝薰下部訖然後取藥如棊子安竹管内
入下部中日再度
莸枝薰法 取東南莸枝五七枝將枝頭輕敲碎
綿纏之蘸硫黃末数轉令厚又截一竹筒先入
下部中部將莸枝藥燒着入筒内薰之
仲景云蛇床子散湿陰中之主藥
蛇床子仁為末以白粉少許和匀相得如枣大
納入户中自然湿散
蒀胚散 陰蝕瘡 蒸豇粉 蝦蟆灰各二錢半

胭脂胚二錢一分 右為細末乾摻

沐浴長春散 男子下元陰濕久冷陰囊左右夜痒抓之則喜住之則痛成瘡流水為害甚苦此方極効 及治婦人陰濕子宮久冷

牡蠣 蛇床子 破故紙 紫梢花 乾荷葉 官桂各等分

每用一兩半水一小鍋入葱白數莖煎八分先薰後洗却用後津調散

津調散 治妬精瘡婦人陰濕瘡膿汁淋漓臭爛

黄連 款冬花各等分 射香少許

為細末或先以地骨皮蛇床子煎湯洗軟帛拭乾津調敷之 忌生湯洗

妬精瘡 青黛 款冬花等分 射香少許

為末先以桑白皮地骨皮煎湯洗軟帛拭乾津唾調末藥敷

婦人玉戶疳瘡 及小兒走馬牙疳

活蜘蛛一枚以生薄荷葉或乾者包蜘蛛燒存性為末酒調服之妙〻如小兒走馬牙疳以此搽之効

癬

丹溪云初起發熱者防風通聖散去硝黄加浮萍皂角刺

羅太無何首烏散 治脾肺風毒攻腫遍身癬变成癮疹搔之成瘡或肩背拘急肌肉頑痺手足皴裂風氣上攻頭面生瘡及治紫白癜風頑麻風症

荊芥穗 蔓荊子 威灵仙 何首烏 炙甘草 防風 車前子 各等分為末每服一錢食後温酒調下白湯亦可

癬在頸項間后延上至耳成濕癬他治不應以芦會一兩甘草半兩和勻先用温漿水洗癬拭乾敷之効

一方 芦會 大黄 輕粉 雄黄 蛇床子 川槿皮 拣郎 為末先刮破癬醋調塗之

乾癬積年生痂疕搔之黄水出每逢陰雨即痒用狼毒末塗之

栢脂膏治乾癬 栢油一斤 黄腊半斤 杏仁四十五粒

朴硝一撮 右件鉄器内用老生姜葱白三根一
順攪五七次煎沸濾過成膏搽之
又方 山荳根末臘猪脂調塗之
祛湿散 多年湿癬大有神功 蚕沙四兩
薄荷半兩 為末摻之或用生油調搽
羌活膏 治頑癬疥癩風瘡疵片流黄水久不瘥
羌活 獨活 明礬 白蘚皮 硫黄、狼毒
各一兩 黄丹 白附子 蛇床子各半兩 軽粉
二錢半 為細末油調成膏搽之

八宝散 治風癬松皮頑癬久不瘥神効
藿香 檳榔 破故紙 大腹皮、雄黄
軽粉 硫黄 枯礬 各等分為末油調搽日
三五次痒即搽之
香疥藥 治風疥癬瘡黄水瘡牛皮癬
軽粉、水銀 樟腦各三錢 大風子四十九枚
川椒四十九粒 杏仁二十一粒 柏油一對 為細末疥
用絹包於瘡上熨之黄水瘡乾摻神効
一抹散 治乾癬不瘥

天南星 草烏頭各一枚用生者 為末以羊蹄根擣
取汁調塗不過三次妙絶
牛皮癬及久年頑癬神方
紅粉霜五分 明礬一錢 密陀僧三錢 川槿皮一錢
杏仁一錢去皮油 為末津唾調搽一日三次三日全愈
脚瘡皮厚如癬或流黄水黄水延處即爛浸淫年
久不愈者 此方屢試屢驗瘡癬俱佳
紅棗二枚去核将皂礬一錢納棗中以苧麻緊
扎用好酒二碗慢火煮成膏不要攪動膏成去
棗不用以膏塗患處二三度全愈、若浸淫瘡

初塗時畧疼少刻便止其瘡就結乾痂妙甚

臁瘡

夫臁瘡者皆由腎臓虚寒風邪毒氣外攻三里之
傍灌於陰交之側風熱毒氣流注兩脚生瘡腫
爛疼痛臭穢歩履艱難此瘡生於臁骨為重以
其骨上肉少皮薄故难愈至有多年無已口開
潰皮爛肉現臭穢可畏治法當先取虫然後敷
藥如隔紙膏麝香軽粉散之類須翹足端坐勿

多行覆庶可全愈矣
隔紙膏 治内外臁瘡 當帰 白芷 黄連
五倍子 雄黄 没藥 海螵蛸 血竭
白芨 白歛 黄蘗 厚朴 已上各五錢 黄丹
乳香 二錢半研 軽粉 一錢 右為細末用清油紙貼
藥敷瘡上絹帛縛定有膿水觧開刮去不潔再
貼藥如此数次即愈須先用燒塩湯洗净片帛
拭乾待片時水氣乾然後貼藥
又隔紙膏 専治臁瘡如神務要用絹帛縛得着
實貼肉方好過兩日取抹浄翻貼之
滴乳 没藥 各二錢 黄丹 炒紫色 降真香灰 各半兩
已上俱另為細末 真黄蠟 一兩 真蜂蜜 一茶盞
右将黄丹入銅鏇内炒紫色次下降香灰末攪
令勻却下蜜黄蠟另熬化傾入油蜜攪令極勻
然後下乳香没藥軽粉片腦再用銅匙攪之又
勻待藥稀稠得所取出磁碗收盛勿令泄氣臨
用看瘡大小攤之油紙綿紙尤佳竹帋不耐藥
在中紙在外翻覆貼之

治臁瘡久不愈 龍骨 二錢半 乾猪糞 一两半存性
軽粉 少許 梹榔 半两 乳香 没藥 各一錢
右為細末先以燒塩湯洗瘡以軟絹帛拭乾清
油調敷瘡濕則掺之
秘傳隔紙膏 治年月深久臁瘡不愈者
老松香 樟腦 谷丹 炒 水龍骨 即旧舡石灰
軽粉 久不愈加 白芷 川芎 海螵蛸
総為細末溶化松香加少清油和之以油紙随
瘡大小糊袋盛藥夹之用水洗净縛在瘡口上
二日定四日一換若單用白芷川芎螵蛸三味
煎水洗之立効
屡験方 柏凡 三錢 墨煤 一两煉存性 研勻以生桐
油做隔帋膏貼之先以五倍子川椒葱三味煎
湯洗拭乾貼藥一日一換七日全愈
又方 治似臁非臁 蜂蜜 四两 嫩松香 一錢二分
先将蜜熔滴水成珠次入松香末攪勻如上法
做貼洗亦同
又方 麻油 二两 熬至滴水成珠又将蜂蜜四兩熬

至滴水成珠将油挽入又将伏龍肝四兩為末
入内攪勻成膏先将瘡洗净以膏塗之一日一
二次其効甚速

又方 冬青葉 臈猪胆 百草霜 二味和勻
将冬青葉與本人嚼爛先将瘡用椒葱湯洗净
乃以胆霜敷後却敷冬青葉三四次便愈

粉麝散 治内外臁臭爛数十年不愈者
生亀一枚 去肉取殼醋一盌炙醋尽為度煅
令白烟尽存性以盌盖在地上出火毒為細末
入輕粉射香拌勻臨用先以葱水洗乾敷藥妙
絶妙絶

又方 新起未久者甚好 玉簪花葉小便浸貼
一日一換五日愈

諸凡瘡毒悪瘡多年臭爛成坑不收口者此方極
佳一七成功 乳香 没藥各五錢 天灵盖一兩煅
右為極細末掺之神灵鮑清溪之子患瘡後腦
瘡肉爛成坑骨露不收口百藥無功敷此立効

終

赤水玄珠第三十卷目録

便毒
楊梅瘡
杖瘡
吠咬 風犬咬
蛇傷
瘰癧門 附馬刀
下疳瘡
金瘡 箭傷 砲傷
凍瘡
馬咬 猫咬 猪咬
人咬
癭 瘤 結核
腸癰門 胃脘癰
痔漏門
湯火門
顛撲損傷門
癘風

新安生生子孫一奎著輯

便毒　疳瘡　楊梅瘡

夫便毒生於小腹下兩腿合縫之間其毒初發寒熱交作腿間腫起疼痛是也夫腎為作強之官所藏者精與智也男女大慾不能直遂其志故敗精搏血留聚經隧乃結為便毒矣蓋腿與小腹合縫之間精氣所出之道路也或觸景而動心或夢寐而不洩既不得偶合陰陽又不能忘

情息念故精與血交滯而成腫結也初起切不可用寒凉之藥恐氣血愈滯不得宣通反成大患惟當開鬱散氣清利熱毒使精血宣暢則自然愈矣

生生子曰按前論蓋思想無窮所願不遂者設也此同一說而意猶未完果如此論當僧尼孀婦宮人曠夫多有此患然予目擊商賈中野合不潔淫妓便搆此疾或疳瘡或楊梅者亦由慾火內熾一旦交合不潔為淫火冲動膚腠開通是以受毒初發之時慎不宜以敗毒之藥瀉之何也毒邪非虛不入若復虛胃氣則毒邪下陷治之非彌年累月不愈也捷法只宜發汗其次利小便膚腠所感之邪汗易散也陰莖腿縫皆肝經絡肝腎主下焦又肝主小便使毒邪從小便中出所治皆順也故治之不旬日便可奏功若毒已發汗利小便躰厚邪固而不得宣通者乃以破毒活血調氣之劑攻之俟毒氣宣通隨以補劑托之亦不失先後着也此予歷試良驗特

附于斯

便毒之劑

退毒散　治便毒腫結　穿山甲（蘸醋焦炙五錢）木猪腰子（醋微炙三錢）　為末每服二錢食前老酒調下　次以醋煮肥皂研膏敷之妙（木猪腰子即木猪苓子）

雙解散　治便毒內蘊熱氣外挾寒邪精血交滯腫結疼痛

桂皮　川大黃　白芍藥　澤瀉　牽牛（炒取頭末）桃仁（去皮炒各二錢）　甘草（一錢）　分做二帖生姜五片

煎食前日二服先小便快熱從小便出後大便
利皆是稠毒

敷藥方　治便毒腫痛　雄黃　乳香各二兩
黃栢一兩　為末新汲水調敷腫處自消

括蔞散　治便毒并惡瘡　括蔞一箇去皮
牛旁子炒　金銀花各三錢　生姜　甘草各半兩
右忌銅鉄器搥碎以酒一大碗煎數沸空心溫
服微利為度

三物湯　治便癰　牡蠣　大黃　山梔子各等分

為末酒水一大盞煎七分空心溫服露一宿尤妙

四神散　治便毒初起寒熱欲成癰疽服此神効
大黃　木鱉子　姜蚕　貝毋各二錢半
用酒水各一鍾煎至一鍾食前熱服若得汗下
為妙

止痛妙絕飲　治便毒腫硬不消不潰疼痛無已
此方一服立能止痛
人参五錢　大黃五錢　酒水各一鍾　煎至一鍾入
乳香沒藥末各一錢空心食前服

曾經瀉後而痛腫如故者此胃氣已弱但當補托
胃氣使氣血充實邪乃消釋已潰者亦以此補
之生肉
人参　黃耆各一錢　粉草五分　防風五分　柴胡五分
當歸一錢　赤芍五分　桂枝四分　白芷
棗一枚水煎服

立消散　消便毒癰腫如神　全蝎炒
核桃去売肉只用隔膜炒　等分為末空心酒調下三錢
下午再服三日全愈

消毒五聖湯　治便毒腫疼神効
五灵脂　白姜蚕　鬱金　貝毋　大黃各三錢
酒水各半煎服連服三帖立愈

下疳之劑

七寶梹榔散　玉莖疳瘡或漸至蝕透久不愈者
梹榔　密佗僧　雄黃　輕粉　黃連　黃栢
朴硝　各等分為末先將葱白漿水洗淨軟帛
挹乾如瘡濕乾摻如乾少油調搽

玉粉散　疳瘡痛不止　密佗僧　寒水石煅

消石各半兩 膩粉 射香各少許 右為末油調
敷湿則乾掺
金銀花散 治下痹 金銀花 荊芥 朴硝
蛇床子 甘松 白芷 檳郎 每用五錢水
煎加葱白二根数沸盆盛先薫後洗一听上藥
敷藥 妙方 多年墻上白螺壳炒竹鞋脣等分
研極細每一錢入梅花片二厘敷此藥就不痛
先以川椒芽茶飛塩煎湯入小口罐内将玉莖
插入罐中先熏後洗

治下疳 象皮燒灰存性如乾用油調敷瘡上
補遺蛀餘瘡 用黑油傘紙燒灰出火毒傅于瘡
上便結靨甚妙
治外腎陰瘡 抱鷄蛋壳 黃連 輕粉
各等分為細末用煎過清油調敷
楊梅瘡之剤
初起者宜清表之 荊芥 防風 升麻 葛根
甘草 川芎 蟬退 當歸 柴胡 酒芩
連翹 白蘚皮 皂角刺各八分 猪胰子二枚

先以土茯苓四兩煎湯溲煎前藥七日見効
又方 癩蛤蚆三隻去腸雜入雄猪肚内苧麻扎
縛水煮極爛食之蛤蚆亦听食三五次除根
又方 嫩羊七八斤一隻者 如常宰治去腸雜
以土茯苓一斤搥碎入腹中苧蔴縛定水煮極
爛听食湯准茶淘飯絶妙〻〻服此後其毒皆發
出頭面俱腫五日後自消七日全愈
神應散 肥皂核燒存性五錢另研為末
荊芥 何首烏 天花粉 防風 苦參

各一兩 薄荷葉五錢 共為末 每日用新鮮白
土茯苓八兩 雄猪肉四兩 入前末藥五分 肥皂核末子一分 共用
水七碗煮爛去渣其肉听食湯准茶服不過十
日全愈再無他餘症 如善肉者可作大剤與
之
擦藥方 極佳 水銀 明凡各一兩 杏仁
大黃各二兩 膽凡三錢 俱為細末用香油拌匀
擦手心脚心前後心每日擦三次不可見風擦
至七日口中熱氣出或喉嚨作疼乃藥力到也

以後解毒藥二帖除根　防風　荊芥穗
牛旁子　玄參　生地　連翹　黃芩　黃連
大黃二錢　白鮮皮各一錢　土茯苓四兩
水六碗煎三碗不拘時服
點廣瘡方　杏仁去皮取霜　真輕粉各一錢　雄黃
辰砂各五分　為極細末以雄猪胆汁調搽一日
三次三日愈
楊梅瘋　十年二十年筋骨風泡腫痛
土茯苓三斤　川椒二錢　甘草三錢　黑鉛一斤
青藤三錢　右以好酒入埕將藥用袋盛煮服之妙
洗楊梅瘡方　臭梧桐　野菊花　金銀花
三味煎湯入旧馬桶内熏之一日二次有痔漏
加枸杞子
楊梅瘡并楊梅風方
川歸　防風　牛膝　羌活　甘草　木瓜
金銀花　皂莢子　熟地　川芎各一錢
土茯苓四兩水五鍾煎三鍾分三次服
加味遺粮湯　治楊梅瘡風毒及悞服輕粉癱瘓

觔骨疼痛不能動履者服此除根
防風　木瓜　木通　苡仁　白鮮皮
金銀花各五分　皂莢子四分　如虛弱加　人參
當歸各七分　土茯苓二兩即仙遺粮也右以水
煎空心服一日三服輕者十日可愈重者必四
十日痊
楊梅漏
猪蹄子湯　治楊梅漏　牙皂去皮炒　麻黃
防風　連翹　地黃各三分　牙硝一分半　土茯苓
四兩　雄猪前蹄一隻水三碗同藥煮熟听食湯
亦盡喫半月全愈
又方　皂角五錢　金銀花五錢　土茯苓四兩
大肥皂核燒存性為末每用三厘前藥煎熟調服
膏藥　猪油一兩熬去渣　加香油三錢　同熬離火稍
冷加乳香沒藥各五錢攪勻再入筷兒茶七錢
攪勻又入氷片一分輕粉五分射香一分待冷
做膏藥貼之
十全大補湯加防風與前方相煎服之庶虛弱者

易收功也凡漏瘡膿水既多故屬不足治宜補養為先

金瘡

治金瘡血不止　半夏　風化石灰　鬱金

右為末摻上血即止

又方　以風化石灰韭葉嫩者同搗入鵝血調和成餅風處陰乾為末傅之血止亦無痕若無鵝血亦可

崔氏　療金鏃刀斧傷破血不止

風化石灰一升　千葉紅石榴花半斤　搗成餅如上法陰乾為末摻之

潔古　刀箭傷　乳香五分　沒藥三分　俱為細末摻之極能止血止痛

又方　生晚蚕蛾　風化石灰　二味搗勻成餅陰乾為末傅之極能止血生肌定痛

本事方　治金瘡血不止　血竭為細末摻之立止生肌

華佗方　治惡瘡金瘡刀斧傷

上好降真香為末傅之入水並無傷痕絕妙

鬼遺方　治金瘡腸出欲入之　磁石　滑石各三兩

為細末白米飲送下方寸匕日再服

杖瘡

鬼代丹　受杖不痛　無名異　乳香　沒藥

地龍去土　自然銅火煅醋淬　木鱉子去殼

各等分煉蜜為丸彈子大溫酒化下一丸任打不痛

乳香散　治杖瘡神効　自然銅醋淬七次五錢　乳香

沒藥各三錢　茴香四錢　當歸五錢　為末每服五錢溫酒調下

若受杖後腹中痛或發熱及杖瘡痛甚如火以雞鳴散下去惡血立愈

潔古沒藥散　治杖瘡止痛極佳且令瘡不移

密陀僧　乳香　沒藥各一兩半　乾胭脂一兩半

膩粉兩半　為細末入蚕花氷片一錢或五分　焼葱與全羊骨髓同搗研如埿攤在緋帛上貼之妙

又方　生地黄　黄柏　童便加韮菜汁調敷
又方　不破者　以韮菜葱頭杵貼冷即易之
膏藥用紫荊皮乳香沒藥生地黄大黄黄柏之類
又方　用野苧根嫩者不拘多少洗淨同塩擂碎
敷上神効傷重者多用塩
杖瘡丹　此方佳妙不可言　劉寄奴末六錢馬
鞭草末四錢蜜調敷如潰者乾摻之
丹溪云　杖瘡用黄柏生地紫荊皮敷此皆要
藥也若血熱作痛宜涼藥去瘀血為先須下鷄

鳴散

凍瘡

張子和曰經云寒瘡流水俗呼為凍瘡或經年不
愈者用野中淨土晒乾以大蒜研如泥捏作餅
子如大觀錢厚量瘡大小貼之以艾火加于餅
上灸之不計壯數以泥乾為度又易溫餅子灸
不拘多少直灸至瘡痂覺痛痒是瘡可治也然
後口含漿水洗漬用雞翎二十莖縛作刷子于
瘡上刷洗淨以此洗刷不致肌肉損傷也用軟
帛拭乾以木香檳榔散敷之如夏月醫之更妙
治凍瘡用茄根燒灰淋水洗淨再用雀兒腦髓塗
之
又方　用蜜佗僧為末以煎熟桐油調敷
羅太無如神散　治凍瘡皮爛不可忍
用川大黄為末新水調掃凍瘡上痛立止
張子和治女僮足有凍瘡令服舟車丸濬川散大
下之遂愈人或疑之戴人云心火降則寒消何
疑之有

冬月脚折皮裂行步疼痛　以溫湯洗拭乾將黄
蠟一兩熔化投松香末三分攪勻每用少許安
刀頭上熔化滴入折中經宿即愈神効
又方　五倍子為末以牛骨髓填縫內即好
治脚指縫爛瘡　掃鵞時取鵞掌黄皮燒存性為
末濕則摻之

犬咬

凡犬咬須以人尿洗淨以頭垢傅傷處又用熟牛
糞塗于外

衍蒙方 用杏仁爛嚼罨傷處以帛縛定立好数
数驗過 紫蘇葉嚼碎塗之亦好
又方先以鹽水洗用萆麻子去殻以井水研成膏
貼傷處 虎骨屑敷之亦好
又方 黄荊葉罨瘡上即安
又方 煨生姜乘熱擦之尤妙
犬咬破傷風腫 人参於桑柴火上燒成灰傳之
良愈
羅太無蟬花散 治夏月犬傷及諸般損傷蛆蟲
極臟臭惡不可近者 蛇退皮一兩火燒存性
蟬蛻五錢 青黛五錢 細辛二錢半 右為細末毎
服三錢酒調下如六畜損傷成瘡用酒灌下如
犬咬傷用醪子和服其蛆皆化為水蠅子不敢
再落其上又以寒水石末乾摻上

風犬咬

羅太無定風散 治風犬咬先口噙漿水洗淨用
綿拭乾貼藥更不再發大有神効
天南星生 防風等分 為細末乾上再不潰膿功

難盡述
濟世方 治風犬咬用核桃殻半箇將野人乾糞
填滿以榆皮蓋定罨於傷處再以艾於核桃上
灸之二七壯即愈永不再發 或用野犬糞灸
仍拔去頂上紅髮

瘋狗咬方 用斑猫七枚去頭足翅以糯米少許
於新瓦上同炒以米黄香為度去米不用以斑
猫研碎好酒調下能飲酒人再進一盃看傷上
下服當日必有毒物從小便出如小狗狀如未
下次日再進如又不下又進之以毒物出為度
若進至七服斑毒不下亦無害矣服藥後腹中
必不安小便茎中刺痛不必慮此毒為藥攻將
下耳痛甚者以蕪青一匙煎甘草湯送下即止
如無蕪青〻黛亦可疾愈後急以香白芷五錢
雄黄二錢半為末擣韭根自然汁湯酒調下去
班猫毒以水淨漱口嚼生葱白罨傷處留小竅
出毒氣不可用他草藥罨忌犬猪羊及發風毒
物小兒量歲數加減 班猫能治食癲狗肉致

病者治同即愈或過二三年再發治亦如前
治癲狗所傷用班猫二十一枚去頭翅足用粳米一勺先將七枚入米內微火炒不令焦赤去此班猫換新班猫七枚入前米內炒令班猫色变復去之又換新班猫七枚如前法炒以米出青烟為度去班猫不用以米為末以冷水入清油少許空心調服頃又再進一服以小便利下悪物為度如不利再進一服利後腹肚疼痛急以冷水調青靛服之以解其毒否則有傷或煎黄連水亦可不宜便食热物或以益元散水調服解之尤妙

又方　取小兒胎髮炒香為末傳用野菊研細酒調服盡醉立効

又方　治癲犬所傷或經久復發無藥可療者用之極驗　雄黄五錢　射香五分
研末勻用酒調二錢服如不肯服者則撚其鼻而灌之服藥後必使得睡切勿驚起任其自醒候利下悪物再進前藥則見効矣

風犬咬後毒發如狗叫者百方不治于化人場中取頭頂骨燒末敷之立愈
風犬咬毒發如狗叫百方不應者以人骨燒末之水下方寸匕雖煩乱者亦効

又方　治風犬咬不急治則生小狗必殺人
雄黄　蟬蛻　等分為末調敷傷處立愈

虎傷人生葛根汁服妙并洗傷處　或用白礬末納瘡口痛立止

馬咬　薄荷汁塗之妙

猪咬　松脂熔作餅貼之　或以黄連甘草節煎湯洗立効

箭傷

劉寄奴散　治箭傷及金瘡口用此並無瘢痕右
劉寄奴為極細末掺之

又法　治箭鏃傷及金瘡傷
松樹老懸皮生為末風化灰煉紅和勻傳之收口止血神効

又法　治毒箭傷破欲死者　藍汁敷之如無用

靛青搽瘡口立効
又法 桑葉陰乾為末若急用焙乾亦可搽刀箭
傷處佳
布智兒從元太祖征回回身中數矢血流滿躰太
祖命取一牛剖其腹納之牛腹中浸熱血內移
時遂甦
李挺從伯顏征郢州砲傷左脇矢貫於胸幾絶伯
顏令剖水牛腹納其中良久甦 上二治出
元史諸方書無載特揭附此

蛇傷
毒蛇沙虱所傷眼合口噤手足強直毒巳入內急
用蒼耳草研汁和酒服滓厚敷患處
人治毒蛇咬 急取癩蝦蟇搗爛敷上帛縛之
又法 治蛇悞入人口中不出 用刀急破開蛇
尾將川椒一粒入內隨即褁龍縛之須臾就出
人咬傷
治被人咬破指頭痛不可忍久則爛脫手指并手
掌諸方書所不載 急用人尿入瓶將患指浸
在內一宿即愈 如潰爛者用赴蛇龜壳燒灰
敷之 若無龜以鱉壳燒灰敷亦可
瘰癧門 附馬刀 瘻 癧 結核
瘰癧者結聚成核初如豈粒漸成梅李累累相連
大小無定結於頸項夾喉之間增寒壯熱狂痛
腫硬不消有風毒熱毒之異其候多緣忿怒氣
逆憂思抑鬱所致初覺便當服散腫潰堅湯或
五香連翹湯漏芦湯之類散之或用大黄牡蠣
湯殊利三兩行瘡上可用十香膏之類貼之及

諸淋洗敷貼等藥治之庶得消散若不散可服
內消丸消之或隔蒜炙之
馬刀瘡亦生於項腋之間下脇延及陰胯形如瘰
癧而長於癧不可認作流注治之皆肝胆怒鬱
之所致也俱當清肝胆之火調氣開鬱以醎軟
之劑附之繼以養氣血流動經絡之劑收功不
可徒務班猫等毒剤攻逐致成瘵怯慎之
柴胡連翹湯 治男婦瘰癧馬刀瘡
柴胡 連翹 知母酒炒 黄芩酒炒各五錢 黄栢酒炒

生地 炙甘草各二錢 中桂三分 大力子一錢
瞿麦穗六錢 川归尾一錢五分
右剉如麻豆大每服三錢或五錢水二大盞煎
至一盞去渣食後热服
薄苛丹 觧瘰癧風热之毒自小便出毒後常須
服此
薄苛 皂角不蛀者去弦皮 連翹 蔓荆子 荆芥
京三稜煨 何首烏米泔浸各一兩
右為末好豉二两半以米醋煎沸漉豉淹令軟

研如糊和丸桐子大每服三十丸食後热水下
每日一服病雖愈仍常服以消餘毒
神秘散 治瘰癧
班猫去頭足翅米炒二十八枚 荆芥穗 直姜蚕炒去糸嘴
黑豆各微炒取末一錢
右為細末每服一錢五更好酒調下日中當取
下悪物如不下次日五更再進一服或更不下
第三日五更先食秫米粥一碗次服此藥其毒
决下如小便痛澁以葱茶解之或木通燈草煎

湯調之楊氏家藏方頭晚先將活石末一錢用米飲調服半夜時又一服至五更服神
秘散看虛實或二三錢第二日仍以灯心湯調
琥珀末一錢如小便痛用青黛一錢甘草湯調
下即止
蝙蝠散 治瘰癧多年不瘥
蝙蝠一箇 猫頭一箇 右同烧作灰撒上黑豆其
骨灰化為細末湿即乾掺乾則油調敷之内服
五香連翹湯効
白巻蛇散 治九漏瘰癧發於項腋之間或痛或
不痛

白巻蛇酒浸去皮骨焙二兩 生犀角二錢 牵牛半生半炒一兩
青皮五錢 右為末每服一錢入膩粉五分五更
糯米飲調服巳時下悪物乃瘰癧之根也更候
十日再服一服忌發風热毒物已成瘡者一日
便見効
四聖散 瘰癧服白巻蛇散轉利後此藥調之永
去其根 海藻洗 石决明煅 羌活
瞿麦穗各等分 右為細末每服二錢米湯調下
清水畫為度

散腫潰堅湯　治馬刀瘡結硬如石或在耳下至缺盆中或至肩上或於脇下皆手足少陽經中及瘰癧遍於頦或至頰車堅而不潰在足陽明經中所出或二瘡已破乃流膿水並皆治之卧時服藥斟酌病人飲食多少大便硬以意消息治之

昆布　桔梗各半兩　廣茂微炒　京三稜酒洗炒　連翹各三錢　升麻六分　黃連　白芍　葛根各二錢　歸尾　柴胡　甘草各五分　龍胆草酒洗炒四錢　黃芩酒洗一錢五分一半生一半炒　右每服六錢先水浸半日煎热服于卧處伸足在高處頭微低每嚥一口作十次嚥至服畢依常安卧取藥在胸中停留也　另配半料為細末煉蜜為丸菉豆大每服一百九或一百五十丸就以此藥送下

瞿麦飲子　治瘰癧馬刀此方須久服乃効

瞿麦穗半斤　連翹一斤　每服一兩水煎食後服

海菜丸　治瘰癧生於頭項上交接名蛇盤瘰宜當早治之　海藻菜蕎麦炒　白姜蚕微炒去系觜

右等分為細末海藻菜旋炒研篩湯泡白蚕取肉藏半用所泡湯為丸如梧子大每服六七十丸食後臨卧米飲送下其毒自大便泄出若与淡菜連服為妙盖淡菜生於海藻上亦治此病忌豆腐鷄羊酒麺日五六服

蜂房膏　治热毒氣毒結成瘰癧

露蜂房炙　蛇蛻　玄参　蛇床子　黄芪各三錢　杏仁二兩半　乱髮鷄子大　飛丹　黄蠟各二兩

先将前五味剉細綿裹用酒少許浸一宿勿令酒多用油半斤内杏仁乱髮煎髮消盡濾去渣再煎然後下丹蠟再熬成膏傾倒於磁盆中取貼瘡上一日一換

檳榔散　治氣毒瘰癧心膈壅悶不下飲食

檳榔　前胡　赤茯苓　牛旁子炒各一兩　人参　只殻去白炒　沉香　防風各五錢　炙甘草二錢

每服五錢生姜一片水煎服

射干連翹湯　治瘰癧寒热

射干　連翹　玄参　赤芍　木香　升麻

前胡　山梔仁　川歸　炙甘草各一兩　大黃二兩炒
每服五錢水煎服氣盛加芒硝少許服之
括蔞子散　治瘰癧初腫疼痛寒熱四肢不寧
括蔞子　連翹　何首烏　大力子微炒
大黃微炒　皂角子仁　白螺殼　梔子仁
牽牛微炒　甘草生各一兩
為細末食後溫酒下二錢
内消丸　瘡腫初生及瘰癧結核熱毒欝滯服令
内消大効

青皮　陳皮　牽牛取頭末多二兩　薄荷葉八兩
皂角八兩不蛀者去粗皮槌碎水煮軟揉汁熬膏　右為末以皂角
膏和為丸菉豆大每服三十丸食後荊芥湯下
皂角煎丸　治風毒瘰癧
皂角不蛀者三十條內十條泡黑十條酥炙用十條水煮軟揉汁用　何首烏
玄參　薄荷葉各四兩　右為末與前膏子同煉
蜜為丸碗豆大每服三四十丸食後白湯下
柴胡通經湯　治小兒項側有瘡堅而不潰名曰
馬刀

柴胡　歸尾　生甘草　連翹　黃芩
牛旁子　京三稜　桔梗各一錢半　黃連一錢
紅花少許　水二中煎服此方亦治瘰癧乃是攻
裡内消之劑
消腫瘡　治馬刀瘡　黃耆　括蔞根各一錢半
連翹三錢　歸尾　紅花少許　甘草各一錢
右分作二帖水煎服
十香膏　治五發惡瘡結核瘰癧痄腮疽痔
沉香　射香各一錢　木香　丁香　乳香

甘松　藿香　零陵香　安息香　白芷各五錢為細末
川歸　川芎　黃耆　木通　芍藥　細辛
升麻　白斂　獨活　川椒　藁本　菖蒲
木別子　厚朴　商陸根　官桂　梔子仁
蓖仁　松子仁　杏仁各五錢　槐枝　桑枝
柳枝　松枝各二兩　沒藥　輕粉　雄黃　硃砂
雲母石　犀角　血餘灰　枯礬各二兩另研末
真酥油　羊腎脂　猪脂各二兩　飛丹一斤
麻油三斤　右如常法煎成膏藥以緋帛攤貼

如腸胃癰疽可作丸子如梧子大每服七丸空
心溫酒呑
救苦勝靈丹　治馬刀挾癭從耳下或耳後下頸
至肩上或入缺盆中者乃手足少陽經之分野
其瘰癧在於頦下或至頰車乃足陽明經之分
野受心脾之邪而作也今將二証合治之
黃耆一錢護皮毛實腠理活血氣實表補元氣乃瘡家之聖藥　真漏芦五分
人參三分補肺氣如氣短及不調而喘者加之　升麻一錢　歸身二錢
葛根五分此三味俱是陽明本經藥　甘草五分能調中和諸藥瀉火益胃

連翹一錢此一味乃十二經瘡中之藥不可無者散血結氣聚此瘡家之神藥也
牡丹皮三分去腸胃中畜帶宿血　生地　熟地各三分此二味諸經
中和血生血凉血之藥也　白芍藥三分如夏月倍用之補中益氣治腹痛如冬月
寒証勿用　肉桂能散結堅如陰症瘡瘍用之此寒因熱用之意又為陰寒覆盖其瘡
用辛熱去之煩渴者勿用　柴胡功同連翹如瘡不在少陽經勿用　羌活一錢
黍粘子三分無腫不用　昆布二分味醎若堅硬甚者用能輭堅也
京三稜炮二分　廣茂三分此二味瘡堅硬甚者用之不硬者勿用
獨活　防風各一錢此二味与羌活於開手足太陽症脊痛須強不可回頭防風
辛溫如瘡在膈上雖無手足太陽症亦當用之為能散結去上焦風邪助黃芩之功也　黃連

益智仁二分如唾多者胃不和也或吐沫吐食胃中寒者加之無則勿用　厚朴
炒三分治煩悶　神曲炒二分食不消化宿用之　麥芽一錢消食健脾
薑炒一錢二分如腹脹加之　黃栢炒三分如有熱或腳膝無力加之如煩燥散去
太者此腎中伏火也更宜加前　右為細末湯浸蒸餅捏作餅
子晒乾擣如米粒大每服三錢白湯下如氣不
順加橘紅甚者加木香少許量病人虛實消息
之毋令藥多妨其飲食此治之大法也如止在
陽明分者去柴胡黍粘子餘皆用之如在少陽
分為馬刀挾癭獨活漏芦升麻葛根加瞿麥式

分　如本人氣素弱其病勢來時氣盛而不短
促不可因其平素宜作氣盛治之乃從病變治
之權也加黃芩黃連黃栢知母防已視邪氣上
中下摻而用之假令在上焦止用黃芩半酒洗半生用
在中焦加黃連如在下焦加酒製黃栢防已之
類　如大便不通滋其邪盛者加酒製大黃利
之　如大便燥者加桃仁泥大黃　如風結燥
不行者加麻仁大黃以潤之　如風澁而大便
不行者加煨皂角仁大黃秦艽利之　如脉澁

覺身亦氣澁而大便不通者加郁李仁大黄以除風燥　如陰寒症為寒結秘而大便不通以局方半硫丸或加炮附子乾姜煎氷冷服之大抵用藥之法不惟瘰瘍一家凡諸疾病氣衰怯弱者當去苦寒之劑多加人参黄耆甘草之類以瀉火而補元氣餘皆倣此

玉燭散　和血通經能使瘰癧自消及治室女經不行頸多結核

川帰　芍藥　大黄　甘草　熟地　芒硝

黄芩　川芎　各等分每服五錢姜三片水煎服日進一服七八日効

治瘰癧未破者如神百藥不應者累効

杏樹葉（陰乾為末五分）　人中白（煆為末二分半）　蝙蝠（焙乾為末二分半）　白花蛇蛻（煆存性二分半）　蜜蜂（七枚焙為末）

右将杏樹葉末用清水調再入四味末藥和匀敷患處却将皮帋一張以針刺孔貼藥上如乾用清水就帋上刷之每一晝夜換藥一次　如面上發热服清凉飲子数帖自退

敗毒瘰癧方神効

白膠香　海螵蛸　降真香（用心無土乾者）　右等分為末掺患處外以湿帋揜之一夕而退

已破者　蜜蜂（一十一枚）　蛇退（七分半）　蜈蚣（二条端午収者）

右用麻油四两将前藥入油内以文武火熬成入光粉二两用桑枝七条如箸大者急攪候冷出火氣七日方可用帋攤貼

已上二方乃鄭蒙門累驗者不須服藥貼此五七日便消

海藏方　治項後側少陽經中疙瘩不辨肉色不問大小及月日久遠或有赤硬腫痛

生山藥（一挺去皮）　萆麻子（一枚）　右研匀攤貼之如神

丹溪云山藥生者能消腫硬極佳極佳

清凉餅子　生山慈姑　良姜　等分擣為餅罨之能散去寒热　或以生慈姑磨調酒服大妙

此藥大能散瘀如神

本事方　治瘰癧眞癧

蝌蚪皮瓦上炒研為末加輕粉乾敷

治頸上核塊動者　夏枯草六錢末　甘草一錢末
右和勻每服一錢至二錢茶清調下
肘後方　治頷下瘰癧如梅李大宜速消之
海藻一斤　酒一升浸數日稍稍飲之
文武膏　治瘰癧
桑椹黑熟者二斗以布袋絞取汁甆器中熬成
膏白湯化下一匙一日三服紅者晒乾為末白
湯調服
結核　獨形而小核者
八 三十卷　卅九
劉守真云結核者火氣熱甚則鬱結堅硬如菓中
核也不須潰發但熱氣散則自消
丹溪云結核或在頸項在臂在身如腫毒者乃痰
注於皮裡膜外之間結聚而不散也問其平日
好食何物吐下後用藥散之
結核在頸項方　直羌蚕炒　大黄酒浸　青黛
膽星各等分　右為末蜜丸噙
結核在下頰　二陳湯加連翹防風川芎酒芩蒼
朮皂角刺羌蚕射香行太陰厥陰之積痰使結

核自消甚捷
濟世方　治頰下結核不消經驗方
大蜘蛛不拘幾枚以好酒浸之研爛同浸酌酒
去渣臨卧温热服之
海藏　生山藥萆麻子方佳方在癧門
癭氣　氣結於項久留不去而項為脹大
丹溪曰癭氣先須斷厚味　海藻一兩洗　黄連二兩
右為末以少許置掌上時時舌舐之津咽下如
消三之二須止後服
八 三十卷　三二
又方　黄栢二兩　海藻一兩　不用黄連亦佳
治癭氣結核癗癗腫硬　昆布一兩洗去鹹為末
每用一錢綿裹於好醋中浸過食之咽津藥味
盡再噙之
肘後方　治頸下卒結囊欲成癭　海藻一斤洗過
酒浸飲之
破結散　治五癭極佳　麥麵四分　松蘿　半夏
貝母　海藻洗　龍胆草　海蛤　通草
昆布　枯礬各三分　右為末酒服一錢日三忌

鯽魚猪肉五辛生菜毒物二十日愈

玉壺散　治三種癭　海藻洗　海帶洗　昆布　雷丸各一兩　青塩　廣茂各五錢

右為末煉蜜丸芡實大噙化

人參化癭丹　海帶洗　海藻洗　海蛤　昆布四味皆焙　澤瀉炒　連翹各一兩　猪靨　羊靨各十枚

右為末蜜丸芡實大臨睡噙化一二丸忌油膩

寶金散　治癭氣無不瘥

猪羊靨十對煖水洗去脂膜後晒乾為細末　海藻洗　海帶各三兩

八三上末

廿二

丁香　木香　琥珀研　射香各一分研　珍珠研五錢

右先將各味為細末配和勻再重羅過每服一錢熱酒一盞調服夜睡時須垂頭而睡　若童男女十服効　大人一日見効有孕者忌之

海帶丸　治癭久不消　海藻　貝母　陳皮　青皮各等分　右為末煉蜜丸彈子大食後噙化一丸大効

治癭氣神効方　海藻　海帶　昆布　蒲黃各二錢　猪靨子五枚焙乾　右為末每服二錢半臨睡以酒調服且不用枕頭三日

無擇曰癭多著於肩項瘤則隨氣凝結此等皆年數深遠浸大浸長堅硬不可移者名曰石癭皮色不变者名曰肉癭筋脉露結者名曰筋癭赤脉交結者名曰血癭隨憂愁消長者名曰氣癭五癭皆不可妄決破決破則膿血崩潰多致夭枉

瘤

瘤有六骨瘤脂瘤肉瘤膿瘤血瘤粉瘤膿瘤即膠瘤也惟粉瘤與膿瘤可决餘皆不可決潰肉瘤尤不可治治則殺人

八三表

廿二

點瘤瘡方神驗　桑炭灰　棗木灰　黃荊灰　桐殼灰各二升半　蕎麥灰炒　右以沸湯淋汁五碗許澄清入班猫四十箇川山甲五片乳香冰片不拘多少後入煎作二碗以磁器盛之臨用時入新石灰調成膏敷瘤上乾則以清水潤之其効若神

丹溪治丹瘤　草麻子去殼研入麵一匙水調搽之甚妙

消瘤方　用向陽槐枝於菜油灯盞火上以槐枝薰热浸油熨瘤上如法熨数次其瘤自消

腸癰門　附胃脘癰

夫腸癰者乃陰陽偏勝喜怒無時伏於臟腑之中結在腸胃之内血凝氣滞回旋失度不能通行聚結成癰致生腫痛孫真人云卒得腸癰而不曉其病候錯則殺人其病初起覺腹中微痛小腹腫而強抑之則痛小便澁似淋時時汗出復悪寒其身皮甲錯腹皮緊急如腫之状按之濡或發热無汗灑淅悪寒皆其候也其脉洪数者為有膿也可下脉遲緊者未有膿不可下也甚者腹脹轉側有水聲或遶臍生瘡汁從臍出或大便下膿血或一足不能舉凡此皆為悪候胃脘癰者經曰胃脉沉細沉細者氣逆逆者人迎反盛則热聚於胃口而不行故胃脘為癰也治法亦與腸癰頗同初以踈利之藥導其滞次以排膿消毒托裡之藥調之此其大法也

脉經問曰羽林婦何以知腸有膿師曰脉滑而数滑則為實数則為热滑則為榮数則為衛衛数下降榮滑上升榮衛相干血為敗濁小腹痞堅小便或澁或自汗出或復悪寒膿為已成設脉遲緊則為瘀血血下即安

薏苡附子敗醤散　治身甲錯腹皮急如腹脹本無積聚身热脉数者　附子炮二分　敗醤五分　薏苡一錢　右為末每服一錢水煎頓服小便當下而愈

三因方　苡仁　附子同前　敗醤一两二錢五分　毎用四錢水一盞半煎七分去滓空心服

千金大黄牡丹湯　治腸癰小腹痞堅或偏在膀胱左右其色白堅大如掌热小便自調時自汗出脉遲堅者未成膿可下之當有血脉数則膿已成不復可下　大黄四两　牡丹皮三两　芒硝二两　冬瓜仁一升　桃仁五十枚　右水五升煮一升頓服當下膿血

無擇薏苡湯　腸癰腹中痛煩燥不安或脹滿不食小便澁婦人産後虚热多有此病縱非癰但

疑是者便可與或有差亦無妨　冬瓜子四兩
薏苡五兩　牡丹皮　桃仁各三兩　如無冬瓜仁
以瓜蔞仁代之每服五錢水煎服　姚氏去桃
仁用杏仁　崔氏加芒硝二兩
醫案曰女子腹痛百方不治脉滑数時作热腹微
急孫尚診曰腹痛脉當沉細今脉滑数此腸癰
也以雲母膏一兩作丸如梧桐子大用牛皮膠
溶化温酒調膠水吞丸子下餉時服尽下膿血
一盆而安

昔一婦人腸中痛不可忍大便從小便中出楊吉
老之壻李生診之曰夫芤脉見於寸部者乃積
血在胸今芤見於関乃腸生癰也乃出雲母膏
作百十九煎黄耆湯吞下利膿血数升而安
右腸癰五方丹溪所集也前三方置於篇首者
蓋亦腫瘍瀉利例也後二方用膠黄耆煎湯吞
藥者乃潰瘍補例也
四聖散一名神效栝蔞散　治腸癰〻疽五發乳癰便毒
服之神應　大生瓜蔞一枚去皮　粉草四錢研末

乳香一錢研末　沒藥二錢研末　右用好酒二大盌漫
火煎至一盌分作二次兩日服盡大便順導悪
物妙　若乾瓜蔞則用兩枚若病甚者再服以
退為度此方極佳　盌音碗
牡丹皮散　腸癰冷症腹濡而痛時〻利膿
丹皮　人參　天麻　白茯　黄耆　木香
川歸　桃仁去皮尖　川芎　官桂各二分　白芷
苡仁　甘草　右用水煎温服
梅仁湯　腸癰裡急隠痛大便閉澁

梅核仁四十九枚去皮尖　大黄三兩　牡丹皮一兩七錢五分
冬瓜仁四兩　芒硝二兩半　犀角一兩半　每服七
錢水煎服　下利膿血三兩行為度
神仙蠟礬丸　治腸癰神妙此藥不拘老幼皆可
服之無不取効最止疼痛不動臟腑乃内托之
藥也　方見癰疽門
丹溪曰腸癰大腸有热積死血流注桃仁承氣湯
加連翹秦艽近肛門破入風者难治用防風之類
河間射干湯　治胃脘癰人迎脉逆而盛嗽膿血

營衛不流熱聚胃口成癰　梔子仁　赤茯苓
射干去毛　升麻各一兩　赤芍一兩半　白术五錢
每服五錢水煎将熟入生地黄汁一合蜜半合
再煎溫服不拘時
復元通氣散　治諸氣澁耳聾腹癰便癰瘡疽無
頭止痛消腫
青皮　陳皮各四兩　甘草三寸半生半炙　川山甲炒
瓜蔞根各二兩　金銀花一兩　連翹一兩
右為末熱酒調下

痔漏門

痔者肛門内外有瘰脹疼者是也東垣謂濕熱風
燥四氣相合而致也痔有五種謂牡痔牝痔脉
痔腸痔血痔也古方又有酒痔氣痔虫痔翻花
痔鼠妳蟻結等痔之名不一究其所因亦不過
乂嗜辛热炙煿新酒及房劳憂思蘊積热毒憤
鬱之氣所致也或藏於肛門之内或突於肛門
之外若蘊毒深者其狀大蘊毒浅者其狀小大
者如蓮花鷄冠核桃之狀小者如牛妳鷄心櫻
桃之類久而不愈有妨行坐或出鮮血或流膿
水則成漏矣治法在外者宜熏之洗之在内者
宜祛其風而除其濕消其热而觧其毒斯得治
之法矣

東垣秦艽蒼术湯　治痔疾若破謂之痔漏大便
秘澁必作大病此由風热乘食飽不通氣逼大
腸而作也受病者燥氣也為病者胃濕也胃刑
大腸則化燥火以乘燥热之實勝風附热而來
是濕热風燥四氣相合故大腸頭成塊者濕也

作大病者風也若大便燥結者主病兼受火邪
也热結不通夫燥屎者其西方肺主諸氣其体
收下亦助病病為邪須當破氣藥兼之治法全
矣服之其疾立愈不可作丸以剉湯與之効如
神　秦艽一錢去芦　澤瀉三分　蒼术七分製　防風根
五分　桃仁去皮尖一錢　當歸根三分酒洗用身　黄栢去皮
酒洗五分　大黄煨少許雖大便秘亦不可多用　檳郎一錢細末調服之　皂角
仁燒存性去皮一錢細末調下服之　右除檳郎桃仁皂角仁
三味候煎成藥研勻調入外餘㕮咀作一服水

三盞煎至一盞二分去査入前三味再上火煎
至一盞空心熱服待少時以美饍壓之不犯胃
氣也服藥日忌生冷硬物及酒麪大料物乾姜
之類犯之則藥無効如有白膿加五朶白葵花
須除蕚去心細剪入青皮五分不去白入上藥
同煎又用木香三分爲細末同檳郎等三味再
上藥同煎依上法服餌古人以此疾多以歲月
除之此藥一服立愈若病久者再服必愈

秦艽白术丸

秦艽(去芦) 歸稍(酒洗) 桃仁(酒浸去皮尖另研各一兩) 地榆(三錢) 澤瀉
皂角仁(燒存性去皮各半兩) 枳實(麩炒) 白术(各半兩)
右爲細末和桃仁泥研勻煎熱沸湯麪糊丸雞
豆大焙乾白湯下空心宿食消盡服之少時以
美膳壓忌生冷硬物冷水菜并湿麪酒及五辣
辛熱大料物之類犯之則藥無驗十服必愈

蒼术澤瀉丸

蒼术(四兩去皮) 澤瀉 枳實 秦艽(各二兩) 地榆
皂角子(燒存性各一兩) 右爲細末燒餅爲丸如桐子
大每服三十丸米飲湯或酒下

一婦人產後痔作瘡有頭如蒜頭大或下鮮血或
紫血大便疼與黑神散又多食肉太飽此湿熱
在大腸 郁李仁(去皮) 麻仁 槐角(各之錢) 枳實
皂角仁(五錢爲末) 蒼术 歸尾 生地(各三錢) 大黃
(炒一錢) 右分六帖內三仁另研煎服

又方 治痔用雞冠花不拘多少濃煎湯每服一
盞空心服 本草云雞冠花性凉治瀉血

丹溪治番花痔頭向上是大腸熱甚收縮爲主用

四物解毒加枳殼白术槐角秦艽

治番花痔 荊芥 防風 朴硝 右煎藥湯洗
之次用木鼈子鬱金研末龍腦些少水調塗上

痔藥膏子治外痔番花脫出黃水不止腫痛病並
用銀罐篦蘸藥塗傳日一次重者五七次立愈
先用藥水洗拭乾却傳此膏用眞棗灰不拘多
少淋濃汁兩碗熬至一碗却入草烏片大黃片
各二錢再漫火熬至半碗入甘草一錢數沸下
淨細石灰半匙頭不可多略沸三五次用絹一

重花紙二重如絞漆狀濾過再熬成膏候給用
真胆礬五分研極細末放入膏中用瓷器盛貯
封之臨用入龍腦末和勻傅之
治腸痔鱉甲丸 鱉甲 蝟皮炙焦黑 川山甲炙焦
白礬枯 附子 猪牙皂角各半兩炙焦存性二分
右細末研勻蒸餅丸如桐子大米飲下二十丸
食前日三服
又方 槐花炒 白礬枯各一兩 附子五錢 右細末
研勻蒸餅丸如桐子大每服二十丸米飲下食

八 三十二卷 四十一

前日三服
丹溪治二十三年不愈者三服止用蓮花蕋散
蓮花蕋 黑牽牛頭末各一兩半 當歸半兩 礬紅少許
右為末先忌食肉五七日空心多食肉一頓就
取温酒下三錢約兩時辰取下膿血或虫是効
海藏外臺治五十歲痔不瘥塗熊胆取瘥神効諸
方不及此
七聖丸 治太腸疼痛不可忍羊叔和云積氣生
於脾藏傍大腸疼痛陣難當漸交稍瀉三焦濕

莫漫多方立紀綱
羗活一兩 檳郎 木香 川芎 桂枝去皮各半兩
大黄煨八錢 郁李仁去皮另研一兩
右除郁李仁另研外為細末煉蜜丸桐子大驗
虛實臨時斟酌丸数白湯下取大便微利一服
而愈切禁不得多利大便若大便大行其病滋甚
治鼠痔結核作渴疼痛方
皂角炙 川山甲 黄蓍 荊芥 槐子
木香 蝟皮 鱉甲醋炒 桔梗 露蜂房炒焦

八 三十二卷 四十二

芍藥各一兩 大黄五錢
右為末煉蜜丸桐子大每服三十丸温酒下食
前日三服未止加至四五十丸
治痔疾下血疼痛不止以玩月沙不拘多少慢火
熬令黄色為末每二錢入乳香五分空心温酒
調下日三四服瘥
秦艽羗活湯 治痔漏成塊下垂疙瘩不任其痒
升麻根 柴胡 甘草炙 麻黄根各五分 黄蓍
秦艽各一錢 防風根七分 藁本三分 細辛炒

紅花少 羌活根三分一錢 水煎服

治痔有虫咬穀道痒或下膿血多取槐白皮濃煎汁安盆中坐薰之塞其穀道湯冷更煖之良久欲大便當虫出不過三度即愈如用末綿裹納下部

淋渫藥 治下部痔腫大腸頭痒痛

葳靈仙 枳殼各一兩麩炒 右為粗末熬水薰洗冷即再煖臨卧避風洗三次挹乾貼蒲黃散

丹溪治腸風痔漏有虫如絲細黑頭取去除根

〔八二卷〕 四三

瞿麥半斤 猪牙皂角一寸

右為末入猪腰子一雙內用米泔煮空心食之少頃肚痛上攻虫皆隋出作地坑埋之薄粥補之

當歸郁李仁湯 治痔漏大便硬努出大腸頭下垂多血苦痛不能忍

皂角仁另研細末調服 郁李仁 秦艽各一錢 麻子仁一錢半 當歸稍 生地黃 蒼术各五分 澤瀉三分 枳實七分 大黃三錢煨

右除皂角仁研細末餘藥剉如麻豆大水三大盞煎一盞去查入皂角末調在內空心食前候宿食消尽服之忌風寒處大小便如欲凉大腸寬大腸則用枳殼去穰入巴豆鉄線纏煮透去巴豆入藥用若丸藥則搗爛用煎藥則乾用

治腸痔 每大便下血槐樹上木耳取末之飲服方寸匕日三服良

治腸痔多年不瘥下血不止木賊枳壳各二兩乾姜一兩大黃一分四味並剉一處入銚子內炒黒色存性二分搗羅温粟米湯調食前服二錢七甚妙

〔八三卷〕 四四

治痔漏穿方 鷄子一個煮熟去黃取白切炒 明礬如皂角子大甚上枯過用三分 右為末用温湯洗净拭乾用紙撚點藥送入瘡孔內立効日三易

又方 川山甲燒 肉荳蔻仁三個 同為末米飲調二錢服 如氣痔膿血甚者刺蝟皮一兩燒服中病即已不必尽劑

治痔神應散 治五種腸風下血上厠糞前有血名外痔糞後有血名内痔大腸不收名脫肛穀道四面有努肉名妳痔頭上有孔漏出名腸風

並治之　黃牛膽（十枚）猪膽（中者）　蛇蛻皮（一條白者）
猪牙皂角（七錢）　川山甲（七片）　刺蝟皮（一兩剉）
右五味細剉入甕瓶內以黃泥封固候乾先用
小火燒令烟出後用大火煅令通赤為度取出
攤開候冷搗羅為末服時先令患者臨臥時細
嚼胡桃仁一個如糊用無灰好酒一盞送下不
可言語便睡至五更時以溫酒調下藥末三錢
至辰時更進一服雖年久不過三服立効
丹溪治腸風痔漏如神　大樹木上寄生藥取乾為

一八三二卷　四五

末酒水米飲任下或丸桐子大服三十丸亦可
千金方　治五痔方蒼耳莖葉以五月五日採乾
為末水服方寸匕或丸桐子大服之立効
洗痔疼　用荆芥朴硝桑寄生定痛解毒去風涼
大腸熱安胎如腫者加倍子木鱉子研極細調
服而愈
又方　五倍子朴硝桑寄生蓮房水煎洗一方
加百藥煎洗
洗痔方　輕者用朝東馬齒莧刘寄奴濃煎湯熏
待溫却用手洗拭乾重者加大青葉梗乾者一
半同煎
丹溪治痔痒用灰莧帶根煎濃湯先熏後洗
又方　取河水頻洗用蝸牛塗之
一方治痔　用雄鷄胆片腦和匀貼之
一方　熊胆塗之神効
蒲黃散　治下部痔漏　蒲黃　血竭（半兩）
右為細末每用少許貼於患處
熏痔法　蝟皮（切方三指大）　雄黃（棗大研）　熟艾（鷄子大）

八三三卷　四六

右為末用瓦器以灰實一半如燒香法安長桶
內坐其上熏之烟氣從口出為佳凡三度熏永
瘥勿犯風冷忌鷄肉毒物
丹溪治痔瘡　大蒜十片頭垢捏成餅子先安頭
垢餅於痔頭上外安蒜片以艾灸之
本事方　治一判官乘騾入駱谷有痔疾因此大
作其狀如胡瓜貫於腸頭熱如溏灰火至驛僵
仆主驛吏云此病予曾患來須灸即瘥用柳枝
濃煎湯先洗痔便以艾炷其上連灸三五壯忽

覺一道热氣入腸中因轉瀉鮮血穢物一時出
至痛楚瀉後遂失胡瓜所在登驛而馳去
無擇云腸澼如痔如大澤中有小山突出為痔人
於九竅中凡有小肉突出皆曰痔不特於肛門
邊生有鼻痔眼痔牙痔等其狀不一方書分出
五種曰牡曰牝曰脉曰腸曰氣牝痔者肛边生
瘡腫突出一日數枚膿潰即散牡痔者肛边發
露肉珠狀如鼠嬭時時滴漬膿血脉痔者腸口
顆顆發瘟且痛且痒出血淋漓腸痔者腸内結

核有血寒热往来登溷脫肛氣痔者遇恐怒則
發肛門腫痛氣散則愈又方有酒痔每遇飲酒
發動瘡腫痛而流血血痔則每遇大便清血隨
下而不止宜解热調血順氣為主若久不愈必
至穿穴為漏矣

治痔切勿用生砒毒氣入腹反至奄忽忌喫生冷
硬物冷菜之類及酒濕麪五辣辛热大料物及
乾姜之類犯之無効此東垣格言也

秦艽防風湯　治痔漏每大便時疼痛

秦艽　防風　歸身　白术（各一錢半）　甘草（炙）
澤瀉（六分）　黄柏（五分）　大黄（煨）　陳皮（各三分）　柴胡
升麻（各三分）　桃仁（廿箇去尖另研）　紅花（少許）
右水煎空心热服

烏金散　治痔漏
川山甲　蝟皮（燒存性）　黄牛角䚡（剉碎炒黄）　牙皂角
槐子　皂莢刺　枳殼　貫衆　阿膠（各等分）
川山甲（炒黑）　右為細末每服錢半用胡桃肉爛研
併調酒食前服大腸热荊芥湯下漏血不止（川帰湯下）

蝟皮丸　治諸痔出血裡急後重
川帰　川芎　白芍　枳殼（各五錢）　槐花（炒三錢）
艾葉（炒）　地榆　黄耆　白礬（枯）　貫衆（各錢半）
蝟皮（一两炙焦）　大皂角（一条酥炙）　猪後蹄垂甲（十箇炙焦）
蜂房（炒焦二錢五分）　川山甲（炒焦二錢五分）　皂角刺（燒焦一錢五分）
一方有蟬退洗焙　晷燒二錢　右為末醋糊丸
如桐子大每服七十丸

逐瘀湯　治热痔通利大小便取下黑物
川芎　赤芍　生地　白芷　五靈脂　枳殼

阿膠　蓬术炮　茯苓　茯神　木通
生甘草各一分　大黃生　瓜仁去皮各一分半
每服三錢姜三片蜜三匙煎服以利為度污血
作疼通用

鈎腸丸　治久新諸痔肛邊腫疼或痒挾虛寒而
作者　栝蔞二箇燒存性　蝟皮剉碎礶內燒存性二箇
白礬　綠礬枯　胡桃仁十五箇燒存性　白附子生
半夏　南星　鷄冠花五兩燒　枳殼　附子去皮臍
訶子去核各二兩　右為末醋麪糊丸梧子大每服

八 三千卷 四九

二十丸空心臨卧温酒下

槐角丸　治諸痔出血及痔頭上有孔名瘻
槐角一兩炒　地楡八兩　川歸八兩　黃芩八兩
防風八兩　枳殼八兩　右為末酒糊丸如梧子大
每服五十丸米飲下

乾葛湯　治酒痔
白乾葛　枳殼　半夏　茯苓　生地各半兩
黃芩　甘草各一分　杏仁五錢　每服三錢黑豆
百粒姜五片白梅一個水煎服

橘皮湯　治氣痔
陳皮　枳殼　川芎　槐花炒各半兩　梹郎
木香　瓜仁　紫蘇莖葉　香附　甘草炙各一錢半
每服三錢姜棗煎服

黑玉丹　治腸風及痔漏頭疼不可忍用此去蛋
拔根三五服見効　蝟皮八兩剉　猪懸蹄百隻
牛角䚡八兩　槐角二兩　雷丸　脂麻各二兩
乱髪皂角湯洗焙　敗棕剉各二兩　苦練根剉二兩半
右用磁礶內燒存性研細末入乳香一兩射香

八 三一卷 五十

四錢研合和匀酒糊丸如桐子大每服五十丸
先細嚼胡桃一枚以温酒呑下日二服甚者日
三服空心及食前服

又方　治同上
人参　黃蓍炙　生地　川歸　川芎　条芩
升麻　枳殼　槐角各等分　右為細末麪糊丸
如桐子大每服三十丸空心米湯下

敷藥蝸牛膏　蝸牛一枚　腦子　射香各少許擣
之用磁合盛次早取汁附之

一方 熊胆一錢 射香一分 片腦五厘 共為細末點田中大螺數枚碗盛候汁出取以點之

一方 寒水石 朴硝 共為末以津調手指點藥附痔上

一方 蝟皮燒灰生洒油和附 治腸痔下部者如虫餂炙末用

一方 治諸痔用川山甲自尾根尽處數除三鱗不用取第四五大鱗橫三行燒存性為末入射香少許臘茶一匙同調空心服以澄下濃者附瘡上其冷如氷冷永不痛大効

附後方 治漏 蜂房一枚炙黃赤色為末每用一錢臘猪脂調附瘡上

一方 用兎系子炒黃黑色為末用少許和鷄子黃調附亦治谷道中赤腫

一用木鱉子槌去油煎湯洗一用槐柳枝煎湯洗

又方 飲酒多之人生痔三黃丸以生地黃汁為丸空心淡酒呑下三五十丸立効

二八通玄丹 梅東先生方

宣連入兩用茱萸四兩炒去茱萸 川帰二兩 烏梅肉 槐角 枳殻各二兩 右為末以雄猪肚一箇洗淨入藥在內外以韮菜四五斤包其肚用水醋共数碗煮肚熟為度去韮菜并肚以藥爛搗丸如桐子大每服空心白湯下五七十丸

虫痔 用鰻魚乾燒烟薰之虫尽死而愈

治穀道邊生瘡久不愈者 用鷄内金燒灰存性研細末乾貼患處如神

皂角煎丸 治內痔漏腸頭裏面生核寒熱往来

滿尺皂角二挺去弦醋炙 白礬煅 刺蝟皮炙黃

薏苡仁 白芷各一兩 桃仁去皮炒 甜葶藶炒

川芎 桔梗各半兩 猪後蹄垂甲十枚燒存性

右為細末煉蜜丸如桐子大每服五十丸空心用桑白皮煎湯送下

拔毒散 敷痔腫毒處

大黃 黃蘗 白芨 石羔 黃芩 黃連

白歛 梔子 朴硝各等分

右為末用井花水調塗

湯火門

凡湯火傷急向火炙雖極痛強忍一時即不痛慎勿以冷物搨之及井底泥傳之使熱氣不出爛入肌肉

火燒以好酒洗之再以鹽傳其上如皮塌者以酒熬牛皮膠傳之

熱酒傷用糯米粉炒黑末酒調傳之

治湯火灼未成瘡者用艾白根燒灰鷄子黃和傳之如成瘡用白蜜封之以竹中取膜貼上日三次

治湯火瘡麸皮炒黑灰為末傳上神妙此方有補性始終皆可用

治湯火瘡取舊烹銀爐中燒過焦黃土研細如粉以生姜調於帛上貼之痛止

一方用溶銀鍋子細末油調傳上佳

保生救苦散　治火燒熱油損或至皮肉爬及一切狗嚙損傷并刀斧傷用生寒水石不拘多少為極細末調塗之或乾上然不如油調塗其痛立止並不作膿無分毫厘苦楚日近完復永無

破傷風症

氷霜散　治火燒皮爛大痛

寒水石生　牡蠣燒　朴硝　青黛　輕粉各等分

右為細末新水或小油調塗立止

治火燒　桐油　水銀各等分　右二件以柳條不住手攪成膏再入大黃石羔二末和以牛皮膠入少水溶開外用猫兒肚底毛細剪摻上貼之以青綿傳之妙

治湯火瘡爛者以黃蜀葵花落者淨器収之入水些少待爛成水傳上神妙

熱油燒外痛以蜜傳之立安　梅師方

治湯火瘡至妙　用劉寄奴為末先以粳米漿鷄翎掃傷處後以藥末摻上不痛且無痕大凡湯傷先用盐末摻之護肉不壞然後傳藥

又方以榆白皮末猪脂油塗瘡愈

顛撲損傷門

按發明經云夫從高墜下惡血畱於內不分十二經絡聖人俱作風中肝經畱於脇下以中風療

之血者皆肝之所主惡血必歸於肝不問何經之傷必留於脇下蓋肝主血故也痛甚則必有自汗但人汗出皆為風症諸痛皆屬於肝木况敗血凝滯從其所屬入於肝也從高墜下逆其所行之血氣非肝而何以破血行經藥治之

內經云肝脉搏堅而長色不青當病墮若搏因血在脇下令人嘔逆金匱云寸口脉浮微而澀然當亡血若汗出設不汗出者當身有瘡被刀斧所傷亡血故也

金瘡出血脉沉小者生浮大者死

砍瘡出血一二石者脉大二十日死

砍剌出血不止者其脉止脉來大者七日死滑細者生

從高顛仆內有血腹脹滿脉弦者生小弱者死

劉宗厚云撲破傷有瘀血在內脉堅強實則生虛小弱者死若亡血過多脉虛細小者生浮大數實者死皆為脉病不相應也

子和云諸落馬墜井打撲傷損悶肭挫折杖瘡腫發焮痛不止者可峻下二三十行痛止腫消宜以通經散導水丸等藥或加湯劑瀉之後服和血消腫散毒之藥

劉宗厚曰按子和於墮車落馬杖瘡悶肭者俱用峻下其有心恙牙關緊急者云是驚涎堵塞於上俱用三聖散先吐後下其法雖峻然果有經涎瘀血停留於內焮痛腫脹發於外者亦奏捷功但於出血過多老弱之人脉虛大者亦當詳求

又曰謹按撲打金刃損傷是不因動氣而病生於外

外受有形之物所傷乃血肉筋骨受病非如六淫七情為病有在氣在血之分也所以損傷一症專從血論但須分其有瘀血停積而亡血過多之症蓋打撲墜墮皮不破而內損者必有瘀血若金刃傷皮出血或致亡血過多二者不可同法而治有瘀血者宜攻利之若亡血者兼補而行之又察其傷有上下輕重淺深之異經絡氣血多少之殊惟宜先逐瘀血通經絡和血止痛然後調氣養血補益胃氣無不効也須見圖

城中軍士被傷不問頭而手足胸背輕重治者例以大黃芋藥利之後大黃鈌少甚者遂以巴豆代之以為不於初時瀉去毒氣後則多致危殆至於略人手指亦悉以藥利之殊不知大黃之藥惟與有瘀血者相宜其有亡血過多元氣胃氣虛弱之人不可服也其巴豆大熱有毒止能破堅逐積用於此疾尤非切當所以有服下藥過後其脉愈見堅大治者不察又以為瘀血未尽而復下之因而夭折人命可不慎歟

凡損傷切不可食冷水血見寒則凝但一系血入心即死以攻下瘀血之劑治之

金匱治馬墜及一切筋骨損方

大黃一兩酒浸 緋帛如手大燒存性 亂髮如鷄子大燒存性

炊単布一尺燒灰 敗蒲一把二寸 桃仁四十九粒去皮尖

甘草如中指節炙 七味以童便煎成入酒一大盞次下大黃去滓分溫三服先剉敗蒲席半領煎湯浴衣被覆斯須通利痛楚立瘥

復元活血湯 從高墜下惡血留於脇下疼痛不可忍

柴胡五錢 當歸六錢 甘草 川山甲炮各二錢 大黃一兩酒浸 桃仁五十枚去皮尖 紅花 瓜蔞根各二錢 右件桃仁研爛剉如豆大毎服一兩水二中半酒半中煎至七分食前服以利為度得利後痛或不尽服乳香神應散

靈樞云墜墮惡血留於脇下則傷肝〻胆之經行於脇下屬厥陰少陽宜以柴胡為引用為君以當歸活血脉又急者痛也以甘草緩其急亦能生新血陽生陰長故也為臣川山甲括蔞根桃仁紅花破血潤血為之佐大黃酒製以蕩滌敗血為之使

當歸導滯散 治損傷瘀血大便不通紅腫暗青疼痛昏悶畜血內壅欲死

大黃一兩 當歸三錢 射香少許 右二味為細末入射香和匀毎服三錢熱酒調下其瘀血自下若骨節傷折疼痛以定痛接骨紫金丹治之

定痛乳香神應散 東垣方 治從高墜下疼痛不可忍及腹中疼痛 乳香 没藥 雄黒豆

桑白皮　獨科栗子各一兩　破故帋二兩炒
當歸一兩　水蛭半兩　右為末每服五錢醋一盞
沙石器内煎至六分入射香少許温服
定痛接骨紫金丹
麝香　沒藥　紅娘子各一錢半　烏藥二錢
地龍二錢半去土　川烏　草烏各一兩炮　五灵脂半兩
木鱉子半兩去殼　茴香二錢半　黒丑五分生用　骨碎補
威灵仙　金毛狗脊　防風　自然銅七次醋淬
各五錢　禹餘粮四錢　陳皮　青皮各二錢五分
右為細末醋糊丸桐子大每服十丸至二十丸
温酒送下
三因鷄鳴散　從高墜下及木石所壓凡是損傷
瘀血凝滯疼痛欲死兼以此藥推陳致新神効
此方治血滯於肺部氣分也　大黄一兩酒浸
杏仁三十粒去皮尖　右研細酒一碗煎至六分去滓
鷄鳴時服至晩取下瘀血即愈若便覺氣絶取
藥不及急劈開口以熱小便灌之
王海藏云若登高墜下撞打及傷心腹胸中積血
不散以上中下三焦部分分之以易老犀角地
黄湯桃仁承氣湯抵當湯丸之類下之亦有以
小便同煎治之者更有内加生地當歸煎服者
亦有加大黄者惟智者擇之
潔古巴戟湯　治從高墜下及打撲内損昏冒嗜
卧不能飲食此謂血閉臓腑不通　巴戟去心
大黄各半兩　當歸　地黄　芍藥　川芎各一兩
右水煎以利為度
嚴氏奪命散　治刀刄所傷及從高墜下木石壓
損瘀血凝滯心腹疼痛大小便不通
水蛭用石灰拌慢火炒令焦黄色半兩　黒丑二兩　右為末每服
二錢熱酒調下約行四五里再用熱酒調黒丑
末二錢催之須下惡血成塊以尽為度
破血止痛行經之劑
破血散　治乘馬損傷跌其脊骨惡血留於脇下
其痛苦楚不能轉側
羌活　防風　桂各一錢　柴胡　連翹各二錢
歸稍二錢　水蛭二個炒烟尽研　射香少許另研

右分作二服每服二大錢酒水一盞除水蛭射
香外另研如泥煎餘藥一大盞調二味食前服
地龍散　治腰脊痛或打撲損傷從高墜下惡血
留於太陽經中令人腰脊或脛腨臂腰中痛不
可忍　中桂　地龍各四分　羌活二錢　黃栢
甘草各一錢　蘇木六分　麻黃五分　桃仁六枚
歸稍一分　每服五錢水煎服
三因加味芎藭湯　治打傷敗血入胃嘔吐黑血
川芎　當歸　白芍　百合浸半日　荊芥穗各等分

右水酒各半煎服
元戎加味四物湯　治虛人損傷不禁下者
四物湯加川山甲水煎服
花蕋石散　治一切金刃箭鏃傷及打撲傷損猫
犬咬傷或至死血瘀傷處以藥摻之其血化為
黃水再摻藥便活不疼痛如內損血入臟腑煎
童子小便入酒少許調一大盞服之立效若牛
觝腸出不損者急納腸入用細系或桑白皮為
線縫合肚皮縫上摻藥血止立活如無桑白皮
用生麻續亦可並不可封裹瘡口恐作膿血如
瘡乾以津液潤之然後摻藥婦人産後敗血不
盡血迷血暈惡血奔心胎死腹中胎衣不下至
死者但心後覺煖急以童子小便調一盞取下
惡物如肝片終身不患血風血氣症若膈上有
血化為黃水即時吐出或隨大便出
石硫黃四兩　花蕋石二兩　右二味相拌合勻先
用紙筋和鹽泥固濟瓦罐子一箇內可容藥候
泥乾入藥在內再用泥封口候乾安在四方磚
上上書八卦五行字用炭一秤籠疊周匝自巳

午時從下着火漸漸上徹直至經宿火冷炭盡
又經宿出罐細研以絹羅子篩極細磁盒盛之
依法使用

雜方

本事方　治打撲墜損惡血攻心悶亂疼痛水仙
散未展荷葉陰乾一味為末食前以熱童便一
盞調下三錢以利下惡物為度
經驗方　治打撲損筋傷骨折

黄栢（一两） 半夏（五[illegible]） 右為細末用生姜自然汁調如稀糊敷以紙花貼如乾再敷如骨折先以絹帛封縛次用杉樹皮夾定良久痛止即痒覺熱乃是血活筋骨復舊輕者三五日重者不過旬日矣

本事方 治跌仆傷筋損骨痛不可忍（此方乃神仙秘授）

生地（為末） 藏瓜姜糟（各一斤） 生地（四两切）

右都炒令匀熱以布裹罨傷折處冷則易之（神效）

治打撲内損筋骨疼痛

乳香 没藥 芍藥 川芎 川椒（去子及閉口者） 當歸（各半两） 自然銅（煅三錢）

右為細末用黄蠟四两溶開入藥末不住手攪勻丸如彈子大每服一丸用好酒煎開消尽乘熱一服吃尽看何處痛向痛處卧霎時服三五丸立効

衍義云 没藥通滯血打傷撲損疼痛皆以酒化服夫血滯導而行之則痛腫消焉

肘後方 治被打瘀血在骨節下出者

生鐵（一斤） 酒（五升）煎取一升飲之

丹溪治一人因上山惡血瘀入内損傷食少脉絃 治宜活血和氣

川芎（三錢） 青皮（二錢） 芍藥 滑石（各一錢） 丹皮（五分） 炙甘草（一錢） 桃仁（七枚研） 水煎服之

綴耳鼻法 治擦落耳鼻用髮入罐子鹽泥固濟煅為末乘急以所擦落耳鼻蘸灰綴定以軟帛縛定立効

肩穿法 凡負重擔肩破者剪貓兒頭上毛不語唾粘之

遠行脚打泡 以生麪水調為糊貼過夜即乾不可擦破

又方用飯粘搗貼以紙覆之過夜次日平復効

抵金用 跌撲傷損閃扭出骨竅等症

蚕沙（炒黄） 菉豆粉（炒黄各四两） 枯礬（二两四錢）

右為末釅醋調敷患處厚紙貼之絹帛綁扎换數三四次即愈忌產婦

秘傳神效散 治跌撲損傷骨折骨碎筋斷疼痛不可忍者此藥極能理傷續斷累驗若神

用路上或墻脚下過往人便溺處經久碎瓦片取来洗净火煆醋淬五七次瓦黄色為度以刀刮細末每服三錢好酒調服不可以藥微賤而輕忽其功也

一字散　治跌撲傷損功効同前

半兩錢五枚火煆醋淬四十九次　甜瓜子仁五錢　珍珠二錢

右為末每服一字好酒調下

治跌撲傷損　用蟹二隻連殼搗爛好酒二碗漂煎去渣飲之留渣敷患處　八三十七卷

治損傷神効　治跌傷骨折急取雄鷄一隻豈患人酒量多少成一碗半碗將鷄刺血於酒中温之令患人熱飲其痛立止驗甚　六三五

癘風

内經云脉風成癘此疾非止肺腎二臟有之以其病蝬於鼻俗呼為肺風也鼻準赤而脹大乃血随氣化也氣不施則血聚血聚則肉潰而生虫此属厥陰當以藥踈之可用局方升麻湯下錢氏瀉青丸是也餘病各随經而治之癘風成癩樺皮散主之從少至多服五七月後灸承漿七壮瘡愈勿止藥再灸同止　承漿一名懸漿在唇下宛宛中足陽明任脉之會療偏風口喎面腫消渴口齒疳蝕生瘡灸之佳每灸七壮至七七壮止灸則血脉宣通其風應時而愈艾炷如小竹筋頭大不可灸破血向但令當脉灸亦能愈疾　八三十卷　六才

樺皮散　治肺臟風毒遍身瘡疥及癮疹瘙痒

杏仁泡去皮尖水一碗煮至五分取出晒乾另研　荊芥穗各二兩

枳殼去穰炭火燒存性　樺皮各燒存性四兩　炙甘草五錢

右五味為末每服二錢食後温酒調下日進三次

凌霄散　治癘風神効

蟬退 地龍(去土焙) 白僵蚕 全蝎(各七箇)
凌霄花(五錢) 右為末每服二錢酒調下無時常
宜浴每浴坐於湯中浸一時久服藥神効

四聖保命丹

大黃(五錢) 黃栢(八兩) 苦參 荊芥(各四兩) 乾蟾(一隻煆)
瓜蔞根 防風(各五錢) 輕粉(二錢)
右為末每服一錢茶清一盞調下空心日午臨卧各一服服五七日後先於牙縫內出臭黃涎渾身疼痛次後便利膿血病根悉去

加減何首烏散 治紫白癜風筋骨疼痛四肢少力眼紅無白鼻梁崩壞皮膚瘡疥及手足皴裂睡卧不安行步艱辛

何首烏 蔓荊子 石菖蒲 荊芥穗
甘菊花 枸杞子 威靈仙 苦參(各五錢)
右為末每服三錢蜜茶調下無時

參毛丸 治大麻風

苦參(一斤) 獺毛(半斤煆存性) 為末陳米糊為丸梧桐子大每服五十丸酒送下一日二次

仙方鯪鯉散 此方治大麻風極妙絶勝他方之寶

穿山甲活者大約重十觔為妙剖開肚不去腸雜以真生漆一觔塗在肚內陰乾七日用泥包火煆存性研極細末每服三分或五分火酒調下用真青布被上下蓋之出汗臭不可聞不得見風待汗乾被上俱是小虫服十日眉毛復出身上膿水瘡皆愈一月即脫軀除根

愈風散 治一切惡風癩疾除鼻梁崩壞者不治外其餘不問新久無不收功

淡豆豉 真輕粉 只殼 俱為末每服一二錢五更空心糯米湯調下至早飯後稍覺困倦欲睡不睡乃藥力搜風使然當逐下惡物再服後鶬風丸調理

鶬風丸 治大麻風不拘年月以効為度

鶬風(二兩) 防風(一兩) 地榆 麻黃(去節) 雄黃(另研) 天麻(各半兩)
右為細末醋糊為丸梧桐子大每服三十五丸酒下日三 忌雞猪魚蒜粘滑油

膩燒炙胡椒房失能如此調養則萬全矣若初起三五年者十全八九如縱恣無忌憚者則不能收全功

癧瘡方

明礬末　黃蠟　新鮮土茯苓　過路珍珠草　紫背天葵根子各一兩　右為末煉化黃蠟加生蜜糖拌搗為丸梧子大每服三十丸米飲下初服一日三次後只一日一次

又秘方　治大麻風癩疾

死人頸虫洗淨銅片上焙乾為末每用一二錢用皂角刺煎濃湯調下　若腫而有疙瘩者乃陽明經濕熱壅盛先以防風通聖散服二三帖然後再服此藥蓋此藥有補功以皂針為引故能達表能久服之極有神功非泛常草木可比倫也用遍橫死者於檢屍場中問仵人買之極多不難

終

赤水玄珠跋

是集也曩予客吳興時與銅壁山人創其事嘗慮浩汗難竟中輟者屢矣陳松亟允祿吳九宜文學間謂予曰集成則予病不成則天下病予終毋吕一人故病天下乎深然之會有事還里中與予姪元素畢力裒校竄削積十餘年迺成屢謀入梓而未能復持過吳興則銅壁光祿皆已捐館無由商訂為之慨然光祿冢君春野曁舊遊諸君子無

忘久要各出金錢以畀梓人不
踰年遂告成事嗟乎佛力廣大
其於營締莊嚴何有而財施法
施資于十方應得善果刻茲管
窺蠡測之見僅僅祖述岐黃續
明和緩何能迴向醫王萬一惟
以徼惠諸公得覺宿心所願集
行群迷頓廓衆病咸瘳庶幾與
諸公共此好生之德洽于天下
稱檀波羅蜜云爾

一生、子孫一奎識

長城周承積書

醫旨緒餘二卷

（明）孫一奎撰

明孫泰來孫朋來刻本

醫旨緒餘二卷（浙江巡撫採進本）

明孫一奎撰。大旨發明太極陰陽五行之理，備於心身，分別藏腑形質，手足經上下，宗氣、衛氣、榮氣、三焦、包絡、命門、相火及各經絡配合之義。又引黃庭經以證丹溪相火屬右腎之非。引脈訣刊誤以駁三因方三焦有形如脂膜之謬。分噎膈翻胃為二證，辨癲狂癇之異治，皆卓然有特識。其議論諸家長短，謂仲景不徒以傷寒擅名，守真不獨以治火要其。戴人不當以攻擊蒙譏，東垣不專以內傷奏績。陽有餘陰不足之論不可以訾丹溪，而攖寧生之技亦可並垂不朽，尤千古持平之論云。

醫旨緒餘序

素靈為醫學之祖厥旨精深脫非高智曷能洞徹玄竅而融奧妙碩軌之醫宗率執方以為捷徑即間有讀內經者亦堇堇假口說以欺人之叩其義輒咽喉間作囁嚅狀靡能暢朗至靈樞豈惟茫然且未嘗接睫也醫若此安望其見病知微哉海陽孫生東宿往以是術游余雲上聲聞籍甚與論患者偃立諸搢紳家延生趾相錯也余雖見生察脈投劑迥異常品心故奇之迺視家大鄣生持所著輯醫旨緒餘抵余徵序余讀之卒業見其鈎素靈之隱察受病之因辨症名之異同經脈之逆順暢往哲已發所未盡擴前賢缺漏所未言蓋信往之奇中雲上者本心得而出之故能隨俗為變而取效神也詎如庸衆之嘗試湯為哉是刻也猶然生之緒餘爾載觀生赤水玄珠二十卷其諳精學博斯可具見乎余故奇生乃因其請而序諸首生名一奎別號東宿歸安沈考功觀頤

為諆東宿說以家世受易又號生生子故西吳咸稱生生子云

賜進士第文林郎知績溪縣事烏程吳維魁譔

叙醫旨緒餘

醫之為道豈眇小乎哉陶鑄天地和順陰陽宣節氣化措民物而置安全其功與粒食蒸民者同功而其立言祕旨可等潔淨精微之蘊脫若性非睿哲養非深邃蘊積非以歲年與夫受衷非慈祥長厚則無能窺閫奧以觀其妙調瘥癘回夭札而登之康寧黃髮也世之業是術者非不紛然彩矣顯眯謬自用有稱名家亦擬方書為套本鮮濟則委天命不可為偶而獲効輒揚揚矜詡其能莫自信執方之為便以斯職業安望其究素靈之真詮晰和扁之渺緒哉醫道之小業醫

者自小之也余族叔文垣仲年以機穎儁奕著比受書了了昭徹大義塾師殊異之舞象而後訪兄之括蒼遇異人以禁方相授歸則會乃翁疾即由儒徙業又念良醫以意中而執方爲下簡籍所載古人之意存焉乃發巖書讀之上自靈樞素難下及古今名家靡不繙閱又匪徒然蒐獵古人之言詮務因言詮驗洽古人之神髓居而心惟出而廣詢近而丘里鄉國之士靡不諮遠而江淮河漢之險靡不蹈就專門以叩厥秘宗儒碩以研厥精積之三十年所獨智益徹而理竅益融于凡天

地間浮沉升降之機陰陽闔闢之運氣化推遷消息盈縮之數人身之寒熱虛實順逆表裏之異鏡瑩於中其治病也察天時稽氣運審受病之因酌君臣佐使之用故投劑輙効籍籍竒矣何論薦紳尊人以及太耋而新都之鉅閥窮簷与三吳之顯貴隱約靡不飲其湯液而稱有喜也且也日以其已試者輯而錄之又采諸名家言與人辯難等語彙編成集名曰醫旨緒餘是集也三才之理明五行之義著相火之辯暢以達三焦之位論而確以至臟腑之分配病名之異同經絡之源貫呼吸之本原脉象之考胗

法治法之定靡不備載又列前賢之長以標其善簡冊雖約而其遠宗之正近取之周孝叢之精謙冲之度一集而四善具焉猶曰緒餘惡有能出其右而稽涉論哉昔皇甫有言人而不精醫藥雖有忠孝之心仁慈之性君父危困赤子顛連將何以濟余不佞謂斯精詣若是咸可濟之矣故掇拾其槩而為之序觀者慎毋謂余儒宗親而言近阿哉

族子燁元熹頓首拜譔

醫旨緒餘上卷
醫旨緒餘下卷

醫旨緒餘上卷目錄

太極圖引
太極圖
太極圖說 附中和集太極圖說
不知易者不足以言太醫說
問三才所同于人身何以見之
命門圖說
右腎水火辯
七節之傍中有小心
難經正義三焦評 附東垣三焦論
問診三焦包絡
脉義
問十二支土多十二經火多之義
問手心主
手足經配合臟腑之義
問五行金木水火土之義
問心包絡何以不得為臟
問右腎何以不得與十二經之數

問五行土無定躰
問十二經臟腑命名之義
原呼吸
診法
診脉推移指法
宗氣營氣衛氣說
[illegible]辯
噎膈翻胃辯
四時脉說
問傷寒桂枝湯用桂枝說
氣鬱脇痛論
論痰為津液脾濕所生
咳嗽
哮
喘
論汗不可純作血看
論五鬱
論嘔血

論咳血
論齒衄
顫振
火附相火辯
泄瀉辯
防暑
瘧論
痢疰痛辯
鼻䶊鼻淵

下卷目錄
脇痛
腹中水塊作痛
腎消
羅先生藥戒
人身前後上下左右二十八脉
人身有四海
刪定野山秘抄種子說
護胎說
王節齋本草集要參著論
人身內景說
同身骨節說
驗胎訣
不執方說
列張劉李朱滑六名師小傳
晉過舊文
難經脈分府木浮沉說
難經十八難圖註辯

七十五難不字辯
八十一難是病二字辯
靈樞經小引
本神篇
決氣篇
脈論
五癃津液別篇
賊風篇
婦人無髭
原缺

醫旨緒餘卷上

明新安休寧生生子東宿孫一奎　著撰
子　泰來　明來　仝校梓

太極圖抄引

生生子曰天地萬物本爲一體所謂一體者太極之理在焉故朱子曰太極只是天地萬物之理在天地統體一太極在萬物萬物各具一太極即陰陽而在陰陽即五行而在五行即萬物而在萬物夫五行異質四時異氣皆不能外乎陰陽陰陽異位動靜異時皆不能離乎太極人在大氣中亦萬物中一物爾故亦具此太極之理也惟具此太極之理則日用動靜之間皆當致夫中和而不可須臾離也醫之爲教正示人節宣天地之氣而使之無過不及攻是業者不能尋繹太極之妙豈知本之學哉故具太極圖抄於首簡

太極圖



太極圖說

山陽度氏曰上之一圈者太極本然之妙也及其動靜既分陰陽既形而其所謂上之一圈者常在乎其中蓋本然之妙未始相離也至於陰陽變合而生五行水火木金土各具一圈者所謂分而言之一物一太極也水而木木而火火而土土而金復會於一圈者所謂合而言之五行一太極也然其指五行之合也總水火木金而不及土者蓋土行四氣舉是四者以該之兩儀生四象之義也其下一圈爲乾男坤女者所謂男女一太極也以見太極之妙流行於天地之間者無乎不在而無物不然也

中和集曰上之一圈者釋曰圓覺道曰金丹儒曰太極所謂無極而太極者不可極而極之謂也釋氏云如如不動了了常知易係云寂然不動感而遂通丹書云身心不動以後復有無極真根言太極之妙本也是知三教所尚者静定也周子所謂主於静者是也蓋人心静定未感物時湛然天理即太極之妙也一感於物便有偏倚即太極之變也苟静定之時謹其所存則天理常明虚靈不昧動時自有主宰一切事物之来俱可應也静定工夫純熟不期然而自然至此無極之真復矣太極之妙應明矣天地萬物之理悉備於我矣

不知易者不足以言太醫論

生生子曰天地間非氣不運非理不宰理氣相合而不相離者也何也陰陽氣也一氣屈伸而為陰陽動静理也理者太極也本然之妙也所以紀綱造化根柢人物流行古今不言之藴也是故在造化則有消息盈虚在人身則有虚實順逆有消息盈虚則有盈虚之道有虚實順逆則有調劑之宜斯理也難言也包犧氏畫之文王彖之姬公爻之尼父贊而翼之黄帝問而岐伯陳之越人難而詁釋之一也但經於四聖則為易立論於岐黄則為靈素辯難於越人則為難經書有二而理無二也知理無二則知易以道陰陽而素問靈樞難經皆非外陰陽而為教也易理明則可以範圍天地曲成民物通知乎晝夜靈素難經明則可以節宣化機拯理民物調燮札瘥疾病而登太和故深於易者必善於醫精於醫者必由通於易術業有專攻而理無二致也斯理也難言也非獨秉之智不能悟亦非獨秉之智不能言也如唐祖師孫思邈

者其洞徹理氣合一之旨者歟其深於易而精於醫者歟其具獨見之智者歟故曰不知易者不足以言太醫惟會理之精故立論之確即通之萬世而無斁也彼知醫而不知易者拘方之學一隅之見也以小道視醫以卜筮視易者亦蠡測之識窺豹之觀也惡足以語此

問三才所同者于人身何以見之

生生子曰人之與天地萬物同者同此理氣也朱子曰人之與物本天地之一氣同天地之一躰也故能與天地並立而為三才皇極經世曰天有四時地有四支四支各有脉也一脉三部一部三候以應天數神統於心氣統於腎形統於首形氣交而神主其中三才之道也攖寧生卮言曰天地非大氣鼓鑄則寒暑不能以時潮汐不能以訊霜露氷雪不能以其候人身非此氣鼓鑄則津液不得行

呼吸不得息血脉不得流通糟粕不得傳送也內經陰陽應象大論曰天氣通於肺地氣通於嗌風氣通於肝雷氣通于心谷氣通於脾雨氣通於腎六經為川腸胃為海九竅為水注之氣卮言曰人首尊而足卑天地奠位也脾肺相為母子山澤通氣也肝膽主怒與動雷風之相薄也心高腎下水火不相射也此人之所以與天地參而為三也

命門圖說

生生子曰、天人一致之理、不外乎陰陽五行、蓋人以氣化而成形者、即陰陽而言之、夫二五之精、妙合而凝、男女未判、而先生此二腎、如豆子菓實出土時兩瓣分開、而中間所生之根蒂、內含一點真氣、以為生生不息之機、命曰動氣、又曰原氣、稟乎有生之初、從無而有、此原氣者、即太極之本體也、名動氣者、蓋動則生、亦陽之動也、此太極之用所以行也、兩腎、靜物也、靜則化、亦陰之靜也、此太極之體所以立也、動靜無間、陽變陰合、而生水火木金土也、其斯命門之謂歟

此中間動氣即太極也

素問曰、腎藏骨髓之氣、又曰、北方黑色、入通於腎、開竅於二陰、藏精于腎、難經曰、男子以藏精、非此中可盡藏精也、蓋腦者髓之海、腎竅貫脊通腦、故云、

生生子曰、三十六難言腎有兩臟、其左為腎、右為命門、命門者、諸精神之所舍、男子以藏精、女子以繫胞、故知腎有二也、三十九難言五臟亦有六臟者、謂腎有兩臟也、其左為腎、右為命門、命門者、精神之所舍也、男子以藏精、女子以繫胞、其氣與腎通、細考靈素、兩腎未嘗有分言者、然則分之者自秦越人始也、追越人兩呼命門為精神之舍、原氣之繫、生之本、女子繫胞者、豈漫語哉、是極歸重于腎為言、謂腎間原氣、人之生命、故不可不重也、黃庭經曰、腎氣經于上焦、營于中焦、衛于下焦、中和集曰、闔闢呼吸、即玄牝之門、天地之根、所謂闔闢者、非口鼻呼吸、乃真息也、越人亦曰、腎間動氣者、人之生命、五臟六腑之本、十二經脈之根、呼吸之門、三焦之原、命門之義、蓋本于此、猶儒之太極、道之玄牝也、觀銅人圖命門穴、不在右腎、而在兩腎俞之中、可見也、難經雖有命門之說、並無左右水火之分、何後人妄臆指命門屬相火耶、顧靈素三陰三陽手足十二經配合、皆有定儒、以象十二時、十二月、十二律之意、今又以命門為屬火、則當綂

之。於何經十二經既無所統，則兩腎皆屬少陰水
可知。黃庭經曰：兩部腎水對生門（左腎爲壬，右腎爲癸，生門者臍也）
或曰：然則脉訣何謂命門配三焦屬相火也。余曰：
此高陽生之悞，戴同父辯之已詳。三焦是手少陽
經，配手厥陰經爲表裏，乃手經配手經，火配火，爲
定偶之。豈有手配足，火配水之理哉。滑伯仁難經
本義註曰：命門其氣與腎通，則亦不離乎腎，其習
坎之謂歟（坎水也易謂上下二坎今而又於坎曰習坎）手心主爲火
之閏位，命門即水之同氣歟，命門不得爲相火，三

焦不與命門配，亦明矣。虞庶亦云：諸家言命門爲
相火，與三焦爲表裏。按難經只有手心主與三焦
爲表裏，無命門三焦表裏之說。據此，則知諸家所
以紛紛不決者，蓋有惑于金匱真言篇王註引正
理論謂三焦者有名無形，上合手心主，下合右腎，
遂有命門三焦表裏之說。夫人身之臟腑，一陰一
陽，自有定偶，豈有一經兩配之理哉。夫所謂上合
手心主者，正言其爲表裏，下合右腎者，則以三焦
爲原氣之別使而言之爾。知此，則知命門與腎通，

三焦無兩配，而諸家之說不辯而自明矣。或曰：如
子所云，則命門屬水歟？予曰：右腎屬水也，命門乃
兩腎中間之動氣，非水非火，乃造化之樞紐，陰陽
之根蔕，即先天之太極，五行由此而生，臟腑以繼
而成。或者謂屬水屬火，屬臟屬腑，乃是有形質之物，
則亦有經絡動脈，而形于診，靈素亦必著之于
經也。或曰：然則越人不以原氣言命門，而曰右腎
爲命門，何也？予曰：此越人妙處，乃不言之言也。言
右腎，則原氣在其中矣。蓋人身之所貴者，莫非氣

血，以左血右氣也。觀黃帝陰符經曰：人腎屬于水，
先生左腎，象北方大淵之源，次生右腎，內有真精，
主五行之正氣，越人故曰原氣之所繫，信有核歟。
或曰：靈素命門有據乎？予曰：陰陽離合篇有太陽
根起于至陰，結于命門（至陰穴名在足小指外側）啓玄子註曰：
命門者，藏精光照之所，則兩目也。靈樞亦曰：命門
者，目也。蓋太陽乃腎之表，目者宗脉精華之所聚，
故特以精華之所聚處，而名之爲命門也。（右釋命門）

右腎水火辯

或曰、人皆謂右腎屬相火、相火即少火、觀坎之象、則知腎具水火之道、一陽居二陰間為坎、水火並而為腎、故惟坎加習也、子以右腎為屬水、然則其說非與、余曰、以惟坎加習、斯其說所以非也、夫坎於也、上下皆坎、易故曰習坎、觀先天圖乾南坤北、後天圖離南坎北、五行火高水下、故仙家取坎填離、以水升火降、既濟為道、謂採坎中之一陽、填離中之一陰、此還乾坤本原之意也、坎離異元待之義、安得謂一陽居二陰之間無乃指一陽為火耶、然

則離以一陰居二陽之間、又作何說也、夫物物具五行、五行一陰陽、陰陽一太極、五臟均有此金木水火土、何乃指坎中之陽為火、指右腎為少火也、坎中之陽、即兩腎中間動氣、五臟六腑之本、十二經脈之根、謂之陽則可、謂之火則不可、故謂坎中之陽亦非火也、二陰即二腎也、腎既皆陰、則作一水一火並看者亦非矣、不然、坎中之陽尚不可以火目之、而右腎又何可以屬火哉、或曰、子是之言固矣、彼北極玄帝象下有龜蛇者何說也、且昔少

隨程可久曰、北方常配二物、故惟坎加習、於物為龜為蛇、余曰、此何可以證水火並而為腎之謬也、蓋龜蛇乃道家寓意處、謂蛇屬心火、龜屬腎水、能降此二物、不使妄動、庶坎離得以交姤、而身中之丹可成、若腎則封藏之本、精之處也、安可牽扯龜蛇而議之耶、顧其觀哉、斯乎其不可矣、

或問、七節之傍、中有小心、或指下第七節命門穴為小心者、有以小心為志心者、有以小心為少火、以少火為相火者、何紛紛之不一耶、請為悉之、

生生子曰、此出內經刺禁論、啓玄子註曰、小心者、真心神靈之宮室也、又註陰陽類論篇有曰、新校正云、按大素小心作志心、楊上善以志心為腎神、故乃倒數脊骨下七節、認為小心、顧命門穴乃十四椎間、即以下逆數之、亦在第八節矣、非第七節也、又不思經曰、伏鼓不浮、上空志心、此陰脈盛而陽氣弱故上控子心如奔脈積氣寂狐之類是也、啓玄子註曰、脈伏鼓擊而不上浮、是心氣不足、故上控引於心而為病也、此註良是、

設為腎而言、則當無上空二字矣、此楊上善之悮
故後人即以命門為小心、認小心為少火、認少火
為相火、顛倒無限、皆由此一悮也、或曰、然則小心
果為何物、余曰、滑伯仁經度篇心經註下有云、心
系有二、其一上與肺相連、入肺兩大葉間、其一由
肺系乃下、由斜向後、並脊背細絡相連、貫脊髓、正
當七節之間、下與腎相通、蓋五臟系皆通于心、心
通五臟系也、又按內臟圖、心系果如所云、據此觀
之、小心、即心包絡也、何一陽亦謂手厥陰心包絡

發原正在心五椎下二節七節之傍、正與膻中平
對、并不可紊談、如彼逆數之、則心當在十五椎、肺
在十九椎下、自素問以來、未嘗聞此倒數法也、靈
樞經曰、膻中者、心主之宮城也、此與啓玄子註真
心神靈之宮室相孚、以心系並脊背貫脊髓、正當
七節之間也、彼倒数下七節、始于楊上善、繼而刘
守真醫學統宗已辯其非、余不復贅、

難經正義三焦評

或有以馬玄臺難經正義問於生生子曰、馬氏謂難
經所言三焦乃上中下之三焦、故曰無形之氣、若
手少陽之三焦、乃是有形、引靈樞素問經旨及
東垣等論為證、而以手厥陰配合、俱寓診于右尺、
子以其說為何如、幸條悉之、以詔來學、生生子曰、
馬玄臺蒐究經旨甚博、考證諸篇極工緻、非苦心
者不能也、但謂三焦有二、上中下之三焦、行脈道
以通十二經、手少陽之三焦、惟司決瀆之職而已、
謂東垣誤之、而不能正之、又引三因方謂脂膜
如手掌大者為三焦、而寓診于右尺、斯言不能無

槩、何也、上古文字、不容易看、亦有不可強解者、亦
非聰明所可臆度、不可辯者、寧缺之、不敢妄議、恐
增後人一障也、姑即所疑、條陳于左、以俟明哲、
馬氏曰、手少陽三焦、焦當作膲、是有形物也、上中下
之三焦、焦字從火、謂能腐熟水穀變化也、余按焦
字亦不一、靈樞背腧篇有云、肺腧在三焦之間、心
俞在五焦之間、據銅人圖肺俞在三椎下、心俞在
五椎下、是以焦字作椎字看也、椎、槌也、節也、斯上
中下之三焦、亦是以地段三停而言、如云上中下

三節也、焦膲同用、如藏臟同用也、不必拘從火從肉、但觀上下文義何如尔、推馬氏之意、不過謂從肉則是有形、從火則是無形、蓋為有形無形生疑也、

馬氏曰、三因方云、古人左為腎藏、其府膀胱、右為命門、其府三焦、三焦有脂膜如手大、且曰宋有擧子徐遁者、醫療有精思、曰齊嘗大飢、群丐相𦧲而食、有一人皮肉盡而骨脉全者、視其五臟、見右腎之下有脂膜如手大者、正與膀胱相對、有二白脉自

其中出、夾脊而上貫腦、意此即導引家所謂夾脊雙關者、而不悟脂膜如手大者之為三焦也、由是知三焦為有形也、按導引家夾脊雙關正是兩腎、非別有物也、愚謂此言無稽、不必信也、蓋醫以靈素為宗、靈素不載、如張仲景華佗王叔和孫思邈皆擅名古今者、未有一言及此、史載秦越人隔垣洞見人藏腑者、假令三焦如手掌大、何不言之、而反曰無形之氣、又觀手少陽經、起止散絡、亦無夾脊貫腦之說、獨陳無擇言之、豈無擇之神知、出靈素諸公之上、而採[illegible]

以勝之哉、愚故謂無稽之言、不必信也、余惟人身禀賦有肥瘠、有長短、有男作女形、女作男形、臟腑亦有厚薄之不一、人臟內景、殆與猪相類、兩腎即兩腰子、兩腰子皆累于脂膜之中、間或有偏長短者、不可因脂膜之垂長者、便指為臟腑也、兩白脉自中出者、正腎之脉絡尔、膀胱中處腹下、亦非偏于左者、抑何相對若是之偶耶、據云大飢而相𦧲、安有捨美好而不食、尚從容乎有所待也、此不待辯而可知、若脂膜左右長短不同、由人之肥瘠也、

且如平人之胆、僅藏汁三合、姜維之胆大如斗、平人喉管二、一通氣、一通食、銅人圖有載、大賊歐希範之喉管有三、彼陳無擇者、抑信之否乎、三焦既有形若是、銅人圖必圖而表之、華氏內照圖亦必表而出之、何一陽曰、世傳華佗神目、置人裸形于日中、洞見其臟腑、是以象圖、俾後人準之為論治設、觀三國時[illegible]人亦[illegible]少華佗之醫、不可謂無稽[illegible]有三焦如是乃圖之、不足載哉、何一陽又曰、全[illegible]臟腹考驗[illegible]

腑、心大長于豕心、而項平不尖、大小腸與豕無異、惟小腸上多紅花紋、膀胱真是脬之室、餘皆如難經所云、亦無所謂脂膜如手掌大者、余謂心小腸屬火、故色皆赤、三焦亦屬火、色獨如脂膜、是不可信矣、顧戴同父氏有言曰、三因方之好異也、云三焦有形如脂膜、附于腎夾脊、若果如是、則內經難經言之矣、其經脉又何偏屬歷絡之云乎、醫學從疑俗斷極叱其非、惜乎人未之考也、（徐遁之説出龍川志、而陳無擇引之、且引難經男子藏精女子繫胞二句于夾脊有脂之下、是以命門為三焦也、左外如此何可信哉、黃帝陰符經有曰、二腎內生白脉二條、上貫朝元通靈陽之宮、直此現之、外可知矣）

或曰、子以難經三焦無形之言為是、何靈樞本藏篇皆謂有厚薄緩急直結縱橫、惟其有形、乃有此語、余曰、本藏篇論三焦者、非特為三焦有物如是也、厚薄直結緩急等語、為膀胱而言也、合通篇臟腑配應而觀其義自見、攄五臟各有一腑為應、三焦為孤腑、（上中下三焦、同號為孤腑）又為外府、又為中瀆之府、按瀆者、水也、膀胱為津液之府、津液亦水也、三焦為决瀆之官、膀胱之用也、又為腎間原氣之使、以其無形、故附膀胱而言之、何以然、黃帝曰、願聞六腑之應、岐伯荅曰、肺合大腸、大腸者皮其應、心合小腸、小腸者脉其應、肝合膽、膽者筋其應、脾合胃、胃者肉其應、腎合三焦膀胱、三焦膀胱者腠理毫毛其應、帝曰、應之柰何、岐伯曰、肺應皮、皮厚者大腸厚、皮薄者大腸薄、（云云）腎應骨、密理厚皮者三焦膀胱厚、粗理薄皮者、三焦膀胱薄、踈腠理者三焦膀胱緩、皮急而無毫毛者、三焦膀胱急、毫毛美而粗者、三焦膀胱直、稀毫毛者、三焦膀胱結也、三焦原

非五行正府、而無所應、故稱外府孤府、因帝以六府之應為問、三焦既為膀胱之用、原氣之使、故以膀胱合而應之、以荅六府之應如此也、又本輸篇曰、肺合大腸、大腸者傳導之府、心合小腸、小腸者受盛之府、肝合胆、胆者中精之府、脾合胃、胃者五穀之府、腎合膀胱、膀胱者、津液之府、此五臟五府五行正配合者也、獨少陽三焦無合、乃復曰、少陽屬腎、腎上連肺、故將兩藏、三焦者中瀆之府、水道出焉、屬膀胱、是孤之府也、（千金方論孤府亦同）是六府之所

與合者合二篇觀之、三焦屬腎與膀胱、故附膀胱而言、非為三焦有物如是也、勇士篇之縱橫、及諸篇言有形者多類此、彼陳無擇之脂膜、果有理踈理密直結縱橫也乎哉、無擇之好異而故為之辭也、

[illegible]府皆有合有應惟二焦無合無應[illegible]足六陽府會稱故稱足二焦足三焦[illegible]陽之別絡也非另有一個足二焦也[illegible]太道出焉[illegible]是孤之府等語[illegible]形者皆是言膀胱以膀胱乃下焦[illegible]主水三焦瀆司決水故正言之

或曰、三焦既無形如此、何氣府篇有少陽脈氣所發者三十二穴、繆刺篇有少陽之絡、經脈篇有三焦少陽之脉、經別篇有少陽心主之正、經筋篇有少陽心主之筋、衛氣篇有少陽心主之本、陰陽二十五人篇言手少陽之上血氣盛則眉美而長等語似涉有形、今曰無形、然則彼皆非耶、余曰、所謂有形者、指其經依附各屬經絡而貫者言也、蓋手少陽乃十二經中之一經、其動脈原有起止、亦有脈絡經筋俞穴出入相應、以經絡手上中下一身也、非謂無其經脈而虛作一氣看也、因有此經故

有此病、云無形者、指其府也、以其無特形、故稱亦府、非若五府稱赤腸白腸黃腸青腸黑腸、長若干、重若干受盛若干、云若獨指其經脈起止俞穴主病等語、便謂是有形之府、不思奇經中如衝任督等脈、皆有起止、亦皆主病、衝為血海、任主胞胎、亦可為衝任等脈如有形府例看否耶、有形之說不必辯而其謬自明矣、

馬氏曰、東垣此事難知問三焦有幾、似嘗究心于此者、惜乎謂三焦有二者、不及上中下之三焦、則探矣、是欲闡內經而內經之義未融、欲正難經而難經之言仍在也、余曰、此事難知乃王好古所著、好古為東垣高第、問三焦有幾者、非為手少陽三焦當分上中下為二也、是欲人知三焦有手足之分、爾手少陽三焦主持于上、足三焦主持于下、足三焦者、足太陽膀胱之別也、若將手少陽三焦又分出一箇上中下三焦、合足三焦觀之、得無有三箇三焦耶、則鑿矣、好古此篇分三焦甚有功、但謂命門包絡于右尺同診、又謂包絡亦有三焦之稱、為

命門之火遊行于五臟六腑之間主持于內也
似亦未究相火命門之義雖經雖有命門之説未
嘗言其為火觀男子以藏精一句則知右腎非火
矣難經曰精者水也又曰其氣與腎通水與火可
相混耶鄙見參于高陽生脉訣以三焦配命門而
滑壽著難經脉訣又以心包絡皆混配命門三
焦于右尺故有命門屬火之説何一陽醫書統體
極動其盗襲之訛言蔡陳圖局誑世釣譽夫命門乃
兩腎中間動氣人之生命所司故曰精神之所舍

原氣之所繫觀銅人圖以命門穴于兩腎俞中間
深為得旨

泰來曰三焦總只一名已言手三焦者以其經屬手少陽又其治在膻中係手經ゝ手上也言足三焦者以其經即足太陽之別絡又其治在氣街緣足經ゝ手下也雲素以下焦係六腑之數即知手少陽三焦然丁焦之三焦總只一名已

馬玄臺曰命門之脉不必拘于右尺以其氣與腎通
也兩腎間動氣人之生命左腎亦可以診之擬其
將右腎入左尺同診者是要出右尺部位居三焦
包絡始有診地也又欲使人知是前人之意故托

言王叔和脉訣歌云右肺大腸脾胃命由是以三
焦包絡寓診于右尺也愚謂玄臺博究如此豈有
不識脉訣非叔和書哉正若三焦包絡二脉無所
歸著不得已而引脉訣歌為証仍稱王叔和之名
者不過要使人尊信也抑不思叔和脉經寸關尺
之診上部合于上焦關部合于中焦尺部合于下
焦亦尺皆以脊為候而無三焦包絡左右之分于
今方書以亦同今人不體認脉訣之非往ゝ為其
牽縛又强扶而合之亦大可嘆也戴同父脉訣刊

誤首篇闢之甚詳真千載斷案讀之亥豕自見毋
用多喙

馬氏謂心火面北君道也故居寸上相火面南臣道
也故居尺下三焦包絡皆屬相火故寓于右尺下
部診之余曰此强合之辭也人多不思相火命名
之義往ゝ以陰火作相火看故淆涸集辯之包絡
乃護心之脂膜不離于心膻中氣海三焦之所布
皆在膈上與心相近故稱曰相火以其為君火之
相也余竊謂相猶宰相輔成君德位必相近今馬

氏以三焦包絡二脉診法部位無所著落、是為診法部位而言、非為君臣尊卑定南北也、論定分、則君臣尊卑有南北、論診法、則部位之居有遠近勢也、亦理也、包絡之護心、與宰相之近君一也、若將包絡居尺下、則與心遠矣、世豈有遠離于君、而謂之相哉、此又可以倒觀矣、且經謂上以候上、下以候下者、均此理勢也、按洪範五行、火曰炎上、水曰潤下、難經亦曰火炎上而不能下、故在上部、水流下行而不能上、故在下部、今以南北尊卑之勢叅

而使居下部、豈不背經義哉、徒拘、、以君臣尊卑而言、則肺亦臣也、經曰肺者心之蓋也、抑何反加于心之上耶、蓋肺相傳之官、位近心君、故治節由之、是以同處于膈上也、觀素問三焦包絡皆處膻中、蓋膻中者臣使之官、喜樂出焉、以近心君、故喜樂由之、又三焦為氣父、包絡為血母、從心肺而言也、以心主血、肺主氣、皆居鬲上、故曰膻中之分、父母居之、氣之海也、是故不得而居于右尺下部也、

○謝堅白難經本旨、亦推宗脉經、謂手厥陰即手少陰心脉同部、三焦脉上見寸口、中見于關、下焦去腎同診、此其說殊合經旨、千古不易之定論也、

或曰、三焦下合右腎、子以其說然歟否歟、余曰此啓玄子引正理論之言、不知何所據、徧攷靈素、只有上合手心主一句、無下合右腎之說、或曰、然則與手心主配合為表裏者何也、余曰、手少陽三焦之脉布膻中、散絡心包、手厥陰心主之脉、出屬心包絡下膈、歷絡三焦、因其脉上下交絡、故也、又俱屬手經、均為相火、以類相從、雖為表裏、然非五臟五

腑比也、此何以故、余曰、爲是非也、蓋藏有聲色臭味、府有出納受盛、二經無聲色臭味出納受盛、雖是表裏、實非藏府比也、素問運氣篇曰心包非藏也、三焦非府也、余故曰、以類相從也、

或曰、馬氏謂上中下之三焦、行脉道以通十二經、手少陽之三焦、惟司決瀆之職而已、子以為非耶、余曰、噫嘻、人之好異也、經書豈容易言哉、圭齋歐陽公曰、難經先秦古文、蓋為醫式之祖也、東坡蘇公曰、醫之難經、句句皆理、字字皆法、後世達者神而

明之如珠走槃如槃走珠無不可者若出新意棄舊學以為無用非愚無知則狂而已看書之法當以意會其理而融其辭不可執已見以害其意夫所謂三焦者乃上焦中焦下焦三處地位合而名之也以手少陽經統而屬之以合十二經之數人之有十二經猶日之有十二時歲之有十二月也上焦主納而不出其治在膻中中焦主腐熟水穀其治在臍旁下焦分別清濁主出而不納其治在臍下滑伯仁曰治猶司也猶郡縣治之治言三焦所治之地方在斯也有以呼上焦為三焦者如云三焦為氣之父指上焦之氣海而言也（是上焦亦可以三焦稱也）有以呼中焦為三焦者如云三焦欬狀欬而腹滿不欲飲食此皆聚于胃關于肺者是也（是中焦亦可以三焦稱也）有以下焦呼為三焦者如云決瀆之官中瀆之府者是也（是下焦亦可以三焦稱也）此三焦者外有經而內無形故曰外府明非五藏五府之有合應也又曰孤府袁淳甫難經本旨曰所謂三焦者于膈膜脂膏之內五臟五腑之隙水穀流化之閒其氣融

會于其間熏蒸膈膜發達皮膚分肉運行四旁曰上中下各隨部分所屬而名之實元氣之別使也是故雖無其形倚內外之形而得名雖無其實合內外之實而為位者也靈樞經曰上焦出于胃上口並咽以上貫膈而布胸中走腋循太陰之分而行還至陽明上至舌下足陽明常與營俱行陽二十五度行陰亦二十五度一周也故五十度而大會于手太陰矣此則秦越人謂作水穀之道路氣之所終始者為不誣矣中焦亦並胃中而出上焦之後此所受氣者泌糟粕蒸津液化其精微上注于肺脈乃化而為血下焦者別廻腸注于膀胱而滲入焉故水穀常并居于胃中成糟粕而俱下于大腸而成下焦滲而俱下濟泌別汁循下焦而滲入膀胱焉觀此下焦之文則純是決瀆之事馬氏乃謂上中下之三焦以氣看手少陽之三焦作有形府看謂其惟司決瀆之職而已分三焦為二何其謬哉靈蘭秘典曰三焦者決瀆之官水道出焉瀆猶江河淮濟之瀆爾雅曰瀆者獨也各獨出其

所而入海也、夫決瀆本下焦之事、決瀆之官、猶今之總督河道之職也、今以三焦之名、而獨任下焦之職、此其故何哉、蓋以水瀆在下、非氣莫導、膀胱所藏之水、必待氣海之氣施化、乃為溲便注泄、是故以三焦治之、謂賴其氣而為之前導也、故曰氣化則能出矣、若曰不必下焦之氣施化、而手少陽自能決而出焉、則經不當復繳氣化則能出矣之句、或曰、三焦是六腑之一、故決瀆由之、恐不可作下焦看也、余曰此正是馬氏所疑之處、馬氏以手

少陽三焦為腑、惟司決瀆、下焦非腑也、故作氣者、不思素問宣明五氣篇曰、胃為噦、為恐、大腸小腸為泄、下焦溢為水、膀胱不利為癃、膽為怒、又靈樞九針篇曰、六氣為病、膽為怒、胃為氣逆噦、大腸小腸為泄、膀胱不約為遺溺、下焦溢為水、據此二篇、則靈素亦以下焦係六腑之數、是下焦與三焦無彼此也、是故不分而為二也、王好古雖引靈樞謂有足三焦之說、緣足三焦乃太陽之別絡（別絡之絡）乃並太陽之正、入絡膀胱、約下焦（約足束也）約實則閉癃、

虛則遺溺、雖有足三焦之名、實則足太陽之絡脈也、蓋下焦乃足經之所屬、故即膀胱言之也、本輸篇言腎合三焦膀胱、亦以此故、好古此問、不過欲人知此義耳、實無二質可分也、諸家言有形狀有俞穴者、皆不過即其經脈而言、如奇經衝任督之類也、噫、夫難經靈素之翼也、脈經診候之宗也、難經載心包絡命門三焦者凡八篇、脈經闡靈素之要旨、推脈候之本原、噫、醫學至秦越人亦神矣、至王叔和亦可稱精思矣、二公殫心究竟、著述垂訓、

亦可謂無滲漏矣、乃陳無擇不信難經、而信龍川不核之方志、世人不宗王叔和脈經、而宗高陽生之脈訣、且也妄肆譏彈、是何異河伯而議海若之汪洋、處蟻封而談藐姑射之靈秘哉、多見其不知量也、余為此辯、豈不知將益增嘵嘵之口、顧後之人惑于其說、而莫之覺、須為秦王忠臣也、或毀或譽、何暇計哉、孔子曰、知我者其惟春秋乎、罪我者其惟春秋乎、余私心竊欲自附云、

附東垣三焦論

東垣云、三焦有名無形、主持諸氣、以象三才之
用、故呼吸升降、水穀往来、皆待此以通達、以
上焦在心下、主内而不出、中焦在胃脘、主腐熟
水穀、下焦在臍下、主分别清濁、出而不内、統而
論之、三才之用、本於中焦、中焦者胃脘也、禀天
地之冲氣、陰陽清濁自此而分、十二經絡自此
為始、故不得其平、則寒熱偏勝、虚實不同、榮衛
亦滞、清濁不分、而生諸病、故曰氣會三焦、手少
陽脈通于膻中、膻中者臣使之官、為氣之海、審
此則知三焦者、冲和之本也、三焦相火及包絡
之脉、人之元氣也、周身何處無之、是名相火、用
事、主持陰陽之氣、神明之府也、出醫學發明

診三焦包絡

或有難於生生子曰、心主包絡三焦之説、已得聞命
矣、但診法尚未詳明、如子所言動脉下行於足經
者、法當診於下部歟、誠如是、令人之惑滋甚也、且
足經腎肝之動脉皆不上行于手、又何故取法於
手之尺部而診腎肝耶、請再悉之、余曰、唔、如上所
疑、是殆未知寸關尺上下陰陽之義也、夫脉之一
字有二義焉、十二經之動脉、乃路陌之脉、非寸關
尺之謂也、寸關尺之脉、乃氣血之先、人之神也、故
可以候周身百骸之疾、余之所指非即動脉為診、
乃宗内經脉經形於上者上診之、形于下者下診
之、乃法象也、非為動脉之出入而言也、昔秦越人
述内經之微言、而取診法於寸關尺者、又豈無所
本哉、寸關尺之部位、乃手太陰經經渠大淵穴也、
實手大陰經之動脉出入之地、古人取此以驗五
臟之脉者、以肺受百脉之朝、又五臟六腑之氣味
皆出于胃、変見于氣口、以氣口為五臟主、而脉之
大要會也、按脉要精微論曰、尺内兩傍則季脇也、
尺外以候腎、尺裏以候腹中、附上左外以候肝、内
以候膈、右外以候胃、内以候脾、上附上、右外以候
肺、内以候胸中、左外以候心、内以候膻中、前以候
前、後以候後、上竟上者胸喉中事也、下竟下者少
腹腰股膝脛足中事也、按此附上謂關也、上附上
謂寸也、寸關皆有左右手分診、而尺獨不分左右

者則兩尺皆以腎為診也明矣内經論脉法亦詳前後上下如此皆法象天地配合陰陽誠為古不可少易者越人闡明内經之旨取寸関尺以脉一身臟腑上下之候而王叔和宗之皆本于此心包絡附近于君當宗脉經心部脉之乃上以候上之意也三焦亦當如脉經上中下分診之其腎肝之元[illegible]本不上行於手而腎肝之元神氣血之先豈[illegible]豈出元氣上行耶玉機真臓論曰臟氣者不能自致於手太陰必因于胃氣乃至於手太陰

也故一難獨取寸口以决五臟六腑死生吉凶之法其義可見是以醫者要明天地陰陽上下之理以譬周身則自然貫通不為異論束縛為醫而不本素難脉經而一聽庸俗口耳之學與為儒而不講明四書五經惟徒剽竊時義者何異孫思邈曰不知易者不足以言太醫斯言誠有味哉

脉義

脉者天地之元氣也人受天地之氣以生故一身之升降浮沉即造化生生不息之機其不息者脉也

按内經五常政大論篇岐伯曰根于中者命曰神機神去則機息脉之為字從肉從永其命名為陌謂脉脉不断長永之道也是斡旋一身而為之綱領彼四時之脉雖有如絃鉤毛石之謂者無非跡陰陽浮沉升降消長而取義耳至其運行之妙有[illegible]伏隱見可驗於一呼一吸之間仲景曰呼吸者脉之頭也是以有呼吸則有脉無呼吸則脉息氣絶而變化矣此其天人一致之理四時流行之機微妙不易名狀必潛會默契庶可得其真体劉守

真釋名為幕今以為未然爾雅謂膜幕也幕絡一体也非謂脉也膜則有形而脉則以神運無形者也觀天何言哉四時行百物生可見矣故見此者謂之知道悟此者謂之知脉脉何容易言哉右釋脉義

問十二支土多十二經火多之義

有以十二支問于生生子曰十二支屬水火木金者各二土屬有四者何也生生子曰萬物生於土而歸于土土屬四維寄旺於四季之末故土有四也

土也者在人以脾胃家之四肢屬脾四肢猶四維也臟腑皆藉脾胃以為養猶萬物皆藉于土也又問人之十二經金木水土各二而已火獨有四者何也生生子曰有令德之君必有調元贊化之臣然後綱維立教化行而成無為之治假令君非相以贊襄勿何能助百執事恪恭厥職三焦包絡亦猶是也包絡有護持之功三焦有承宣節制之效何以見營衛出于三焦而所以營于中衛于外大氣持于胸中以行呼吸使臟府各司其職而四

肢百骸奠安者孰非相火斡旋之功哉古人以藥譬兵以身譬國良以此夫丹溪曰天非此火不能生物人非此火不能以有生信然

問手心主

或有問於生生子曰靈蘭秘典篇問十二經貴賤相使何獨遺手心主也生生子曰無所遺也以膻中該言爾膻中者臣使之官喜樂出焉靈樞脹論篇曰胸腹者臟腑之郭也膻中者心主之宮城也素問遺篇曰膻中在胸兩乳間為氣海手厥陰包絡之所居此作相火位故言臣使主其喜樂

手足經配合臟腑之義

有以十二經問屬手足者何以故生生子曰陰陽上下配合之義也手經之脉起于手足經之脉起於足手經主持於上足經主持于下手足經者所以紀上下也猶易之本乎天者親上本乎地者親下也素問遺篇曰心肺心包絡皆膈上屬手經肝脾腎在下屬足經手同手經足同足經手足經臟腑陰陽相配皆然乃一合也或曰臟腑既以陰陽

配合表裏何無夫妻之義乎曰夫妻配合是以相尅言陰陽此以手足同類言陰陽乃自然之勢不可紊者如手太陰肺金也裏也陰也手經也故以手陽明大腸金配手少陰心火也裏也陰也手經也故以手太陽小腸火配足太陰脾土也陰也裏也足經也故以足陽明胃土配足厥陰肝木也陰也裏也足經也故以足少陽膽木配足少陰腎水也陰也裏也足經也故以足太陽膀胱水配此五臟五腑五行正配合也手厥陰心包絡火也手少

陽三焦亦火也。二經雖無特形，皆屬相火。一為氣父，表也；一為血母，裏也。亦是以類配也。手以手配，足以足配，陰以陰配，陽以陽配，火以火配，水以水配，金以金配，木以木配，土以土配，皆自然之勢，不得不然者。觀此配合，則知上下手足陰陽皆有定偶，手配手之陰陽，足配足之陰陽，則手經之三焦不配足經之右以下字

問五行金木水火土之義

生生子曰：夫五行者，一水、二火、三木、四金、五土，咸有所也。何以然？素問運氣曰：水之為言潤也，水氣之潤任養。火之為言化也，陽在上，陰在下，燬然盛而化生萬物也。木之為言觸也，陽氣觸動，冒地而生也。金之為言禁也，陰氣始禁止萬物而揫斂。土之為言吐也，含吐萬物，將生者出，將歸者入。水生于一。靈樞經曰：太一者，水之尊號，一數之始也。天地未分，萬物未成之初，莫不先見於水。先天地之母，後萬物之源。以今驗之，則草木子實未就，人蟲胎卵胚胎皆水也。故天一生水，一，陽數也；子，北方水之位也。子者，陽生之初，故水曰一。地二生火，二，陰數也；午，南方火之位也。午者，陰生之初，故火曰二。天三生木，三，奇之數，木居東，東亦陽也，故木曰三。地四生金，四，偶之數，金居西，西亦陰也，故金曰四。天五生土，五者，奇之數，亦陽也，土應西南長夏，故土曰五。以上下左右合而觀之，孚莫不有一定之理，而人身應之。午位居上，故火旺於午，在人以心應之，故心居上。子位居下，水旺於子，在人以腎應之，故腎居下。卯位居左，木旺於卯，在人以肝應之，故肝居左。酉位居右，金旺於酉，在人以肺應之，故肺居右。中者土位，土居未，在人以脾胃應之，故脾胃居中。此五行不易之定位也。觀五行一定之理，則火不在下，卻尤可見矣。

問心包絡何以不得為藏

或有曰：難經言藏有六，心肝脾肺腎五而已，餘一藏乃右腎也。手厥陰心包絡既是十二經中之一經，與少陽為表裏矣，乃不以包絡為藏，而以右腎當之，何也？生生子曰：心包絡乃包心之脂膜，實不離手心也。雖其經起止有二，餘絡出入屈折相同。觀靈樞邪客篇有曰：少陰無腧，心不病乎？岐伯曰：外經病而藏不病也。蓋心者，五臟六腑之大主，精神

之所舍其藏堅固邪弗能容容之則心傷心傷則神去神去則死矣故諸邪之在於心者皆在於心之包絡包絡者心主之脉也故獨取其經於掌後銳骨之端其餘脉出入屈折其行之疾徐皆如手少陰心主之脉行也非若右腎之有形質者比也以其腎無特形是故不得為特藏也

又問右腎既為六臓之一矣何十二經中不以右腎之有形者足其數固乃以手心主當之此其故何哉

生生子曰詳乎哉問也難經雖有右腎命門為一臓之説然外無經絡所屬且又云其氣與腎通則亦皆腎而已矣其習坎之謂歟黄庭經曰北方黑色入通於腎開竅于二陰左腎為壬右腎為癸（壬癸皆水也）内經四氣調神大論篇曰腎者主蟄封藏之本精之處也受臓府之精而藏之也（精亦水也）回其皆屬水故以足少陰之經統而屬之此二而一一而二者也彼手心主者外有手厥陰之經絡屬于相火隷於手經額手足經陰陽配合之勢手不與足配火不與水配陰不與陰配是故不得與十二經之數也且火高水下水火不相射也

問五行土無定體寄旺四季各一十八日何長夏一月土又獨主之

生生子曰朱子云天有春夏秋冬地有木火金水人有仁義禮智皆以四者相為用也論歳氣流行之序以次之中有春夏秋冬四時木火金水各主一時以行其氣並不言土而土在四季中矣土又獨主長夏一月者蓋長夏建未未位西南乃土正旺

之地顧五行之理順而相生無少間斷彼冬之水生春之木春之木生夏之火夏火正熾焉能使其生金徒有傷之而已火旺則土相故以土継之是火生土而土生秋金秋金生冬水冬水復生春木乃可生生無窮禮運曰播五行於四時周子亦曰五行順布四時行焉是四時之内固備五行之氣也由是而土獨主於長夏也

問十二經臓腑命名之義

生生子曰此聖人觀數于物而名之也按爾雅曰心

纖也靈識纖微無物不貫心也危言曰心者深也為之君主神明出焉深居端拱而相火代之以行事也肺者茷也茷茷然而居乎其上為五臟之華蓋也又云肺鼓也言其氣敷講也脾者裨也所以為胃行水穀而裨助乎四臟也又脾屬土天高而地下尊卑之義也腎者神也神也者妙萬物而為言者也為作強之官技巧出焉妙萬物者也又腎者引也腎屬水主引水氣灌注諸脉也肝者幹也屬木象木枝幹也為將軍之官謀慮出焉所以幹

事也胃者彙也萬物之所聚故曰海也腸者暢也實而不滿通暢胃氣去滓穢也膽者敢也為中正之官決斷出焉敢之義也又曰膽者澹也清淨之府無所受輸淡淡然也膀胱者胞之室也室以藏物猶包裹也又曰胞䏙也空虛之言也主以虛承水汋也包絡者以其包絡乎心不使濁氣熏蒸乎心也又名手心主者以其主行心之事也手是言手經三焦以焦言猶三才也三才之用重乎中焦滑伯仁曰三焦始于原氣用乎中焦散于膻中上焦主內而不出下焦主出而不內其內其出皆係中焦之腐熟用乎中焦之為義其可見矣

原呼吸

生生子曰呼吸者即先天太極之動靜人一身之原氣[illegible]有生之初就有此氣默運於中流動[illegible]臟腑得所司而行焉難經曰腎間動氣[illegible]之本十二經脉之根呼吸之門經謂[illegible]出此也腎納氣納此也謂呼在肺而吸在[illegible]肺高腎下猶天地也故滑伯仁曰肺主呼

吸天道也此呼吸乃口鼻之呼吸指穀氣而言也腎司闔闢地道也此闔闢乃鼻息指原氣而言也靈樞曰五穀入于胃也其糟粕津液分為三隧故宗氣積于胸中出于喉嚨以貫心脉而行呼吸行猶承行此指後天穀氣而言謂呼吸資宗氣以行非謂呼吸屬宗氣也何者人一離母腹時便有此呼吸不待乎穀氣而後有也雖然原氣使無宗氣積而養之則日餧而瘁呼吸何賴以行故平人絕穀七日而死者以水穀俱盡臟腑無所充養受氣也然必待七日乃死未若呼吸絕而即

死之速也、以是知呼吸者根于原氣、不可須臾離也、宗氣如難經一難之義、原氣如八難之義、原氣言脉、穀氣言用也、右原呼吸

論診法

生生子曰、甚矣脉之難言也、非脉之難言也、欲盡於寸關尺三部之難也、非盡於寸關尺三部之難也、□□於寸關尺三部、而能以意會於臟腑之外之難也、若脉竟於經絡、運行於臟腑、而充周於郛廓脉候、若不以意會、徒拘拘以一臟一腑而盡於寸

關尺三部之中、則凡臟腑之外、經絡之間、腦項胸背腰膝蹻踝四肢百骸與有不病者、又將安診吾謂三部之中、非一臟一腑所能盡也、彼內經脉要精微論篇、但言候五臟與胃、餘大小腸及膀胱不言者、非畧之也、各以部地而該之也、何哉、如曰尺外以候腎、尺裏以候腹中、所謂腹中者何物也、蓋小腹之下、大小腸膀胱所居之地也、又如左外以候肝、內以候膈、膈非腑也、獨非一身中物乎、膈之下、膽所居也、五臟之系、上下聯絡、莫不經循鬲

逕然、則候鬲者非即鬲膜已也、又如左外以候心內以候膻中、膻中雖非實臟、乃心主之宮城、與右內以候胸中相同、皆即其部地言之也、腹中胸膈之候、乃內景之事、而胸膈腹之外、又何以候之、故從四句復申言曰、前以候前、後以候後、上竟上者、胸喉中事也、下竟下者、小腹腰股膝脛足中事也、□□□三部中非拘拘一臟一腑所可盡也、余故以□盡於三部、而意會於臟腑之外之難也、古人以寸部之陽候頭痛、以尺部診大小二便、雖云腎

主二便、其實上以候上、下以候下之驗也、特附于右、以廣三部診外之意云、

証候推移指法

內經脉要精微論篇曰、推而外之、消息之、內而不外、有心腹積也、推而內之、消息之、外而不內、身有熱也、推而上之、消息之、上而不下、腰足清也、推而下之、消息之、下而不上、頭項痛也、

左寸外以候心、內以候膻中、左關外以候肝、內以候膈、右寸外以候肺、內以候胸中、右關外以候胃、內

以候脾兩尺外以候腎裏以候腹中是以有推而內推而外消息之法也

一說左寸推而上之上而不下頭項痛推而下之下而不上胷脇痛也推而內之內而不外心腹積也推而外之外而不內眼目昏也

左關推而上之上而不下腰足清也推而下之下而不上腸胃痛也推而內之內而不外筋骨痛也推而外之外而不內身有熱也

左尺推而上之上而不下小腹痛也推而下之下

而不上足脛痛也推而內之內而不外小便濁也推而外之外而不內腰足痛也

右寸推而上之上而不下氣喘急也推而下之下而不上胷中痛也推而內之內而不外咽喉痛也推而外之外而不內背脊痛也

右關推而上之上而不下吐逆也推而下之下而不上主下血也推而內之內而不外腹有蟲也推而外之外而不內肌肉痛也

右尺推而上之上而不下小腹脹也推而下之下

而不上足腿痛也推而內之內而不外疝瘕也推而外之外而不內小便秘也

汪石山曰按消息謂詳細審察也推謂以指那移于部之上下而診之以脈有長短之類也又以指那移于部之內外而診之以脈有雙弦單弦之類也又以指推開其筋而診之以脈有沉伏止絕之類也刊誤謂內外以指按輕重言推有移義故特著之非但外以候心內以候膻中之類也

宗氣營氣衛氣

生生子曰宗氣者為言氣之宗主也此氣搏于胸中混混沌沌人莫得而見其端倪此其體也及其行也肺得之而為呼腎得之而為吸營得

之而營于中、衛得之而衛于外、胸中即膻中、膻中之分、父母居之氣之海也、三焦為氣之父、故曰宗氣。出于上焦也、○營氣者、為言營運穀氣入于經隧、達于臟府、晝夜營周不休、始于手太陰、而終于手太陰、以應刻數焉、故曰營。出中焦。也、又曰營是營于中、又曰營在脉中、世謂營為血者、非也、[illegible]下字非中焦之中、乃經隧中[illegible]論云、營者水穀之精氣、和調于五藏、灑陳于六府、乃能入于脈也、○衛氣者、為言護衛周身、溫分肉、肥腠理、不使外邪侵犯也、始于足太陽、五

十度而終于足太陽、故曰衛。出下焦。也、又曰衛是衛于外、又曰衛在脉外、此外字亦非脉言乎表、蓋言行乎經隧之外也、內經痺論篇云、衛氣者、水穀之悍氣、其氣慓疾滑利、不能入于脈也、故循皮膚分肉之間、熏于肓膜、散于胸腹、逆其氣則病、從其氣則愈、

生生子曰、人與天地生生不息者、皆一氣之流行爾。是氣也、其于身中、名曰宗氣、又曰大氣、經營晝夜、無少間斷、靈素載之、而後人莫之言也、後人只知有營衛、而不知營衛無宗氣、曷能獨循于經隧、行呼吸以應息數、而溫分肉哉。此宗氣者、當與營衛並稱、以見三焦上中下皆此氣而為之。統宗也、靈樞經五味篇曰、穀始入于胃、其精微者、先出胃之兩焦、中下焦也、以溉五臟、別出兩行營衛之道、其大氣之搏而不行者、積于胸中、命曰氣海、大氣即宗氣、氣海即膻中、又邪客篇曰、五穀入于胃也、其糟粕、下焦津液、中焦宗氣、上焦分為三隧、故宗氣積于胸中、出于喉嚨、以貫心脈、而行呼吸焉、此出上焦、為一隧也、營氣者、泌其津液、注之于脈、化以為血、以營四末、內注五臟六腑、以應刻數焉、此出中焦、為一隧也、衛氣者、出其悍氣之慓疾、而先

行四末分肉皮膚之間、而不休者也、晝日行于陽、夜行于陰、常從足少陰之分、間行于五臟六腑、此出下焦、為一隧也、營衛生會篇、黃帝曰、願聞營衛之所行、皆何道從來、岐伯曰、營出于中焦、衛出于下焦、衛氣篇曰、其浮氣之不循經者、為衛氣、其精氣之行于經者、為營氣、講明此三氣者、自秦越人而後、惟四明馬玄臺難經正義、殊究極工、於宗氣則曰、自夫飲食入胃、其精微之氣、積于胸中、謂之宗氣、宗氣會于上焦、即八會之氣會于膻中也、惟此宗氣主

呼吸而行脉道於營氣則曰營氣者乃陰精之氣也即宗氣之所統猶太極之分而為陰也此氣行于晝二十五度行于夜二十五度始于手太陰五十度而復會于手太陰而行晝行夜十二經之陰陽營歷二而所謂太陰主內者此也於衛氣則曰衛氣者乃陽精之氣也亦宗氣之所統猶太極之分而為陽也晝則行于陽二十五度夜行于陰二十五度始于足太陽五十度而復會于足太陽引靈樞歲露篇曰衛氣一日一夜常大會于風府風府者

足太陽督脉陽維之會所謂太陽主外者此也晝營氣行陽行陰主晝夜言衛氣行陰行陽主陽經陰經言營氣之行于晝者陽經也有陰經行于夜者陰經中有陽經故行陰行陽主晝夜言也衛氣則晝必止行于陽（行三陽經也）夜必止行于陰（行三陰經也）是陰陽不指晝夜言也又謂靈樞五十營等篇言氣脉流行自手太陰而始至足厥陰而終循環不已漏水下一百刻計一萬三千五百息脉行八百一十丈推之則二刻行一度為一周身也晝夜共

行五十度則每經各行五十次矣並未嘗言晝止行寅時大腸止行卯時又不思各經長短不一[illegible]以分時註釋如果十二經分配十二時以一時[illegible]行一經何以能八刻之一千八十息脉行六十四[illegible]八尺而四度周于身也又何以能十二時之一[illegible]五百息脉行八百一十丈而五十度周于[illegible]止行一經者實理勢之所必無也[illegible]此公精究經旨融會貫通王[illegible]一人而已非苦心精累不能也觀第一

難一章則可以見其槩惜乎獨于三焦惑于陳無擇之言未之加察余三復之餘微有憾焉然終不以寸朽而棄合抱之材也

痢與滯下辯

或有問於余曰劉河間云仲景治痢多用承氣但與滯下混同立論而無分別致之諸方亦未見其有分治者抑河間之說不足憑歟余曰前人畧之也經雖無明文然顧名思義可知矣書曰夏傷於暑秋多瘧痢痢者利也通利之義乃時症也或後泄

瀉而得、或徑大便膿血、蓋秋令氣降、腹中積精因
時下行、而痢也。彼滯下者、滯是積滯之滯、不因時
令、不由泄瀉、而竟裏急後重、垢膩之物頻併而下
也、豈可同日語哉。故滯下之症、始得之、多用推陳
致新迎而奪之之法、至於治痢、有用補法者、有用
澁法者、有燥濕者、有升提者、有消之者、有溫之者、
有分利者、有下之者、然初時不敢遽以藥下之、因
時[illegible]宜、必審其胃實積因、乃敢推蕩耳。余故云痢
者、[illegible]令氣而言也。滯下者、四時皆有之、名既別、則

治法當有徑庭矣。或曰唯
古謂先水瀉而後膿血者、為脾傳腎、乃賊邪、難愈。先
膿血而後水瀉者、為腎傳脾、乃微邪、易愈。朴傳微
賊之說、是亦以大槩言之也。究竟其說、世亦有先
後水瀉膿血、而各有難易者。愚謂先水瀉而後膿
血、此脾先虛而積滯繼至、故難愈。先膿血而後水
瀉、此積滯既去、已無邪矣、故易愈。高明幸參之、

噎膈翻胃辯

或有問於余曰、丹溪局方發揮云、翻胃即是噎膈、噎
膈乃翻胃之漸。言此蓋火氣炎上、熏蒸津液成痰、
切切不可用香燥之藥、若服之必死。又曰年高者
不治。蓋少年氣血未虛、用藥劫去痰火、病不復作、
老年氣血已虛、病必不起。據曰翻胃即噎膈、似是
一病、又曰噎膈乃翻胃之漸、似又是二病、至用藥
[illegible]死、乃今時亦有用香燥而得生
者、[illegible]翻胃、古雖未辯、然擬名定義似
[illegible]治[illegible]無同也、獨局方發揮一書、蓋為
關溢痛或燥熱諄諄立言、於名義亦未暇辯也。愚

意謂噎膈翻胃、乃是三病、亘古至今、曾未有人剖
析其義者。夫飲食入於噎間、不能下噎、隨即吐出、
自噎而轉、故曰噎。膈是膈膜之膈、非隔截之謂也、
飲食下噎、至於膈間、不能下膈、乃徐吐出、自膈而
轉、故曰膈。翻胃是飲食已入胃中、不能運化而下
脘、又燥結不通、朝食而暮吐、暮食而朝吐、明其自
胃中而倒出、故曰翻胃也。均一吐病、而有上中下
之分。數千年間、惟潔古老人治吐、而有上中下之
論、曰上焦吐者主於氣、中焦吐者主於積、下焦吐

者王于寒故今人亦有用香燥而治愈者寒氣使然也在人体認真切爾至于年老之人誠然台効丹溪豈欺我哉

張雞峯曰膈是神思間病惟内觀自養庶可克濟斯言亦良語也

四時脉說

或者曰脉有七表八裏九道而無絃鈎毛石四時春絃夏鈎秋毛冬石也且其義安在予曰此陰陽升降之理也三才原一太極春絃者肝之

脉也與膽為表裏夫陽氣自地而升此時其氣尚微在半表半裏之間故其氣來耎弱輕虛而滑端直以長故曰絃夏脉鈎者是陽極而陰生也夫鈎本大而末小夏至一陰生夏月六陽之氣盡升其脉來大而去小故曰鈎秋脉毛者此毛字讀作毫字孟子明足以察秋毫之末正是此義明陰氣自天而降輕細以浮故曰毛冬脉石者冬令萬物潛藏之時是陰極而陽生也腎主其令腎屬水主閉藏沉而有力如石之在水中故曰石夫升降浮沉之理變化無窮豈槩槩之七表八裏九道[illegible]且脾胃平和之脉不大不小不短不長難以別狀惟以意消息之彼二十四歌者正如以管窺天也噫

問傷寒用桂枝說

或問生生子曰傷寒書桂枝湯後有云脉浮緊發熱汗不出者不可與也與之則表益實而汗益難出耳則是以桂枝為固表藥也何麻黄湯中又用桂枝為臣耶生生子曰考方療疾全在体認氣味衍

義謂桂大熱桂味辛甘主温中利肝肺氣為諸藥先聘通使温和榮衛宣導百藥無所畏然桂枝湯用桂者以其衛為邪襲則氣不固故汗出惡風桂枝味辛甘陽劑也陽劑其行快入咽則先布散充達百骸四肢無處不至此散之之意也至于止汗自是芍藥芍藥味酸陰劑也陰劑入咽其行遲故先散之而後收之一開一闔邪氣散而真氣不過洩以致于適中非謂桂枝能止汗也麻黄湯用桂枝為臣者亦以其辛甘發散為陽若謂其實表止

汁，將安用之。蓋以其寒傷榮，桂枝雖能佐麻黃而散寒邪，和
榮衛，則邪自不能容，無汗出而解也。桂枝湯後啜
粥不可與者，為內有芍藥，寒既傷榮，發熱無汗，從
用酸寒收斂之劑，則邪無從而出表，乃益實也。非
訶子熱偏實表也。風陽氣也，陽主散，風傷衛則氣
散而汗出；寒陰氣也，寒主斂，寒傷榮則氣斂而無
汗。故治法無汗要有汗，取辛散能發汗也；有汗要
無汗，取酸收能止汗也。但用桂枝者，以其既能發
散，而又能溫和榮衛也。予故曰考方療疾，全在体

認氣味。

氣鬱脇痛論

或問治氣鬱脇痛，有謂達之者，有謂瀉之者，於達瀉二字還有說否？生生子曰：脇者，肝之部分，又足少陽經所行之地。此經多有餘。經曰：東方實。丹溪曰：氣有餘便是火。內經曰：肝者將軍之官，謀慮出焉；膽者中正之官，決斷出焉。蓋人于日用之間，不能恬澹虛無而純合乎天和，惟不能恬澹虛無而合乎天和，是以七情一有不遂則生鬱，鬱久則生火

壅遏經隧，充塞清道，而痛作矣。至於痛極而涌酸水者，觀洪範所謂曲直作酸，乃肝膽之咎徵也。經曰：木鬱則達之。啓玄子謂吐之，令其條達，此固一說也。然於達之之義猶有所未盡焉。達是通達之義，非獨止於吐也。木鬱於下，以柴胡川芎之類[illegible]散之以[illegible]其挺然之性，正所謂因曲而為之[illegible]達[illegible]而升之，皆達之之義也。仲景小柴胡湯治少陽脇痛，以柴胡為君，得其旨矣。經曰：有餘者瀉之。今肝實而脇痛，因宜瀉之矣。本草列青

皮香附黃連白芍柴胡川芎之類，均為瀉肝之劑，芍不擇而用之，吾未見得志也。何者？夫青皮香附瀉氣之沖逆者也，黃連白芍瀉血之沸騰者也。經曰：上者抑之，為其當下而不下，故用此辛酸苦寒之劑以泄其沖逆沸騰之勢，使之降下，以致乎平而已。此正治法也，群皆識其為瀉也。至若柴胡川芎之所以為瀉者，則異乎是也。蓋柴胡川芎升發肝膽之清氣者也。經曰：下者舉之，為其當升而不升，故用此辛甘苦平之味，于陰中提陽，以扶其直

遂不屈之性、使之上升、以復其常、是清陽升而濁陰降也、正前所謂木鬱則達之之意、此從治法也、醫皆未識其所以為瀉也、經曰輕者正治重者從治、又曰輕者可降、重則從其性而升之、又曰過者折之以其畏也、不謂瀉之過者謂鬱甚而為火也、折之者折之也、畏者如木鬱之病、用辛散屬金之藥以味勝其紛駁剪伐其猖獗、以致于中和、乃撥亂反正之意也、此皆識陰陽升降之理順逆之勢、有如是耳、噫苟為醫而不明陰陽升降之理、順逆之勢、則用藥安能識其正哉、且夫人與天地相流通者也、即舉肝而言之、在天為雷、在方為東、在時為春、在五行為木、在人為肝、運動之氣皆相參焉、故張子和曰、膽與三焦尋火治、肝與包絡都無異、丹溪曰、此指龍雷之火而言也、在人以肝膽應之、凡物不得其平則鳴、彼陽氣久伏埋遏于九地之下、則品物為之潛藏、當其升發之際、必轟然迅烈、大發聲震驚于天關之外、然後品物咸亨、此勢也、理也、今木鬱之病亦近之、木鬱于下、則春升之令不行、以故痛而猛猛而吐、吐而愈者、亦均此也、均此理也、知夫此、則凡造物之所以有升降順逆者、皆得以遂其正矣、於用藥乎何有、

論痰為津液脾濕所生、亦有因於火、因於虛、因於氣、因於食者、而二陳峻利之劑、不可以槩用也、

生生子曰、痰者、津液所生也、經曰、飲食入胃、游溢精氣、上輸於脾、脾氣散精、上歸於肺、通調水道、下輸膀胱、水精四布、五經並行、五臟陰陽、揆度以為常也、若脾虛傷濕、則失其健運之常、不能致精於脈遂而成痰、此脾濕而生痰者也、有陰血不足、陰火上逆、肺受火侮、不得清肅下行、由是津液凝濁、生痰不生血者、此又因陰虛火動而成痰者也、由是知痰之為物、皆脾濕津液所成明矣、治痰者要當察其所來之源、世俗例以二陳統治諸痰、不分寒熱、因於濕者、固亦宜矣、蓋半夏燥脾濕、陳皮利肺氣、茯苓入手太陰、利水下行、甘草調和諸性、入脾為使、三味皆燥濕剽悍之劑、使水行氣下、濕去土

燥疾熱珍乎嘩斯捷矣使□無寒濕則何以當之由是知二陳之治痰者非治痰也是治痰之因於濕也至於火刑肺金不得下降而用二陳者此又失之差也因於火則治火火降金清秋令通行水□□又痰安從生丹溪曰黄芩治痰假其下火正□治一經乃以二陳治之吾知肺愈燥而火□□□不能去而反增其喉痛聲啞咳嗽益□□□湯也已又有食積痰者飲食過飽則傷脾胃傷則氣餒氣餒則濕停濕停則痰生矣宜以保和丸類治之又有氣鬱生痰者嚴用和云人之氣道貴乎順順則津液流通決無痰飲之患是以治痰必先利氣者謂痰之所從來皆由七情鬱結氣道不清氣積生涎令利其氣使鬱結開而氣道暢抑何痰飲之有宜七氣湯越鞠丸之類治之是也又有風痰者由表虛皮腠不密風邪得以乘之肺氣不利邪鬱為熱是以濁涕稠粘治宜散風利氣如杏仁枳殼紫蘇前胡之類是也有驚痰者驚則神不守舍氣亂胸中清濁相干脈道壅塞痰遂

生焉故驚痰者多生心痛癲疾以牛黄鎮心丸之類治之是也有冷痰者由脾胃虛弱不能運化精微氣餒行遲津液凝滯所致治宜温煖脾胃脾充而津液行矣如乾姜白术之屬是也又有腎虛不□□火津液上泛不能生血者緣肺主出腎主納入腎虛不能納氣歸原出而不納則積積而不散則痰生焉以八味腎氣丸之類治之是也內有伏苓澤瀉利水下行使濕去而痰絶也地黄山萸補實腎水水升則火自降而金收藏之職矣至於中氣不足痰因積聚胃中亦有所養不可峻用利藥恐胃一傷虛變莫測宜當温補使脾胃充實痰自流動如六君子之類是也此丹溪所以諄諄戒人峻用利藥之失也若夫流飲支飲伏飲懸飲溢飲積年累月膠固難治者當視其形氣何如或汗或吐或下或熔隨其所宜劫而去之痰去則當補養務使中氣充實庶無峻利之失矣學者亮之

或曰丹溪云實脾土燥脾濕是治痰之本也又曰二陳湯一身之痰都管欲上行加引上藥欲

下行加引下藥吾子以此言非丹溪語邪余曰此蓋指脾胃濕化之痰也脾胃為水穀之海五臟六腑之所受氣者也人之七情居處不能一一中節有拂鬱則氣血凝滯津液不行痰斯生矣故丹溪每以實脾土燥脾濕而言也如痰在脇下非白芥子不達痰在四肢非竹瀝不行痰在皮裏膜外非竹瀝不除氣虛之人有痰非竹瀝不開又曰痰結核在咽喉燥不得出以化痰藥加鹹能軟堅之味瓜蔞仁杏仁海石連翹

少佐以朴硝蜜丸噙化又曰天花粉大能降上膈熱痰海粉熱痰能降濕痰能燥頑痰能消枳實治痰能衝墻壁人中黃能降陰火而清食積之痰又曰痰因火盛逆上治火為先白朮黃芩石膏之類久病陰火上升津液生痰不生血宜補血制相火其痰自除丹溪未嘗純倚二陳為用矣已上述治痰之藥亦不為不多矣丹溪何嘗固執於此蓋以意立法耳醫者貴乎貫通達變則得之否則何以異於刻舟求劍也

咳嗽

生生子曰古云咳者謂無痰而有聲肺氣傷而不清也嗽者謂有痰而無聲脾濕動而生痰也合曰咳嗽者既有聲而復有痰也然其病不一有五臟咳[illegible]咳有六氣咳有虛咳有實咳有水咳有火[illegible]而用藥亦異觀古人立方多所主於肺[illegible]肺者有飲肺者有濕肺者有痛[illegible]屬金而主乎聲者也惟肺也外統[illegible]一身之護衛內為華蓋位五臟之至尊肺

受百脈之朝故病每干於肺設不干肺抑何咳焉是以治咳必兼于肺至於清痰降火流濕潤燥補腎疏風者莫明于丹溪纂要條分列治極為詳盡但主嗽多咳少耳學者宜於是而擴充之則思過半矣

哮

生生子曰丹溪云哮者專主於痰宜用吐法亦有虛而不可吐者必使薄滋味不可純用寒涼必兼散表此深遠病情者也其閉亦有自童幼時被酸鹹

之味或傷脾或搶肺以致痰積氣道積久生熱妨
礙升降而成哮症一遇風寒即發緣肺合皮毛以
寒外束弗得發越內熱鬱新痰復生因新痰而
致舊痰並作也是以氣高而哮擡肩拮項不得仰
臥面赤頭疼惡寒發熱治宜散表表散熱解氣道
流通痰亦可平飲食厚味傷脾不能運化而發
者脾傷則舊痰不得布散而生痰涎壅塞經隧肺
氣為之不利則胸滿腹痛盜汗潮熱晝夜發哮聲
如拽鋸治宜消食健脾清痰利氣斯亦定矣有房

勞大過腎水衰少不能制火下降火寡于畏而侮
所勝肺金受傷金傷則生化之源絕矣病則下午
潮熱哮聲如雷頭疼面赤盜汗煩躁晝輕夜重脈
數無力治當補腎制火清金潤燥庶或得安有氣
逆而發者經曰怒則氣上有升無降又曰大怒則
火起于肝又曰上升之氣自肝而出中挾相火脈
虛不能平木病則胸滿脇痛耳聾眼赤氣出如火
治宜抑肝利氣是痰也氣厚者當劫而吐之拔其
病根根拔又當速補中氣中氣充實痰不再作矣

喘

生生子曰內經云諸氣憤鬱皆屬于肺諸滿喘嘔亦
屬于肺以肺主氣者也諸喘氣逆者乃陽火急數
而然也一呼一吸為一息呼隨陽出吸隨陰入呼
吸之間脾受其氣通乎營衛合乎陰陽然則息急
[illegible]遏氣微合之喘逆由火熱而息急也
[illegible]七情所感或脾腎俱虛或脾濕腫滿
[illegible]或[illegible]滯皆所以致之要當合脈
[illegible]製方庶無差失之患矣

又曰方書有云治喘嗽者有云治痰喘者有云治喘
逆氣急者有云氣喘者不可不分別明白究治此
病虛實攸係匪輕驗今之喘嗽者既嗽而兼有喘
聲也痰喘者喉中有痰或出或不能出擡肩擷項
者是也喘逆氣急者無痰嗽而獨氣急作喘聲也
氣喘者較逆急勢則稍緩耳前二者兼痰兼嗽蓋
有雜症以干之故治有汗吐下之不同也後二者
乃本臟氣虛或陰虛火動及產後喘急者為孤陽
幾於飛越治惟補之斂之攻補之不同由虛實之

異路也少有差忒則輕者重重者死矣予于此之二病尋究端倪會類治法逐証填方不以亦漫自媒其間蒐集不盡者猶俟后之明敏籍此為左券云爾

喘而無汗者宜解表　喘而有汗者宜和營衛固表　[illegible]滑脉沉實者為內實當下之　發時有痰[illegible]者宜化痰　發時有痰不能出者宜開提之　食積痰逆者宜導痰運脾　飲水多者宜滲利之　久嗽不已痰壅胸膈氣實者宜吐之　心火形肺者宜清心熱　氣從小腹上冲乃衝脉之火宜調中益氣湯加黃栢知母以降之　脉數無力者宜滋陰降火　產後喘急者郭氏謂孤陽絕陰極為難治　本臟氣虛及久喘攻擊太過者宜人參五味阿膠之類補之　新喘氣實者宜葶藶枳殼桑皮之類瀉之　腫滿脾虛不能攝水上迫于肺喉中作水雞聲者或小青龍湯或導水丸桑皮赤小荳瞿麦之類決之　瘀血凝滯胸膈者或韮汁之類以活之

論汗不可純作血看當以氣看為妥

生生子曰靈樞經云汗者心之液又曰奪汗者無血奪血者無汗故今人多認汗為心血也愚謂五藏皆有汗不獨心有之也經脉別論篇曰飲食飽甚汗出于胃驚而奪精汗出于心持重遠行汗出于腎疾走恐懼汗出于肝搖体勞苦汗出于脾夫汗不過一氣而已此氣者乃五穀之精氣靜則化而為血以養生身（靈樞經曰血者神氣也血之與氣異名而同類焉）擾則越而為汗（又作化而氣先發越也）易曰地氣上而為雲天氣下而為雨陰陽應象大論篇曰陽之汗以天地之雨名之良以此也（啓玄子註曰夫人汗泄于皮膚者是陽氣之發泄耳然其取類于天地之間則雲騰雨降而相似也）

五欝

生生子曰內經有五欝之論謂木欝達之火欝發之土欝奪之金欝泄之水欝折之雖統揭夫欝之名而未顯言夫欝之症與詳明其達發奪泄折之義惟是後之人認達為吐認發為發汗以泄為解表利小便以奪為下以折為抑其冲逆意義未必非

是恐於經義未之盡也。余故縷析五鬱之症并治法焉。夫五臟一有不平則鬱。達是條達，或通達也；發是發越；泄是疏泄；奪是攘奪；折是決折。何者？夫內經曰：木鬱達之。木鬱者，肝鬱也。達者，條達通達之謂也。木性上升，怫逆不遂則鬱，故凡脇痛耳鳴，眩運暴仆，目不識人，皆木鬱症也。當條而達之，以遂其挺然不屈之常。如食塞胸中，而肝膽之氣不升，故胸腹大痛，宜而吐之，以舒其木之氣，是在上者因而越之也。木鬱于下，脇疼日久不愈，以柴胡、川芎之類開而提之，亦條達之意也。[illegible][illegible]用當歸輩者也，推而伐之，誅非適達之意歟。

火鬱發之。火鬱者，心鬱也。發者，發越之謂也。火性炎上，怫逆不遂則鬱，故凡瞀悶目赤，少氣瘡瘍，口渴溲黃，卒暴僵仆，嘔噦吐酸，瘈瘲狂亂，皆火鬱症也。當發而越之，以返其自然之常。又如五心煩熱，肌膚大熱，過食冷物，抑遏陽氣于脾土之中，以火鬱湯、升陽散火湯，皆發之之意也。又謂[illegible]生外向揚之思想無窮，所願不遂，抑鬱不樂，因生瘡疾，不進飲食，或氣不升降，如醉如痴，以木香、石菖蒲、生姜、雄黃之類，疏而動之，亦發之之意也。小便溲為瘡瘍[illegible]痹，以黃連解毒湯、導赤散、八正散之類，引而下之，亦非越之之意歟。土鬱奪之。土鬱者，脾鬱也。奪者，攘奪之謂也。土性貴燥，惟燥乃能運化精微而致各臟也。壅滯滲濡則鬱，故凡腫滿痞塞，胕腫，大小便不利，瘧疾蠱脹，皆土鬱症也。當攘而奪之，以復其健運之常。又如腹中窒塞，大滿大實，以枳實導滯丸、木香檳榔丸、承氣湯下而奪之，是中滿者瀉之于內也。如食傷脾，痞脹莫[illegible]，[illegible][illegible]，以橘半枳术丸[illegible][illegible][illegible]而不思飲食[illegible][illegible][illegible]，以木香化滯湯[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]之諸痞[illegible][illegible]濕熱[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]之意歟。金鬱泄之。金鬱者，肺鬱也。泄者，疏泄之謂也。金貴空清，壅塞[illegible]則鬱，故凡咳喘胸[illegible]，喘息膹滿，[illegible][illegible]畏寒，皆金鬱症也。當疏而泄之，以肅其清降之常。又如[illegible][illegible]咳嗽惡寒，以參蘇飲、人參敗毒散，皆[illegible]之之[illegible][illegible][illegible][illegible]飲，或水飲入肺，喉中如水雞之聲，或肺癰嘔膿血，以葶藶大棗瀉肺湯治之，亦非泄之之意歟。

水鬱折之。水鬱者，腎鬱也。折者，決折之謂也。水貴沉靜，搏激窒塞則鬱。故凡冷唾上湧，水腫腹脹，腰膝不利，屈伸不便，皆水鬱症也。決而折之，以導其東歸之常。又如[illegible][illegible]水逆上而為[illegible]嗽，以[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]之，決之之意也。腰疼痛不可俯仰，或如[illegible][illegible]之狀，以桂心之[illegible][illegible]之，或小便[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]而為白[illegible]，以小茴香、澤瀉、黃柏之劑治之，亦非決之之意歟。是皆因其曲而直之也。舉其槩，則餘可推矣。若以達為吐，以發為汗，以泄為解表利小便，以奪為下，以折為抑其沖逆，然固然，於經義恐猶未盡善。

也、且後文又曰然調其氣過者折之、以其畏也所謂瀉之愚謂過者淫勝之謂也、折之者謂裁之如如木勝助之以辛、火勝助之以鹹之類、從其畏而伐之故曰五臟一有不平所勝平之遞相濟養交互剋伐此之謂也、

怒傷血

素問曰、大怒則傷肝、甚則嘔血、并飧泄、又曰心主血、肝藏血、脾統血、怒氣上逆、則脾氣受傷、所藏所統之血皆妄行而錯亂也、古方有用芎附飲治之而效者、良由川芎香附能調肝氣、氣和而血歸經也、丹溪有用桂五錢為末、冷水調服者、緣桂能和榮衛通血脈、木得桂而枯、且又為從治之法、故不獨恃寒凉為治也、必須參之脈証、如脈微弱、虛軟精神疲憊、急當獨參湯進之、如脈洪大絃長有力精神不倦、或覺胸中氣塞、或血是紫黑塊者、當以承氣湯下之、此釜底抽薪法也、若勢緩而血鮮紅、宜以葛可久十灰散、阿膠血餘灰之類止之、或調氣或下或止、全在臨症活法、勿得執一以戕生也、

滑伯仁曰、血溢血泄、諸蓄妄証、其治也予率以桃仁大黄行血破瘀之劑、以折其銳、而後區別治之、或問失血復下、虛何以當行血破瘀之劑、予曰血既妄行、迷失其道、不去蓄利、則以妄為常、曷以禦之、且去者自去、生者自生、何虛之有、且如婦人行經十、六日不止者、有十數日不止者、可見去者自去、生者自生也、乳婦亦然、

生生子曰、時師治血、愛用寒凉、每每畏用溫補二法亦偏見也、夫有寒當溫、有虛當補、聖哲不能廢其規、但要体認切當、毋輕舉也、假使胃寒或久為寒凉所激、以至血不歸經、不溫可乎、暴吐暴衄、昏運軟倒、不補可乎、故王海藏治飲冷傷脾吐血、以理中湯、理治中脘、分利陰陽、此亦理治內衄之法也、羅太無曰、理中湯能止傷胃吐血、以其方最理中脘、分利陰陽、安定血脈、葛可久治吐血昏運、用獨參湯、仲景曰、血脫益氣、東垣曰、陽生陰長、皆有旨趣、實法在當用而用也、設若陰虛火動、咳嗽已久

肺有伏火痰帶血絲或紫色血屑又當滋陰[illegible]
開鬱清痰而前劑未敢以輕試也是知咳血吐血[illegible]
痰帶血絲惟當滋陰潤肺為先暴吐昏運却宜補
虛濕脾為最全在体察病源分致偏僻斯為良師
[illegible]仁曰諸見血非寒証皆以為血熱迫逐至妄行
然皆後有下行之或挾風或挾湿或挾氣又有因
虛而發者其本皆然上中下治各有所宜在上
則梔子黃芩黃連芍藥犀角蒲黄而濟以生地牡
丹皮之類胃血古人有胃風湯正是以陽明火邪

為風所扇而血為之動中間有桂取其能伐木也
若蒼术地榆白芍藥之類而濟以火劑大腸血以
手陽明火邪為風為湿也治以大劑風劑風能勝
湿也如黄連芩芍藥柏皮荊芥防風羌活之類兼
用雞冠花則述類之義也
又曰驚而動血者屬心怒而動血者屬肝憂而動血
者屬肺思而動血者屬脾勞而動血屬腎

論咳血

生生子曰咳血多是火鬱肺中治宜清肺降火開鬱
清痰咳止而血亦止也不可純用血藥使氣滯痰
塞而鬱不開咳既不止血安止哉設下午身熱而
脉細数此真陰不足當清上補下

論齒衄

生生子曰有姪女十歲因毀齒動搖以苧麻摘之血
因出不止以小瓦盆盛之一日夜積十一盆用末
藥止其血少頃復從口中吐出身亦不倦亦事之
奇異也可見人身之血不可測量診其脉皆洪大
有力以三製將軍末子二錢用枳殼湯少加童便

調下是夜之半去黑糞數塊其血頓止再不復發
後又見一男子每齒根出血盈盆一月一發百藥
不効歷十餘月每發則昏昧知其人好飲投前劑
一服而安又一老嫗患此一發五七日一日約有
升餘投前劑亦安所下皆有黑糞是知此疾多陽
明熱盛所至者緣衝任二脉皆附陽明陽明者多
氣多血之經也故一發如潮湧急則治其標故投
以釜底抽薪之法應手而愈要知腎虛血出者其
血必點滴而出齒或攸攸而疼必不如此之暴且

甚有餘不足最要詳認、

顫振

有謂作諸禁鼓慄者非也、諸禁鼓慄乃閉并戰搖以寒而實熱也、夫顫振乃兼木氣而言、惟手足肘前戰動、外無凛慄之狀、

生生子曰、顫振者、八病手足搖動、如抖擻之狀、筋脉約束不住、而莫能任持、風之象也、內經云、諸風掉眩、皆屬肝木、木主風、風爲陽氣、陽主動、此木氣太過而尅脾土、脾主四肢、四肢者、諸陽之末、木氣鼓之故動、經謂風淫末疾者此也、亦有頭動而手足不動者、盖頭乃諸陽之首、木氣上冲、故頭獨動而手足不動、散于四末、則手足動而頭不動也、皆木氣太過而兼火之化也、木之畏在金、金者土之子、土爲木尅、何暇生金、素問曰、肝一陽也、心二陽也、腎孤藏也、一水不能勝二火、由是木挾火勢而寒于畏反侮所不勝、直犯無憚、難經謂木横乘金者是也、此病壯年鮮有、中年已後乃有之、老年尤多、夫老年陰血不足、少水不能滅盛火、極爲難治、前

哲畧不及之、惟張戴人治新寨馬叟作木火兼痰而治得效、遇此症者、當參酌厥旨而運其精思云、

明火篇

生生子曰、內經氣交變大論篇云、南方生熱、熱生火、其令熱、其變消爍、其災燔焫、運氣五行生死順逆爲日火主于南應夏、火之爲言化也、言能化生萬[illegible]君火爲二之氣、經以熱稱之、相火[illegible]以暑稱之、暑之與熱、皆火令也、六化[illegible]在泉成形、在天爲氣、行有五而氣有六、以分君火相火之化、六氣化者、謂寒暑燥温風火也、乃天之元氣、六氣皆有一化、舉大槩也、君火之化熱、主春末夏初行暄淑之令、而不行炎暑、應君之德也、相火之化暑、主於夏、夏之爲言大也、與午同意、炎暑乃行、人有觸其氣者、皆令氣之病也、當從四時令氣之治、非病機中五臟厥陽之火同治也、五臟厥陽之火、所致之疾、當從病機之治、盖令氣之火、自外而治者、病機之火、自内而生者、內外至疾之原不同、則治法當合求其所屬矣、病機出至真要大論篇

丹溪相火篇議

生生子曰火為五行之一化生之機在天在人不可一日而無諸書雖往往於雜症中言之然未有能分君相之名及明令氣之序是以多認陰火為相火又有以五志之火為相火即明達精詣如丹溪之格致餘論相火篇亦以龍雷之火為相火又分君火為人火相火為天火愚甚惑焉嘗按內經陰陽應象大論篇有壯火氣衰少火氣壯之言天元紀大論篇有君火以名相火以位之言並無天火人火龍雷火之說至丹溪而始言之何哉愚度丹

溪之意既謂肝腎之陰悉具相火是以指肝腎之陰火為相火又曰見于天者出于龍雷則木之氣出于海則水之氣或以龍雷皆動物凡動皆屬火故以相火為天火耶假若以動皆屬火而遂以相火為天火然則君火亦有動之時也獨不可屬之天哉愚謂火為造化生息之機不能不動第不可以妄動火有天人之分不可以君相分屬天人何言之蓋天有六氣君火主二之氣相火主三之氣

是君相皆可以天火稱也人有十二經十二經中心為君火包絡三焦為相火是君相皆可以人火稱也故以天之六氣言則二之氣三之氣歲歲若是為亙古不易之常運以人身言則心為君火包絡三焦為相火亦亙古不易之定論君火相火皆有定體以裨助生生不息之功不可一日而無故曰天非此火不能生物人非此火不能有生若彼肝腎雖皆有火乃五志之淫火而非五行之正火致人疾而為元氣之賊不可一日而有也今丹溪

不以六氣之火為天火而以肝腎陰火為龍雷之火為天火不以七情所感之火為人火而以君火為人火夫肝藏血腎藏精彼謂悉具相火愚不知其何所見也且經以君火主春末夏初二之氣以熱稱之丹溪乃謂經以暑與濕言之夫暑屬三之氣濕屬四之氣各有主之者與君火何預經以相火主三之氣以暑稱之丹溪乃書經以火稱之謂其暴悍酷烈於君火指為元氣之賊大與經旨相牴牾所以然者良由認相火未真故其立言支離

多病前後自相矛盾、至於君火以名相火以位之
言、亦不能暢條其義、夫君火以名者、蓋以君[illegible]
火然至尊無為、惟正火之名、故曰君火以名、相火
以位者、蓋相宜行火令、而守位稟命、故曰相火以
位、猶之宰相奉行君令、為職位所宜然也、彼於相
之為義、未明是以相火之論未當也、愚始閱此篇、
疑非丹溪之筆、已而詳玩筆勢、與其他議著相類、
或出于一時之意見、未遑稽考、不然登梓時亦未
暇校正竄易耶、釋今不為辯校、則後之學者不知

從丹溪之長徒執迷其陰火為相火之說、卒之認
相火為賊、大不知以五志之火為賊、火其悮人也
甚矣、迺丹溪初心、本欲開後之聾瞽、不知此論使
聾瞽者益聾瞽也、愚故須為丹溪之忠臣、不憚辯
駁者、正欲成丹溪惠後之心、又何暇計僭踰之罪
我同志者幸亮之、

泄瀉辯

生生子曰、按泄瀉二字、取義必有輕重、非一症而無
分別者也、何也、據書有云泄者、有云瀉者、有云泄
瀉者、假使無分別、經何分言之、若是、愚謂泄出少
而勢緩者、為泄、若漏泄之謂也、瀉大出而勢直下
不阻者、為瀉、傾瀉之謂也、姑表出以俟明哲正焉、

防暑論

生生子曰、孰謂夏之傷暑者、在于冬之藏精也、暑者
火也、以人與天地同一橐籥、故天地之氣有升降、
人之氣亦隨之、夏月六陽之氣盡出于地、人之腹、
亦地也、氣浮於外、腹中虛矣、虛而勞動不當、則病
生焉、况人不善攝生者、多于冬月陽氣潛藏之時、

斲喪過甚、精氣虛竭、精氣者天真本然之氣也、精
此為來春發生之本、本一虛竭、則生元絕矣、經曰、
冬不藏精者、春必病温、夏必煎厥、人有春末夏初
患頭痛体熱、食少自汗、怠惰嗜臥者、此注夏病也、
仲景謂春夏劇、秋冬差者是也、暑為盛夏失令之
極、陽氣既浮、陰血又竭、幾何不病、苟或攝養不當、
勤勞失矩、氣血復耗、神將何依、于是卒暴僵仆迷
悶、霍亂之症叠出不已、孫真人教人以五月常服
生脉散、蓋謂脉者氣血之先、氣血者人之神也、火

令熱傷元氣以人參能補天真之元氣也三味必
斂浮散之氣不使飛越又能滋肺補腎庚金二味
真陰枯竭以門冬復脈通心生津潤燥三味和諧
同為補劑名曰生脈散冥亦救其冬不藏精之夫
此[illegible]然於予休孕未病之先力則易為若稟弱既
六[illegible]矣故善防暑月之病者不若保腎水
者[illegible]也東垣論暑兼脾胃虛弱而言
其[illegible]丹溪載夏月伏陰在內戒用燥熱王綸
微義與戴籍間所載暑病尤斑斑焉皆當細玩學
者能潛心貫而通之無餘蘊矣

痿論

生生子曰世之病痿者甚多而治痿之法甚少攻之
內經且特立篇目非泛常總括病機者倫也治法
之少由後人或未能盡悉經旨今按內經皆以氣
熱為五痿受病之胎則可見痿之病本皆自氣熱
中來也何者痿躄之始五臟因肺熱葉焦遞相傳
染緣肺者統諸氣心之蓋臟之長君之相傳而治
節之所由係焉五痿之疾殆肺之一氣流傳猶宰
相於一言以令天下也觀其獨取陽明為治不以
五痿異者此又可見以肺熱為本而五痿為標故
治痿取陽明是謂定于一也此取字有救人補之
之意非所謂攻取也蓋陽明乃五臟六府之海主
[illegible]宗筋又衝脈者經脈之海與陽明合于宗筋陰
[illegible]宗筋之會會于氣衝而陽明為之長皆屬于
[illegible]于督脈陽明虛則宗筋縱帶脈不引故
[illegible]其陽明使谷氣充衝脈盛帶脈引
宗筋閏是以能束骨而利機關故其治獨取陽明

而不以五痿異也既得以熱字為本陽明為用睹
症處方則在人自擴充之書曷能盡所言哉
丹溪曰內經痿論肺熱葉焦五臟因而受之發為痿
躄又曰諸痿皆屬于上指病之本在肺也或曰內
經治痿之法獨取陽明何也曰諸痿生于肺熱只
此一句便見治法大意經曰東方實西方虛瀉南
方補北方此固是就生剋言補瀉而大經大法不
外于此五行之中惟火有二腎雖有兩水惟其一
陽常有餘陰常不足故經曰一水不能勝二火理

之必然金體燥而居上主氣畏火者也土性濕而
居中主四肢畏木者也火性炎上若嗜欲無節則
水失所養火寡于畏而侮所勝肺得火邪而熱矣
木性剛急肺受邪熱則金失所養木寡于畏而侮
所勝土得木邪而傷矣肺熱則不能營攝一身脾
傷則四肢不能為用而諸痿之病作瀉南方則肺
金清而東方不實何脾傷之有補北方則心火降
而西方不虛何肺熱之有故陽明實則宗筋潤能
束骨而利機關矣治痿之法無出於此駱龍吉亦

曰風火相熾當滋腎水東垣先生取黃柏為君黃
蓍等藥為輔佐而無一定之方有兼痰積者有濕
多者有熱多者有濕熱相半者有挾寒者臨病製
方其善于治痿乎雖然藥中肯綮矣若將理失宜
聖醫不治也但是患痿之人若不淡薄滋味吾知
其必不能安全也

生生子曰劉宗厚謂治痿方多缺畧者皆因混入中
風条內故也此皆承丹溪治痿不得作風治斯言
深得病旨風乃外入者故當逐散痿則內藏不足
所致治惟有補而已但丹溪痿篇中既以內經治
痿獨取陽明之說設為或問矣乃不荅所以取陽
明之旨而以難經瀉南補北之法摘為治痿之方
斯亦法外變通之意第不思所問取陽明之義竟
何所發明是欲彰之而復蔽之也胡不曰陽明者
胃也胃土也萬物之所以資生焉為脾之表脾胃
一虛肺失所生而虛則不能宣通藏腑節制經絡
如胃不虛胃氣充則能布散津液使臟腑各有
所稟受而筋骨流通如是則何有于葉焦何有于痿

躄也要知痿之終始只在肺胃之間而已矣肺熱
葉焦則不能節制諸經胃氣虛弱則臟腑無所受
氣帶脈不引宗筋枯槁而痿躄之所由兆故內經
治痿所以獨取乎陽明也以陽明為五臟六腑之
海也獨之一字是謂足可以盡其治之辭彼丹溪
瀉南補北之法或可以施肺腎之痿其于肉痿敢
試之乎經曰肌肉濡漬痺而不仁發為肉痿啟玄
子註曰肉屬于脾脾惡濕濕著肌肉則衛氣不營
故發為肉痿也據此則瀉火補水之法可得以槩

治肉痿乎否也丹溪天資甚高筆力尤健尤天資[illegible]
高者或一時之興隨筆成文或自執己見以為是
不復更檢觀篇後咸發東垣治痿之善即可以見
其天分惜乎不以東垣之善返照未免自是之為
累歟

[illegible]辯

[illegible]言癲狂者有言癲癇者有言風癇
[illegible]者有言驚癇者有分癲癇為二門者
累無定論究其獨言癲者祖內經也言癲癇言癲

狂者祖靈樞也要之癲癇狂大相逕庭非名殊而
實一之謂也靈樞雖編癲狂為一門而形症兩具
取治異途較之于癇又不相侔矣諸書有云大人
為癲小兒為癇此又大不然也素問謂癲為胎病
自母腹中受驚所致今乃曰小兒無癲可乎癇病
大人歷歷有之婦人尤多予故據經文分為三目
庶治者有所辯別云

明癲症

夫癲者或狂或愚或歌或笑或悲或泣如醉如痴言
語有頭無尾穢潔不知積年累月不愈俗名[illegible]
風此志願高大而不遂所欲者多有之

明狂症

夫狂者猖狂之謂也言其病之發猖獗剛暴有如傷
寒[illegible]陽明大實發狂罵詈不避親疎甚則登高而
歌棄衣而走踰垣上屋持刀執棍日夜不止狎之
[illegible]之[illegible]如有邪依附者是也

[illegible]

夫[illegible]也有連日發者有一日三五發

者或因驚或因怒而動其痰火發則昏昧不知人
事耳無所聞目無所見眩仆倒地不省高下甚而
瘈瘲抽掣目作上視或口眼[illegible]或口作六畜之
聲將醒時必吐涎沫彼癲狂皆無以上証也用此
辯之亦易詳明大抵皆痰火所致

鼻鼽

生生子曰按鼻鼽一症今人患者甚多攷諸古方鮮
有言其病因者惟運氣曰火攻肺虛鼻鼽少陰司
天熱氣下臨肺氣上從鼽衄鼻窒又云少陰司天

熱淫所勝民病衄衊嚏嘔又云少陽司天火淫所勝甚則鼽衄又歲金不及炎火乃行民病鼽嚏又曰陽明所至為鼽嚏按運氣皆以火熱司令為言火尅金熱傷肺蓋以鼻為肺之竅也雖云少陰少陽燥火司令之年為病然亦只是腸胃素有痰火積熱者乃有此證也不然火熱主令之歲三年之內焉得無夫盡人人有此病也耶故曰必腸胃素有痰火積熱者然後有此感也何者大腸肺之府也胃五臟之所受氣者也內經曰九竅不利腸

胃之所生也鼻主無形者經曰清氣通於天又曰鼻主天氣愚謂腸胃設無痰火積熱則其平常上升之氣皆清氣也縱火令之年何損耶若夫腸胃素有痰火積熱則其平常上升之氣皆氳而為濁耳金職司降喜清而惡濁今受濁氣熏蒸凝聚既久壅遏鬱結而為痰涕至于痔珠瘜肉之類皆由積久燥火內燔風寒外束隧道壅塞氣血升降被其妨礙澆培彌厚猶積土而成阜也按運氣云云純以火熱司令之歲火氣下臨肺氣上從乃成鼻

鼽嚏衄之症假令水濕司令之歲必無鼻鼽嚏衄而鼻鼽嚏衄之証必待火熱司天之歲而能成耶噫如斯而談則鑿矣觀仲景傷寒論太陽症當與麻黃湯不與者必成鼻衄又見今人每每感風寒[illegible]以鼻塞濁涕及素有鬱熱者微觸風寒即鼻塞[illegible]者或謂[illegible]其互積年累月竟成鼻鼽鼻淵者往往[illegible]經曰膽移熱于腦則辛頞鼻淵又曷嘗[illegible]司令而後始設此病耶愚設曰必腸胃素有痰火積熱又值火熱當權之年內外之火夾

攻於此時有甚耳或曰予以運氣之言為不足徵歟何今之按天時占歲候與夫驗豐旱及諸星卜家動輒取應吾恐後之吹毛者將藉此以非子矣子曷逃乎予曰愚亦深知備諭為非而無所逃也愚又奚敢謂運氣為不足徵也夫運氣云者指歲運火令當權所不勝者受邪是大略以理談之也否則咳嗽吐血肺癰等症又何莫而非火尅金之候耶愚之所謂腸胃痰火積熱者即病因也於運氣有所叢而無相悖戾焉知我者其鑒諸

鼻淵 俗名腦漏

生生子曰、按書云、鼻流清涕者為鼻鼽、流濁涕者為鼻淵、內經氣厥論篇曰、膽移熱于腦、則辛頞鼻淵、[illegible]者濁涕下不止也、傳為衄衊瞑目、故得之氣[illegible]註曰、厥者逆也、腦液下滲則為濁涕、[illegible]故曰、鼻淵也、足太陽脈起于[illegible]上入絡腦、足陽明脈起于鼻交頞[illegible]太陽之脈、令腦熱則足太陽逆與陽明之脈俱盛、薄于頞中、故鼻頞辛也、辛謂酸痛、予嘗以防風通聖散除硝黃、其滑石石膏減半、倍加辛夷花、先服三五帖、再用此為丸、每服七十丸、早晚白湯吞服、半斤則瘳[illegible]

醫旨緒餘下卷

脇痛

余弟於六月赴邑、途行受熱、且過勞、性多躁暴、忽左脇痛、皮膚上一片紅如碗大、發水泡瘡三五點、脈七至而弦、夜重于晝、醫作肝經鬱火治之、以黃連青皮香附川芎柴胡之類、進一服、其夜痛極、且增熱、[illegible]看之、其皮膚上紅大如盤、水泡瘡又加至三十[illegible]、醫教以白礬研末、井水調敷、仍于前藥加青黛龍膽草進之、其夜痛苦不已、叫號之聲徹于四鄰、脇中痛如鉤摘之狀、次早觀之、其紅已及半身矣、水泡瘡又增至百數、予心甚不懌、乃載歸以詢先師黃古潭先生、先生觀脈案藥方、哂曰、切脈認病則審矣、製藥訂方則未也、夫用藥如用兵、知己知彼、百戰百勝、今病勢有燒眉之急、疊卵之危、豈可執尋常瀉肝之劑正治耶、是謂驅羊搏虎矣、且苦寒之藥、愈資其燥、以故病轉增劇、水泡瘡發于外者、肝鬱既久、不得發越、乃侮其所不勝、故皮膝為之潰也、至于自焚則死矣、可懼之甚、為訂

一方以大瓜蔞一枚重一二兩者連皮搗爛加粉草二錢紅花五分戌時進藥少頃就得睡至子丑時方醒問之已不痛矣乃索食予禁止之恐邪火未盡退也急煎藥渣與之又睡至天明時微利一度復睡至辰時起視皮膚之紅皆已氷釋而水泡瘡亦盡斂矣後亦不服他藥夫病重三日飲食不進呻吟不輟口一劑而愈真可謂之神矣夫瓜蔞[illegible]甘寒經云泄其肝者緩其中且其為物柔而滑[illegible]不逆甘緩潤下又如油之洗物未嘗不潔

考之本草瓜蔞能治插脇之痛蓋為其緩中潤燥以致于流通故痛自然止也

腹中水鳴

生生子曰一婦三十五歲無子恐夫娶妾致鬱經不行者三月矣病腹痛惡心諸醫皆云有孕其夫亦粗知醫舉家欣喜治以安胎行氣止痛之藥服三五十帖不効痛苦益甚凡未申時發寒熱腹中有塊如彈子大者二三十枚翻騰作痛行動則水聲漉漉痛極則吐酸水五六碗吐盡則塊息而寒熱除痛亦不作明日亦然又作瘧治轉劇召予診左手弦尺濇右手滑弱重取則滑尺同左脈經已五月不行矣予曰此鬱病也豈有濇脈成孕之理若然則前藥當効矣其夫亦悟乃為製方以二陳加香附山梔撫芎玄胡當歸紅花之類藥進而痛止連與四帖皆効但藥止則痛發如故調治一月不能[illegible]予因持脈案見先師黄古潭先生先生乃[illegible]曰此鬱火病也其病起于肝膽蓋肝主謀慮[illegible]謀不決則鬱生鬱生則木盛木盛則凌

脾脾傷則不能運化精微而生氣血以故月水不來也肺金失于母養則降殺之令不行木寡于畏而侮所不勝是以直冲犯清道以作吐也吐後諸症皆減者木升而火息也為裁一方以黄芪五錢柴胡三錢白芍藥二錢甘草一錢陳皮貝母只實各五分姜三片一劑而寒熱除再劑而痛減吐止水聲亦絶七日不發其夫喜曰是何神速也乃拉予復請命于先生先生曰夫寒熱者少陽膽也吐酸者厥陰肝也痛而腹塊翻騰者火盛激動其水

如鍋中湯滾泡浪沸騰是也。吐多則肺金愈傷，故
用黃芪補肺金為君，使得以制肝木；以柴胡瀉肝
為臣，以升發其膽火。經曰：木鬱則達之。達是通達
之義。夫木性上升者也，既鬱則不升，故用柴胡升
發膽肝之清氣，使衝開其鬱結，以復其常。又曰：過
者折之，以其畏也。所謂瀉之，補肺制肝，正謂此也。
又曰：泄其肝者緩其中，以甘草緩中為佐。又曰：木
位之主，其瀉以酸，以白芍藥于脾中瀉木為臣。病
久生鬱，鬱久則生涎，以貝母陳皮只實開鬱逐涎

為裨，使然後金得其正，木得其平，土得其安，由是
病去而愈速。前方用山梔黃連之類，皆降下之藥，
火勢正熾，豈區區寒涼所能抑哉？故經曰：輕者正
治，重則從其性而升之。但凡治病，要當識得此意。
先生吾邑黟人也，汪石山翁弟子，少業儒，通五
經，以疾就醫治病，每有超見，此畧述其二耳。且
此今人所患者多，而治者鮮有若是之明且盡
也，故揭附于斯，以公同志者，庶先生之名不泯
也。

治腎消

本事方云：唐李祠部治消渴者，腎虛所致，每發則小
便甜。醫多不知其故，方書缺而不言。洪範曰：稼穡
作甘。以物理推之，淋餳醋酒作脯法，須臾即甜，足
明人之食後滋味皆甜，流在膀胱，若腰腎氣盛，則
上蒸炊化成精氣，下入骨髓，其次為脂膏，又其
次為血肉，其餘則為小便，故小便色黃，血之餘氣
也。五臟之氣鹹潤者，則下味也。若腰腎既虛冷，則
不能蒸化，穀氣盡下為小便，故味甘不變，其色清

冷，則肌膚枯槁也。猶如乳母，穀氣上泄，皆為乳汁；
消渴病者，下泄皆為小便，皆精氣不實於內，
則小便頻數也。又肺為五臟華蓋，若下有暖氣蒸，
則肺潤；若下冷極，則陽不能升，故肺乾而渴。譬如
釜中有水，以火暖之，又以板覆之，則暖氣上騰，故
板能潤；若無火力，則水氣不能上升，此板終不得
潤。火力者，腰腎強盛也，常須暖補腎氣，飲食得火
力，則潤上而易消，亦免乾渴之患。故仲景云宜服
八味腎氣丸。

余族兄双栢五旬後病此時師以滋陰降火之劑投之小便愈多色清而長味益甘渴益甚屢更醫率認為熱盡用苦寒輕劑如天花粉黃連麥冬石膏知母之類重劑如汞丹之類不但不效反至遍身如癩精神歷削脈皆細數余復[illegible]一此東垣所云消渴末傳也能食者必發腦[illegible]不能食者必傳中滿鼓脹今脈細數而[illegible]皆陰虛陽多其無症瘍乎急宜血藥毋用寒涼壞胃也乃以腎氣丸加桂心五味子鹿角膠

益智仁服之半月精神漸長消渴痊除小便亦甜膏瘳俱脫十年無恙後以不如意事觸之渴疾復作諸醫又以滋陰劑與之遂成腫滿而斃嗚呼痛哉設若守加味腎氣丸未必有是腫滿病也仲景東垣實為祖師千載之下盍使人崇信也特附于斯以告同志

羅太無藥戒

客有病痞者積于其中伏而不得下自外至者捍而不得納從醫而問之曰非下之不可歸而飲其藥既飲而暴下不終日而向之伏者散而無餘向之捍者柔而不支焦膈道達呼吸開利快然若未始有疾者不數日痞復作投以故藥其快然也亦如初自是不踰月而痞五作五下每下輒愈然客之氣一語而三引體不勞而汗股不步而慄肌革無[illegible]中藟然莫知其所來嗟夫心痞非[illegible]而下之術未爽也藟然猶何如聞[illegible]藟然往而問之醫笑曰子無怪是藟然者也乃子之末固為是藟然也坐吾語汝天下

之理有甚快於吾心者其末也必有傷求無傷於其中則無望快於吾心夫陰伏而陽蓄氣與血不運而為痞橫乎子之胸者其累大矣擊而去之不須臾而除甚大之累和平之物不能為也必將搏擊震撓而後可夫人之和氣冲然而甚微汩乎其易危擊搏震撓之功成而子之和亦已病矣由是觀之則子之痞凡一快者則子之和亦一傷矣不踰月而決者五子之和平之氣不既索乎故藟然如不終日也且將去子之痞而無害於和也子歸

燕居三月，而後與之藥可為也。客歸三月，齋戒而復請之。醫曰：子之氣少復矣。取藥而授之，曰：服之三月而疾少平，又三月而少康，終年而可復常。且飲藥不得亟進。客歸而行其說，然其初使人懣然而遲之，蓋三投藥而三反之也。然日不見其所攻之效。久之，則月異而時不同，終歲而疾平矣。客謁[illegible]之，坐而問其故。醫曰：此醫國之說也，豈[illegible]哉？子獨不見秦之治民乎？悍而不聽令，[illegible]而不勤事，放而不畏法令之不聽，治之不變，則秦之民常痞矣。商君見其痞也，厲以刑法，威以斬伐，悍厲猛鷙，不毫髮少貸，痛剗而力鉏之。於是乎秦之政如建瓴，流通四達，無敢或拒，而秦之痞常一快矣。自孝公以至二世，凡幾痞而幾快矣。積者已[illegible]，理者已柔，而秦之民無懽心矣。故猛政一快者，歡心一亡，積快而不已，而秦之四肢枵然，徒具其物而已。民心日離，而君孤立於上，故匹夫大呼，不終日而百姓皆起，秦欲運其手足肩膂，而漠然不我應。故秦之亡也，是好為快者之過也。昔者

先王之民，其初亦嘗痞矣。先王豈不知砉然擊去之以為速也？惟懼其有傷於中也，故不敢求快於吾心。優柔而撫存之，教以仁義，道以禮樂，陰解其亂，而除去其癥，旁視而懣然，有之矣。然月計之，歲察之，前歲之俗非今歲之俗也。不擊不搏，無所忤逆，是以日去其戾氣而不嬰其欲心，於是政成教達，安樂久而後患除矣。是故三代之治，皆更數聖人，歷數百年而後俗成，則予之藥終年而疾愈，蓋無足怪也。故曰：天下之理，有甚快於吾心者，其末也必有傷；求無傷於其中，則無望快於予心。雖然，豈特治天下為然哉！客再拜而紀其說。

人經脈上下左右前後二十八脈考

靈樞經第十五篇有曰：人經脈上下左右前後二十八脈，以應二十八宿。夫謂二十八脈者何？左右手足上下各十二經，又陰蹻陽蹻共二十六也，合任督二脈前後，以足其數云。

人身四海說

生生子曰：天有四時，地有四海，而人亦應之。四海者，

髓海血海氣海水穀之海也十二經水皆注于海也岐伯曰胃者水穀之海其輸上在氣街下至三里衝脈者為十二經之海其輸上在于大杼下出于巨虛之上下廉膻中者為氣之海其輸上在于柱骨之上下前在于人迎腦為髓之海其輸上在于其蓋下在風府有餘不足皆可得而見也氣海有餘者氣滿胸中悗息面赤氣海不足則氣少不足以言血海有餘則常想其身大怫然不知其所病血海不足亦常想其身小狹然不知其所病水穀之海有餘則腹滿不足則飢不受穀食髓海有餘則輕勁多力自過其度不足則腦轉耳鳴脛痠眩冒目無所見懈怠安臥凡此有餘不足宜審守其輸而調其虛實無犯其虛順者得復逆者必敗

出靈樞海論篇

刪定野山秘抄種子論

易曰天地絪縕萬物化醇男女媾精萬物化生則絪縕者升降凝聚之謂也媾精者配合交感之謂也必二氣合則化自生矣否則獨陽不生獨陰不成

惡能望其化生哉然則人之不孕育者豈夫婦竟無一交媾之遇耶遇而不識不會是亦獨陰獨陽之謂也不知者諉於天命則泥矣間有侶為資藥餌以養精血候月水以種孕育又多峻補以求詭遇則嗣未必得而害已隨之此固予之痛惜也久矣因究種子之道有四一曰擇地二曰養種三曰乘時四曰投虛是也何也蓋地則母之精也種則父之精也時則精交媾之時也虛則去舊生新之初也予嘗聞之師曰不受胎之原有二陰失其道而不能受者以氣勝血衰故也衰則寒熱乘之氣凝血滯而營衛不和經水先後多寡不一也陽失其道而不能施者以氣虛精弱故也弱則原于色欲過度耗其精元精元既弱譬之射者力微矢枉安能中的究斯二者皆由不能自宝以致真元耗散陽不施陰不受陰涸陽枯則生生之道息矣猶乃歸之天命不亦悞哉以是種子者必地盛則種可投又必時與虛俱得焉可成孕而生子矣雖然至難養者精至難遇者時與虛苟不憑以藥餌之

力、亦以調攝之宜候以如期之法、則養與遇竟莅
然矣又知種子之法以調經養精為首而用藥須
審平和夫婦尤必相保守、旬日之間可使精元俱
實、待時而合時則所謂三十時中兩日半也經候
至此積穢蕩滌既盡新血初生時與虛俱會而可
以[illegible][illegible][illegible]矣又恐情竇不開陰陽背弛續有奇延
以[illegible][illegible][illegible]于宮開而真元媾合、兩情暢美雖平
生[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]孕矣尚何疑哉是乃歷試歷驗、百發
中[illegible][illegible][illegible]呼、是說也、豈畔道云乎哉亦以培植

元氣順養天真特資藥力以佐助之所謂人定亦
可以勝天者是也、由是而知始而無嗣者非天也、
人自戕天也、繼而有嗣者、亦非天也、人能成其天
也、故曰、斯道順則成人逆則成丹慎毋以天命自
諉也、噫以天命自諉者良可惜哉

護胎說

凡婦人孕後當戒之在色不知自慎則慾動而子宮
復開豈惟多致半產漏下、即生子亦多瘡毒夭傷
何也由淫火熾胎也彼馬牛之類受胎後牡逼身
輙踶之使不得近謂之護胎何致有半產之事、人
惟多慾故往往不知護也產寶論及婦人科俱缺
此一款余故采荻園雜記所載者潤色之如此、

王節齋本草集要參蓍論

或有問於生生子曰觀子視病用藥嘗於各家所長
亦[illegible]之亦未嘗見子純用參蓍何獨於此便便不
以[illegible]乎曰予之便便蓋欲白王公之冤而針時
弊也[illegible]王公以六經出身、行軒岐之道著書立
言[illegible][illegible]之志亦然矣觀其書羽翼丹溪固欲成人

之美者蓋丹溪揚温補之弊其書雖行後之人頗
倒於其間者猶未斬然而截迹也、故王公亹亹告
戒常恐後之人不遵丹溪陰虛之說而濫温補之
害豈意後人不究其原而于告戒之處則一槩未
偶而[illegible]塑凡遇發熱咳嗽見紅之疾不察病因不
詢兼症則曰此正王公陰虛火動忌用參蓍之病
也當以滋陰降火治之冤哉冤哉王公欲成人之
美者詎謂釀禍迄今不已耶、何者時師誦王公之
言、於雜著則曰是拳拳於滋陰也、誦本草於參蓍

則曰是溫也、積溫可以成熱、此陽也、陽旺則陰愈消、肺寒則可服、肺熱反傷肺等語時不徹口、間欲有用之者、則衆起而排之、乃曰參蓍豈易服者耶、服則殺人、是以病家亦相安於滋陰、雖死而無悔也、識阜理融者每為之束手、正如一傅衆咻、欲求不、實亡也、雖矣推王公之心、抑何嘗謂參蓍不補陰之專補焉哉、觀其序本草集要云古人因病以立方、非製方以待病、學醫之道莫先於讀本草、藥性明然後可處方、云云、時師觀書、只識吹毛求疵

安知通章大義、又安知寓意之處、如古人諷諫之謂也、王公本草集要於人參條下云味甘氣溫微寒、云云、夫既主補五臟、安精神、定魂魄、止驚悸、除邪氣、明目、開心益志、調中生津、通血脈、治五勞七傷、已上症誰謂非五臟之陰虛者耶、王公曷為不刪而略之、王公蓋以其味甘、氣雖溫而又有微寒在焉、故集此為補陰者之法眼也、雖有肺受火邪喘嗽及陰虛火動勞嗽吐血勿用之語、蓋指不當補而補之者、觀其復引仲景論亡血脈虛以此補

之謂氣虛血弱、故補其氣而血自生、陰生於陽、甘能生血也、以通章大義觀之、王公何嘗道人參不補陰也、丹溪治陰虛咳嗽、瓊玉膏、葛可久治吐血獨參湯、義皆本此、於黃蓍條下云味甘氣微溫云云、夫既補丈夫虛損、五勞羸瘦、補中生血、補肺氣實皮毛、瀉陰火、為退熱之聖藥、治虛勞自汗無汗則發、有汗則止、又治消渴腹痛泄痢腸風血崩帶下、月候不調、胎前產後一切痛、補腎三焦命門元氣藥中呼為羊肉、已上症誰謂非五臟之陰虛者耶、

王公曷為不刪而畧之、王公亦以其甘能生血、且其氣微溫、是以能溫分肉而實皮毛、以通章大義觀之、王公何嘗道黃芪不補陰也、東垣治血虛發熱、以黃芪一兩當歸二錢、名曰補血湯、治盜汗用當歸六黃湯、以黃芪為君、義皆本此、夫本草之所以集者、特述其藥性之剛柔氣味之溫涼補瀉之專功、以為立方治病之準、誰謂通章之義不足憑而於一句積溫成熱之說、獨可據哉、必如時師所言養血藥中以四物湯為主加黃柏知母就為滋

陰降火之妙劑尚惟然後之而無疑抑不思當歸味甘辛氣溫川芎味辛氣溫當歸雖補血亦能破血以其甘中有辛也川芎上行頭巔下行血海乃血中之氣藥也治一切氣溫中散寒開鬱行氣燥溼又曰久服則走散真氣蓋辛散故也較之於參耆補性優劣爲何如俱一本草語也俱王公所集要也豈師既宗王公乃不畏芎歸之辛而獨畏參耆之甘耶何特也丹溪心法傳中羅成之云先生猶以芎歸之性辛溫而非陰虛者所宜服況其他乎時師既遵王公當求王公之所自知王公之所自則可以知丹溪之用心矣予故曰丹溪謂陰虛者救時之言也王公道陰虛者成人之美者也時師言陰虛者偏而僻者也畏人參如虎者與又丹溪王公之罪人悞天下之蒼生者也予之便言豈好辯哉願爲王公之忠臣耳

洗冤錄載沿身骨節上下聯絡名目

夫人兩手指甲連者小節小節之後中節中節之後本節本節之後肢骨之前生掌骨掌骨上生掌肉掌肉後可屈曲者腕腕左起高骨者手外踝右起高骨者右手踝二踝相連生者臂骨輔臂骨者臂骨三骨相經者肘骨肘骨可屈曲者曲肘曲肘上生者臑骨臑骨上生者肩髃肩髃之前者橫髃骨橫髃骨之前者髀骨髀骨之中陷者缺盆缺盆之上者頸頸之前者顙喉顙喉之上者結喉結喉之上者胲胲之上者頭頭兩傍者顋顋兩傍者頰車頰車上者耳耳上者曲鬢曲鬢上行者頂頂前者顖門顖門下者額額下者眉眉際之末者太陽穴太陽穴前者目目兩傍者兩小眥小眥上者上臉下者下臉正位能瞻視者目瞳子瞳近鼻者兩大眥近兩大眥者山根山根上印堂印堂上者腦角腦角下者耳枕骨枕骨下橫生者頸骨頸骨兩傍者釵骨釵骨下中者腰門骨釵骨上連生者腿骨腿骨下可屈曲者曲瞅曲瞅上生者膝蓋骨蓋骨下生者脛骨脛骨傍生骱骨骱骨下左起高大者兩足外踝右起高大者兩足右踝脛骨前垂者兩足趺骨趺骨前者足本節本節

前者小節、小節相連者足趾甲、趾甲後生者足前趺、趺後凹陷足心下生者足掌骨、掌骨後生者跟肉踵、肉後者脚跟也。

洗冤錄驗胎法

又五臟論有[illegible]者[illegible]者云一月如珠露、二月如桃花、三[illegible]男女[illegible]、[illegible]形象全、五月筋骨成、六月毛髮生、[illegible]母孩左、八月動左手於母腹右、[illegible]三[illegible]尚足生、若驗得未成形像、只念一[illegible]紅[illegible]一片或一塊、若經日壞爛多化為

水、若所墮胎已成形像者、謂頭腦口眼耳鼻手脚指甲等全、亦有臍帶之類、若胎在母腹中被驚而死、其胎下係紫黑色、血蔭軟弱、若生下腹外死者、其屍係淡紅赤色、胞衣白、却無紫黑色、極易驗也。

人身內景說

咽之與喉有二竅、前後不同、喉在前、咽在後、咽則因物而嚥、以應地氣、而為胃之系、下連胃管、為水谷之道路、自咽而入於胃、胃主腐熟水谷、其水谷精悍之氣自胃之上口出於賁門、輸於脾、脾氣散精、上歸於心、淫精於脈、脈氣流經、經氣歸於肺、肺朝百脈、輸精于皮毛、毛脈合精、氣行于腑、腑精神明、留於四藏、冲和百脈、順養神氣、利關節、通九竅、滋志意者也、其渾穢則自胃之下口入於幽門、傳于小腸、自小腸下口至于大腸上口、大小二腸相會為闌門、闌門者、闌約水谷以分別也、其水則滲灌入于膀胱、膀胱者胞之室也、胞虛受水、而為藏水之室家也、其渾穢入于大腸、大腸一名回腸、以其回屈而受小腸之濁穢也、唯主出納、以應天氣、而

為肺之系、下接肺經、為喘息之道路、自喉嚨而通於肺、肺下無竅、而有空、行列分布諸藏清濁之氣、以為氣管、大腸為肺之府、肺色白、故大腸為白腸、主傳送濁穢之氣、下行而不使上干於心肺、所謂傳瀉行道之府也、肺之下有心、心系有二、一則上與肺相通、一則自肺葉曲折向後、並脊膂細絡相連、貫脊通髓、而與腎系相通、小腸為心之府、心色赤、故小腸為赤腸、主引心火濁氣下行、而不使上干于華蓋、所謂容受之府也、蓋心通五藏系、而為

五藏之主有膈膜遮蔽濁氣不得上薰于心所以真心不受邪凌犯其所以致病者心包絡耳心包絡是心上漫脂之外有細筋如絲與心肺相連者是也心包絡經自膻中散布絡繞于三焦三焦其氣通達十二經絡上下往來無有休息自與心包絡配合為表裏故俱有名而無合應脾系在膈下著右脇上與胃膜相連胃為脾之府脾色黄故胃為黄腸乃為水谷之府也肝系在心肺下著左脇上貫膈入肺中與膈膜相連而膽在肝短葉之間膽為肝之府肝色青故膽為青腸而為清淨之府也腎與臍對形如石卵而曲附脊膂有系上通于心所謂坎離相感水火升降者此也膀胱為腎之府腎色黑故膀胱為黑腸而為津液之府也

不執方說

余屈首受醫日惟有事于素難病源病機甲乙等書俯而誦仰而思希心融貫前哲秘旨而未逮也若彼局方袖珍惠濟等集間用之参考而不敢執泥至臨症務虚心察受病之因始敢投劑亦未嘗執方以合病以故執方之夫往往見而駭之議之謂如上方書之傳簡易捷徑大有便于後學素值諸書固云精妙延漫艱深力難究竟胡子好雖忌多性與人殊豈予診病用藥頗與方書懸異有病[illegible]各有始終用一法而不殊有三五更其方[illegible]獲効此違何道哉或方書不足[illegible]敢與奚與諸醫殊致也余曰嘻醫何[illegible]人之死生関于呼吸間余何敢師心自用而以嘗為也古稱用藥如用兵然齊步伐肅部

伍坐作進退刺殺攻擊一定而不亂者法也胡可廢也運者知己知彼置伏設奇臨變不測其運用妙於一心藥之君臣佐使味之甘苦寒涼方之丸散湯引著于載籍者法也察病之寒熱虚實感之臟腑表裏所以君臣佐使甘苦寒涼補瀉而丸散湯引者不廢方亦可不執方也故按局用兵而不達變者以卒與敵執方治病而不察因者未有能生人者也雖然不執方而又合法亦匪易臻也脱非生平融通素難本草仲景潔古守真東垣丹溪

諸書不可以經與私容醫何容易設也予徒以方
書為捷徑蓋亦未求之上古乎上古之世無方扁
鵲傳載長桑君以禁方相授受亦不載曰何方春
秋時秦緩醫和淳于公輩以醫名天下亦未嘗
有方傳也至張仲景乃始有方足知東漢已前醫
[illegible]妙醫已法審病投劑未嘗拘方也彼豈私其方
[illegible]誤後之人拘執不變必致誤人
[illegible]不達病機之詳確審經絡之虛
[illegible]程接明氣味之走守合色脈衍天和
調燮陰陽參相造化以一理貫之理融則識真識
真則機順自然應變不膠方自吾心出病可去而
功可成以成功而名方誰曰不可余何能余僅守
方而不執焉已予寧以余言為迂矣

張劉李朱滑六名師小傳

孫氏生生子曰醫以通變稱良而執方則泥故業醫
者能因古人之法而審其用法之時斯得古人立
法之心矣不則窺其一斑而議其偏長即醫如張
仲景李東垣諸公亦妄加譏貶也可乎哉可乎哉

余故列其因時立法者於後

醫學自漢秦以上無方有方自張長沙始故醫家以
長沙為方書之祖既世議長沙者率謂其長於傷
寒而短於雜証余惟醫如長沙亦無間然矣乃長
沙之[illegible]於傷寒者蓋病莫大於傷寒而變証亦莫甚
[illegible]死決于七日十三四日之間非若他
[illegible]也長沙發其緩急故以傷寒為首
[illegible]要略治雜証書也獨非長沙著述
[illegible]傳有曰仲景受業於同郡張伯祖善

于治療尤精經方時人謂扁鵲倉公無以加焉觀
此則仲景不專長於傷寒又可知矣而劉宗厚亦
曰吾嘗用東垣之藥效仲景處方宗厚丹溪高弟
也不效丹溪而效仲景以仲景醫之亞聖非丹溪
可企及者歟仲景亦取法乎上之意云後世慎
毋輕議長沙也

張戴人醫亦奇傑也世人不究其用意議其治疾惟
事攻擊即明理如丹溪格致餘論亦譏其偏厚薄
之說出蓋令人畏汗吐下三法如虎并其書置之

不其瞭矣予悲寬之心惟人之受病如寇入國不
先逐寇而先拊循適足以養寇而擾黎元也賞人
有見於是說以攻疾為急疾去而後調養是得詩
寇安民之法矣彼仲景麻黄瓜蒂大承氣不攻擊
之疾者寧緩急而用之此仲景意也今予當於認
[illegible]以導調補戴人特揚其證者言之也
[illegible]之所湊其氣必虛者詳分道下文
[illegible]為實一句引精氣奪則虛又遺邪
[illegible]虛者正氣虛也又遺實者邪氣

實也一句據其可議戴人為言而于戴所急畧而
不採丹溪且若此餘又何怪哉且戴人名其書曰
儒門事親豈有儒者事親而行霸道以害其親者
哉必不然矣譬彼武王伐紂先懸紂於太白而後
散財發粟漢高入秦降子嬰而後約法三章彼拘
拘然進調補而諱攻擊是猶治國專用賞而不用
罰也則舜誅四而尼父誅卯為多事哉予因著於
篇以為戴人辯白

有謂劉守真長於治火斯言亦未知守真所長也守
真高邁明敏非泛常可儔其所治多在推陳致新
不使少有怫鬱正造化新新不停之意醫而不知
此是無術也此王海藏之言海藏乃東垣高弟尚
推敬如此則其邃學可知且其所撰原病式歷揭
素問病機一十九條而屬火者五又觀人心好動
諸動屬火夫五行具于人身者各一惟火有君有
相加以病機屬火者多也原病式特為病機而發
故不暇以及其餘若所著保命集三卷治雜証則
皆妙絕矣然則謂守真長于治火者其真未知守
真所長者乎

醫家雜議李東垣善于內傷而虛怯非其所長故有
補腎不若補脾之語竊謂腎主閭闔腎間原氣人
之司命豈反輕於脾胃哉蓋病有緩急而時勢有
不同東垣或以急者為首務也彼當金元擾攘之
際人生斯世疲于奔命未免勞倦傷脾憂思傷脾
飢飽傷脾何莫而非傷脾也若內經曰脾胃者倉
廩之本營之居也又曰五臟六腑皆禀受于脾胃
脾胃一傷則臟腑無所受氣故東垣惟孜孜以保

脾胃為急彼虛怯傷腎陰者乃燕居安閒淫佚之疾又不可同日而語也不則內外傷辨惑與外科精義及蘭室秘藏等書皆治雜証者豈止內傷已哉亦可以覩矣

今觀近世醫家明理學者宜莫如丹溪雖倡陽有餘陰不足之論亦自有所在也蓋以人當承平酗酒縱欲以竭其精精竭則火熾復以剛劑認為溫補誤服燥熱之劑內熱骨立而斃與燈膏竭而復加炷者何異此陽有餘陰不足之論所由著也

後李不察緊守其說一遇虛怯開手便以滋陰降火為劑及末期卒聲啞洩瀉以死則曰丹溪之論具在不知此不善學丹溪之罪而于丹溪何尤丹溪為許文懿高第學原考亭其認病最真而投劑最確觀其治許文懿之病及痰風十三症可槩見矣功首罪魁之言余嘗為究之昔荀卿喜為高論而李斯祖之以禍天下則振佚行劫之說著矣大都前哲立論必有定見調施經權必合宜適彼執方而不達变者反為丹溪累也余故不惜牙頰辯之

余讀史記至太史公所稱由光及伯夷之語未嘗不掩卷嘆有伯仁之術而後無有彰之者伯仁我明奇士也拔萃之精不下丹溪即其文辭如素問抄難經註診家樞要外經絡發揮與瘡瘍序痿匡皆傳世可見其術精之大成矣明後學但知宗丹溪而不知丹溪之學於伯仁諸集若罔聞知雖其術有言也治有功彼所全成名如宋太史列傳所稱亦吳之一氏于戴盡丹溪為當時搢紳所游揚又戴

元禮劉宗厚諸名士為弟子故丹溪之名籍之而伯仁藉雖高弗若之矣何一陽有言歷考上古高賢若以岐伯越人為醫中尼父則仲景可為顏曾之陪而河間東垣當在宰我子貢之列若伯仁義理精明製作醇粹可與游夏之流至彥脩又下一等也此論甚確而今宗伯仁者不然也豈惟伯仁則戴人守真亦若是爾故太史公曰岩穴之士欲砥立名行非附青雲之上惡能聲施後世哉此言信矣余故特為伯仁表之也

生生子曰余著論若是、非阿所好也、欲後人知仲景不徒以傷寒擅長、守真不獨以治火要譽、戴人不當以攻擊蒙譏、東垣不專以內傷樹績、陽有餘陰不足之譚不可以疵丹溪、而攖寧生之長技亦將與諸公並称不朽矣、同志者幸亮之、

生生子曰今學經宗儒謂為人子不可不知醫為知言已、韓氏醫通益證斯言為匪欺也、韓飛霞為親習醫而餘澤徧物、閱其集方、揩當而修製合宜、其技劑多奇中、有以哉、余惧其術泯泯也、用采其論藥數款附於集、令後人識有韓飛霞云、

醫通緒論章

飛霞子曰、天地萬物氣成形也、不位不育、病之時也、人之養氣賤形而致中和者、醫之道也、夫醫而至于鍼砭藥餌第二義矣、易無妄九五曰、無妄之疾、勿藥有喜、孔子曰、無妄之藥、不可試也、此最上義也、得醫之最上義者、氣之冲、神之化、皆此身之真息以踵也、盧扁指竪子、華陀剖腸腑、白玉蟾呵醫藥餌云乎哉、鍼砭云乎哉、

風土異宜自然、氣隔古分南北二政、自今輿圖以河界南北、而江之東閩之西可類從矣、南北云者、陰陽之軌、四方之數、八風之輻輳也、

人□□氣參天兩地、一氣流行而已、氣失其平之謂□疾、□之謂病、三才相因之謂機、機動之謂時、陰符經曰、天發殺機、移星易宿、地發殺機、龍蛇起陸、人發殺機、天地反覆、又曰、食其時、百骸理、動其機、萬化安、又曰、三才既宜、三盜既安、嗚呼斯可與契醫之三昧矣乎、

醫之理可比周易、鍼砭藥餌即卜筮法也、丹溪云、陰生氣高、陽生之謬言乎、謂冷生氣是復卦䷗、熱生風是姤卦䷫、即天根月窟之化機、內經所謂亢則害、承乃制者也、故王安道論曰、易也者造化之不可常者也、惟其不可常、故神化莫能測、易曰、一陰一陽之謂道、陰陽不測之謂神、世之攻醫卜而自小焉者何也、

藥性裁成

藥有成性必材相制味相洽而後達夫病情古書如本草桔湯液珍珠諸篇予不能悉記也而二五之升沉鹹苦酸辛甘者觸物在焉姑列數則以例其餘

論用藥　標為攻擊宜生料者以氣全力強本病服餌宜以製劑大成病在元氣宜醇醲

論人參　人參依虛回元氣於無何有之鄉王道也黑附子回陽霸功赫奕甘草調元無可無不可

論當歸　當歸主血分之病川產力剛可攻秦產柔宜補凡用本病酒製而痰獨以姜汁浸透導血歸源之理熟地黃亦然血虛以人參石脂為佐血熱以生地黃姜黃條芩佐之不絕生化之源血積配以大黃婦人形肥血化為痰二味姜浸佐以利水道藥要之血藥不容舍當歸故古方四物以為君芎藥為臣地黃分生熟為佐川芎為使可為典要云

論香附　香附主氣分之病香能竄苦能降推陳致新故諸書皆云益氣而俗有耗氣之訛女科之專非也治本病略炒兼血以酒煮痰以姜汁虛以童便浸實以鹽水煮積以醋浸水煮婦人血用事氣行則無疾老人精枯血閉惟氣是資小兒氣日充形乃日固大凡病則氣滯而餒故香附於氣分為君藥世所罕知佐以木香散滯洩肺以沉香無不升降以小茴香可行經絡而鹽炒則補腎間元氣香附為君參芪為臣甘草為佐治虛怯甚速佐以厚朴之類決壅積佐以稜莪之類攻壅積之甚者

予嘗避諸香燥之熱而用檀香佐香附者以檀香流動諸氣極妙也

論半夏　痰分之病半夏為主脾主濕每惡濕濕生痰而寒又生濕故半夏之辛燥濕也然必造而為麴以生姜自然汁生白礬湯等分共和造麴楮葉包裹風乾然後入藥風痰以猪牙皂角煮汁去渣煉膏如餳入姜汁火痰黑色老痰如膠以竹瀝或荊瀝入姜汁濕痰白色寒痰清以老姜煎濃湯加煅白礬三分之一（如半夏三兩礬一兩）俱造麴如前法

予以霞天膏加白芥子三分之二姜汁礬湯竹瀝
造麯治痰積痰痾者、日能使腐敗隨大小便出、或
散而為瘡、此半夏麯之妙也、古方二陳湯以此為
君、世醫因辛反減至少許、而茯苓滲濕、陳皮行氣、
甘草醒脾、皆臣佐使、而反多其銖兩、蓋不造麯之
過、觀法製半夏以姜礬製辛、即能大嚼是也、伏以
南星治風痰、以姜汁酒浸炒芩連及瓜蔞實香油
拌製略炒之類治痰火、以麯炒枳殼只實姜汁浸
蒸大黃海粉之類治老痰、以蒼朮白朮俱米泔姜

汁浸炒、甚至乾姜烏頭皆治濕痰、而常有[illegible]
以肉豆蔻配半夏麯加神麯麥芽作丸、尤有奇[illegible]
厚養之人酒後多此、而苦痰為病者十常八九、
方書謂天下無逆流之水、人身有倒上之痰、氣[illegible]
血餘、化而為痰、故治痰以行氣殺血為要、

論黃連　火分之病黃連為主、五臟皆有火、平則[illegible]
病則亂、方書有君火相火邪火龍火之論、其實一
氣而已、故丹溪云氣有餘便是火、分為一類、丸治
本病畧炒以從邪、實火以朴硝湯、假火以酒、虛火
以醋、痰火以姜汁、俱浸透炒、氣滯火以茱萸、食積
瀉以黃土、血痰癥瘕以乾漆汁、俱以水拌同炒去
黃土、[illegible]以[illegible]酒浸透焙、目疾以人乳浸
蒸、[illegible]為君、佐以桂少許煎[illegible]入[illegible]
主心脈、[illegible]心[illegible]刻、入五苓滑石大[illegible]
遺、以上姜酒[illegible]同炒者為君、史君子為主、曰[illegible]
酒煮為佐、廣木香為使、治小兒五府、以茱萸炒者
加木香等分、生大黃倍之、水丸治五痢、以姜汁酒
煮者為末、和霞天膏治癲癇諸風眩暈瘡瘍、皆神

效、非彼但云瀉心火、而與芩柏諸苦藥例稱者比
也、

論諸藥　余治疵痾、先循經絡者、即諸古書所載引
經報使、藥貴識真爾、如心經以人參益氣、石菖[illegible]
血、朱砂鎮心、天竺黃去痰、滌瀉濕熱、而連肉茯神
赤茯苓遠志益智酸棗之屬、利心竅以安神識、中
間製煉、如以苦焦之味達本經、鹹引所畏辛達所
勝、酸益其母、而甘瀉其子、皆裁成藥性之道、

論五穀　粳米造飯、用荷葉煮湯寬中、芥菜葉者[illegible]

痰氣蔚藥者行氣鮮肌薄荷葉者氣熱淡竹葉者
辟暑造粥則粥之外入茯苓酪者清上實下葛藟
粉者理胃花椒汁者辟嵐瘴薑葱汁豉者發汗與
夫古方羊腎豬腎之類無非藥力也一人淋素不
服藥余教以專啖粟米粥絕他味旬餘減月餘痊
以五谷治病之理
[illegible]汁[illegible]風谿疫蒸露治內熱雞汁研墨止
吐[illegible]研[illegible]仁調酒破血積胡桃仁佐破故帋
杜[illegible]丸治腰濕痛如神大棗煮汁去渣煉膏救

小兒脾虛胃寒不能藥者蓮肉作末雖禁口痢精
帶加雞頭糠止轉食允此余以應驗習之家亦五
菜治疾之理
論五菜　韭白愈淋子澁精犬葱汁和五倍子末濕
虛脫之痢非虛脫不用莧煮汁愈初痢羅蔔風熱
愈傷食嗽白扁豆廣脾清暑蒜汁煮香附加𡉏
大黄治瘴鄉中毒諸菜俱能治病貴專啖耳
論五畜禽蟲之屬　黄牛肉補氣與綿黄芪同功羊
肉補血與熟地黄同功猪肉無補而人習之化也

惟膽于肝肚于胃腰子于腎脊髓于骨心于血可
引諸藥入本經實非其補療則全體大補異時每
欲以肉汁煉膏如霞天膏小刀圭之法恨不多得
牛肝連膽用朴硝作脯消痞塊骨髓煎油擦四肢
之損禽則鵝善𤺌風稚雞補損老雞作羹起衰蚕
則蟯蜋土裹燒熟與兒食治疳蚌皮作丸大治驚
癇疳痢以上予治厚養之人多用之亦從其化也
獨犬之壯陽從夫所尚古方戊戌酒蓋為虛寒病
設耳或云士無故不殺犬豕則古人已鑑於珍矣

意者黑黄二色足補脾腎亦可如小刀圭法為之
以治虛怯勞瘵而戒恣欲之非憤庸工者可擇食
之云
論異類有情丸人至中年氣脉衰弱便可以此丸服
餌此方藥僅三品而補性極峻蓋鹿乃陽獸食山
中之靈草故多壽夏至一陰生而角便解角稟純
陽之氣故補人身之陽龜者靈物也屬陰能養陰
上可補心下可補腎故補人身之陰虎西方之獸
也屬金而能抑木故虎嘯而風生也三者皆多壽

皆有生育、皆有靈性、殊非草木金石比也、賤穿

無補益乎、

鹿茸鹿角霜龜板虎脛骨各如常製為末、以猪脊髓加煉蜜為丸梧桐子大、空心塩湯呑五七十丸、或加猪膽汁三合和于劑中、以寓降火之意、

難経本義十八難圖註辯

十八難云、越人曰、手太陰陽明金也、足少陰太陽水也、水流下行而不能上、故在下部、足厥陰少陽木也、生手太陽少陰火、火炎上行而不能下、故為上部、手心主少陽火、生足太陰陽明土、土主中宮、故在中部也、滑伯仁註曰、手太陰陽明金、下生足太陽少陰水、水性下流、故居下部、足少陰太陽水、生足厥陰少陽木、木生手少陰太陽火、及手心主火、火炎上行、是為上部、火生足太陰陽明土、土居中部、復生肺金、此五行子母更相生養者也、觀于於難所列之圖、乃以手厥陰心主火與手少陽三焦火分診在下部右尺、圖與註自相背戻、後人舍然宗之、不復查考、且経文只云手之太陰陽明、足之

太陽少陰為上下部、言肺高而腎下、子母相望之意、按脉経以心肺合於上焦、脾胃肝膽合於中焦、腎膀胱合于下焦、兩尺分診兩腎、無手厥陰少陽之語、千金方診法與脉経同、頑靈蘭秘典篇曰、膻中者臣使之官、喜樂出焉、啓玄子註曰、膻中在胸中両乳間、為心君播宣教令、氣布陰陽、氣和志適、則喜樂由生、脉要精微以左寸之外候心、内以候膻中、膻中為十二職之一、以其無形與心肺並居胸中、故論附焉、本義此圖恐未必是伯仁之意、豈有自相矛盾哉、此必後人泥脉訣右腎太[illegible]命之説、而以此圖牽合、因土居中部、乃以火居下部生中土也、獨不思手太陽少陰之火、復御而生耶、智者自能辯之、

按何一陽醫學統宗有云、圖註難經乃四明張世賢襲取紀天錫袁坤厚盧廡舊筆、斷[illegible]淺附己意、欺為新撰、維揚運司梓行、[illegible]多、然則難経本義之圖註、實張世賢之集者、[illegible]人増附梓焉、非滑氏之筆明矣、

難經肺金肝木浮沉説

三十三難曰、肝青象木、肺白象金。肝得水而沉。木得水而浮。肺得水而浮、金得水而沉。其意何也。答詞以五音剛柔吸受云云、是啓後學要識五行造化之玅、而註者又以長生臨官帝旺為言、而不就肝肺上説、其説似訓釋太深玄之又玄者也。□□□氏□注所云心脾腎得水皆沉、不知又當何□□□□且不若平平講去、亦自明暢、且又開發後學、陰陽相感之義、雖不明言、而理實寓焉。蓋肺雖屬金、而位處膈上、行陽道多、且其經為手太陰主手。氣以體而言、金也。以用而言、氣也。而又屬手經故浮。肺熱則手經之氣去、而金之體獨存、故熱則沉也。肝雖屬木、而位處膈下、行陰道多、且其經為足厥陰主手血。以躰而言、木也。以用而言、血也。而又屬足。經故沉。肝熱則足經之血去、而木之體獨存、故熱則浮也。是本之義也、臨官帝旺之説、彼豈牽合、學者詳之。

難經七十五難金不得平木不字辯

生生子曰、七十五難云、經言東方實、西方虛、瀉南方補北方、何謂也。云云故瀉火補水、欲令金不得平木也。經曰、不能治其虛、何問其餘、此之謂也。滑伯仁曰、不字疑衍。四明陳氏曰、仲景云、木行乘金曰横。内經曰、氣有餘則制己所勝、而侮所不勝。木實金虛、是木横而凌金、侮所不勝也。木實本以金平之、然以其氣正強而横、金平之、則兩不相伏而戰、戰則實者亦傷、虛者亦敗、金虛本資氣于土、然其時土亦受制、未足以資之、故取水為金之子、又為木之母、於是瀉火補水、使水勝火、則火餒而取氣於木、木乃減而不復實、水為木母、此母能令子虛也。木既不實、其氣乃平、平則金免木凌、而不復虛、水為金子、此子能令母實也。所謂金不得平木、不得徑以金平其木、必瀉火補水、而旁治之、使木金之氣自然而平耳。而滑伯仁又曰、陳氏之説、亦自有理、但為不之一字纏擾、牽強費辭、不若直以不字為衍文爾。余曰、不字非衍、難經所謂不者、乃姑息之謂、不徑以金平木、故有瀉火補水之治、觀越人

謂金木水火土當更相平更字與不字乃一篇之大關鍵也此更字與二十難更相乘更相伏更字義同謂互相平制不直令金以平木也觀仲景木行乘金曰橫之橫字則知金非等閑之虛即驟補之猶未能自保況欲令其得平木乎彼金之得平木乃以五行自相平者言也此以五行更相平者言和更與所行當有別不然越人何不徑去補金使得平木而乃曰瀉南方補北方哉越人之微意正欲瀉火以泄木之餘補水以實金之虛五行遍相濟更互尅伐子為母復仇之義故曰欲令金不得平木也此圍魏救韓之意不平之平乃所以平也陳氏訓不字誠是但于更字仍欠發明故未免啟後人之疑醫道如伯仁亦可謂精詣矣乃以不字為衍文余又不知其何見也

此不字乃一篇主意瀉火補水之治法也觀者甚毋忽

難經八十一難篇是病二字辨

生生子曰八十一難云經言無實實虛虛損不足而益有餘是寸口脈耶將病自有虛實耶其損益奈何然是病非謂寸口脈也謂病自有虛實也云云彼註難經者謂是病二字非誤即衍愚謂二字非誤亦非衍蓋答辭也言此是病之虛而非寸口脈也與夫子答子路曰然有是言也一類皆答問文法爾經書中多有之窮經者能以意逆志而玩其辭斯得之矣

節抄靈樞引

生生子曰余從醫以靈素為祖但其書出秦火之後斷簡殘篇幾至散失雖命世之才如秦越人淳于意張機諸公聆治稱神奇者亦未之訓釋書義于始於素問採摭成卷門分章析訓類詳明既約亦備矣而偏執局曲之夫尚吹毛索疵妄加訶詆乃於靈樞非惟不敢註一字且置此書略不涉目夫靈樞一經於臟腑經絡盈虛順逆針法暨餘不周悉頑棄而不讀何稱醫哉何稱醫哉余觀史崧先生序靈樞有曰夫為醫者在讀書讀而不能為醫者有矣未有不讀而能為醫者也余嘗從靈斯語用節抄靈樞數條於後以備參考云

本神篇

黃帝問於岐伯曰何謂德氣生精神魂魄心意志思
智慮請問其故岐伯荅曰天之在我者德也地之
在我者氣也德流氣薄而生者也故生之來謂之
精兩精相搏謂之神隨神往來者謂之魂並精而
出入者謂之魄所以任物者謂之心心有所憶謂
之意意之所存謂之志因志而存變謂之思因思
而遠慕謂之慮因慮而處物謂之智故智者之養
生也必順四時而適寒暑和喜怒而安居處節陰

陽而調剛柔如是則僻邪不至長生久視是故怵
惕思慮者則傷神神傷則恐懼流淫而不止因悲
哀動中者竭絕而失生喜樂者神憚散而不藏愁
憂者氣閉塞而不行盛怒者迷惑而不治恐懼者
神蕩憚而不收心怵惕思慮則傷神神傷則恐懼
自失破䐃脫肉毛悴色夭死於冬脾愁憂而不解
則傷意意傷則悗亂四肢不舉毛悴色夭死於春
肝悲哀動中則傷魂魂傷則狂忘不精不精則不
正當人陰縮而攣筋兩脇骨不舉毛悴色夭死於

秋肺喜樂無極則傷魄魄傷則狂狂者意不存人
皮革焦毛悴色夭死於夏腎盛怒而不止則傷志
志傷則喜忘其前言腰脊不可以俛仰屈伸毛悴
色夭死於季夏恐懼而不解則傷精精傷則骨痠
痿厥精時自下是故五藏主藏精者也不可傷傷
則失守而陰虛陰虛則無氣無氣則死矣是故用
針者察觀病人之態以知精神魂魄之存亡得失
之意五者以傷針不可以治之也肝藏血血舍魂
肝氣虛則恐實則怒脾藏營營舍意脾氣虛則四

支不用五藏不安實則腹脹經溲不利心藏脈脈
舍神心氣虛則悲實則笑不休肺藏氣氣舍魄肺
氣虛則鼻塞不利少氣實則喘喝胸盈仰息腎藏
精精舍志腎氣虛則厥實則脹五藏不安必審五
藏之病形以知其氣之虛實謹而調之也

決氣篇

黃帝曰余聞人有精氣津液血脈余意以爲一氣耳
今乃辨爲六名余不知其所以然岐伯曰兩神相
搏合而成形常先身生是謂精何謂氣岐伯曰上

焦開發宣五穀味熏膚充身澤毛若霧露之溉是謂氣何謂津岐伯曰腠理發泄汗出溱溱是謂津何謂液岐伯曰穀入氣滿淖澤注於骨骨屬屈伸洩澤補益腦髓皮膚潤澤是謂液何謂血岐伯曰中焦受氣取汁變化而赤是謂血何謂脉岐伯曰壅遏營氣令無所避是謂脉黃帝曰六氣者有餘不足氣之多少腦髓之虛實血脉之清濁何以知之岐伯曰精脫者耳聾氣脫者目不明津脫者腠理開汗大泄液脫者骨屬屈伸不利色夭腦髓消

脛痠耳數鳴血脫者色白夭然不澤其脉空虛此其候也黃帝曰六氣者貴賤何如岐伯曰六氣者各有部主也其貴賤善惡可為常主然五穀與胃為大海也

脹論

黃帝曰夫氣之令人脹也在于血脉之中耶藏府之內乎岐伯曰二者皆存焉然非脹之舍也黃帝曰願聞脹之舍岐伯曰夫脹者皆在於藏府之外排藏府而郭胸脇脹皮膚故命曰脹黃帝曰藏府之在胸脇腹裏之內也若匣匱之藏禁器也各有次舍異名而同處一域之中其氣各異願聞其故岐伯曰夫胸腹藏府之郭也膻中者心主之宮城也胃者太倉也咽喉小腸者傳送也胃之五竅者閭里門戶也廉泉玉英者津液之道也故五藏六府者各有畔界其病各有形狀營氣循脉衛氣逆為脉脹衛氣並脉循分為膚脹三里而寫近者一下遠者三下無問虛實工在疾寫黃帝曰願聞脹形岐伯曰夫心脹者煩心短氣臥不安肺脹者虛滿而喘咳肝脹者脇下滿而痛引小腹脾脹者善噦

四肢煩悗體重不能勝衣臥不安腎脹者腹滿引背央央然腰髀痛胃脹者腹滿胃脘痛鼻聞焦臭妨於食大便難大腸脹者腸鳴而痛濯濯冬日重感于寒則飧泄不化小腸脹者少腹䐜脹引腰而痛膀胱脹者小腹滿而氣癃三焦脹者氣滿於皮膚中輕輕然而不堅膽脹者脇下痛脹口中苦善太息帝曰脹者焉生何因而有岐伯曰衛氣之在身也常然並脉循分肉行有逆順陰陽相隨乃得

天和五藏更始四時循序五穀乃化然後厥氣在下營衛留止寒氣逆上真邪相攻兩氣相搏乃合為脹也帝曰脹論無問虛實工在疾瀉近者一下遠者三下今有其三而下下者其過焉在岐伯曰衛氣相亂陰陽相逐其於脹也當瀉不瀉氣故不下三而不下必更其道氣下乃止不可復始可以萬全烏有殆者乎其於脹也必審其脈當瀉則瀉當補則補如鼓應桴惡有不下者乎

五癃津液篇

黃帝問於岐伯曰水穀入于口輸於腸胃其液別為五天寒衣薄則為溺與氣天熱衣厚則為汗悲哀氣并則為泣中熱胃緩則為唾邪氣內逆則氣為之閉塞而不行不行則為水脹余知其然也不知其何由生願聞其道岐伯曰水穀皆入于口其味有五各注其海津液各走其道故三焦出氣以溫肌肉充皮膚為其津其流而不行者為液天暑衣厚則腠理開故汗出寒留于分肉之間聚沫則為痛天寒則腠理閉氣濕不行水下留于膀胱則為溺與氣五藏六府心為之主耳為之聽目為之候肺為之相肝為之將脾為之衛腎為之主外故五藏六府之津液盡上滲於目心悲氣并則心系急心系急則肺舉肺舉則液上溢夫心系與肺不能常舉乍上乍下故欬而泣出矣中熱則胃中消穀消穀則蟲上下作腸胃充郭故胃緩胃緩則氣逆故唾出五穀之津液和合而為膏者內滲入于骨空補益腦髓而下流於陰股陰陽不和則使液溢而下流於陰髓液皆減而下下過度則虛虛故腰

背痛而脛痠陰陽氣道不通四海閉塞三焦不瀉津液不化水穀并行腸胃之中別于迴腸留于下焦不得滲膀胱則下焦脹水溢則為水脹此津液五別之逆順也

賊風篇

黃帝曰夫子言賊風邪氣之傷人也令人病焉今有其不離屏蔽不出室穴之中卒然病者非不離賊風邪氣其故何也岐伯曰此皆嘗有所傷於濕氣藏於血脈之中分肉之間久留而不去若有所墮

墜惡血在內而不去、卒然喜怒不節、飲食不適、
溫不時、腠理閉而不通、其開而遇風寒、則血氣凝
結、與故邪相襲、則為寒痺、其有熱則汗出、汗出則
受風、雖不遇賊風邪氣、必有因加而發焉、黃帝曰、
今夫子之所言者、皆病人之所自知也、其毋所遇
邪氣、又毋怵惕之志、卒然而病者、其故何也、唯
有因鬼神之事乎、岐伯曰、此亦有故邪留而未發、
因而志有所惡、及有所慕、血氣內亂、兩氣相搏、其
所從來者微、視之不見、聽而不聞、故似鬼神、黃帝

曰、其祝而已者、其故何也、岐伯曰、先巫者因知百
病之勝、先知其病之所從生者、可祝而已也、

婦人無鬚篇

黃帝曰、婦人無鬚者、無血氣乎、岐伯曰、衝脉任脉皆
起於胞中、上循背裏、為經絡之海、其浮而外者、循
腹右上行、會於咽喉、別而絡唇口、血氣盛則充膚
熱肉、血獨盛則澹滲皮膚、生毫毛、今婦人之生、有
餘於氣、不足于血、以其數脫血也、衝任之脉、不榮
口唇、故鬚不生焉、黃帝曰、士人有傷於陰、陰氣絕

而不起、陰不用、然其鬚不去、其故何也、宦者獨去、
何也、願聞其故、岐伯曰、宦者去其宗筋、傷其衝脉、
血寫不復、皮膚內結、唇口不榮、故鬚不生、黃帝曰、
其有天宦者、未嘗被傷、不脫于血、然其鬚不生、其
故何也、岐伯曰、此天之所不足也、其任衝不盛、宗
筋不成、有氣無血、唇口不榮、故鬚不生、黃帝曰、善
乎哉、聖人之通萬物也、若日月之光影、音聲鼓響、
聞其聲而知其形、其非夫子、孰能明萬物之精、是
故聖人視其顏色、黃赤者多熱氣、青白者少熱氣、

黑色者多血少氣、美眉者太陽多血、通髯極鬚者
少陽多血、美鬚者陽明多血、此其時然也、夫人之
常數、太陽常多血少氣、少陽常多氣少血、陽明常
多血多氣、厥陰常多氣少血、少陰常多血少氣、太
陰常多血少氣、此天之常數也、

憂恚無言篇

黃帝問於少師曰、人之卒然憂恚而言無音者、何道
之塞、何氣出行、使音不彰、願聞其方、少師荅曰、咽
喉者、水穀之道也、喉嚨者、氣之所以上下者也、會

厭者音声之户也口脣者音聲之扇也舌者音聲之機也懸雍垂者音聲之関也頏顙者分氣之所泄也橫骨者神氣所使主發舌者也故人之鼻洞涕出不收者頏顙不開分氣失也是故厭小而疾薄則發氣疾其開闔利其出氣易其厭大而厚則開闔難其氣出遲故重言也人卒然無音者寒氣客於厭則厭不能發發不能下至其開闔不致故無音黃帝曰刺之柰何岐伯曰足之少陰上繫於舌絡於橫骨絡于會厭兩寫其血脈濁氣乃辟會

厭之脉上絡任脉取之天突其厭乃發也

邪客篇

黃帝問於伯高曰願聞人之肢節以應天地柰何伯高荅曰天圓地方人頭圓足方以應之天有日月人有兩目地有九州人有九竅天有風雨人有喜怒天有雷電人有音聲天有四時人有四肢天有五音人有五藏天有六律人有六府天有冬夏人有寒熱天有十日人有手十指辰有十二人有足十指莖垂以應之女子不足二節以抱人形天有

陰陽人有夫妻歲有三百六十五日人有三百六十節地有高山人有肩膝地有深谷人有腋膕地有十二經水人有十二經脉地有泉脉人有衛氣地有草蓂人有毫毛天有晝夜人有卧起天有列星人有牙齒地有小山人有小節地有山石人有高骨地有林木人有募筋地有聚邑人有䐃肉歲有十二月人有十二節地有四時不生草人有無子此人與天地相應者也

大惑篇

黃帝問於岐伯曰余嘗上於清泠之臺中階而顧匍匐而前則惑余私異之竊內怪之獨瞑獨視安心定氣久而不觧獨博獨眩披髮長跪俛而視之後久之不已也卒然自上何氣使然岐伯對曰五藏六府之精氣皆上注于目而為之精精之窠為眼骨之精為瞳子筋之精為黑眼血之精為絡其窠氣之精為白眼肌肉之精為約束裹擷筋骨血氣之精而与脉并為系上屬于腦後出于項中故邪中于項因逢其身之虛其入深則隨眼系以入於

腦入於腦則腦轉腦轉則引目系急目系急則目
眩以轉矣邪其精其精所中不相比也則精散
散則視岐視岐見兩物目者五藏六府之精也營
衛魂魄之所常營也神氣之所生也故神勞則魂
魄散志意亂是故瞳子黑眼法於陰白眼赤脉法
于陽也故陰陽合傳而精明也目者心使也心者
神之舍也故神精亂而不轉卒然見非常處精神
魂魄散不相得故曰惑也黃帝曰余疑其然余每
之東苑未曾不惑去之則復余唯獨爲東苑勞神

乎何其異也岐伯曰不然也心有所喜神有所惡
卒然相惑則精氣亂視誤故惑神移乃復是故間
者爲迷甚者爲惑

十二經絡臟象見証

手太陰肺藏象（是經多氣少血）

肺之爲藏六葉兩耳四垂如盖附著於脊之第三
椎中有二十四空行列分布諸藏之氣爲五藏華
盖云

其經起於中焦下絡大腸還循胃口上膈屬肺從肺
系橫出腋下下循臑內（肩下臂上通名曰臑）行少陰心主之
前（臑內廉凡有三脉太陰居前少陰居後厥陰居中也）下肘中（臂上臑下接處曰肘）循
臂內上骨下廉（臑下掌上名曰臂臂有二骨大陰脉循臂上骨之下廉也）入
寸口（掌後高骨動脉爲關前爲寸口中動脉太淵穴也）上魚循魚際（魚際穴也）
出大指之端（少商穴也）其支者從腕後直出次指
內廉出其端
是動則病肺脹滿膨膨而喘欬缺盆中痛甚則交兩
手而瞀此爲臂厥是主肺所生病者咳嗽上氣喘
渴煩心胸滿臑臂內前廉痛掌中熱氣盛有餘則

肩背痛風寒汗出中風小便數而欠虛則肩背痛
寒少氣不足以息溺色黃變卒遺失無度

手陽明大腸經藏象（是經多血多氣）

大腸長二丈一尺廣四寸徑一寸當臍右回十六
曲盛穀一斗水七升半

其經之脉起于大指次指之端（商陽穴也）循指上廉（指上廉本節前二間穴本節後三間穴也）出合谷兩骨間（合谷穴也）上入兩
筋之中（陽溪穴也）循臂上廉入肘外廉（曲池穴也）上臑外前
廉上肩出髃骨之前廉上出於柱骨之會上下入

缺盆絡肺下膈屬大腸其支者從缺盆上頸貫頰
入下齒中還出挾口交人中左之右右之左上挾
鼻孔
是動則病齒痛頸腫是主津液所生病者目黃口乾
鼽衄喉痺肩前臑痛大指次指痛不用氣有餘則
當脉所過者熱腫虛則寒慄不復
足陽明胃經常多氣多血
胃大一尺五寸紆曲屈伸長二尺六寸徑五寸盛
穀二斗水一斗五升

其經之脉起於鼻之交頞中旁約太陽之脉下循鼻
外入上齒中還出挾口環唇下交承漿卻循頤後
下廉出大迎循頰車上耳前過客主人循髮際至
額顱其支者從大迎前下人迎循喉嚨入缺盆下
膈屬胃絡脾其直者從缺盆下乳內廉下挾臍入
氣衝中其支者起于胃口下循腹裏下至氣衝中
而合以下髀關抵伏兔下膝臏中腿下腿上接處曰膝下循
脛外廉謂脛骨之外廉也其外廉下膝下二寸三里穴也又下三寸巨虛上廉也又下三寸巨虛
下廉下巨虛也直下中解溪穴也至下足跗上衝陽穴也足面中動脉是也凡跗是
跗直下大指之間皆有動脉其大指之間足少陽脉也上入指本節後間動脉足厥陰脉也上跗上
動脉足陽明脉也針經終始篇云陽明在上厥陰在中少陽在下者是也凡言間皆謂兩指中間也
入中指內間中指內間內庭穴也本節後陷中陷谷穴也大指次指之端
穴屬也兌其支者下廉三寸而別下入中指外間其支
者別跗上入大指間出其端
是動則病洒洒然振寒善伸數欠顏黑病至則惡人
與火聞木音則惕然而驚心欲動獨閉戶牖而處
甚則欲上高而歌棄衣而走賁響腹脹是為骭厥
是主血所生病者狂瘧溫淫汗出鼽衄口喎唇胗

頸腫喉痺大腹水腫膝臏腫痛循膺乳氣街股伏
兔骭外廉足跗上皆痛中指不用氣盛則身以前
皆熱其有餘于胃則消穀善飢溺色黃不足則身
以前皆寒慄胃中寒則脹滿
足太陰脾經藏象足經多氣少血
脾廣三寸長五寸掩乎太倉附着於脊之第十一
椎
其經之脉起於大指之端隱白穴也在大指端內側循指內側白
肉際大都穴也大指內側本節後過核骨後核骨下太白穴也核骨在足大指本

節後約二寸內踝骨前約三寸如棗核橫于足內側赤白肉際者是也穿大節指為孫拐骨者非是也上內踝前廉內踝下前陷中商丘穴也上踹內循脛骨後交出厥陰之前上膝股內前廉膝輔骨下陷中陰陵泉穴也入腹屬脾絡胃上膈挾咽連舌本散舌下其支者復從胃別上膈注心中

是動則病舌本強食則嘔胃脘痛腹脹善噫得後與氣則快然如衰身體皆重是主脾所生病者舌本痛體不能動搖食不下煩心心下急痛寒瘧溏瘕泄水閉黃疸不能臥強立股膝內腫厥足大指不

用

手少陰心經藏象是經多氣少血

心形如未敷蓮花居肺下膈上附着於脊之第五

椎

其經之脈起于心中出屬心系下膈絡小腸其支者從心系上挾咽繫目系其直者復從心系卻上肺下出腋下肺脈從肺系橫出腋下心脈從肺而出于腋下包絡脈既臑下抵腋下循臑內後廉行太陰心主之後下肘內少海穴也循臂內後廉臂內後廉上腕寸半靈道穴也抵掌後兌骨之端神門穴也入掌內後廉掌內後廉小指本節後陷中少府穴也循小指之內出其端少衝穴也在小指內廉之端

是動則病嗌乾心痛渴而欲飲是為臂厥是主心所生病者目黃脇痛臑臂內後廉痛厥掌中熱

手太陽小腸經藏象是經多血多氣

小腸長三丈二尺左回疊積十六曲胃之下口小腸上口在臍上二寸水穀於是入焉復下一寸外附於臍為水分穴則小腸下口也至是而泌別清濁水液入膀胱滓穢入大腸

其經之脈起于小指之端少澤穴也循手外側小指本節前前谷穴也本節後陷中後谿穴也上腕臂下掌上節處曰腕腕前起骨中陷中腕骨穴也當腕中陷處陽谷穴也出踝中直上循臂骨下廉出肘內側兩筋之間少海穴也上循臑外後廉出肩解繞肩胛交肩上入缺盆絡心循咽下膈抵胃屬小腸其支者從缺盆循頸上頰至目銳眥卻入耳中其支者別頰上䪼抵鼻至目內眥斜絡於顴

是動則病嗌痛頷腫不可回頭肩似拔臑似折是主液所生病者耳聾目黃頰腫頸頷肩臑肘臂外後

癃痛

足太陽膀胱藏象（足經多血少氣）

膀胱者廣九寸居腎之下大腸之側小腸下口乃膀胱上口水液由是滲入焉盛溺九升九合

其經之脉起於目內眥上額交巔其支者從巔至耳上角其直者從巔入絡腦還出別下項循肩髆內挾脊抵腰中入循膂絡腎屬膀胱其支者從腰中下挾脊貫臀入膕中（膕下端上接處約文中央動脉曰膕中委中穴也）其支者從髆內左右別下貫胛挾脊內過髀樞（髀樞者云臀肉骨解）

循髀外從後廉下合膕中以下貫踹內（足肚曰踹）出外踝之後（崑崙穴也）循京骨（京骨穴也）至小指外側（小指外側本節後陷中束骨穴也本節前通谷穴也小指端至陰穴也）

是動則病衝頭痛目似脫項似拔脊痛腰似折髀不可以曲膕如結腨如裂是為踝厥是主筋所生病者痔瘧狂顛疾頭顖項痛目黃淚出鼽衄項背腰尻膕腨脚皆痛小指不用盛者人迎大再倍于寸口虛者人迎反小於寸口也

足少陰腎藏象（足經多氣少血）

腎有兩枚重一斤一兩狀如石卵附着于脊之十四椎當胃下兩旁

其經之脉起于小指之下斜走足心（湧泉穴也）出于然骨之下（然骨之大骨也在內踝前起大骨下陷中然谷穴也）循內踝之後（內踝之後跟骨上陷中動脉太谿穴也）別入跟中以上踹內出膕內廉（內踝上二寸復溜穴也）上股內後廉貫脊屬腎絡膀胱其直者從腎上貫肝膈入肺中循喉嚨挾舌本其支者從肺出絡心注胸中

是動則病飢不欲食面黑如地色欬唾則有血喝喝

而喘坐而欲起目䀮䀮如無所見心如懸病飢狀氣不足則善恐心惕惕如人將捕之是謂骨厥是主腎所生病者口熱舌乾咽腫上氣嗌乾及痛煩心心痛黃疸腸澼脊臀股內後廉痛痿厥嗜卧足下熱而痛盛者寸口大再倍于人迎虛者寸口反小于人迎也

手厥陰心包絡之經（是經多血少氣）

滑伯仁曰心包一名手心主以臟象校之在心下橫膜之上豎膜之下與橫膜相粘而黃脂漫裹者

心也其漫脂之外有細筋膜如系與心肺相連者
心包也君火以名相火以位手心主代君火行事
以用而言則曰手心主以經而言則曰心包絡一
經二名實相火也

其經之脈起于胸中出屬心包絡下膈歷絡三焦其
支者循胸出脇下腋三寸上抵腋下循臑內行太
陰少陰之間入肘中[illegible]下臂行兩筋之間(兩筋之上)[illegible]入掌中(勞宮穴有動脈也)循中指出其
端(中衝穴也)其支者別掌中循小指次指出其端

是動則病手心熱臂肘攣急腋腫甚則胸脇支滿心
中澹澹大動面赤目黃喜笑不休是主脈所生病
者煩心心痛掌中熱

手少陽三焦之經(是經多氣少血)

三焦者水穀之道路氣之所終始也上焦在心下
下膈在胃上口其治在膻中直兩乳間陷者中中
焦在胃中脘當臍上四寸不上不下其治在臍旁
下焦當膀胱上口其治在臍下一寸

其經之脈起于小指次指之端(關衝穴也)上出兩指之間(兩指之間陷中液門穴也上兩指本節後陷中中渚穴也)循手表腕(陽池穴也)出
臂外兩骨之間(兩骨之間上腕二寸支溝穴也)上貫肘(天井穴也)循臑
外上肩而交出足少陽之後入缺盆布膻中散絡
心包下膈循屬三焦其支者從膻中上出缺盆上
項繫耳後直上出耳上角以屈下頰至䪼(䪼頰骨也)其
支者從耳後入耳中出走耳前過客主人前交頰
至目銳眥

是動則病耳聾渾渾焞焞嗌腫喉痹是主氣所生病
者汗出目銳眥痛頰痛耳後肩臑肘臂外皆痛小

指次指不用

足少陽膽之經(是經多氣少血)

膽長三寸在肝之短葉間包精汁三合為清淨之
府諸府皆傳穢濁獨膽無所傳道故曰清淨膽升
減則目昏又吐傷膽倒則視物倒植

其經之脈起于目銳眥上抵頭角下耳後循頸行手
少陽之前至肩上却交出手少陽之後入缺盆其
支者從耳後入耳中出走耳前至目銳眥後其支
者別銳眥下大迎合手少陽抵于䪼下加頰車下

頭合缺盆以下胸中貫膈絡肝屬膽循脅裏出氣
街繞毛際橫入髀厭中其直者從缺盆下腋循胸
過季脅下合髀厭中（[illegible]）以下循髀陽
出膝外廉下外輔骨之前（外輔骨之前陽陵泉穴也 膝之下[illegible]）
之[illegible]（[illegible]）下出外踝之前（丘墟穴也）循
之上[illegible]入小指次指之間（小指次指本節前俠谿穴也 本節後[illegible]）
[illegible]其支者別跗上入大指之間
循大指歧骨內出其端還貫爪甲出三毛
是動則病口苦善太息心脅痛不能轉側甚則面微

塵體無膏澤足外反熱是為陽厥是主骨所生病
者頭角頷痛目銳眥痛缺盆中腫痛腋下腫馬刀
夾癭汗出振寒瘧胸脅肋髀膝外至脛絕骨外踝
前及諸節皆痛小指次指不用
足厥陰肝藏象（是經多血少氣）
肝左三葉右四葉凡七葉其治在左其藏在右附
着于脊之第九椎
其經之脈起于大指叢毛之際（大敦穴也）上循足跗上廉（足跗上大指間陷中行間穴也 大指本節後間陷中太衝穴也）去內踝一寸上
踝八寸交出太陰之後（內踝前一寸中封穴也）上膕內廉（曲泉穴也）循股陰入毛中過陰器抵小腹挾胃屬肝絡膽
上貫膈布脅肋循喉嚨之後上入頏顙連目系上
出額與督脈會於巔其支者從目系下頰裏環唇
內其支者復從肝別貫膈上注肺（經脈篇）
是動則病腰痛不可以俛仰丈夫㿗疝婦人小腹腫
甚則嗌乾面塵脫色是主肝所生病者胸滿嘔逆
飧泄狐疝遺溺癃閉
督脈

督之為言都也行背部之中行為陽脈之都綱奇
經八脈之一也
督脈者起于下極之腧並于脊裏上至風府入腦上
巔循額至鼻柱屬陽脈之海也
脊之為骨凡廿一椎通項骨三椎共二十四椎自
屏翳而起歷長強穴並脊裏而上行循腰腧陽關
命門懸樞脊中筋縮至陽陵靈臺神道身柱過風
門循陶道大椎瘂門至風府入腦循腦戶強間後
頂上巔至百會前頂顖會上星神庭循額至鼻柱

經素髎水溝兌端至齗交而終焉　云陽脉之海者以人之脉絡周流于諸陽之分譬猶水也而督脉則為之都綱故曰陽脉之海

任脉

任之為言妊也行腹部中行為婦人生養之本奇[illegible]之下以上毛際循腹裏上關元至[illegible]之海也

任與督一源而二岐督則由會陰而行背任則由

會陰而行腹夫人身之有任督猶天地之有子午也人身之任督以腹背言天地之子午以南北言可以分可以合者也分之以見陰陽之不離合之以見渾淪之無間一而二二而一者也任脉起于中極之下會陰之分也由是循曲骨上毛際至中極行腹裏上循關元石門氣海陰交神闕水分下脘建里中脘上脘巨闕鳩尾中庭膻中玉堂紫宮華蓋璇璣天突廉泉上頤循承漿環唇上至齗交分行繫兩目下之中央會承泣而終焉　云陰脉之海者亦以人之脉絡周流於諸陰之分任猶水也而任脉則為之總會焉故曰陰脉之海

附王好古類集五臟苦欲補瀉藥味

肝苦急急食甘以緩之甘草欲散急食辛以散之川芎以辛補之細辛以酸瀉之芍藥虛以生姜陳皮之類補之經曰虛則補其母水能生木腎乃肝之母腎水也苦以補腎熟地黃黃柏是也如無他證錢氏地黃丸主之實則白芍藥瀉之如無他證錢氏瀉青丸主之實則瀉其子心乃肝之子以甘草瀉心

心苦緩急食酸以收之五味子欲軟急食鹹以軟之芒硝以鹹補之澤瀉以甘瀉之人參黃芪甘草虛以炒鹽補之虛則補其母木能生火肝乃心之母肝木也以生姜補肝如無他證錢氏安神丸主之實則甘草瀉之如無他證錢氏方中重則瀉心湯輕則導赤散

脾苦濕急食苦以燥之白朮欲緩急食甘以緩之甘草以甘補之人參以苦瀉之黃連虛則以甘草大

棗之類補之、如無他證錢氏益黃散主之、心乃脾
之母以炒盐補心實則以枳實瀉之、如無他證以
瀉黃散瀉之、肺乃脾之子、以桑白皮瀉肺、
肺苦氣上逆急食苦以瀉之、訶子皮一作黃芩、欲收
急食酸以收之白芍藥、以辛瀉之桑白皮以酸補
之、以[illegible]子虛則五味子補之、如無他證錢氏阿膠
散[illegible]脾乃肺之母、以甘草補脾實則桑白皮瀉
之、如無他證以瀉白散瀉之、腎乃肺之子、以澤瀉
瀉腎

腎苦燥急食辛以潤之知母黃柏、欲堅急食苦以堅
之知母以苦補之、黃柏以鹹瀉之、澤瀉虛則熟地
黃黃蘗補之腎本無實不可瀉、錢氏止有補腎地
黃丸、無瀉腎之藥肺乃腎之母、以五味子補肺
以上五臟補瀉內經臟氣法時論中備言之欲
究其精詳、看本論、

臟腑瀉火藥

黃連瀉心火　木通瀉小腸火

黃芩瀉肺火 梔子佐之　黃芩瀉大腸火

柴胡瀉肝火 黃連佐之　柴胡瀉膽火 亦以黃連佐之

白芍藥瀉脾火　石膏瀉胃火

知母瀉腎火　黃柏瀉膀胱火

柴胡瀉三焦火 黃芩佐之

以上諸藥各瀉其火不惟止能如此更有治病
[illegible]君合為主處詳其所宜而用勿執一也

[illegible]東垣藥類法象

天有陰陽

風寒暑濕燥火　三陰三陽上奉之

温涼寒熱四氣是也温熱者天之陽也涼寒者
天之陰也此乃天之陰陽也

地有陰陽

金木水火土　生長化收藏下應之

辛甘淡酸苦鹹五味是也皆象於地辛甘淡者
地之陽也酸苦鹹地之陰也此乃地之陰陽也
味之薄者為陰中之陽味薄則通酸苦鹹平是也
味之厚者為陰中之陰味厚則泄酸苦鹹寒是也
氣之厚者為陽中之陽氣厚則發熱辛甘溫熱是也

氣之薄者爲陽中之陰氣薄則發泄辛甘淡平凉寒
是也

輕清成象 味薄茶之類 本乎天者親上

重濁成形 味厚大黃之類 本乎地者親下

氣味辛甘發散爲陽 酸苦湧泄爲陰

清陽發腠理 清之清者也

清陽實四肢 清之濁者也

濁陰歸六腑 濁之濁者也

濁陰走五臟 濁之清者也

藥性要旨

苦藥平升 微寒平亦升

甘辛藥平降 甘寒瀉火

苦寒瀉濕熱 苦甘寒瀉血熱

用藥升降浮沉補瀉法

肝膽 味辛補酸瀉 氣溫補凉瀉

心小腸 味鹹補甘瀉 氣熱補寒瀉

脾胃 味甘補苦瀉 氣溫凉寒熱補瀉各從其宜

肺大腸 味酸補辛瀉 氣凉補溫瀉

腎膀胱 味苦補鹹瀉 氣寒補熱瀉

五臟更相平也。一臟不平，所勝平之，此之謂也。故云安穀則昌，絕穀則亡。水去則榮散，穀消則衛亡，榮散衛亡，神無所居。又仲景云：水入於經，其血乃成，穀入於胃，脈道乃行。故血不可不養，衛不可不溫，血溫衛和，榮衛將行，常有天命矣。

苦泄 甘緩 酸收 鹹軟 淡滲泄 辛散

[illegible]

藥類法象

風升生 味之薄者陰中之陽味薄則通 酸苦鹹平是也

防風 味甘辛性溫　升麻 氣平味微苦　柴胡 氣平味苦辛

羌活 氣微溫味苦甘平　葳靈仙 氣溫味苦　葛根 氣平味甘

獨活 氣微溫味苦甘平　細辛 氣溫味大辛　桔梗 氣微溫味苦辛

白芷 氣溫味大辛　藁本 氣溫味大辛　鼠粘子 氣平味辛

蔓荊子 氣清味辛　川芎 氣溫味辛　天麻 氣平味苦

秦艽 氣微溫味苦辛平　荊芥 氣溫味苦辛　麻黃 氣溫味甘苦

前胡 氣微寒味苦　薄荷 氣溫味苦辛

熱浮長 氣之厚者陽中之陽氣厚則發熱辛甘溫熱是也

黑附子 氣熱味大辛　烏頭 氣熱味大辛　乾姜 氣熱味大辛
良姜 氣熱味辛一本味甘辛　乾生姜 氣溫味辛　南桂 氣熱味大辛
桂枝 氣熱味甘辛　草豆蔻 氣熱味大辛　丁香 氣溫味辛
厚朴 氣溫味辛　木香 氣熱味苦辛　益智 氣熱味大辛
白豆蔻 氣熱味大辛　川椒 氣熱味大辛　吳茱萸 氣熱味苦辛
[illegible] 氣[illegible]味[illegible]　延胡索 氣溫味辛　縮砂 氣溫味辛
[illegible] 氣[illegible]味[illegible]　神麴 氣大暖味甘

濕化成 中央 戊濕其本氣平其兼氣溫涼寒熱在人以胃應之 己土其本味[illegible]其兼味辛甘鹹苦在人以脾應之

黃芪 氣[illegible]味甘　人參 氣溫味甘　甘草 氣平味甘

當歸 氣溫味辛一作味甘　熟地黃 氣寒味苦　半夏 氣微寒味辛平
白朮 氣溫味甘　蒼朮 氣溫味甘　陳皮 氣溫味微苦辛
青皮 氣溫味辛　藿香 氣微溫味甘辛　檳榔 氣溫味辛
莪朮 氣溫味苦辛　京三稜 氣平味苦　阿膠 氣微溫味甘平
訶子 氣溫味苦　杏仁 氣溫味甘苦　大麥蘖 氣溫味鹹
桃仁 氣溫味甘苦　紫草 氣寒味苦　蘇木 氣平味甘鹹一作味酸

燥降收 氣之薄者陽中之陰氣薄則發泄辛甘淡平寒涼是也

茯苓 氣平味甘　澤瀉 氣平味甘　猪苓 氣寒味甘淡
滑石 氣寒味甘　瞿麥 氣寒味苦辛　車前子 氣寒味甘

燈心草 氣平味甘　五味子 氣溫味酸　桑白皮 氣寒味苦酸
天門冬 氣寒味微苦　白芍藥 氣微寒味酸　麥門冬 氣寒味微苦
犀角 氣寒味苦酸　烏梅 氣平味酸　牡丹皮 氣寒味苦
地骨皮 氣寒味苦　枳殼 氣寒味苦　琥珀 氣平味甘
連翹 氣平味苦　枳實 氣寒味苦酸　木通 氣平味甘

寒沉藏 味之厚者陰中之陰味厚則泄酸苦鹹[illegible]寒是也

大黃 氣寒味苦　黃柏 氣寒味苦　黃芩 氣寒味苦
黃連 氣寒味苦　草龍膽 氣寒味大苦　石膏 氣寒味辛
生地黃 氣寒味苦　知母 氣寒味大辛　防己 氣寒味大苦

茵陳 氣微寒味苦　朴硝 氣寒味苦辛　瓜蔞根 氣寒味苦
牡蠣 氣微寒味鹹　玄參 氣微寒味苦　山梔子 氣寒味微苦
川楝子 氣寒味苦　香豉 氣寒味苦　地榆 氣微寒味苦酸

標本陰陽論

天陽無圓氣上外升生浮晝動輕燥六腑
地陰有方血下內降殺沉夜靜重濕五臟

夫治病者當知標本以身論之則外為標內為本陽為標陰為本故六腑屬陽為標五臟屬陰為本此臟腑之標本也又臟腑在內為本各臟腑之經絡

在外為標此臟腑經絡之標本也更人身之臟腑陰陽氣血經絡各有標本也以病論之先受病為本後傳流病為標凡治病者必先治其本後治其標若先治其標後治其本邪氣滋甚其病益畜若先治其本後治其標雖病有十數證皆去矣謂如先生輕病後滋生重病亦先治輕病後治重病如是則邪氣乃伏蓋先治本故也若有中滿無問標本先治中滿謂其急也若中滿後有大小便不利無問標本先利大小便次治中滿謂尤急也除大小便不利及中滿三者之外皆治

其本不可不慎也從前來者為實邪從後來者為虛邪此子能令母實母能令子虛是也治法云虛則補其母實則瀉其子假令肝受心火之邪是從前來者為實邪當瀉其子火也然非直瀉其火十二經中各有金木水火土當木之分瀉其火也故標本論云本而標之先治其本後治其標既肝受火邪先於肝經五穴中瀉滎心行間穴是也後治其標者於心經五穴內瀉滎火少府穴是也以藥論之入肝經藥為之引用瀉心火藥為君是治實

邪之病也假令肝受腎邪是從後來者為虛邪當則當補其母故標本論云標而本之先治其標後治其本既受水邪當先於腎經湧泉穴中補木是先治其標後於肝經曲泉穴中瀉水是後治其本此先治其標者推其至理亦是先治本也以藥論之入腎經藥為引用補肝經藥為君是也

五方之正氣味 制方用藥附

東方甲風乙木其氣溫其味甘在人以肝膽應之

南方丙熱丁火其氣熱其味辛在人以心小腸三焦

包絡應之

中央戊濕其本氣平其兼氣溫涼寒熱在人以胃應之

中央己土其本味鹹其兼味辛甘酸苦在人以脾應之

西方庚燥辛金其氣涼其味酸在人以肺大腸應之

北方壬寒癸水其氣寒其味苦在人以腎膀胱應之

人乃萬物中之一也獨陽不生獨陰不長須稟兩儀之氣而生化也聖人垂世立教不能渾說必當分

析以至理而言則陰陽相附不相離其實一也呼則隨陽出吸則隨陰入天以陽生陰長地以陽殺陰藏此上說止明補瀉用藥君之一也故曰主病者為君用藥之機會要明輕清成象重濁成形本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也清中清者清肺以助其天真清中濁者榮華腠理濁中清者榮養於神濁中濁者堅強骨髓故至真要大論云五味陰陽之用辛甘發散為陽酸苦湧泄為陰淡味滲泄為陽鹹味湧泄為陰六者或收或散或緩或急或燥或潤或軟或堅各以所利而行之調其氣使之平也

隨證治病藥品

如頭痛須用川芎如不愈各加引經藥（太陽川芎　陽明白芷　少陽柴胡　太陰蒼朮　少陰細辛　厥陰吳茱萸）

如頂巔痛須用藁本去川芎

如肢節痛須用羌活去風濕亦宜用之

如腹痛須用芍藥惡寒而痛加桂惡熱而痛加黃柏

如心下痞須用枳實黃連

如肌熱及去痰者須用黃芩肌熱亦用黃芪

如腹脹用姜制厚朴（一本有芍藥）

如虛熱須用黃芪止虛汗亦用

如脅下痛往來潮熱日晡潮熱須用柴胡

如脾胃受濕困無力怠惰好臥去濕用白朮

如破滯氣用枳殼高者用之夫枳殼者損胸中至高之氣二三服而已

如破滯血用桃仁蘇木

如補血不足須用甘草

如去痰須用半夏熱痰加黃芩風痰加南星胸中寒痰痞塞用陳皮白朮多用則瀉脾胃

如腹中窄狹須用蒼朮

如調氣須用木香

如補氣須用人參

如和血須用當歸凡血受病者皆當用也

如去下焦濕腫及痛并膀胱有火邪者必須酒洗防己草龍膽黃　知母

如去上焦濕及熱須用黄芩瀉肺火故也
如去中焦濕與痛熱用黄連𭛠瀉心火故也
如去滯氣用青皮勿多服多則瀉人真氣
如渴者用乾葛茯苓禁半夏
如嗽用五味子
如喘者用阿膠
如宿食不消須用黄連枳實
如胸中煩熱須用梔子仁
如水瀉用白术茯苓芍藥
如氣刺痛用枳殼看何部分以引經藥導使之行
則可

如血刺痛用當歸詳上下用根梢
如瘡痛不可忍者用寒苦藥如黄栢黄芩詳上下
用根梢及引經藥則可
如眼痛不可忍者用黄連當歸根以酒浸煎
如小便黄者用黄栢數者澁者或加澤瀉
如腹中實熱用大黄芒硝
如小腹痛用青皮

如莖中痛用生甘草梢
如驚悸恍惚用茯神
如飲水多致傷脾用白术茯苓猪苓
如胃脘痛用草荳蔻
凡用純寒純熱藥必用甘草以緩其力也寒熱
相雜亦用甘草調和其性也中滿者禁用經云
中滿勿食甘

用藥凡例

凡解利傷風以防風為君甘草白术為佐經云辛甘
發散為陽風宜防風味辛及治風通用故防風為
君甘草白术為佐
凡解利傷寒以甘草為君防風白术為佐是寒宜甘
緩也或有別證於前隨證治病藥內選用分兩以
君臣論
凡眼暴發赤腫以防風黄芩為君以瀉火以黄連當
歸根和血為佐兼以各經藥用之
凡眼久病昏暗以熟地黄當歸根為君以羌活防風
為臣甘草甘菊之類為佐

凡痢疾腹痛以白芍藥甘草為君當歸白术為佐見
血先後以三焦熱論
凡水瀉以茯苓白术為君芍藥甘草為佐
凡[illegible]風以防風為君隨治病為佐
凡[illegible]以五味子為君有痰者以半夏為佐喘者以阿
[illegible]有熱無熱以黄芩為佐但分兩多寡不同
凡小便不利黄栢知母為君茯苓澤瀉為佐
凡下焦有濕草龍膽防已為君甘草黄栢為佐

凡痔漏以蒼术防風為君甘草芍藥為佐詳别證加
減
凡諸瘡以黄連當歸為君甘草黄芩為佐
凡瘧以柴胡為君隨所發時所屬經分用引經藥佐之
已上皆用藥之大要更詳別證於前隨證治療
藥内逐旋加減用之

東垣報使

太陽 羌活 下黄栢
陽明 白芷升麻 下石膏
少陽 柴胡 青皮
太陰 白芍藥
少陰 知母
厥陰 青皮 柴胡

小腸膀胱屬太陽 藁本羌活是本方
三焦膽與肝包絡 少陽厥陰柴胡強
陽明大腸兼足胃 葛根白芷升麻當
太陰肺脉中焦起 白芷升麻葱白鄉
脾經少與肺經異 升麻芍藥白者詳
少陰心經獨活主 腎經獨活加桂良
通經用此藥為王 更有何病到膏肓

十二經向導

手太陰肺
南星 款冬花 升麻 桔梗 山藥
檀香 五味子 粳米 白茯苓 阿膠
天門冬 麥門冬 桑白皮 葱白 杏仁
麻黄 益智 丁香 白豆蔻 知母
砂仁（檀香豆蔻為使） 梔子 黄芩 石膏

足太陰脾

草豆蔻　茱萸　砂仁人參是智為使　防風　[illegible]

益智　黃芪　蒼朮　白朮　膠飴

滑石　茯苓　麻子　甘草　半夏

通入足太陰[illegible]

[illegible]　木瓜　白芍藥　藿香

[illegible]仁

手陽明大腸

升麻　白芷　麻子　秦艽　薤白

白石脂　砂仁白石脂爲使　肉豆蔻　石膏

足陽明胃

丁香　草豆蔻　砂仁　防風　石膏

知母　白朮　神麯　葛根　烏藥

半夏　蒼朮　升麻　白芷　葱白

通入手足陽明

麻黃酒　大黃酒　連翹　升麻　白朮

葛根　石膏　檀香以佐他藥　白芷

手少陽三焦

川芎　大黃酒　柴胡　青皮　白朮

熟地　黃芪　地骨皮　石膏　細辛

附子

足少陽膽

半夏　草龍膽　柴胡

通入手足少陽

[illegible]　川芎　柴胡　連翹

手厥陰心包絡

沙參　白朮　柴胡　熟地　牡丹皮

敗醬

足厥陰肝

草龍膽　蔓荊子　阿膠　瞿麥　桃仁

山茱萸　代赭石　紫石英　當歸　甘草

青皮　羌活　吳茱萸　白朮

通入手足厥陰

青皮　熟地　柴胡　川芎　皂角

苦參　桃仁

手太陽小腸

白朮 生地黄 羌活 赤茯苓 赤石脂

砂仁赤石脂爲使

足太陽膀胱

蔓荊子 滑石 茵陳 白茯苓 猪苓

[illegible] 桂枝 黄柏 羌活 麻黄

[illegible]

[illegible] 羌活 藁本 蔓荊子 茴香

[illegible] 白朮 澤瀉 防己 大黄酒

手少陰心

麻黄 桂心 當歸 生地 黄連

代赭石 紫石英 梔子 獨活 赤茯苓

足少陰腎

知母 黄柏 地骨皮 阿膠 猪膚

牡丹皮 玄參 敗醬 牡蠣 烏藥

山茱萸 天門冬 猪苓 澤瀉 白茯苓

沉香 甘草 五味子 吳茱萸 益智

丁香 獨活 桔梗 砂仁黄柏茯苓爲使

通入手足少陰

細辛 熟地 五味子 澤瀉 地榆

附子 知母 白朮

攻逐血積癥瘕類

[illegible] 三稜 蓬朮 川芎 歸尾

[illegible] 大黄 紅花 蘇木 黑丑

[illegible] 針香 [illegible] 神曲 白芷

[illegible] 桃仁 [illegible] 水蛭 乾漆

木香 通草 牛膝 山查 大黄

丹參 射干 麥芽 水銀 硇砂

鱉甲

肉積類

硇砂 阿魏 山查

甚者 巴荳

酒積類

葛根 葛花 神曲 麥芽 黄連

青蒿 巴荳

甚者 甘遂 牽牛

魚積類

橄欖　芦根　草果　紅曲

甚者　巴荳　芫花

血積類

歸尾　桃仁　紅花　蘇木　牛膝

乾漆　[illegible]　大黃

甚者　虻蟲　水蛭

氣積類

木香　[illegible]　沉香　檀香　烏藥

枳殼　青皮　枳實

甚者　黑丑

水積類

黑丑　澤瀉　猪苓　郁李仁　海藻

昆布

甚者　芫花　大戟　甘遂　商陸

涎積類

雄黃　膩粉　枯礬

甚者　礞石　巴荳　瓜蒂　甘遂

輕粉

痰積類

半夏　南星　竹瀝　礞石　枳實

海石　蝸梢　皂莢

甚者　瓜蒂　藜芦　巴荳

食積類

砂仁　香附　麥芽　青皮　枳實

神曲　[illegible]　紅曲　草果

甚者　巴荳

蟲積類

薏苡根　吳茱萸根　酸石榴根　使君子

雷丸　蕪荑　乾漆　檳榔

甚者　苦楝根皮　錫灰　輕粉　鶴虱

諸瓜菓積　平胃散加健脾消導倍加肉桂加

麝香丸妙

荳腐積

蘿蔔子

荳粉積

杏仁

諸骨鯁在喉中

狸頭骨　鸕鷀骨　野苧根　紫玉簪花根

威灵仙　蓬砂

安胎類

桑上寄生　川續斷　杜仲　白朮　條芩

葱白　阿膠　鯉魚　地黄　艾葉　砂仁

人参　黄芩　銀　烏骨雌鷄　家苧根皮

墮胎類

雄黄　雌黄　水銀　粉錫　朴硝　大戟

巴豆　牛黄　藜芦　丹皮　牛膝　桂心

皂莢　蔄茹　槐子　薏苡　瞿麦　大附子

天雄　烏頭　蜈蚣　斑猫　芫青　水蛭

虻虫　蝟皮　蛇皮　蟹爪　半夏　黑丑

麝香　桃仁　芫花　代赭石　羊躑躅

難産

槐子　桂心　滑石　貝母　皂莢　蛇退

頭垢　麻油　牛膝　龟板　兎腦　柞木

丹参　海馬　益母草　猪脂酒　冬葵子

急性子

通乳汁類

石鍾乳　土瓜根　狗四足　猪四足　王不留行

通草　猪蹄　木通　葵子　芝麻

内外吹

蒲公英　金銀花　鹿角　貝母　栝蔞

青皮　白芷　芭蕉根

蛇虫百毒

雄黄　巴豆　射香　丹砂　乾姜　甘草

白芷

蜈蚣毒

桑皮汁及煮桑根汁　澄清

蜘蛛毒

藍青汁　麝香

蜂蠆毒

蜂房　藍青汁　薄荷汁

狗毒

杏仁　礬石　韮根　人尿汁　虎骨

風狗毒

斑猫

十八反

甘草反諸藥類

大戟　芫花　甘遂　海藻

烏頭反諸藥類

半夏　瓜蔞　貝母　白歛　白芨

藜芦反諸藥類

人參　玄參　丹參　沙參　苦參　細辛

芍藥

醫旨緒餘下卷終

廣筆記十三卷

（明）繆希雍撰 丁元薦輯 莊綬光增輯

炮灸大法一卷用藥凡例一卷

（明）繆希雍撰

明天啟二年莊綬光刻本

先醒齋廣筆記四卷、戶部尚書王際華家藏本

明繆希雍撰。希雍字仲醇、常熟人。明史方技傳附見李時珍傳中。天啟中、王紹徽作點將錄、以東林諸人分配水滸傳一百八人姓名、稱希雍為神醫安道全。以精於醫理故也。是編初名先醒齋筆記、乃長興丁元薦取希雍所用之方裒為一編。希雍又增益羣方、兼採本草常用之藥、增至四百餘品。又增入傷寒溫病時疫治法。故曰廣筆記。希雍與張介賓同時、介賓守法度、而希雍頗能變化。介賓尚溫補、而希雍頗用寒涼。亦若易水河間各為門徑。然實各有所得力。朱國禎湧幢小品記天啟辛酉國禎患膈病、上下如分兩截、中痛甚不能支。希雍至、用蘇子五錢即止。是亦足見其技之工矣。

筆記方序

予既不事王侯獨全微尚繼棲自遂遠於塵累以保天年然無功及物亦豈遂人之懷乎於是蒐輯醫方

精求藥道用存利濟隨所試効摘家藏之好事者抄録轉相授受復多獲驗先是長興丁客部長孺手集予方一冊命之曰先醒齋筆記梓行於世板留嚴邑未便流通交游中多索此書者卒無以應予適旅泊金沙文學莊君歛之時時過從請增益群方更采本

草常用之藥增至四百餘品詳其脩事文增入傷寒溫病時疫治法要旨採屬其季君嶔之鏤板流行傳之遠邇應窮鄉僻邑舟次

旅邸偶乏明醫俾病者按方施治以療疾是則是書或有補於世也夫欽之曰善時

天啓二年歲次壬戌仲冬既望東吳繆希雍自序

先醒齋筆記敘

先大夫雅好醫錄方技成帙予小子識之茲多無緒也歲丁卯交繆仲淳氏仲淳豪爽自負岐黄之訣稀東垣仲景以上尤注精本草回三墳書不傳之者以爾遊轍不持藥囊為人手疏方輒奇中其所矜視及刀匕湯液與俗醫左俗醫不能解輒謗遇險怪症數年不起或皇遽計無復之必拱手請質繆先

生仲淳註之生死人攘臂自快不
索謝上自明公卿下至皁隸乞
兒莫不平等視猶索方者日是相知
錄其方遂翻傳試靡不奇驗仲淳
一切無所睠回顧用之何如爾仲

淳意所獨到堅執不移至從堅相
傾卻走意氣閒定自若其察脈審
症四顧踟躕又甚細甚密甚小心
生平好游緇流羽客樵叟村豎相
與乘昵睎披肝膽以故篋羅秘方

甚富搖椎仲淳能衷之曰吾以脈
與症試方不以方嘗病也乎辛亥
賜告歸不敢以山中餘日漫付高枕
彙三十餘年所積方取奇中者裁
之仲淳爲錄次先後彙類而梓之

以廣其傳竊自附古人手錄方書
之意云仲淳諱希雍海虞故家子
多僑寓所至稱寓公

癸丑春日曲肱道人丁元薦題

廣筆記目錄

中風
寒
暑
瘧
痢
脾胃
泄瀉
虛弱
吐血
消渴
婦人
幼科痘瘄附
腫毒
腦漏
雜症
炮炙大法
用藥凡例

廣筆記

故鄣丁元薦長孺甫集校
延陵莊斂光殺之甫增次

中風

治法大畧

凡言中風有真假內外之別差之毫釐謬以千里何者西北土地高寒風氣剛猛真氣空虛之人猝爲所中中臟者死中腑者成廢人中經絡者可調理而瘳治之之道先以解散風邪爲急次則補養氣血此真中外來風邪之候也其藥以小續命湯桂枝麻黃生熟附子羌獨活防風白芷南星甘草之屬爲本若大江已南之東西兩浙七閩百粵兩川滇南鬼方荆揚梁三州之域天地之風氣既殊人之所稟亦異其地絶無剛猛之風而多濕熱之氣質多柔脆往往多熱多痰真陰既虧內熱彌甚煎熬津液凝結爲痰壅塞氣道不得通利熱極生風亦致猝然僵仆類中風證或不省人事或言語謇澀或口眼歪斜或半身不遂其將發也外必先顯內熱之候或口乾舌苦或大便閉澀小便短赤此其驗也劉河間所謂此證全是將息失宜水不制火丹溪所謂濕熱相火中痰中氣是

也此卽內虛暗風確係陰陽兩虛而陰虛者爲多與
外來風邪迥別法當清熱順氣開痰以救其標次當
治本陰虛則益血陽虛則補氣氣血兩虛則氣血兼
補久以持之設若誤用治真中風藥如前種種風燥
之劑則輕變爲重重則必死禍福反掌不可不察也
初清熱則天門冬麥門冬甘菊花白芍藥白茯苓括
蔞根童便順氣則紫蘇子枇杷葉橘紅鬱金開痰則
貝母白芥子竹瀝荊瀝括蔞仁次治本益陰則天門
冬甘菊花懷生地當歸身白芍藥枸杞子麥門冬五
味子牛膝人乳白膠黃栢白蒺藜之屬補陽則人參
黃耆鹿茸大棗

乙卯春正月三日予忽患口角歪邪右目及右耳根
俱痛右頰浮腫仲淳曰此內熱生風及痰也治痰先
清火清火先養陰最忌燥劑
真蘇子三錢廣橘紅二錢括蔞根三錢貝母四錢天門冬三錢麥
門冬五錢白芍藥四錢甘草七分鮮沙參三錢明天麻一錢甘菊
花三錢連翹二錢河水二鍾半煎一鍾加竹瀝一杯霞天
膏童便饑時服日二劑初四至初九日加懷生地黃
二錢初十加牛膝四錢黃栢二錢十三日去連翹加石斛三錢
五分五味子七分白稨荳二錢乾葛八分十八日去連翹天麻

乾葛白稨荳加蓮肉四十粒
正月廿二日定方　初日進二劑後每日一劑
天門冬三錢麥門冬五錢生地黃五錢白芍藥四錢牛膝酒蒸五錢
炙甘草一錢貝母二錢括蔞根二錢蓮肉四十粒酸棗仁六錢真
蘇子二錢黃栢一錢五分甘菊花二錢鮮沙參三錢廣橘紅二錢
五味子八分河水三鍾煎一鍾饑時服
二月十二日定方
天門冬三錢麥門冬五錢蘇子二錢五分廣橘紅二錢五分白茯
苓三錢貝母二錢黃栢一錢五分括蔞根二錢五味子七分鮮沙參
三錢玄參二錢甘菊花二錢五分甘草七分酸棗仁五錢生地黃

四錢白芍藥四錢牛膝五錢蓮肉六十粒十日後去括蔞根三
月廿八日去玄參加石斛二錢至五月盡病始全愈前方
中間加參一錢服一劑反覺浮火上升卽去之
丸方
胡麻仁三斤卽黑芝麻桑葉酒拌蒸曬三斤何首烏三斤人乳拌九蒸九曬
蒼朮二斤米泔浸去皮拌黑豆蒸又拌蜜蒸又拌人乳蒸凡三次蒸時須烘曬極乾
牛膝二斤去蘆甘菊花二斤懷生地二斤天門冬去心蒸二斤
柏子仁二斤黃檗一斤枸杞子二斤
又丸方　先時合成病中仲淳以爲可服日進兩許百日後方另煎丸
人參去蘆人乳浸飯上蒸切片烘乾十兩五味子蒸烘乾十兩去枯者打碎山茱

茰肉(八兩) 沙苑蒺藜(一斤半，打糊和藥十二兩) 川巴戟天(去骨)
(以甘菊花枸杞子同酒浸蒸晒乾八兩) 蓮鬚(金黄色者良六兩) 枸杞子(去梗者及蒂)
(乳潤過烘乾十二兩) 川牛膝(去蘆酒蒸十兩) 天門冬(六兩) 蓮肉(去心每粒分作五六)
(瓶罨器內炒焦黄色錢十二兩) 白茯苓(如法人乳拌晒八兩) 黄栢(蜜炙四兩) 砂仁(二兩炒)
(兩) 懷生地(十一兩) 鹿角霜(酥拌炒研如飛麪十二兩) 鹿茸(六兩火炙去毛切片)
(酥炙) 菟絲子末(八兩) 加甘菊花(六兩) 煉蜜同蒺藜糊和丸如
梧子大每六錢空心饑時各一服淡鹽湯吞

一治右半身不遂(右屬氣虛)

白蒺藜(炒去刺) 甘菊花 何首烏(如法) 黄耆(蜜炙) 天門冬(去心)
麥門冬(去心) 人參(去蘆) 漆葉(酒拌九蒸九晒各一兩) 白茯苓(去皮) 白芍

藥(酒拌) 牛膝(去蘆酒蒸各十二兩) 川續斷(十兩) 橘紅(八兩) 煉蜜丸梧子
大空心白湯下忌食白萊菔牛肉牛乳○若在左者
屬血虛宜加當歸身熟地黄鹿角膠栢子仁(各兩許) 杜
仲(八兩酥炙)○如火盛多痰肺經有熱者去人參加青蒿
子 鱉甲(各十二兩) 如左右臂俱轉掉不便者亦用此方

王宇泰治臧位宇氣虛痰多脾胃有濕晚年半身不
遂神效

人參(一斤) 半夏麯(二斤薑汁竹瀝製) 白朮(一斤半) 牛膝(一斤) 天門冬(一斤)
懷生地(一斤) 用長流水煎成膏再入鹿角膠(一斤) 虎骨膠
(一斤) 霞天膠(一斤) 河間府梨膏(一斤) 煉蜜(二斤) 各製膏和勻重
湯燉一日夜出火氣每空心臨卧取半酒杯以竹瀝
梨汁各二杯人乳桑瀝各一杯和勻重湯頓熱調服

廣筆記

寒

傷寒時地議并六經治法

夫傷寒者大病也時者聖人所不能違者也以關乎死生之大病而藥不從時顧不殆哉仲景醫門之聖也其立法造論後之明師如華佗孫思邈輩莫不宗之漢末去古未遠風氣猶厚形多壯偉氣尚敦厖其藥大都爲感邪即病而設况南北地殊厚薄不侔故其意可師也其法不可改也循至今時千有餘年風氣澆矣人物脆矣况在荆揚交廣梁益之地與北土全別故其藥則有時而可改非違仲景也實師其意變而通之以從時也如是則法不終窮矣故作斯議條列其方稍爲損益以從時地俾後之醫師知所適從庶幾患斯疾者可免於夭枉爾

辨驗外感眞僞法

凡外感必頭疼其疼也不間晝夜探其舌本必從喉嚨內乾出於外多兼煩躁不煩躁者即輕證也不頭疼而發熱不發熱而頭疼頭雖疼而有時暫止口雖乾而舌本不燥骨雖疼而頭不疼雖渴而不欲引飲至夜或偶得寐遇食不好亦不惡居處雖若尫怯而神氣安靜凡若此者皆非傷寒也

三陽治法總要

太陽病 其證發熱惡寒惡風頭痛項强腰脊强遍身骨痛脉雖浮洪而不數多不傳經煩躁脉數急者是欲傳經宜先發汗以解表邪 其藥以羌活湯爲主羌活三錢前胡二錢甘草八分葛根二錢生姜三片棗二枚杏仁九粒去皮尖研爛 水煎服秋深冬月應用此方亦可量加紫蘇葱白如冬月天氣嚴寒感邪即病服此藥不得汗本方加麻黄一錢生薑四片共前七片得汗勿再服 如病人自覺煩躁喜就清凉不喜就熱兼口渴是即欲傳入陽明也若外證頭疼遍身骨疼不解或帶口渴鼻乾目疼不得卧即係太陽陽明證羌活湯中加石膏知母麥冬大劑與之得汗即解 如自汗煩躁頭疼遍身骨疼不解者羌活一錢桂枝七分石膏一兩二錢麥冬六錢知母三錢竹葉一百二十片白芍藥二錢甘草八分 如冬月即病太陽證惡寒畏風頭疼遍身骨疼自汗不渴宜用桂枝八分芍藥二錢甘草一錢大棗二枚生姜一片

太陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下者愈其外證不解者不可下當先解表表證罷少腹急結者

乃可下之桃仁承氣湯無蓄血證大承氣湯
正陽陽明病東陽明者手陽明大腸正陽陽明者胃家實是也　其證不大
便自汗潮熱口渴咽乾鼻乾嘔或乾嘔目眴眴不得
眠畏人聲畏木聲畏火不惡寒反惡熱或先惡寒不
久熱發熱甚則譫語狂亂循衣摸床脉洪大而長宜
急解其表用竹葉石膏湯大劑與之不嘔無汗與葛
根湯亦須大劑若表證已罷脉緩小便利是病解矣
若表證罷後邪結於裏大便閉小便短赤宜用調
胃承氣湯或小承氣湯下之下後按其腹中不作痛
而和病即已解如作痛是燥糞未盡也再用前藥下

之以腹中和二便通利爲度　陽明病不能食若其
人本虛勿輕議下　陽明病頭眩欬而咽痛者用葛
根甘草桔梗麥冬四味濃煎數數與之　陽明病無
汗小便不利心中懊憹者當發黃急用梔子麥冬淡
豆豉大劑濃煎與之如已見身黃急加茵陳爲君主
之　陽明病衂血此緣失於發汗宜用荊芥二錢葛
根二錢麥冬五錢牡丹皮一錢五分蒲黃二錢茅根
二兩側栢葉二錢生地黃三錢濃煎與之兼飲童便
陽明病心下硬滿者此邪未入於腹中愼勿下之
用竹葉石膏湯加栝蔞一個擣碎桔梗二錢黃連一

錢　陽明病邪結於裏汗出身重短氣腹滿而喘潮
熱手足濈然汗出者此大便已鞕也六七日已來宜
下之用小承氣湯不行換大承氣湯勿大其劑若大
便不鞕者愼勿輕下　陽明病發汗不解腹滿急者
亟下之　傷寒六七日目中不了了睛不和無表證
大便難宜承氣湯下之　陽明病下之早外有熱手
足溫不結胸心中懊憹不能食但頭汗出梔子豉湯
主之　陽明病發潮熱大便溏胸滿不去者與小柴
胡湯去人參加栝蔞黃連　陽明病自汗出或發汗
後小便利津液內竭大便雖硬不可攻之須俟其自

大便用蜜導或膽導法通之　大下後六七日不大
便煩不解腹滿痛本有宿食宜再用承氣湯下之
食穀欲嘔屬陽明非少陽也胸中煩熱者竹茹湯主
之竹茹三錢麥冬五錢枇杷葉三大片蘆根三兩內
無熱證者小便利口不渴此爲陽明虛也吳茱萸湯
主之吳茱萸二錢人參三錢生薑一錢五分大棗三
枚水煎日三服　凡陽明病多汗津液外出胃中燥
大便必鞕鞕則譫語以小承氣湯下之若一服譫語
止者勿再服　陽明譫語發潮熱脉滑而數者小承
氣湯主之服藥後腹中轉氣者更與一服若不轉氣

者勿更與之若服藥後次日不大便脉反微濇者裹
虛也爲難治勿復議下　陽明病下血譫語者此爲
熱入血室汗止在頭用荆芥三錢葛根三錢黄芩一
錢五分麥冬五錢牡丹一錢五錢生蒲黄二錢濃煎
以童便對飲之　陽明病脉浮緊咽燥口苦腹滿而
喘發熱汗出惡熱身重若下之則胃中空虛客氣動
膈心中懊憹舌上有胎者梔子豉湯主之　若渴欲
飲水舌燥者白虎湯加人參主之　若脉浮發熱口
渴小便不利者猪苓湯主之　陽明病協熱下利者
宜六一散心下痞者以黄連括蔞湯調服之　脉浮

遲表熱裏寒下利清穀者四逆湯主之附子乾姜甘
草　趺陽脉浮而濇小便數大便鞕其脾爲約麻子
仁丸主之麻仁十三兩芍藥四兩枳實四兩大黄八
兩厚朴三兩杏仁六兩蜜丸如梧子大每用十丸日
三服　陽明實則譫語虛則鄭聲鄭聲者重語也直
視譫語喘滿者死下利者亦死　發汗多若重發其
汗譫語脉短者死脉和者不死　若吐若下後不解
不大便五六日或至十餘日日晡時發潮熱不惡寒
獨語如見鬼狀若劇者發則不識人循衣妄撮惕而
不安微喘直視脉弦者生濇者死（此是陽證見陰脉也）微者但

發熱譫語者大承氣湯下之利勿再服　陽明病發
狂棄衣而走登高而歌此陽明實也以承氣湯亟下
之如便不結者大劑白虎湯灌之石膏四兩麥冬二
兩知母一兩五錢加大青一兩甘草七錢太陽陽明
病協熱下利者宜六一散以黄連煎湯調服之　太
陽陽明并病六七日表證仍在其人發狂者以熱在
下焦少腹當硬滿小便自利下其血乃愈當用桃仁
承氣湯　又二陽并病太陽證罷潮熱汗出大便難
譫語者（[illegible]）宜大承氣湯
少陽病　其證口苦咽乾眩往來寒熱胸脇痛胸滿

或痛耳聾脉法弦細頭痛發熱者屬少陽少陽不可
發汗發汗則譫語胃和者當自愈不和者則煩而悸
傷寒三日少陽脉小者欲已也　凡太陽病不解
傳入少陽者脇下硬滿乾嘔不能食往來寒熱未經
吐下脉沉緊者與小柴胡湯柴胡二錢四分人參九
分黄芩九分甘草九分半夏一錢五分生姜九分大
棗二枚水煎温服日三　加減法　若胸中煩而不
嘔去半夏人參加括蔞根一枚　若脇下痞鞕去大
棗加牡礪二錢半　若渴者去半夏加人參括蔞根
若腹中痛者去黄芩加芍藥三錢　若心下悸小

便不利者去黃芩加茯苓二錢　若不渴外有微熱者去人參加桂一錢用覆勿溫覆取微汗愈　若欬者去人參大棗加五味子一錢少佐以乾姜　陽明少陽并病必下利脉滑而數有宿食也當承氣湯下之　若已吐下發汗溫針譫語柴胡湯證罷此爲壞病知犯何逆以法治之　三陽合病脉大上關上但欲睡眠目合則汗藥用百合一兩麥門冬五錢炙甘草一錢知母二錢竹葉五十片栝蔞根二錢鱉甲如法三錢白芍藥二錢　三陽合病腹滿身重譫語遺尿白虎湯加百合主之　傷寒六七日無大熱其人煩躁者此爲陽去入陰故也　傷寒三日三陽爲盡三陰當受邪其人反能食而不嘔此爲三陰不受邪也

三陰治法總要

三陰病其證有二一者病發於三陽不時解表以致邪熱傳入於裏雖云陰分病屬於熱糞結宜下腹滿不可按宜下有燥糞協熱下利宜下腹痛下利宜芍藥黃芩炙甘草以和之如便膿血即加滑石黃連佐以升麻乾葛　如邪雖入裏糞猶未結宜清其熱渴者用白虎湯竹葉石膏湯不渴或心下痞者宜黃連黃芩芍藥枳殼麥冬栝蔞輩以清之　或邪未結於下焦少腹不堅痛而誤用芒硝以伐真陰洞泄不已元氣將脫宜用人參白朮炙甘草大棗乾姜芍藥大劑與之不止佐以升提升麻葛根柴胡之類

若從無陽邪表證從不頭疼發熱寒邪直中陰經此必元氣素虛之人或在極北高寒之地始有是證法宜溫補以接其陽附子人參乾姜官桂大劑與之陽回寒退即以平補之劑調之勿過用桂附以防其毒

三陰各經見證悉從仲景傷寒論法治之如少陰咽痛咽中生瘡聲不出用苦酒湯到咽即効故知古人立法非今人可及也

春溫夏熱病大法

冬傷於寒至春變爲溫病大都頭疼發熱或渴或不渴三陽證俱然亦間有先微寒後即發熱者大抵發熱其常也藥用辛溫佐以辛寒以解表邪太陽宜羌活湯陽明宜白虎湯無汗不嘔者間用葛根湯少陽往來寒熱等證不可汗吐下宜和解小柴胡湯渴者去半夏加栝蔞根耳聾熱盛去人參加麥冬知母栝蔞根渴亦加之

至夏變爲熱病其表證大約與春溫同但熱比於溫則邪氣更烈耳解表用白虎湯竹葉石膏湯有太陽

證則加羌活有少陽證則加柴胡黃芩如發班白虎湯竹葉石膏湯加玄參梔子桔梗鼠粘連翹大青小青青黛大劑與之二證若大便秘宜按之其邪已結於內便鞕宜察邪結中焦小承氣湯調胃承氣下之邪結下焦少腹堅痛始用大承氣湯下之

傷寒溫疫其不可治及難治者皆屬下元虛

傷寒溫疫三陽證中往往多帶陽明者以手陽明經屬大腸與肺為表裏同開竅於鼻足陽明經屬胃與脾為表裏同開竅於口凡邪氣之入必從口鼻故兼陽明證者獨多

邪在三陽法宜速逐遲則胃爛發班或傳入於裏則屬三陰邪熱熾者令陰水枯竭於法不治矣此治之後時之過也

近代醫師鹵莽既不明傷寒治法又不識雜證類傷寒往往妄投汗下之藥以致虛人元氣變證叢生元氣本虛之人未有不因之而斃者矣戒之哉汗下之藥焉可嘗試也

時氣傷寒　除陰症不可服

苦參一兩水酒各一碗煎八分重者水醋各半服之一汗而愈不論傷寒久近立効本草云天行尤良

史鶴亭太史丁亥春患瘟疫頭痛身熱口渴吐白沫晝夜不休醫師誤謂太史初罷官歸妄投解鬱行氣藥不效又投以四物湯益甚諸醫謝去謂公必死遣使迎仲淳至病二十餘日矣家人具以前方告仲淳曰誤也瘟疫者非時不正傷寒之謂發于春故謂瘟疫不解表又不下使熱邪彌留腸胃間幸元氣未盡故不死亟索淡豆豉約二合許炒香麥門冬兩許知母數錢石膏兩許一劑大汗而解時大便尚未通太史問故仲淳曰昨汗如雨邪盡矣第久病津液未回故大便不通此腸胃燥非有邪也令日食甘蔗二三株兼多飲麥門

冬湯不三日去燥糞六十餘塊而愈

章衡陽銓部患熱病病在陽明頭痛壯熱渴甚且嘔鼻乾燥不得眠胗其脉洪大而實仲淳故問醫師醫師曰陽明證也曰然問所投藥曰葛根湯仲淳曰非也曰葛根湯非陽明經藥乎曰陽明之藥表劑有二一為葛根湯一為白虎湯不嘔吐而解表用葛根湯今吐甚是陽明之氣逆升也葛根升散故用之不宜白虎湯石膏知母甘草加麥門冬竹葉名竹葉石膏湯石膏辛能解肌鎮墜能下胃家痰熱肌解熱散則不嘔而煩躁壯熱皆解矣遂用大劑竹葉石膏湯

疏方與之且戒其仲君曰虜刑非六十萬人不可李
信二十萬則奔還矣臨別去囑曰斯時投藥五鼓瘥
天明投藥朝飡瘥已而果然或謂嘔甚不用半夏何
也仲淳曰半夏有三禁渴家汗家血家是也病人渴
甚而嘔是陽明熱邪熾盛劫其津液故渴邪火上升
故嘔半夏辛苦温而燥有毒定非所宜又疑其不用
甘草何也曰嘔家忌甘仲景法也
高存之之隣人賣腐者傷寒發噦兩日夜不省人事其
子乞方仲淳問曰汝父當時曾頭疼身熱乎曰然曰
曾服汗藥乎曰未也曾吐下乎曰未也仲淳因索傷

廣筆記　寒　二一

寒書檢之其方類用乾薑柿蒂丁香及附子等温熱
之藥未條僅載白虎湯一方仲淳思之曰傷寒頭痛
身熱口渴本屬陽明熱邪傳裏故身凉發噦未經汗
吐下邪何從而出第其人年老多作勞故于白虎湯
中加參錢一劑立起
于潤父夫人娠九月患傷寒陽明證頭疼壯熱渴甚
舌上黑胎有刺勢甚危仲淳投竹葉石膏湯索白藥
子（醫馬病者）不得即以井底泥塗臍上乾則易之一日夜
盡石膏十五兩五錢病瘳越六日產一女母子並無
恙

存之一家人婦傷寒來乞方仲淳已疏方與之矣見
其人少年問曰若曾病此乎曰然曰愈幾日而妻病
曰八九日曰曾有房慾否曰無之仲淳故曰若有房
慾此方能殺人也其人即置方不取遂以褌襠雄鼠
糞麥冬韭白柴胡二劑勢定更用竹皮湯二三劑全
愈
姚平子傷寒頭疼身熱舌上胎胸膈飽悶三四日熱
不解奄奄氣似不屬者一醫以其體素弱病久虛甚
意欲投參少許仲淳叱曰參一片入口死矣亟以大
黃（一兩）瓜蔞（二枚）連子切片黃連枳實下之主人驚疑不

廣筆記　寒　二二

得已減大黃之半二劑便通熱立解遂愈
張太學璇浦內人患熱入血室發狂欲殺人白下醫
以傷寒治之煎藥未服陳錫玄邀仲淳往診仲淳云
誤矣覆其藥投一劑而安先與童便繼與凉血行血
安心神藥遂定
翁文學具茨感冒壯熱舌生黑胎煩渴勢甚劇時稽
勳諸昆仲環視揮涕群醫束手仲淳以大劑白虎湯
一劑立甦或問仲淳治傷寒有秘法乎仲淳云熟讀
仲景書即秘法也（白虎湯中曾加人參三錢）
四明虞吉卿因三十外出疹不忌豬肉兼之好飲作

泄八載矣忽患傷寒頭痛如裂滿面發赤舌生黑胎煩躁口渴時發譫語兩眼不合者七日洞泄如注較前益無度其尊人虞仰韶年八十二矣客寓莊欽之處方得長郎凶問懷抱甚惡膝下止此一子坐待其斃腸爲寸裂欽之向余曰此兒不祿仰韶必繼之即不死八十二老人挾重貲而聽其扶櫬東歸余心安乎萬一有此性有親送至鄞耳余聞其語爲之惻然急往診其脉洪大而數爲疏竹葉石膏湯方因其有腹瀉之病石膏止用一兩病初不減此兒素不謹良一友疑其虛也云宜用肉桂附子欽之以其言來告

余曰誠有是理但余前者按脉似非此證豈不數日脉頓變耶復往視其脉仍洪大而數余曰此時一投桂附即發狂登屋必不救矣一照前方但加石膏至二兩飲之曰得毋與泄瀉有妨乎余曰熱邪作祟此客病也不治立殆渠泄瀉已八年非暴病也治病須先太甚急治其邪徐并其夙恙除之急進一劑夜卧遂安即省人事再劑而前惡證頓去又數劑霍然但瀉未止耳余爲疏脾腎雙補丸方而加黃連乾葛升麻以痧痢法治之不一月瀉竟止八載沉疴一旦若失仰韶耄矣別余歸老拜謝垂涕謂父子得以生還皆余賜也

莊欽之一庄僕因受寒發熱頭痛如裂兩日俱痛渾身骨内疼痛下元尤甚狀如刀割不可堪忍口渴甚大便日解一次胸膈飽脹不得眠巳待斃矣欽之以其證來告爲疏一方乾葛三錢石膏一兩半麥門冬八錢知母三錢半羌活二錢半大栝蔞半個連子打碎枳殼一錢桔梗一錢竹葉一百片河水煎服四劑而平此太陽陽明病也貧人素多作勞故下體疼痛尤甚以羌活去太陽之邪石膏竹葉乾葛知母麥門冬解陽明之熱栝蔞枳殼桔梗疏利胸膈之留邪故遂愈

一奴傷寒熱解後復下血不止主人以痢藥投之更甚仲淳云此傷寒失汗之餘症也用地榆麥門冬知母竹葉以代仲景諸血證藥遂愈

常熟吳見吳在京邸時有小青衣患傷寒愈而復復而愈愈而再復不知其幾趙文肅公謂仲淳曰此非兒不能救他人亦不肯往仲淳亟䮘診之病人面色黃白六脉微弱大便不通胸中不快亦不思食曰此爲傷寒百合壞證之餘邪且退矣胸中不快虛而氣壅非實邪也不大便者久病津液枯氣弱不能送也投以人參五錢麥門冬一兩枳殼八錢炒盡劑立解而瘥

莊飲之一僕因傷寒後勞復發熱頭痛腹內作瀉勢甚危急余為疏方山梔仁四錢枳實二錢豆豉一兩川黃連二錢乾葛三錢調六一散五錢服二劑熱退瀉止頭痛亦愈但不思飲食為去山梔枳實黃連加鱉甲四錢炙甘草二錢麥門冬五錢不數劑而愈

梁谿一男子素虛春中感冒頭痛肌痛發熱羌活二錢麥門冬三錢炙甘草一錢紫蘇一錢五分北細辛七分前胡一錢五分次日頭痛止熱未退口渴仲淳用芍藥五味子人曰風邪未退遽用酸斂何也曰因人而施爾一杯即愈

麥門冬二錢甘草一錢栝蔞根二錢五分乾葛一錢五分桑白皮二錢

桔梗一錢白芍藥一錢五味子五分

從祖近湖公少年因房勞食犬肉傷寒諸醫以其虛也攻補兼施至發狂登屋奔走呼號日夜令壯夫看守者幾月餘急走使延朱遠齋遠齋先命煎人參膏二觔以待用潤字號丸藥數錢下之去黑糞無算勢遂定奄奄一息滯於死矣徐以參膏灌之至百二十日全瘳

治傷風後耳聾　仲淳定

甘橘花二錢石菖蒲一錢忌鐵柴胡六分栝蔞根二錢貝母二錢去心前胡一錢甘草六分北細辛四分蘇梗一錢桑白皮二錢忌鐵加竹瀝一杯不拘時服

暑

治傷暑

高存之次郎童時夏月身熱十晝夜止飲白湯諸醫汗之不解以麻仁丸下之熱如故皇急中仲淳忽至診曰此傷暑也白虎湯是其本方因誤汗下虛甚加人參三錢一劑微汗瞑眩少頃熱解更疏一方防其瘧痢仍用人參二錢兼健脾清暑導滯之劑未幾瘧作如方飲之瘧止痢又作存之不得已于生脈散中加益元散飲之兒尫羸甚諸醫曰數日後死矣舉家惶急禳禱紛紜仲淳復自松陵來存之語之故仲淳曰生脈益元散得之矣不診而歸視兒問糜甘否曰甘大呼曰病去矣存之且喜且訝兒旦夕虞不保兒言何易也仲淳曰視兒目光炯炯且飲食味甘是精神已王胃氣轉矣尋果脫然起

臧玉涵子歲半盛夏咳嗽七日因浴受驚又傷食大熱倦頓三日不敢與藥目翳唇蠒舌乾譫之仲淳曰此暑病也當與白虎湯玉涵曰服瀉石膏無害乎曰先以天水散探之服二錢少頃藥夾痰而吐微汗身至黃昏復熱又以天水散二錢不效仲淳曰其爲暑症無疑當以白虎湯加人參因兒患肺熱且止仲淳再診之曰暑邪客於皮膚分肉有熱無寒是爲癉瘧斷當用白虎湯連服二劑不效鼻露眼開口不納氣勢甚危叩仲淳曰此正氣不足勝邪也偶思刺瘧論有云凡瘧先時一食頃乃可治過時則失之也又云無刺熇熇之熱無刺渾渾之脈無刺漉漉之汗意者服藥不得時耶將前藥并劑煎露一宿雞鳴溫服之病頓失更不須調理精神漸復經年無病以此知仲淳察病望氣靈心慧眼又知服藥貴及時當早服晚投當晚服早投當熱而溫當溫而熱均失之也　此

玉涵自定案

任丘裴在澗棄家逃禪持戒茹素遍遊五岳足跡幾滿天下偶客金壇寓西禪寺僧舍酷暑中坐臥小樓日持準提咒三千念佛號三萬忽患頭痛如斧劈身熱發躁口乾日飲冷水斗餘渴猶未解自分必死莊斂之憐其旅病時過視疾一日急走倉頭召斂之永訣以所携書畫玩器盡授斂之泣而言曰兒其爲我收藏吾死後切勿用世俗禮葬我惟以兩缸盛吾尸其中以三尺地埋之耳斂之涕泗塡胸束手無策余此時遊梁谿陽羨間斂之命余僕克勤相追歸視其

脉知係受暑爲疏竹葉石膏湯方飲之如方製藥粥爲煎服不二劑發熱口渴俱止幾十劑病始退旋加健脾藥十餘帖而安

傷暑者霍亂神方　包瑞溪學憲傳仲淳累驗

絲瓜葉一片白霜梅肉一枚并核中仁同研極爛新汲水調服入口立瘥

又方　馬銘鞠傳

用粟米連殼搗碎煎湯溫服下口立愈屢試神效

又方　梁谿顧聖符傳

取稨荳葉搗汁一碗飲之立愈

又方

高存之家僕婦患此仲淳以砂仁一兩炒研鹽一撮沸湯調冷定服一劑愈傷冷物者加吳茱萸四錢

又方

用青蒿嫩葉手揉如豆大井水吞下數枚立愈

治中暑昏眩煩悶欲死

挖地深尺餘取黃土以新汲水調化飲一二甌立愈

又方

取田中泥漿塗臍上令壯者溺其上并溺口中得咽立起

治中暑小便不通　用田螺三枚搗爛入青鹽三分攤成膏貼在臍下一寸即愈

瘧

如發熱口渴先服此方一二劑

麥門冬五錢知母蜜炙二錢五分硬石膏研細五錢竹葉二十片粳米一撮煎八分不拘時服

治熱多作吐頭痛口渴無汗或汗少

白茯苓二錢橘紅二錢山査肉一錢竹茹二錢知母蜜炙二錢麥門冬四錢硬石膏研細五錢

治寒多熱少無汗

乾薑一錢生用柴胡一錢五分當歸廣皮吳茱萸白朮土炒各三錢

○如吐嘔而寒甚者此方去柴胡當歸加人參二錢半夏薑汁炒一錢○如瀉去當歸加茯苓二錢○如有食脾胃不健第二方去當歸加白荳蔻末七分○如寒熱相半及先寒後熱者第二方加黃芩一錢○如汗多加白芍藥酒炒一錢黃耆蜜炙二錢去柴胡○如傷食必惡食第二方加山査一錢白荳蔻末七分神麯炒一錢厚朴薑汁炒一錢○如渴甚者不可用半夏當用第一方加天花粉二錢倍用麥門冬知母須三四劑方可投健脾胃藥或兼用健脾胃藥如白茯苓白朮廣陳皮白芍藥人參白荳蔻山査等劑是也○如寒甚只用第二方加人參五錢生

薑片五〇如寒熱俱甚久不止者前方中去白朮乾薑加鱉甲醋炙研極細二錢地骨皮二錢麥門冬五錢牛膝五錢

太陽經瘧頭痛遍身骨痛項脊覺強主方如渴則兼陽明矣

羌活二錢此係太陽主藥前胡一錢五分猪苓一錢澤瀉一錢炒陳皮二錢〇惡寒加薑皮甚則加桂枝〇渴則加乾葛〇渴甚汗多加麥門冬知母竹葉白朮〇久病用黃耆〇虛甚加人參

治秋深寒熱甚而汗多者

人參白虎湯中加桂枝素有血證及咳嗽者勿用參桂

陽明經瘧熱甚渴甚煩躁惡人聲惡心不眠主方

硬石膏研細五錢麥門冬各五錢加至一兩五錢知母去皮蜜炙三錢加至一兩竹葉三十片加至四五十片粳米一撮水三大碗煎一碗不拘時服〇如瘧初發汗未大透本方加乾葛三錢〇痰多本方加括蔞根三錢橘紅三錢竹瀝一杯〇如嘔本方去竹葉換竹茹一錢橘紅三錢〇汗多本方去乾葛加人參二錢元氣虛倍之白朮二錢〇如兼惡寒其指爪色黯本方加桂枝一錢五分〇頭痛骨痛又兼前症此太陽陽明也本方加羌活二錢〇如在秋末冬初又兼惡寒加桂枝錢每日下午別服開胃健脾消食消痰兼除寒熱瘧邪藥一劑方具於後

麥門冬五錢鱉甲三錢加至一兩廣橘紅人參各二錢加至五錢素有痰火者勿用白荳蔻仁四分加至七分白茯苓三錢烏梅肉一枚白朮二錢因胃熱及肺火咳嗽勿用牛膝肉桂二錢加至八錢水三鍾煎一鍾研入白荳蔻末乘熱服〇如熱甚而嘔加木瓜三錢枇杷葉二片竹茹二錢〇如虛寒胃弱有痰有濕因而嘔者加半夏薑汁製湯泡一錢加至二錢口渴而便澀者勿用

少陽經瘧往來寒熱相等口苦而嘔或兼耳聾

脅脇痛主方

小柴胡湯柴胡黃芩半夏甘草人參鱉甲三錢至七錢牛膝橘紅各三錢至五錢〇如惡食本方加枳實炒一錢白荳蔻五分〇如有肺火本方去人參半夏加麥門冬五錢牛膝鱉甲橘紅如故〇如大便燥及痰盛方中去半夏加當歸二錢竹瀝一杯〇惡寒甚本方加桂枝一錢至二錢生薑皮一錢至三錢〇如兼陽明渴欲引飲此少陽陽明也本方去半夏加石膏八錢麥門冬五錢竹葉二十片每日下午別服開胃健脾消食消痰兼除寒熱瘧邪等藥如前方

太陰脾瘧寒從中起寒甚而後熱嘔甚嘔已乃衰主方

桂枝二錢 人參一錢 白芍藥二錢酒炒 薑皮三錢 水二鍾煎一鍾空心饑時各一服再煎五六分下午別服開胃健脾消食消痰兼除寒熱瘧邪藥如前方

少陰經瘧惡寒心煩而渴小便艱澁無汗躁欲去衣或手足冷或欲飲水或咽痛主方

鱉甲 牛膝各三錢至七錢 知母二錢至五錢 桂枝一錢至二錢 細辛五分 橘紅三錢 白茯苓三錢 豬苓一錢 澤瀉一錢 人參二錢有肺火勿用 薑皮一錢至二錢 水二鍾煎八分空腹餓時各一服○如寒

甚倍人參薑皮○如熱甚倍鱉甲牛膝加烏梅肉有痰加竹瀝下午別服開胃健脾消食消痰除寒熱藥大畧如前方

厥陰經瘧色蒼蒼然善太息不樂主方

桂枝一錢至三錢 柴胡一錢至三錢 鱉甲二錢至四錢 當歸三錢至五錢 橘紅一錢至三錢 牛膝二錢至五錢 何首烏五錢 水三碗煎一碗空心饑時服○便燥及昏暈欲死本方加麥門冬竹瀝下午別服開胃健脾消食消痰除熱藥如前方○如有肺火及內熱去桂枝加知母二錢

治陽分間日瘧寒熱俱甚煩躁舌胎

硬石膏二兩 知母五錢 麥門冬一兩五錢 竹葉百片 栝蔞根二錢 貝母五錢 廣陳皮二錢 發日加人參五錢有肺熱者勿用 薑皮一錢 隔夜煎成露一宿五更服

治隔一日一發先熱後寒熱少寒多午時發頭疼筋骨痛煩燥口乾惡心無汗後半夜涼天明頭痛止

羌活二錢頭不痛即去之 乾葛二錢五分 陳皮二錢 麥門冬五錢 知母二錢 生薑皮二錢 炙甘草五分 何首烏五錢 水二鍾煎八分露一宿天明溫服

治胎前瘧熱多口渴方

黃芩二錢酒炒 柴胡一錢 硬石膏一兩五錢至 麥門冬去心五錢至一兩 知母二錢至四錢去皮蜜炙忌鐵 廣橘紅二錢至三錢 白茯苓三錢 竹葉一百片至一百五十片 ○胃虛加人參二錢至五錢 河水二碗煎八分饑時服發日五更溫服滓再煎六分并進○如熱甚寒亦甚本方加生薑皮二錢至四錢 白朮三錢

治胎前瘧寒甚不渴少汗方

人參 生薑皮各五錢至一兩 廣橘紅去白二錢至四錢 河水二碗煎八分五更溫服再煎五六分并進寒甚者陽氣虛而下陷也益陽氣則寒自止邪自散矣故應多服人參如汗多并加黃耆五六錢

治產後瘧主方

當歸三錢至五錢 柴胡一錢 鱉甲四錢至七錢 牛膝一兩 白茯苓三錢 廣橘紅一錢 生薑皮一錢至二錢 乾薑炒黑四分至六七分 水二鍾煎八分露一宿五更溫服○如渴加麥門冬六錢 竹葉十五片 青蒿一五錢 去生薑皮乾薑○如渴甚更加知母二錢 栝蔞根三錢○痰多并加貝母二錢○如脾胃弱加人參二錢至一兩 元氣虛亦如之○有肺熱者去人參加白芍藥四錢○如汗多加黃耆五錢至一兩○寒甚加桂枝七分至一錢二分 乾薑炒黑七分○如惡露未盡亦如之并加益母草五錢 黑豆一炒淬 蘇木五錢打碎別以絹裹入藥煎 熱多加青蒿三四錢

治三日瘧寒多

當歸酒洗五錢五分 桂枝一錢五分 乾薑二錢 廣陳皮五錢 何首烏洗淨切片五錢 人參二錢至一兩

治三日瘧寒熱俱甚或早晏不齊作止不一

鱉甲 牛膝 何首烏 廣橘紅 麥門冬各五錢 知母二錢 桂枝一錢五分 薑皮二錢無汗倍之 烏梅一枚 乾葛二錢汗多或減去之無汗倍之 水三鍾煎一鍾露一宿發日五更溫服查再煎七分餘日空心餓時服○如渴加石膏一兩 竹葉五十片 渴止去之○氣虛加人參五錢○如汗多加黃耆三錢 兼便燥加歸身五錢○不思食及食難化加人參五錢 白荳蔻仁七分 厚朴一錢五分○如泄去石膏知母竹葉倍白朮加茯苓一錢 車前子二錢 肉荳蔻一錢 澤瀉一錢○痰多加竹瀝一大杯

治三日瘧熱多渴甚

鱉甲 牛膝 何首烏 麥門冬各五錢至兩 知母四錢加至七錢 橘紅五錢 石膏八錢加至二兩 竹葉三十片 水三大碗煎一碗露一宿發日五更服○如惡食加青皮一錢炒九分 白荳蔻仁七分○無汗或有汗而少加乾葛四錢○汗多本方加人參白朮氣虛倍加人參○如嘔本方加竹茹烏梅○便燥加當歸○得汗渴止去石膏乾葛 下午別服開胃健脾消食消痰藥如前法

治三日瘧寒多熱少汗少或無汗

人參 白朮各五錢至一兩 橘紅四錢至六錢 桂枝二錢至三錢 薑皮五錢至一兩 白荳蔻仁七分 水三碗煎一碗露一宿發日五更溫服渣再煎七分連進不拘時空心饑時服

治三日瘧陰分 黃氏婦服之立起

何首烏一兩 牛膝一兩 當歸五錢便溏用炒 鱉甲一兩醋炙 廣橘紅三錢 水三鍾煎一鍾空心服立愈虛極者加人參一兩

治三日瘧

人參一兩 生薑皮五錢 水二鍾煎八分空心服○于中父

病瘧初服此不效仲淳堅持此方加參至三兩生薑皮至一兩五錢二服卽起

治瘧邪未盡而㓟作者先服此方二三劑

鱉甲（醋炙二錢）廣陳皮（去白三錢）白茯苓（三錢）柴胡（一錢）白芍（酒炒二錢）乾葛（一錢）○如惡寒寒熱交作加柴胡（二錢）生薑皮（一錢）○如渴去薑皮加寒水石（七錢）滑石（四錢）○如無汗加乾葛（二錢三四錢）可服參者加參（三錢）

次服方（服之瘧下必止）

乾葛（二錢五分）升麻（醋炒七分）蓮肉（去心四十粒炒）炙甘草（一錢）烏梅肉（一枚）廣橘紅（三錢）白稨豆（炒二錢）鱉甲（二錢）白茯苓（二錢）白芍藥（酒炒三錢）黃芩（酒炒一錢五分）川黃連（土炒二錢加至三錢）河水二鍾半煎八分調水飛過滑石末（四錢）兼吞滯下丸二三服送以葛根湯或蓮子湯亦佳○如腹痛以炒砂仁三四錢濃湯吞滯下丸

治久瘧不已似勞瘵

當歸（酒洗五錢便溏者用）牛膝（酒洗五錢）鱉甲（三錢）何首烏（自採鮮者五錢）廣橘紅（三錢）生薑皮（二錢五分）柴胡（錢五分已上二味熱多無汗者用有汗則去之）貝母（三錢）水三鍾煎一鍾加竹瀝一大杯發日五更時服隔夜先煎露一宿臨服時再重湯頓溫　蓋瘧者暑氣爲病也暑得露卽解世鮮知者

防瘧方（夏秋不輟必無瘧矣）

何首烏（十二兩）茅山蒼朮（十兩）半夏（六兩）橘紅（八兩）人參（四兩）白茯苓（八兩）藿香葉（三兩）白荳蔻仁（一兩五錢）爲細末米粉糊加薑汁丸如菉豆大每五錢下午及臨臥白湯吞

仲淳年十七時爲瘧所苦凡湯液丸飲巫祝靡不備嘗終無救於病徧檢方書迺知瘧之爲病暑邪所致也經曰夏傷於暑秋必痎瘧遂從暑治不旬日瘳後數以意消息散邪之外專養胃氣痰多者消痰氣虛者補氣血虛者益血又分臟腑經絡各從其類以施向導卽經年不愈者竟霍然起矣

沈少卿中丞請告時苦瘧仲淳往胗之憊甚曰再一發死矣先生何方立止之仲淳曰何言之易也疏三方作五劑一日夜飲盡次早瘧止先二劑清暑用大劑竹葉石膏湯加桂枝以其渴而多汗也次二劑徙脾去積滯用橘紅白豆蔻白朮茯苓穀蘗烏梅白稨豆山查麥芽最後一劑人參（一兩）生薑皮（一兩）水煎露一宿五更溫服盡劑而效

顧伯欽患瘧仲淳之門人疏方以白虎湯加人參一兩一庸工云豈有用參至兩數者乎改用清脾飲二十餘劑而瘧不止體尫弱仲淳至笑曰此虛甚非參

不可吾徒不謬也投以大劑參芪一劑而瘥
人參一兩 黃芪一兩蜜炙 知母五錢蜜炙 陳皮二錢 乾葛二錢 甘草八分
石膏五錢

莊歛之妾患瘧寒少熱甚汗少頭痛不嗜飲食余為
脉洪數而實用麥門冬五錢 知母二錢五分 石膏一兩五錢 竹
葉六十片 粳米一撮 橘紅二錢 牛膝一兩 乾葛三錢 白茯苓二錢 白
扁豆三錢 三劑不應忽一日凡寒熱者再昏迷沉困不
省人事勢甚危急歛之過余云恐是虛弱前方石膏
知母竹葉似近寒凉非其治也余亦心疑為去石膏
等而加人參二錢已別矣余追想前脉的非屬虛急
令人往視令其將參煎好勿輕與服待按脉加斟酌
焉次早往視其脉洪數如初急止人參勿服惟仍用
前方而加石膏至二兩何首烏五錢令其日進二劑
瘧遂止

莊歛之前患瘧妾越一載忽頭痛如裂心內雜亂不
清喉作痛失音舌破咳嗽有痰胸膈飽脹惡心不思
飲食如此者四日矣因漸增劇陡發寒熱如瘧狀寒
少熱多熱後頻出汗方解平時有心口痛證并作下
元無力如脚氣狀歛之疑為傷寒余曰此受暑之證
即前年所患瘧而勢加劇耳法當先去其標令以石
膏二兩 麥門冬五錢 知母錢 橘紅二錢半 牛膝五錢 鱉甲四錢 竹
葉一百五十片 貝母三錢 栝蔞根三錢 河水煎服三四劑心內
清頭疼喉痛失音舌破飽脹寒熱俱愈但惡心不思
食如故而心口痛下元無力不減余為去石膏知母
竹葉鱉甲貝母栝蔞根而加延胡索一錢五分 靈脂七分 生
蒲黃一錢五分 薏苡仁八錢 木瓜二錢 石斛三錢 白扁豆二錢 白芍
藥三錢 竹茹二錢 枇杷葉三片 大炙甘草四分 幾十劑而愈

高存之甥女嫁後患胎瘧久不止仲淳云病在陰分
以人參五錢 牛膝一兩 兼健脾清暑一劑而止

章衡陽子室患瘧後失音寒熱愈甚告急仲淳仲淳
云此必瘧時不遇明眼人妄投半夏故也投以大劑
麥門冬 白茯苓 炙甘草 鱉甲 知母 貝母
數劑瘳

治停食發瘧

梁溪王興甫偶食牛肉覺不快後遂發瘧飲食漸減
至食不下咽已而水飲亦不下白湯過喉間嘔出作
碧色藥不受小便一滴如赤茶大便閉諸醫束手仲
淳忽至視之令仰卧以指按至心口下偏右大叫因
詢得其由用丸藥一服至喉輒不嘔水道漸通次日
下黑物數塊如鐵丸藥用碧紅知平胃散作末棗肉

和丸白湯下三錢其病如失再以人參五錢麥門冬五錢
橘紅三錢白芍藥三錢水煎服四日起

治瘧母丸方

鱉甲如法四兩䗪蟲煅存性研極一兩半廣橘紅一兩五錢射干晒乾一兩
青皮醋炒八錢人參八錢肉桂去皮六錢乾漆煅烟起存性研如飛麪五錢為
極細末醋煮稀糯糊和丸如梧子大每四錢空心淡
薑湯下

痢

滯下如金丸滯下俗呼痢疾

真川黃連真薑汁浸曬乾如法炒九次不拘觔兩細末薑汁和水跌丸
如梧子大貯磁器中封固如胃弱以蓮子四十粒橘
紅二錢人參二錢升麻醋炒七分煎湯吞四錢○腹痛以白芍
藥三錢炙甘草一錢黃檗一錢升麻醋炒七分煎湯吞四錢巳後
各條加減皆以丸藥四錢為率○裏急甚以白芍藥
三錢炙甘草一錢當歸二錢升麻醋炒七分煎湯吞四錢○後重
甚加檳榔五分枳殼一錢木香汁七匙調入○口渴及發
熱調滑石末三錢去木香○小便赤澁短少或不利加
滑石末三錢調入各症湯中吞藥○赤多加烏梅肉二錢
山查肉二錢紅麴二錢○兼裏急用當歸等加入如前方
○白多加吳茱萸湯泡一次七分黃芩酒炒一錢五分○噁心欲嘔
即噤口痢多加人參石蓮肉綠色升麻醋炒可用至八分或一錢
白稨荳炒三錢白芍藥酒炒三錢○久痢不止加肉荳蔻一錢
蓮肉去心炒黃三錢砂仁炒一錢五分人參三錢白稨荳炒去殼二錢炙
甘草一錢橘紅二錢白芍藥酒炒二錢白茯苓二錢細末煉蜜丸
如梧子大每服三錢米湯下若積滯未盡加滑石末
三錢每服四錢白湯吞○水瀉無積滯者用人參橘紅

炒砂仁湯吞二錢○凡治滯下非元氣壯實多啖能
食之人愼勿輕用大黃巴豆牽牛甘遂大戟等下藥
○凡産後滯下積滯雖多腹痛雖極不可用大黃等
藥行之致傷胃氣遂不可救但用人參白芍藥當歸
紅麯升麻醋炒益母草加炙甘草一倍滑石末四五錢
足矣○若惡露未盡兼用乳香沒藥各七分五厘炒砂仁
末一錢久之自愈血虛可加阿膠二錢蛤粉炒○凡胎前滯
下宜用黃芩黃連白芍藥炙甘草橘紅赤麯枳殼蓮
肉炒暑用升麻未滿七月勿用滑石證急者必須用
之不拘此例

護心奪命丹治虛弱人患痢及痢久脾胃虛者
肉豆蔻一兩五錢白芍藥酒炒六兩炙甘草一兩廣橘紅二兩白藕
荳炒二兩滑石六兩赤麯炒研四兩蓮肉去心炒焦黃五兩綠色升麻
醋炒二兩五錢川黃連切片拌好酒同吳茱萸浸二宿晒上炒乾分開連萸各將淨黃連三兩白
芍加茱萸一兩細末煉蜜丸如菉豆大每服三錢白湯吞○
如噤口痢并虛弱人卽以前方中去豆蔻另用人參
三錢煎濃湯吞

加味滯下丸
川黃連白痢如前法赤痢用濕槐花炒去槐花八兩白芍藥酒浸切片炒五兩烏
梅肉一兩滑石水飛如法六兩炙甘草二兩升麻綠色者醋炒三兩蓮肉

去心炒如法六兩白稨豆炒去殼二兩紅麯鍊淨炒五兩乾葛一兩爲細
末蜜丸每五錢白湯吞饑時服證重者日三服

又滯下丸
川黃連一斤如法製滑石末八兩檳榔四兩炙甘草三兩木香爲末
和水隔湯燉一兩五錢枳殼炒五兩白芍藥酒炒五兩細末荷葉湯稍
加薑汁糊成丸如菉豆大每服三四錢烏梅湯吞
若加吳茱萸白稨豆陳皮各三兩治白痢作四樣一
無木香一無檳榔枳殼一加當歸一加吳茱萸白稨
豆橘紅去檳榔枳殼○煩熱煩渴惡心者勿用木香
○元氣虛弱者勿用檳榔枳殼○積滯多而後重者

用檳榔枳殼○裏急色赤者用當歸惟惡心嘔吐及
不思食者勿用○久痢加肉豆蔻

治血痢痛甚湯液仲淳傳自包瑞溪學憲試之神驗
白芍藥酒炒五錢此仲淳加入者枳殼槐花同炒去槐花五錢升麻醋炒七分山
貞川黃連薑汁炒五錢滑石末二錢乳香沒藥各七分五厘
查肉一錢甘草五分

治噤痢神效
綠色升麻醋炒一錢人參三錢蓮肉去心炒黃一十枚水一鍾煎半
鍾飲之痊和爲丸更妙每四錢一服白湯吞

治久痢紅中兼有青色白痰間發熱

真川黃連洗花炒一錢五分 白芍藥酒炒二錢 廣陳皮三錢 人參一錢
蓮肉炒十枚 肉豆蔻八分 炙甘草五分 山查肉二錢 綠升麻醋炒五分
砂仁炒一錢 滑石末二錢五分 調服、

治噤口痢吐不納藥者

人參一兩 川黃連薑汁製五錢 石蓮子炒去心五錢 水二鍾煎八分小杯緩服之吐止痢亦止

大黃丸痢初起壯實者可用胃弱者禁施

川大黃切片蜜蒸熟 白芍藥酒浸切片炒六兩 甘草炙三兩 檳榔四兩 木香切片不見火為末一兩 枳殼炒四兩 細末煉蜜同水煎木香和搗為丸如菉豆大白萊菔湯吞三錢重者五錢以行兩三次腹中爽快為度胃氣虛極之人勿輕用之

積滯重而元氣虛者以人參湯吞 孕婦以人參縮砂湯吞行後另用人參丸補之

予家夏秋患此甚衆輒依前方療之歲爲常并以應望中之索方者一一神驗黃聚川年兄太夫人年八十餘偶患痢胃弱服絕粒數日予以升麻人參黃連蓮肉方授之參至一兩諸子駭甚再問予予曰遲則不救矣一劑啜粥再劑腹中響一泄痢即止今年九十餘尚健也

陳赤石督學因校士過勞感暑遂滯下純血醫皆難之陳刺史曰此非繆仲淳莫能療也使者旁午得之吳門一日夜馳至武林仲淳胗得其所由遂用人參五錢 升麻七分 炙甘草一錢五分 烏梅二枚 紅麴一錢五分 川黃連三錢 白芍藥二錢 蓮肉四十粒 煎調滑石末五錢 一劑而愈督學曰痢止矣心搖搖不能閱卷奈何仲淳曰此勞心太過暑因客之故爾加竹葉乾葛酸棗仁一劑遂平

姚公遠幼子病痢一醫誤下之遂下純血氣喘身熱不思食仲淳偶至亟以人參四錢 五 石蓮子白芍藥升麻橘紅草石蠶白藊豆滑石末炙甘草投以一劑喘平血止又數劑痢止仲淳臨別囑公遠曰兒百日內

不出痘則生以下多元氣未復故也未幾即痘果殤

家弟稚端幼病痢甚日夜數十次服數劑即愈

人參三錢 吳茱萸滾湯泡七次一錢 川黃連薑汁炒一錢 後二味伺銚上烝水煎至八分溫服如不受以藥一匙間米湯一匙漸漸飲之胃氣漸復如頭痛發熱煎方中加寒水石六錢即硬石膏 乾葛一錢 別調六一散四錢冷水服

庚子秋華氏妹歸寧忽痢日夜幾百行身熱發嘔一啞數十聲不絕吳醫爭欲下之且曰補即死矣將仲淳以先王母病留謝瀆憐其促治後事甚亟曰既已知危何不以藥試之服如金丸因思飲予固守仲淳

前方以人參五錢炒黃連 白藊豆 升麻 滑石 炙甘草 橘紅 再進如金丸二劑勢稍定更數服愈華水部至今感服

友人虞元靜房中人方孕五月患滯下腹痛口不下數次為定此方甫服一鍾覺藥行至腹即解一次痛亦隨巳滯下全愈

川黃連四錢 白芍藥三錢 黃芩三錢 白藊豆二錢 蓮肉四十粒 橘紅一錢半 枳殼二錢 紅麯二錢 乾葛一錢半 升麻五分 炙甘草一錢 烏梅肉一枚

治毒痢及發疹時疹毒下利方

鮮金銀藤即忍冬藤數兩煎濃汁三大碗入地榆五錢川黃連槐花濕拌炒綠色者四錢 黃檗二錢 黃芩二錢 白芍藥酒炒三錢 炙甘草二錢 升麻炒六分 同煎至一碗調水飛過滑石末五錢不拘時服

治濕熱腹痛

一少年貴介暑月出外飲食失宜兼以暑熱遂患滯下途次無藥病偶自止歸家腹痛不巳徧嘗諸醫之藥藥入口痛愈甚亦不思食仲淳視之曰此濕熱爾其父曰醫亦以濕熱治之而轉劇仲淳曰投何藥曰蒼朮黃連厚朴枳殼陳皮等仲淳曰誤也朮性溫而燥善閉氣故滯下家忌之郎君陰虛人也尤非所宜更以滑石一兩為細末以牡丹皮汁煮之別以白芍藥酒炒五錢炙甘草錢炒黑乾薑五分水煎調滑石末服之須臾小便如注痛立止

秦公蕃病痢醫誤投澁劑一服痢止濕熱無自而出遍攻肢體骨節間以致項強目赤肩背臍膝足脛俱發腫痛甚不能轉側仲淳疏方寄之用白芍藥石斛牛膝木瓜黃檗薏苡仁炙甘草車前子茯苓痛雖止尚不能轉側更用蒺藜菊花何首烏胡麻黃檗炙甘草復逾年愈其始病時一醫稍投參术痛極欲死此

係本證陰虛有火又加濕熱暑濕交攻故現此證名痢風陰虛火多故不受補又不宜燥惟微寒清平之劑調之久之自愈

凡治滯下與大腸滑泄自利不止不同滑泄自利不止有可澁之道故古人有間用罌粟殼及訶梨勒以止其滑泄若夫滯下本屬濕熱濇滯不行法宜疏利藥忌兜澁大腸者肺之腑也大腸既有濕熱留滯則肺家亦必有熱肺乃華蓋之藏經曰脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱是肺氣喜通利惡閉澁故古人藥性中每云利肺氣其意槩可見巳倘誤用罌

米殼訶利勒使濕熱無所宣洩肺氣不得下行非惟滯下增劇濕熱熏蒸上干乎肺則脹悶氣逆不得眠不思食諸證至矣○又有久嗽不愈緣於肺虛有火法當清肺潤肺忌用澁燥閉氣之藥設若誤用粟殼訶子俾火壅於肺不得下降若兼參术半夏即死不旋踵矣世醫往往蹈此覆轍相尋卒無悟者聊為論著敢告方來

已上瘧痢二門諸方皆仲淳斟酌所定因證加減與時消息可謂詳且盡矣然不盡用方書所載投之輒効百不爽一藎獨闢門戶者也

脾胃

黃病有積神方　一平頭試之神驗

蒼朮炒　厚朴薑汁炒　橘紅　甘草　山查肉　白茯苓　麥芽各一兩　檳榔一兩　綠礬一兩五錢火煆研細　為末棗肉丸如梧子大每服一錢白湯吞日三服凡服礬者忌食蕎麥河豚犯之即死

治老人傷冷食及難化之物

生薑或紫蘇煎湯置浴鍋內令病者乘熱浸湯內以熱手揉心胃肚腹氣通食化矣

又方

蘄艾灸胃脘并肚氣從口鼻出立愈

治胃脘痛屬火證者　一女婢患此數十年一劑良已

橘紅　淡豆豉　山梔仁炒黑各三錢　生薑五片　枳殼錢　木一鍾半煎七分服

又治胃脘痛　仲淳療瑀册方

橘紅二錢　白豆蔻仁五分　香附童便炒忌鐵二錢　延胡索醋煮切片　紅麴金黃色者良二錢五分　白芍藥酒炒一錢　甘草炙四分　白茯苓三錢　白木香五分磨汁入煎藥內　紫蘇子研二錢　紫蘇梗二錢　河水二鍾煎一鍾不拘時服豆蔻仁磨之下藥

又方　口渴肩骨疼酸痛不能飲食者神效
真紫蘇子（隔紙焙研細）橘紅　白茯苓（各三錢）竹茹（二錢）白芍藥（酒炒四錢）木瓜（忌鐵三錢）石斛（酒蒸三錢）酸棗仁（炒爆研四錢）麥門冬（五錢）甘草（五分）白荳蔻仁（四分嚼下）先饑時服
治胃中有痰欲吐　陳潛齋傳
廣橘紅　瓜蔞仁（各一兩）薑汁竹瀝和丸梧子大食後服
治脾經痰飲五更咳嗽喉中如有物咽之不下服之甚驗　仲淳立
白茯苓（四兩）蘇子（另研如泥入藥同搗三兩）白荳蔻仁（七錢）貝母（去心三兩）

栝蔞根（三兩）薄荷葉（一兩五錢）連翹（三兩）硼砂（另研如粉七錢）廣橘紅（四兩）麥門冬（去心三兩）貓兒殘葉（六兩）山查肉（三兩）麥芽（炒取淨麪二兩）（一兩五錢）神麴（炒一兩五錢出浙江）霞天膏麴（四兩）枇杷葉（四兩）為極細末懷山藥粉糊和丸如麻子大白湯吞三四錢
治痰嗽吐不已胸膈有冷物上塞飲熱湯稍下
橘紅　白茯苓　蘇子（研細）瓜蔞仁（蛤粉拌炒各一錢）半夏（薑汁炙）遠志（去心甘草汁浸蒸一錢五分）白荳蔻仁（五分）吳茱萸（湯泡去梗一錢）河水二鍾半煎八分饑時服加薑汁五匙竹瀝一杯
化痰生津噙化丸　治膠痰不治陰虛痰火

五倍子揀粗大者安大鉢頭內用煮糯米粥湯浸蓋好安靜處七日後常看待發芽黃金色又出黑毛然後將箸試之若透內無硬即收入粗瓦鉢中擂如醬連鉢日中晒至上皮乾了又擂勻又晒晒至可丸方丸彈子大晒乾收用其味甘酸能生津化痰

治痰

用樞木葉搗煎湯不時呷漸漸痰少兼治膈氣嘔吐
趙太學文度頑痰積血仲淳以霞天膏加化痰消瘀之劑治之而愈

痰厥

金壇庠友張遂甫內人方食時觸暴怒忽仆地氣遂絕延一醫視之用皂角灰吹鼻中不嚏用湯藥灌些不受延至午夜謂必不治醫告去遂甫急叩莊一生一生過視之六脈尚全而右氣口沉伏細尋之滑甚曰此肝木之氣逆衝入胃胃中素有痰致痰夾食閉胃口氣不得行而暴絕也但歷時久湯藥不入矣急宜吐之可活所謂木鬱則達之也亟令覆其身垂首向床下以鵝翎蘸桐油啓齒探入喉中展捎引吐出痰與食纔一口氣便稍通再探吐至兩三口便覺油臭以手推翎但不能言一生曰無妨矣知其體怯不

宜多吐急煎枳橘推蕩之藥灌之盡劑而甦後以平
肝和胃藥調理數劑復故此因恭怒怒則氣上逆痰
因氣壅故現斯證耳所謂尸厥也治厥往往有誤予
故表其證以示後來云

飲

飲與痰不同痰膠黏而飲惟水治法亦異飲雖有五
總之或緣飲酒過多酒後發渴多飲茶湯或好飲冷
酒或因天暑煩渴多飲凉水及氷因酒而得者則多
濕熱因飲冷而得者則多寒濕或因鬱而得者則屬
木氣侵脾藥亦小有不同要以降氣燥濕散鬱健脾

行水爲宗乃治法之要領也

方

半夏薑汁製炒四兩 廣陳皮去白四兩 白茯苓四兩 猪苓二兩 澤瀉米泔浸炒二兩 旋復花三兩 厚朴薑汁炒一兩五錢 白朮土炒二兩 枳實麩炒一兩 人參一兩 酒濕者加川黃連一兩 木香五錢 寒濕者加蒼朮二兩 木香五錢 白豆蔻五錢 因鬱者加紫蘇四兩 [illegible]

右爲細末稀米糊入薑汁和丸如菉豆大每五錢淡
薑湯下連進三服空心饑時皆可服如卒急不及治
丸取二十倍中一倍作湯入豆蔻仁末木香汁一匙汁

和飲亦立効

丹陽賀文學字十內人因作家勞鬱患飲證每發吐
嘔不已腸如欲出所吐俱清水動以盆桶計日夜不
止不思飲食就醫金壇諸醫以健脾行氣理鬱清痰
藥投之愈劇困頓待斃字十計無復之矣適予偶從
茗上來莊歛之與字十媚戚也向余語故余即與歛
之偕往視脈審證知爲飲無疑乃用前方加人參三
錢[illegible]劑吐止再劑霍然隨啖粥糜脾氣[illegible]復至今每
病作檢余方服之即平

雲間康孟脩患寒熱不食久之勢甚危以治寒熱劑
投不應偶檢方書與王字泰議投五飲丸立瘥蓋飲
證原有作寒熱之條故治飲病自去矣

治痺方 李上舍大復傳

真茅山蒼朮十觔洗淨先以米泔浸三宿用蜜酒浸
一宿去皮用黑荳一層拌蒼朮一層蒸二次再用蜜
酒蒸一次用河水砂鍋內熬濃汁去渣隔湯煮滴水
成珠爲度每膏一觔和煉蜜一觔白湯調服
一老人專用此方八十餘身輕蹻捷甚於少年
蘄州何刺史年七十餘守桐川飲啗過少年叩其故
口平生服蒼朮丸每日數錢

眞茅山蒼术四觔如法洗浸去皮切片以桑椹懷生地何首烏各一觔熬濃汁至無味而止去渣濾清下蒼术浸之晒乾復浸汁盡爲度細末又以人乳拌勻晒乾數次約重數兩煉蜜爲丸白湯或酒吞

治蠱脹由于脾虛有濕

黃司冦葵峰中年病蠱得異方乃眞茅山蒼术末也每清晨米飲調三錢服不數月強健如故終身止服术七十餘終少停疾作矣

又方

通血香一錢取小葫蘆一個不去子膜入香在內再入

煮酒仍以所開之蓋合縫封之以酒入鍋懸葫蘆酒中挨定不可傾側蓋鍋密煮以三炷線香爲率煮時其香透達墻屋外煮完取葫蘆內子膜并藥烘乾共爲細末每服一錢空心酒送下間五日服一錢服盡葫蘆內藥約有五六錢之數病已釋然矣通血香陝西羊㺀客人帶來蘇杭有

又方

徐文江夫人病蠱脹張漣水治之百藥不効張曰計窮矣記昔年西山有一嫗患此意其必死後過復見之云遇一方上人得生徐如言訪嫗果在也問其方以陳葫蘆一枚去頂入酒以竹筯鬆其子仍用頂封固重湯煮數沸去子飲酒盡一吐幾死吐後腹漸寬調理漸愈蓋元氣有餘而有痰飲者也若腎虛脾弱者宜用金匱腎氣丸十全大補湯去當歸加車前子肉桂

沈孝道觀察中年無子患中滿蠱脹勢孔棘靜養郭外小園中翛然獨坐獨宿食淡者五年歸脾湯六味地黃丸朝暮間服不輟連舉二子

鎮峯常務遠目黃脾氣弱仲淳疏方用

山茵陳三錢 人參一錢 薏仁一錢 蓮肉一錢 木通八分 黃連一錢炒

一錢 山梔仁八分炒 白朮一錢土炒 石斛三錢酒蒸 皆治疸之劑以事冗未服既而身目皆黃小便亦赤乃服仲淳先見飲前藥稍愈一按摩者投以草汁藥酒脾敗遂不起臨沒下瘀血數升亦蓄血證也以其年邁不經慾故留前方尚有茯苓二錢

施靈修乃兄七年前曾患疸症服草藥愈後復發坐多氣多勞故草藥不效服田螺發脹一日夜大作寒熱因發渴小便如油眼目黃且赤手足黃紫仲淳以關血發黃服後藥大小便通黃及渴俱減

橘紅一錢五分 紅麴二錢炒研 山查肉一錢五分 鬱金汁十匙 十五 薏苡仁 錢

木瓜(忌鐵二錢)牛膝(去蘆酒蒸五錢五分)麥門冬(去心五錢)車前子(二錢五分)
赤茯苓(一錢)川通草(五分)白芍藥(酒炒四錢)竹茹(二錢)河水二鍾
煎八分饑時服三日後加人參三錢
孫侯居比部病腹中若有癥瘕不食不眠煩懣身熱
仲淳投以人參芍藥茯苓麥門冬木通棗仁石斛方
甫具史鶴亭太史至見方中有大劑人參駭曰向因
投參至劇此得無謬乎仲淳曰病勢先後不同當時
邪未退滯未消故不宜今病久飽脹煩悶者氣不歸
元也不食者脾元虛也不眠而煩者內熱津液少也
今宜亟用此藥矣四劑而瘳後復病仲淳脉之曰此
陰虛也非前證矣更以麥門冬白芍藥甘枸杞五味
子生地黃車前子而熱遂退

神効沉香丸又名聚寶丹

眞沉香(二錢)眞麝香(八分)血竭(一錢五分)乳香(一錢五分)宿砂仁(一錢)
木香(二錢)玄胡索(一錢)沒藥(五分)細末糯米糊丸如彈子大
用辰砂(一錢五分)爲衣男子嘈胃嘔吐飲食不通此是
胃脘寒痰結阻諸醫無効屢試神驗燒酒磨服男婦
腹痛諸氣作痛産後血氣攻心用陳酒磨服如熱氣
痛葱湯嚼下小兒天弔作痛啼叫不已葱湯磨服

廣筆記

洩瀉

天地之間動靜云爲者無非氣也人身之內轉運升
降者亦氣也天地之氣不和則山川爲之崩竭人身
之氣不調則腸胃失其轉輸外則風寒暑濕之交侵
內則飲食勞倦之不節腸胃因之而變此洩瀉之由
也致疾之端匪一治療之法自殊經云春傷於風夏
生飧泄春者木令風爲木氣其傷人也必土臟受之
又風爲陽邪其性急速故其泄必完穀不化洞注而
有聲風之化也古之所謂洞風是也宜先以風藥發
散升舉之次用參芪白朮茯苓大棗甘草肉桂等藥
以制肝實脾芍藥甘草乃始終必用之劑傷暑作瀉
必暴注大孔作痛火性急速失於傳送也口多渴小
便多赤或不利身多發熱瀉後則無氣以動熱傷氣
也清暑用十味香薷飲清暑益氣湯內虛之人中氣
不足用六和湯不止用黃連理中湯或加減桂苓甘
露飲腎泄者難經所謂大瘕泄也好色而加之飲食
不節者多能致此其泄多於五更或天明上午溏而
弗甚累年弗瘳服補脾胃藥多不應此其候也夫脾
胃受納水穀必藉腎間眞陽之氣熏蒸鼓動然後能

腐熟而消化之腎臟一虛陽火不應此火乃先天之
眞氣丹溪所謂人非此火不能有生者也治宜益火
之原當以四神丸加人參沉香甚者加熟附茴香川
椒
又有醉飽行房腎氣虛乏濕熱乘之下流客腎久泄
不止治宜升陽除濕次用八味丸加山藥茯苓地黃
減半
腎司二便久泄不止下多亡陰當求責腎破故子肉
豆蔻茴香五味子之屬不可廢也白朮陳皮雖云健
胃除濕救標則可多服反能瀉脾以其燥能損津液

故耳
長夏濕熱令行又歲濕太過民多病泄當專以風藥
如羌活防風升麻柴胡白芷之屬必二三劑緣除風
能勝濕故也
泄而少食胃弱故也人參爲君稨豆橘皮佐之
泄而食不消縮砂人參肉豆蔻
泄而腹痛白芍藥炙甘草防風木香
泄而氣弱乾葛人參白朮白茯苓
泄而小水不利車前子木通 中焦有濕熱者宜用猪苓澤瀉
肉積作瀉用肉豆蔻山查蒜

麪積作瀉蘿蔔子
感寒而瀉理中湯加紫蘇
濕痰作瀉半夏白朮茯苓爲君神麴爲佐
九製黃連最能止瀉須與人參等分適可蓋久瀉不
止多緣氣虛純用苦寒胃氣愈閉又下多亡陰必用
人參亦陽生陰長之意也

脾腎雙補丸 治腎泄

人參去蘆一斤 蓮肉去心每粒分作八塊小刀炒黃一斤 菟絲子如法另末一斤半
五味子一斤蜜蒸烘乾 山茱萸肉一斤揀鮮紅肉厚者去核烘乾一斤 眞懷山
藥一斤炒黃 車前子米泔淘淨炒十二兩 肉豆蔻十兩 橘紅六兩 砂仁六兩炒香最後入

巴戟天十二兩甘草汁煮去骨 補骨脂圓而黑色者佳鹽水拌炒研末一斤
爲細末煉蜜和丸如菉豆大每五錢空心饑時各一
服 如虛而有火者火盛肺熱者去人參肉豆蔻巴
戟天補骨脂 忌羊肉羊血
梁溪一女人茹素患內熱每食腸鳴清晨大瘕泄脾
腎雙補丸內去肉豆蔻以白芍藥代之外加白稨豆
十二兩立愈
無錫秦公安患中氣虛不能食食亦難化時作泄胸
膈不寬一醫誤投枳殼青皮等破氣藥下利完穀不
止面色黯白仲淳用人參四錢 白朮二錢 橘紅一錢 乾薑七分炮

分甘草炙錢 大棗肉豆蔻四五劑漸愈後加參至兩
許全愈三年病寒熱不思食他醫以前病因參得愈
仍投以參病轉劇仲淳至曰此陰虛也不宜參乃用
麥門冬五味子牛膝枸杞芍藥茯苓石斛酸棗仁鱉
甲等十餘劑愈
從妹患泄後虛弱腹脹不食季父延諸醫療之予偶
問疾見其用二陳湯及枳殼山查等味予曰請一看
病者見其向內卧眠兩手置一處不復動曰元氣虛
甚矣法宜用理中湯恐食積未盡進以人參三錢橘
紅二錢加薑汁竹瀝數匙夜半思粥稍思頓活季父

大喜盡謝諸醫再以六君子湯加山查肉砂仁麥門
冬調理之數劑立起

治腹痛作泄（予患腹痛泄日十餘度仲淳以一劑止之）

人參（二錢五分） 蒼朮（米泔浸炒三錢） 黃連（薑汁炒一錢） 北五味（蜜炙一錢）
橘紅（一錢五分） 肉豆蔻（一錢） 吳茱萸（泡湯） 白茯苓（各一錢） 藿香（五分）

莊斂之平日素壯實善啖丁巳四月忽患泄瀉凡一
應藥粥蔬菜入喉覺如針刺下咽[illegible]腹絞
辣隨覺腹中有氣先從左升次即右升氣氤遶腹即
欲如廁彈響大泄糞門恍如火灼一陣甫畢一陣繼
之更番轉廁逾時方得離側諦視所泄俱清水盈器

白脂上浮藥粥及蔬菜俱不化而出甚至夢中大遺
了不收攝諸醫或云停滯或云受暑或云中寒百藥
雜投竟如沃石約月餘大肉盡脫束手待斃之有
孀母朝夕相視哀號呼天恨不以身代也余於仲夏
末偶過金壇診其脉洪大而數知其爲火熱所生病
爲疏一方用川黃連三錢白芍藥五錢橘紅二錢車
前子三錢白扁豆三錢白茯苓三錢石斛三錢炙甘
草一錢視其煎成將井水澄冷加童便一杯始服臨
別再三叮嚀云此方勿出以示人恐時師見之大笑
不已也若爲躯命計須堅信服之耳斂之却衆醫下

鍵煎服藥方入喉恍如飲薄荷汁隱隱沁入心脾腹
中似別成一清凉世界甫一劑夜卧達旦洞瀉頓止
連服三劑大便已實前泄時藥粥等物凡溫者下咽
腹中遂覺氣升即欲大解一切俱以冷進方快家人
日以爲常至是啖之覺惡心畏冷旋易以溫始相安
余曰此火退之徵也前方加人參二錢半蓮肉四十
粒紅麴一錢五分黃耆三錢升麻五分黃連減半五
六劑後余將返長興斂之持方求余加減余曰此已
試効方宜固守多服但去升麻可耳越月餘余再過
金壇斂之頻顧向余曰自先生去後守方煎服幾三

十餘劑矣今瀉久止而脾氣困頓不知饑飽且稍飲茶湯覺腸滿急脹如欲寸裂柰何余曰大瀉之後是下多亡陰也法宜用補倘此時輕聽盲師妄用香燥諸藥取快暫時元氣受傷必致變成蠱脹即不救矣復爲疏一丸方人參五兩白芍藥六兩炙甘草一兩五味子六兩綿黃耆五兩山茱萸肉五兩懷山藥五兩熟地黃八兩牛膝六兩紫河車二具蜜丸空心饑時各一服而日令進前湯液方飲之相信甚力堅守二方服幾三年脾胃始知饑而嗜食四體亦漸豐矣飲之恒對余言每遇脾胃不和時或作瀉覺腹中有

火則用黃連否則去之一照余方修治煎服泄遂止而脾頓醒迄今以余所疏方儼如重寶十襲珍藏謂余不啻起死而生之也其病初平後余勸其絶慾年餘欲之因出妾得盡發家人私誅乃知向之暴泄由中巴豆毒本草中巴豆毒者用黃連冷水解之余用大劑黃連澄冷方服政爲對治向使如俗醫所疑停滯受寒中暑法治之何啻千里即信爲是火而時師所投黃連不過七八分至錢許止矣況一月之瀉未有不疑爲虛寒者用黃連至四錢此俗醫所必不解也向余覘其勿出以示人爲是故歟始知察脈施治

貴在合法神而明之存乎其人耳

余治飲之瀉止後恐其元氣下陷急宜升舉用升麻以提之初不知其爲中毒也乃因用升麻太早致濁氣混干上焦胸中時覺似辣非辣似嘈非嘈迷悶之狀不可名狀有時滴酒入腹或啖一切菜物稍辛溫者更寬苦不勝莊一生知其故曰此病在上焦湯液入口即下注恐未易奏功宜以噙化丸治之用貝母五錢苦參一兩真龍腦薄荷葉二錢沉香四錢人參五錢爲極細末蜜丸如彈子大午食後臨卧時各噙化一丸甫四丸胸中恍如有物推下三年所苦一朝

若失

治泄瀉在陽明胃太陰脾經者

白茯苓三錢 白朮炒二錢 炙甘草一錢 車前子炒三錢 陳皮二錢 升麻五分 乾葛一錢 薑三片 大砂仁炒一錢 川黃連薑汁炒一錢五分如無酒蒸者去之 河水二鍾加棗肉二枚饑時服

治大便不通 張選卿傳驗

硃砂研如飛麪五錢 真蘆薈研細七錢 滴好酒少許和丸每服一錢二分好酒吞朝服暮通暮服朝通須天時晴合爲妙

唐震山年七十餘大便燥結胸中作悶仲淳曰此血

液枯槁之候用
大肉蓯蓉三兩白酒浸洗去鱗甲切片 白湯三碗煎一碗頓飲飲竟大便通胸中快然偶一醫問疾曰此劫藥也當調補脾胃爲主易以白朮厚朴茯苓陳皮病如故唐翁曰誤矣仍飲前藥立解爲余之問而叩其故仲淳曰肉蓯蓉峻補精血驟用之反動大便藥性載甚明也

虛弱

天王補心丹 陳練塘先生得自鐙洞中

寧心保神益氣固精壯力強志令人不忘清三焦化痰涎去煩熱除驚悸療咽乾養育心神

人參 懷山藥堅白者 麥門冬去心 當歸身酒洗各一兩 懷生地 天門冬去心各一兩三錢三分 丹參去黃皮八錢 百部去土去蘆 白茯神去粗皮堅白者良 石菖蒲去毛 柏子仁去油者佳另研 甘草長流水潤炙 北五味去梗者 杜仲以上七味各六錢六分 遠志三錢三分 白茯苓一兩五錢四分 淨末煉蜜丸如彈重一錢硃砂一兩研極細爲衣食遠臨臥時噙化後飲燈心湯一小杯

加味六味地黃丸 滋陰固精明目不寒不熱和平之劑久服延年

懷生地如法製八兩 懷山藥四兩 白茯苓堅白者四兩人乳拌曬乾又拌多次更妙 山茱萸去核四兩 牡丹皮三兩 麥門冬去心六兩 澤瀉原方三兩因目疾減半 甘菊花苦者不用六兩 甘枸杞去蒂六兩 北五味去梗者六兩 細末蜜丸如梧子大空心淡鹽湯服四錢

又方加白蒺藜炒去刺五兩

治目疾久不愈

天王補心丸臨臥服加味六味地黃丸空心服症甚者地黃丸加紫河車一具酒洗極淨磁礶內酒煮極

爛搗如泥或焙乾爲末 二方朝夕並進久久自効

世醫治目多補腎不知補心心君火也

治虛眼方

枸杞子 生地 麥門冬各三錢 龍膽草一錢下焦無濕熱者勿用

水二鍾煎七分半餞溫服如脾氣不佳加白豆蔻末五六分

治肝腎二經目疾 從父病後眼花服此立愈

眞甘枸杞一斤去蒂 眞懷生地黃一斤揀肥大者酒洗淨 河水砂鍋內熬膏以無味爲度去渣重湯煮滴水成珠便成膏也每膏一斤入煉蜜六兩空心白湯化下

又丸方仲淳立

眞甘枸杞一斤 甘菊花去蒂一斤 白蒺藜炒去刺一斤 細末煉蜜丸梧子大每四五錢空心白湯吞入地黃斤許更妙

黃學諭潛白患風淚眼每出則流淚殆頻仲淳疏一方寄之穀精草爲君蒺藜和枸杞之屬佐之羊肝爲丸不終劑愈

治不眠以清心火爲第一義

麥門冬五錢 茯神 丹參 沙參各三錢 竹茹二錢 炙甘草一錢 竹葉六十片 石斛酒蒸三錢 遠志一錢 生地四錢 棗仁炒五錢 五味子八分 有痰者加竹瀝

烏鬚明目丸脾胃不佳者去槐角子仲淳立

女貞實酒拌九蒸九曬淨末一斤 甘菊花十二兩 何首烏赤白各半淨二斤如法蒸曬 桑葉一斤 牛膝酒蒸一斤 懷生地酒洗淨二斤 甘枸杞去枯者一斤 乳拌茯苓酥一斤 麥門冬去心一斤半 槐角子十兩 蒼术蜜酒拌蒸曬十二兩 人參人乳拌烘乾一斤 山茱萸肉酒蒸十二兩 烏飯子之黑者取汁熬膏每斤加煉蜜半斤丸如梧子大每日三服服五錢白湯吞忌白菜菔牛肉牛乳蒜桃李雀蛤

補心腎久服輕身延年 仲淳定有熱人宜之

頭桑葉九蒸九曬一斤 黑芝蔴九蒸九曬一斤 甘菊花去蒂八兩 何首烏一斤 甘枸杞一斤 白蒺藜炒去刺末一斤 另女貞實酒拌九蒸九曬一斤 細末煉蜜丸梧子大白湯或酒服

補虛丸方 許廓如丈傳服之有奇驗

綿花子仁一斤 補骨脂四兩 白茯苓二兩 沒藥二兩 煉蜜丸如梧子空心淡鹽湯服

凉血去濕補陰益氣丸予服之甚驗 仲淳立

眞茅山蒼术二斤 懷生地酒洗一斤 甘菊花一斤 車前子米泔浸八兩 人參八兩 牛膝八兩 白茯苓八兩人乳拌積粉至一斤 天門冬熬膏和丸

治虛弱陰精不足

白茯苓一觔拌人乳 另將童便重湯頓溫取壯盛
女子月經布一二個洗入便內拌入茯苓粉晒乾將
茯苓粉再磨加鹿角膠四兩酒化同煉蜜丸如梧子大
空心服白湯吞三錢服久痰從大便出

又方前方

加熟地黃半觔蓯蓉八兩鹿角膠四兩黃蘗四兩菟絲子半觔砂
仁二兩

養陰凉血補心滋腎丸 予長兒久服此有驗

麥門冬六兩鱉甲六兩五味子六兩懷生地黃八兩山茱萸四兩
牡丹皮三兩白茯苓三兩 人乳拌至六兩 天門冬四兩杜仲去皮切片
鹽炙黃蘗四兩砂仁二兩甘草一兩懷山藥四兩栢子仁八兩揀淨
酒蒸另研細如泥 車前子二兩菟絲子八兩枸杞子八兩去梗者遠
志肉二兩牛膝四兩煉蜜為丸空心白湯服五錢仲淳定

集靈方 出內府補心腎益氣血延年益壽

人參 枸杞 牛膝酒蒸 天門冬去心 麥門冬去心 懷生地
黃 懷熟地黃一斤各 河水砂鍋熬膏如法加煉蜜
白湯或酒調服

通真延齡丹

五味子三觔山茱萸二觔菟絲子二觔砂仁一觔車前子一觔巴
戟天一觔甘菊花二觔枸杞子三觔生地黃三觔熟地黃三觔狗

脊四觔懷山藥二觔天門冬一觔麥門冬二觔栢子仁一觔鹿角
霜二觔鹿角膠四觔人參二觔黃蘗一觔半杜仲一觔半肉蓯蓉
三觔覆盆子一觔沒食子一觔紫河車十具何首烏四觔牛膝三觔
補骨脂一觔胡桃肉二觔鹿茸一觔沙苑蒺藜四觔 二觔
膠粉打糊為末同栢子仁胡桃肉泥蒺藜糊酒化鹿角膠
煉蜜和丸如梧子大每服五錢空心饑時各一服龍
眼湯吞有火者不可服

夢遺封髓丹

黃蘗去皮蜜炙半觔砂仁四兩入藥末中甘草二兩山藥糊為丸
加遠志肉去心甘草汁煮二兩猪苓一兩白茯苓一兩五錢蓮鬚二兩山
茱萸二兩北五味去梗者二兩五錢 名太封髓丹出醫壘元戎
仲淳屢用之驗

種子方 兄傳自高

沙苑蒺藜八兩 川續斷二兩菟絲子
山茱萸肉 芡實粉 蓮鬚各四兩 覆盆子
甘枸杞子 煎末以蒺藜膏同煉蜜和丸如梧子
大每服四五錢空腹鹽湯下有火者宜服此兼治夢
遺

又方 此方仲淳傳自江右鄧醫官

與合州補骨脂一觔 以食鹽四兩入滚湯乘熱浸一

宿晒乾次用杜仲去皮酒炒去絲四兩煎濃湯浸一宿晒乾次用厚黃蘗去皮蜜炙四兩煎濃湯浸一宿晒乾別用魚膠四兩剪碎以蛤粉炒成珠同補骨脂炒香磨細末將胡桃肉搗如泥盛以錫盆蒸之取油和末量加蜜搗和丸如梧子大空心用三錢白湯或淡鹽湯吞晚間或錢半時更一服老年人及陽虛無火者宜此有火者忌之

種子奇方

栢子仁去油者酒浸一宿炒鑄上蒸搗爛如泥 鮮鹿茸火燎去毛酥炙透切帶血者宜慢火防其皮破血走也切片為末 等分和栢子仁泥搗極勻加煉蜜丸如梧子大每服空心三錢淡鹽湯吞

補腎健脾益氣方　朱鶴山老年久患腹痛日服一劑強健再生子八十未艾

白茯苓三錢 枸杞子兩 懷生地二錢 麥門冬五錢 人參二錢 陳皮二錢 白朮錢 河水二鍾煎八分

高存之長郎患腹痛仲淳問曰按之痛更甚否曰按之則痛緩仲淳曰此虛症也即以人參等藥飲之數劑不愈但藥入口則痛止其痛每以卯時發待藥漸安至午痛復發又進再煎而安近晚再發又進三劑而安睡則不復痛矣如是者月餘存之疑之更他醫藥則痛愈甚藥入痛不止矣以是服仲淳方不疑一年後漸愈服藥六百劑全瘥

人參三錢 白芍藥二錢 炙甘草錢 橘紅一錢五分 後加木瓜一錢 麥門冬二錢 當歸身二錢

又重定方

人參四錢 白芍藥二錢 麥門冬二錢 甘草一錢五分 當歸二錢 枸杞子二錢 山茱萸肉二錢 木瓜二錢 黃蘗一錢五分 鱉甲二錢 又以鹿角膠間服又以飲食少時惡心去當歸黃蘗加牛膝二錢 秦艽一錢五分 石斛二錢 酸棗仁二錢 延胡索錢

丸方

鱉甲 北五味 白芍藥各四兩 當歸身五錢 麥門冬

牛膝 黃蘗鹽炙 枸杞各四兩 炙甘草二兩 川續斷酒洗三兩 杜仲鹽炙二兩 懷熟地五兩 山茱萸肉四兩 白茯苓三兩 車前子二兩五錢 懷山藥炒二兩 人參四兩人乳浸 天門冬去心四兩 鹿角膠四兩 煉蜜丸每服四錢

高存之長郎兩年腹痛愈後又患臂痛每發一處輒於手臂指屈伸之間腫痛不可忍三四日方愈痛時在手即不能動仲淳曰此即前痛之係虛火移走爲害也立丸方凡四五更定服至此方全愈

治臂痛方

懷生地黃一斤 牡丹皮用酒原浸皆良酒洗各六兩 山茱萸肉八兩 白茯

苓（爲末水飛去筋膜蒸晒再以人乳拌晒數次六兩）山藥（八兩切片炒）澤瀉（米泔浸切片炒六兩）天門冬（去心酒蒸烘燥六兩）麥門冬（去心烘燥八兩）五味子（如法烘乾六兩）牛膝（酒蒸八兩）黃蘗（切片蜜拌炒褐色八兩）枸杞子（去枯者及蒂八兩）砂仁（炒二兩）甘菊花（八兩）何首烏（一斤）虎前脛骨（二對酒蒸三日酥炙透）白茯苓（去皮炒十兩）菟絲子（二兩）爲細末煉蜜丸如梧子大每服五錢空心白湯下

高存之婿蒲生氣上逆每飯下一二口輒噯氣數十口再飯再噯食頃三四作仲淳曰此氣不歸元中焦不運也每劑須人參（一錢）不信服他醫快氣藥愈甚逾二三月仲淳云今須參（四錢）矣不信又逾二三月仲淳云今須參（六錢）矣不信又逾月飲食不下每噯冷氣如團而出上下氣不屬分必死存之坐其家迫令服仲淳藥服首劑不動服再煎不動然亦不如他湯藥輒噯也服三煎忽心口下如爆一聲上則噯氣下則小遺無筭上下洞然卽索粥頓食三四盌不上逆也服五六劑減參二錢噯逆復作復用六錢而安一月後方減參二錢服半年全愈

人參（六錢）麥門冬（三錢）五味子（二錢）橘紅（一錢）砂仁（一錢）白芍藥（二錢）角沉香（五分）益智仁（一錢五分）山茱萸肉（三錢）真蘇子（二錢）枇杷葉（二大片）水煎臨服加沉香汁十五匙逆水蘆根汁

一大盞又十倍爲末山藥糊丸空心白湯吞

陸祚先乃正咳嗽飽脹痰喘水火不通眠食俱廢人參（君）白芍藥（君）蘇子（炒研極細佐）枇杷葉（二大片）白茯苓（佐）二服得眠大小便通啖粥

顧仲恭心腎不交先因失意久鬱及平日勞心致心血耗散去歲十月患[illegible]尚未離床忽左足五指麻冷後已至膝便不省人事良久而甦乍醒乍迷一日夜十餘次醫者咸云痰厥仲淳云純是虛火服丸藥一劑今春覺體稍健至四月後丸藥不繼而房事稍過至六月初十偶出門前症復發扶歸良久方醒是日止發一次過六日天雨稍感寒氣前症又發二次見今兩足無力畏寒之甚自腹以上不畏寒仲淳云大之五臟各有致病之由謹而察之自不爽也夫志意不遂則心病房勞不節則腎病心腎交病則陰陽將離離則大病必作以二臟不交故也法當清熱補心降氣豁痰以治其上益精強腎滋陰增志以治其下則病本必拔蓋心藏神腎藏精與志故也平居應獨處曠野與道流韻士討論離欲之道根極性命之源使心境清寧斷離愛染則精念不起真精自固陰陽互攝而形神調適矣

暫服湯液方

貝母二錢 白茯苓三錢 遠志肉一錢五分 酸棗仁二錢五 蘇子二錢 石
斛一錢 麥門冬五錢 甘草五分炙 木瓜三錢 牛膝八錢 石菖蒲一錢
人乳和童便各一錢 水二鍾煎八分調入牛黃末一分 天竺黃末
二分 竹瀝一大杯臨臥饑時各一服三劑後加人參五錢
枇杷葉三片 調入牛黃一分 天竺黃三分 霞天膏五錢

丸方

遠志肉 天門冬 麥門冬 白茯神 白茯苓人乳
拌晒各六兩 棗仁八兩 杜仲八兩酒 懷生地八兩 白芍藥六兩 甘草蜜炙
二兩五錢 川黃檗六兩 牛膝六兩 五味子六兩 蜜丸如梧子大每

空心服五錢臨臥六錢石斛湯加竹瀝送下忌猪牛
羊肉 羊血 麵蒜 胡椒 鯉魚 牛乳 白萊
菔

一人年三十三歲因努力即發心腹飽滿疼痛
直至臍下皆板兩脇空鬆不可言腹寒即欲就
火火至稍𤸇痛止大便不通小便短縮似宿茶
日夜不斷至五週時飲食漸加時常舉發大約
性嗜酒善怒勞碌所致

當歸身五錢 牛膝四錢 麥門冬五錢 白芍藥五錢酒炒 炙甘草七分
五味子一錢 廣橘紅二錢 茅根五錢打碎 懷生地三錢 宜多食
韭菜童便胡桃肉

婁東王官壽患遺精聞婦人聲即泄瘠甚欲死醫告
術窮仲淳之門人以遠志為君蓮鬚石蓮子為臣龍
齒茯神沙苑蒺藜牡蠣為佐使丸服稍止然終不斷
仲淳於前方加鰾膠一味不終劑即愈

治腰痛

錢晉吾文學腰痛甚胗之氣鬱兼有傷瘀血停滯仲
淳投以

牛膝五錢 當歸身二錢五分 炙甘草一錢 紫蘇梗一錢五 加皮二錢
廣橘紅二錢 香附二錢童便炒 川續斷二錢 水二鍾煎八分

饑時加童便一大杯服二劑愈

又方

先外祖李思塘公少年患腰痛至不能坐立諸醫以
補腎藥療之不効朱遠齋者湖明醫也用潤字號丸
藥下之去黑糞數升蓋濕痰乘虛流入腎中作苦痰
去方以補藥滋腎不逾月起惜其方傳者不真

治盜汗予婦幼患此仲淳以一劑療之今二十餘年不發

黃耆蜜炙二錢 北五味二錢 酸棗仁五錢炒研 炙甘草一錢 麥門冬
五錢去心 人參三錢 白芍藥二錢酒炒 香附二錢童便浸炒 龍眼肉十枚

治噎

蘇子研細二錢 廣橘紅二錢五分 麥門冬去心五錢 白芍藥炒四錢 枇
杷葉去毛刷淨蜜炙三大片 山查肉三錢 白豆蔻仁四分研先下 人參
三錢 逆水蘆根汁一大盞 河水一鍾半 同蘆根汁煎至
八分 加薑汁三匙 竹瀝一杯 饑時服

治溺有餘瀝精不固

菟絲子淨半觔 牛膝與何首烏同蒸半觔淨 栢子仁去油者酒蒸另研如泥十
二兩 杜仲淨四兩 麥門冬去心六兩 枸杞六兩 北五味六兩 血鹿角
二斤 鹿茸去毛酥炙六兩 車前子米泔浸四兩 白茯苓多用人乳拌曬四兩 大
何首烏赤白各半黑豆蒸如法一觔 沒石子二兩 細末煉蜜丸如梧子
每服五錢空腹白湯吞

治鼻衄腸風腹脹便燥

麥門冬去心十兩 懷生地十兩 天門冬去心六兩 五味子去梗者四兩
鱉虱胡麻酒拌九蒸九曬去殼另研如泥十一兩 山茱萸肉六兩 白芍藥
八兩 當歸身五兩 砂仁炒二兩 紫蘇子六兩另研後入 煉蜜丸如梧
子大每五錢空心白湯吞

治腿酸足腫痛

牛膝去蘆酒蒸八兩 杜仲六兩 懷生地八兩蒸熟 甘枸杞八兩 山茱萸
肉六兩 五味子 黃檗各六兩 白茯苓三兩 砂仁二兩 細末煉
蜜丸如梧子大每五錢空心白湯吞皆仲淳定

補腎固精方

北五味如法爲細末每服以好酒下方寸匕久之來
可御女

治弱症吐血夜熱不眠腰痛 陳潛齋傳

紫河車一具男胎首生 自採側栢葉東南枝去梗陰乾四觔 將河
車入石臼內木杵輕輕搗漸下栢葉以極爛爲度起
置磁盆內砂鍋上蒸熟烈日曝乾如無日色或夏天
將栢葉攤成薄餅於磁盆上火烘乾研細末蜜丸如
梧子大空心淡鹽湯下五錢家叔久患腸風百藥不
効服此頓釋

久嗽噙化丸 仲淳定

真龍腦薄荷葉二兩九錢 百部酒浸去心二兩五錢 麥門冬去心二兩 天
門冬去心二兩 桑白皮蜜炙二兩 枇杷葉蜜炙三兩 貝母去心一兩 桔梗
米泔浸去蘆一兩 甘草蜜炙七錢 天花粉二兩 玄參一兩 北五味蜜炙一兩
款冬花蕋二兩 紫菀八錢 真柿霜二兩 橘紅一兩 極細末煉蜜
丸如彈子大不時噙化臨臥更佳

丁中父患目珠痛如欲墮胸脇及背如搥碎狀晝夜
咳嗽眠食俱廢自分不起促仲淳訣別仲淳曰何至
是耶令日進童便三大碗七日下黑血無數痛除咳
熱如故再投以二冬貝母蘇子橘紅白芍藥鱉甲青
蒿子桑根白皮五味子百部枇杷葉竹瀝童便久之

未痊太夫人及胞弟潤父疑其虚促用參耆仲淳不可潤父陰以黃耆二錢入前藥嘗之竟夕悶熱目不交睫始信仲淳不謬固守前方兼服噙化丸勿輟逾月平蓋中父病起于乃翁之變哀傷過甚更觸惱怒所致非虚也肺熱而實肝火上冲故不宜參耆爾

里中一童子年十五患寒熱咳嗽面赤鼻塞夜劇家人以為傷風仲淳視之曰陰虚也蓋傷風之證面色宜黯今反赤而明傷風發熱必晝夜無間今夜劇鼻塞者因虚則火上升壅肺故鼻塞以是知其陰虚也投以麥門冬五味桑皮貝母百部鱉甲生地黃沙參

不四劑瘳

臧儀部靜涵患氣喘自汗晝夜不眠食諸醫以外感治之病甚仲淳胗之曰此腎虚氣不歸元故火上浮喘汗交作脾虚故不思食亟以麥門冬五味子枸杞子滋陰斂肺以蘇子橘紅降氣消痰以芍藥酸棗仁茯苓補脾斂汗不數劑瘳

吐血三要法

宜行血不宜止血

血不行經絡者氣逆上壅也行血則血循經絡不止自止止之則血凝血凝則發熱惡食病日痼矣

宜補肝不宜伐肝

經曰五臟者藏精氣而不瀉者也肝為將軍之官主藏血吐血者肝失其職也養肝則肝氣平而血有所歸伐之則肝虚不能藏血血愈不止矣

宜降氣不宜降火

氣有餘即是火氣降即火降火降則氣不上升血

隨氣行無溢出上竅之患矣降火必用寒凉之劑反傷胃氣胃氣傷則脾不能統血血愈不能歸經矣今之療吐血者大患有二一則專用寒凉之味如芩連山梔四物湯黃蘗知母之類往往傷脾作泄以致不救一則專用人參肺熱還傷肺咳嗽愈甚亦有用參而愈者此是氣虚喘嗽氣屬陽不由陰虚火熾所致然亦百不一二也仲淳立論專以白芍藥炙甘草制肝枇杷葉麥門冬薄荷葉橘紅貝母清肺薏苡仁懷山藥養脾韭菜番降香真蘇子下氣青蒿鱉甲銀柴胡牡丹皮地骨皮補陰清

熟酸棗仁(炒研)白茯神(養心)山茱萸肉枸杞子(補腎)

予累試之輒驗然陰無驟補之法非多服藥不効病家欲速其功醫者張皇無主百藥雜試以致殞身覆轍相尋不悟悲夫(鬱金治吐血聖藥患無真者爾)

顧季昭患陰虛内熱仲淳云法當用甘寒不當用苦寒非百餘劑不可慎勿更吾方欲加減使吾徒累加增損可也果百劑而安

天門冬　麥門冬　桑白皮　貝母　枇杷葉(各二錢)
地骨皮(三錢)五味子(一錢)白芍藥(二錢)鱉甲(三錢)蘇子(研細二錢)車前子(二錢)

王司丞遜之患吐血仲淳診之云多服童便自愈别去貽書門人張選卿曰遜之旋已勿藥矣但相公年尊右手脉弱甚此非細故可致意遜之預爲計時文肅公尚無恙不兩月而遜之疾瘳文肅一病不起

加味六味地黃丸(治吐血遜之服之立起)

地黃(半觔)天門冬　麥門冬　牛膝　鱉甲　黃蘗
青蒿　五味子　橘紅　枇杷葉　懷山藥　山茱萸肉(各四兩)澤瀉　牡丹皮　白茯苓(各三兩)

煎方

蘇子(炒研二錢)枇杷葉(大二片)生地黃(三錢)廣陳皮(二錢)白芍藥(三錢)茅根(一兩)麥門冬(五錢)桑白皮(二錢)番降香(一錢二分血止去之)貝母(二錢)牛膝(四錢)鱉甲(四錢)甘草(一錢)天門冬(二錢)

治陰虛喉痛喉間血腥氣聲啞到此便難措手

麥門冬(三錢)天門冬(三錢)薄荷(八分)貝母(三錢)蘇子(研一錢)橘紅(一錢)炙甘草(一錢)百部(去心二錢)款冬花蕊(二錢)鱉甲(如法四錢)桑白皮(如法三錢)懷生地(三錢)河水二鍾煎八分加童便一杯饑時服

丸方

六味地黃丸中加鱉甲　天門冬　麥門冬　百部
五味子　真阿膠　各如山藥之數煉蜜丸每六錢

空心淡鹽湯吞饑時白滾湯吞(已上皆仲淳法)

莊舍之女患吐血歲常數發其平素善心計夜多竊思不寐凡細務必親戊午冬遂大發氣一上逆則吐血盈碗夜卧不寧醫者百藥雜投遷延至己未夏日夜不瞑目者凡七至後三日夜去血十七盂每盂約二碗餘湯飲不能咽纔一勺入口喘嗽數百聲不止血隨湧出第冷童便凉水稍能下時方盛暑兩足苦寒若氷着襪尚稱冷不已衆醫以爲勞心太過致傷心血動心火故血不能歸經心與腎不交故陰火逆上而水無以制之故喘急不已腎水原虛更當火

丸之令孤陰愈不足故足畏寒甚投以四物及止血凉血如犀角地黄黄檗山梔芩連蒲黄鬱金黒荆芥諸劑而血愈湧甚投以天王補心及大劑茯苓遠志酸棗仁圓眼諸藥而不寐如故衆醫袖手告技窮矣其族兄莊一生邑庠士不行醫深究醫理含之自抱痾來時過視之每節審其證復胗得其脉左右寸關俱有力而數幾七至右關浮沉鼓指特甚細尋之復帶滑兩寸並弦細而遲乃語其親兄欽之曰失血之脉當浮芤細弱腎脉當沉滑有力今並反之若作虛論是病脉不應不治必矣但陰極似陽脉雖強乂按

之必無神證宜嗽水不欲咽而喜飲温今並不然以愚見乃陽盛格陰於下爲極熱證非虛火也法當以大黄玄明粉導陽明之氣下降入陰其關脉帶滑食不下咽是氣逆時強飲食致血與痰夾食停滯不消更須少加枳實否則食閉陽明之氣亦不能下依此可活也欽之以其言商之衆醫悉咋舌稱怪謂此藥一下咽當洞瀉立斃又延一兩日勢危甚含之始自言等死耳吾甘以身聽兄所爲一生乃用生大黄酒洗五錢玄明粉五錢枳實三分欲入桂一分衆以盛夏不肯用一生云不用桂陽氣無嚮導後來難清楚

耳止以前三味長流水一碗煎數沸傾出入小薊汁二酒盃童便半碗和令亟服服下片時許不作瀉而足已温始去襪亦不大喘思飲食乃啜温糜一甌自是血雖來不大吐矣第目夜不寐如昔一生謂此非心經諸藥能愈甲乙經曰衛氣不得入於陰當留於陽陽盛陰虛故目不得瞑此之謂也治法飲以半夏湯一劑陰陽已通其卧立至蓋半夏得一陰之氣而枯所謂生於陽成於陰者故能引陽氣入於陰今吐血證半夏非所宜因思夏枯草亦生於陽而成於陰者爲血分之藥意惟此可以治之乃用夏枯草一兩

作甘爛水煮服覆杯而卧立至後血不復大吐第目有數口不斷陽明脉仍洪數而實不時齒痛咽痛口渴諸證雜見乃於凉血止血劑中加石膏兩許更間服大黄玄明粉至一月後始以大黄用韭汁浸九蒸九晒蚕丸時間服百丸兩三月間大約用過生大黄十餘兩石膏幾三四觔大黄丸復幾及十餘兩陽明數實之脉始退而血漸已真奇證也此後乃純用養陰之劑兼服六味地黄丸無間歷半載幾復故但隔數日或痰中見血如米粒大一二點含之欲速求愈往潤與諸醫商之謂血脱後宜補氣令服參术數劑

復幾致大發仍用前法更半年餘而後不復發矣予初亦以爲陰虛治之不効及一生用前法予聞之深歎其見之是也臨證有一時思慮不到不宜偏執已見參合詳審以別幾微乃無誤耳予因載其案以省後人云

消渴證

湖州庠友張君時泰辛酉正月驟發齒痛十餘日而愈四月間焦勞過多齒痛大發醫用石膏知母等藥投之不効用刀去齒間紫血滿口痛不可忍齒俱搖動矣至六七月間飲食益多小便如注狀如膏肌肉盡削至十一月身不能起冬末用黃耆地黃等藥稍能起立然善食易饑如故小便如膏亦如故今年二三月愈甚亦不服藥齒痛如故當門二齒脫落復加口渴晝夜不止此中下二消證也予爲立後方服未數劑而瘳

麥門冬五兩 五味子三錢 黃連二錢 蘆根五兩 黃耆五錢 懷生地黃六錢 天門冬一兩 用繰絲湯十碗煎二碗不拘時服丸方於前藥中加黃檗三兩 牛膝五兩 沙參六兩 枸杞子四兩 五味子六兩 蜜丸常服遂不復發

廣筆記

婦人

治婦人血熱經行先期

枇杷葉一觔蜜炙 白芍藥半觔酒浸切片半生半炒 懷生地黃六兩酒洗 懷熟地黃四兩酒洗 青蒿子五兩童便浸 五味子四兩蜜炙 生甘草一兩去皮 山茱萸肉四兩 黃蘗四兩去皮切片蜜拌炒 川續斷四兩酒洗炒 阿膠五兩蛤粉炒無真者鹿角膠代之重湯酒化 杜仲二兩去皮酥炙 細末懷山藥粉四兩打糊同煉蜜和丸如梧子大每五錢空心淡醋湯吞饑時更進一服忌白蘿蔔

加減正元丹 治婦人經不調無子

香附一觔同艾二兩醋浸二宿分作四分一分用鹽水炒一分酥炙一分童便炒一分和乳晒上炒 當歸身五兩酒洗 川芎二兩 白芍藥八兩酒浸切片半生半炒 生地六兩酒洗 阿膠四兩蛤粉炒成珠無則鹿角膠代之 枳殼三兩去穰半生半炒 艾二兩用醋浸香附醋打搗餅晒乾 為末米醋煮山藥粉糊丸如梧子大每四錢空腹淡醋湯吞 忌白菜菔 右八味乃正元丹後加減法也加青蒿子二兩 山茱萸肉二兩 銀柴胡一兩五味子二兩 鱉甲醋炙如法四兩 如經調後覺經不行恐有妊娠即勿服如後期去青蒿子銀柴胡鱉甲

治血熱經行先期腰腹痛發熱 血熱忌用芎歸當用第一方

正元丹中去香附換入枇杷葉十兩蜜炙 杜仲去皮酥炙二兩 鹿角膠四兩蛤粉炒 麥門冬四兩去心 青蒿子 山茱萸肉 北五味子各二兩 銀柴胡一兩

治血虛經行後期

白芍藥六兩半生半炒 香附四兩童便浸炒 蘄艾葉一兩五錢如法 懷生地六兩 麥門冬六兩 杜仲二兩酥炙 橘紅二兩 枇杷葉六兩蜜炙 甘草一兩五錢 半生半炒 白膠四兩蛤粉炒成珠研 川芎二兩 青蒿子四兩童便浸晒乾 當歸六兩 用醋煮懷山藥糊丸梧子大每服五錢白湯送下

治血虛經行後期太甚并遍頭疼

當歸身 白芍藥各二錢五分 川芎一錢 甘菊花一錢 藁本一錢 懷生地二錢 荊芥穗八分 天門冬一錢 麥門冬一錢 炙甘草一錢五分 河水煎臨服加童便一小杯

又治經行後期太甚

香附一觔四製 懷生地五兩 白芍藥八兩 枳殼二兩 砂仁二兩 阿膠四兩 蘄艾四兩如法 為末醋煮懷山藥糊丸梧子大每服四錢空心淡醋湯下 一方加懷熟地三兩川芎二兩去砂仁一味俱神效

治腎泄兼脾泄

肉荳蔻四兩粉裹煨 北五味子四兩 補骨脂[illegible]二兩半 白芍藥二兩 砂仁一兩半 甘草八錢 人參三兩 吳茱萸二兩湯泡去梗 為末 山藥粉糊丸如梧子大空心白湯下三錢至五錢

治婦人腎泄無子

肉荳蔻麪裹煨四兩吳茱萸湯泡二兩五錢補骨脂三兩五味子三兩人參一兩木香不見火六錢砂仁八錢細末山藥粉糊丸如梧子大每服三四錢空腹白湯吞

李博士本石內人患痰嗽三年骨立矣經不行諸醫或以爲積血或以爲血枯經閉仲淳云孕也若行血則胎不旋踵但分娩後恐不能全吉爾已而果然

安胎將墮欲死方

懷生地二兩酒炒砂仁末一兩水酒各二碗煎一碗分作二次服立愈此方出本草子偶閱之傳一門人試之如神

保胎資生丸妊娠三月陽明脈養胎陽明脈衰胎無所養故胎墮也服資生丸

人參人乳浸飯上蒸烘乾三兩白朮二兩白茯苓細末水澄蒸曬乾入人乳再蒸曬乾一兩半廣陳皮去白略蒸二兩山查肉蒸二兩甘草去皮蜜炙五錢懷山藥切片炒一兩五錢川黃連如法炒七次三錢薏苡仁炒三次一兩半白扁荳炒一兩半白荳蔻仁不可見火三錢五分藿香葉不見火五錢蓮肉去心炒一兩五錢澤瀉切片炒一錢半桔梗米泔浸去蘆蒸五錢芡實粉炒黃一兩麥芽炒研磨取淨麪一兩右藥共十七味如法修事細末煉蜜丸如彈子大每丸重二錢用白湯或清米湯橘皮湯炒砂仁湯嚼化　忌桃李雀蛤生冷

治惡阻卽胎氣上逆

橘紅一錢麥門冬二錢人參一錢木瓜二錢竹茹一錢枇杷葉三大片藿香五分下咽卽驗

烏蠡魚湯治妊娠腹脹滿頤仲孫子婦患此數帖而安

白茯苓二錢白朮炒二錢五分廣橘紅　木瓜　桑白皮如法蜜炙各一錢紫蘇葉一錢秦艽一錢生薑皮一錢五分用大蠡魚一枚河水五碗煎至三大碗去魚骨濾清始入前藥煎至一碗服之以愈爲度

治子懸卽胎上衝

紫蘇　橘紅　麥門冬去心各等分爲細末每服四錢

用枇杷三大片竹茹一錢五分煎湯調服

治胎驚胎熱一受孕卽宜預服覺凛安乃正服之神驗

木瓜一錢天門冬　黃耆　白芍藥各三錢麥門冬五錢鼠粘子一錢金銀花　甘菊花　石斛　懷生地各三錢連翹一錢炙甘草一錢貝母二錢砂仁一錢人參一錢五分河水二大碗煎八分食遠溫服服至百帖神効

治小兒臍風撮口孕婦時服可預解一切胎毒

甘草生用二錢懷生地四錢連翹二錢黃連酒炒一錢玄參二錢括蔞根二錢木通一錢貝母二錢牡丹皮一錢五分金銀花四錢荊芥穗一錢羚羊角磨汁入藥汁中二十匙約五分河水二鍾煎八分空心饑

時服（仲淳傳自金華視生試之神驗）

催生累驗方

魚膠（四錢切碎每塊針刺燈火上炙脆研）柞枝（四兩鄉食者一葉一刺者是即鑿子木五月開白花不結子）白芷（一錢五分）百草霜（山家者良一錢）千里馬（男子左足女右足舊草鞋燒灰存性二錢）水酒各鍾半將柞枝白芷煎濃至一碗去渣濾清入膠同煮化調二末服之（已上調經脹產方仲淳手定）

琥珀丸（專治婦人生產艱難下胞衣血暈服之野居八李玄白傳神驗）

玄胡索（六錢）懷熟地（八錢）當歸身 川續斷（酒洗炒）川芎（各六錢）川牛膝 人參 沉香 乳香 沒藥（去油各五錢）阿膠（蛤粉炒八錢）辰砂（水飛）大附子 五味子（各五錢）金釵石斛（六錢）肉蓯蓉（酒洗八錢）琥珀 珍珠（上上者各五錢）極細末煉蜜丸如圓眼大以好辰砂飛過為衣蠟丸

家寶丹（馬銘鞠傳不如李玄白方妙）

專治婦人產難胎衣不下血暈胎死腹中及產後小腹痛如刀刺兼治胎前產後一切諸病雜症諸氣中風乳腫血淋胎孕不安平時赤白帶下嘔吐惡心心氣煩悶經脈不調或不通脅胃飲食無味面唇焦黑手足頑麻一切風痰俱效

高存之每年修合普施

何首烏（二兩取白者竹刀切片晒乾）川烏（四兩先用黑豆包裹去皮留待草烏同切）草烏（四兩水浸半日洗去黑毛刮去皮與川烏同切厚片將無灰酒和勻入砂罐中慢火慢煮漸漸添酒一日夜以口不麻爲度）蒼朮（四兩米泔浸一宿去皮切片酒炒）大當歸（酒洗二兩）白附子（二兩去皮）麻黃（去根節湯泡去末）桔梗（炒）粉草（炙）防風 白芷 川芎 人參 天麻 大茴香（炒）荊芥（炒）白朮（炒各四兩）木香 血竭 細辛（各一兩）共極細末蜜丸彈子大每丸重二錢酒化開和童便下○如不能飲者酒化開白湯下○產後腹痛者酒化開益母湯下○更有男婦年久腹痛諸藥不效者服兩三丸即愈○室女經脈不通者用桃仁蘇木紅花當歸煎湯下

惟勞熱有肺火者不宜服

治橫生（高存之試驗）

益母草（六兩）酒煎濃汁加童便一大杯

治胞衣不下（高存之屢試驗）

芒硝（三錢）酒煎服宜加牛膝當歸各五錢

產後調理方（仲淳方）

當歸身（三錢）川芎（一錢五分）生地（二錢）赤芍（酒炒一錢五分）延胡索（醋煮二錢）牛膝（五錢）蒲黃（一錢五分）乾薑（炒黑七分）肉桂（七分火盛者并夏月勿用）山查肉（二錢）五靈脂（醋煮去砂一錢）桃仁（去皮尖）紅花（各八分）黑豆（炒一合）杜仲（二錢炒去絲）續斷（二錢）益母草（二錢若血行腹痛去之）澤蘭

葉一錢荊芥穗五分水煎入童便服過五七日覺少腹
已軟無塊按之不痛即將赤芍藥蒲黃肉桂五靈脂
桃仁紅花六味盡去之另加白芍藥二錢麥門冬三錢五
味子十粒○如虛汗去荊芥川芎加棗仁五錢驚悸亦加
之○汗不止加黃芪人參各二錢○虛甚作喘倍加人
參黃芪倍麥門冬去生地當歸桃仁紅花○如脾胃
弱不食泄瀉加人參多少酌量人肉果五分一錢砂仁七分橘紅八分
○腹痛無力是血虛以鹿角膠五錢酒漿化空心溫服
血暈及血不止發熱作渴用童便一味是產後聖藥

預防血暈神方 古方

將產預將荊芥穗末二錢童便滿湯各一杯聽用兒一
產下即將前末同童便入湯調服永無血暈之病荊
芥能引血歸經也虛脫者人參五錢乾薑二錢肉桂二錢虛
甚者參至一兩加附子

治產後虛脫防血暈 予家素試之神驗

人參一兩真蘇木二兩鹿角膠一兩六錢水二碗酒一碗煎至
一碗加童便一杯頓服俱產下作服

治產後虛喘

己丑予婦產後五日食冷物怒觸作泄乃微嗽又
三月泄不止手足冷發喘床亦動搖神飛蕩不守一

驟以人參五錢附子五錢療之如故加參附又不効漸加
至參一兩附子三錢一劑霍然起
予中甫夫人產後氣喘仲淳投以人參五錢蘇木五錢麥
門冬五錢一劑愈五日後忽自汗無間晝夜聞響聲及
飲熱茶湯即汗徧體投以人參五錢黃芪五錢加當歸身
生地黃二劑不効即令停藥彌日金壇俗忌未彌月
不得診視仲淳徧檢方書至證治要訣治汗門內有
凡服固表藥不効者法當補心汗者心之液也洒然
曰是已于夫人素無有火氣非不足也產後陰血暴
亡心主血故心無所養而病汗亟以炒酸棗仁一兩為

君生地黃白芍藥麥門冬五味子枸杞牛膝杜仲當
歸身阿膠牡蠣龍眼肉大劑與之至三十二劑同効
中甫懼曰得無不起乎或藥應更改乎仲淳曰非也
吾前所以投參芪不應而遽止之者以參芪為氣分
藥劑且大其不應者必與證不合也茲得其情復何
惑乎蓋陰血者難成易虧者也不可責効旦夕仍投
前劑至四十二帖忽得睡汗漸收睡愈熟睡至四日
夜一醒霍然顏色逾常血足則色華也
王善長夫人產後腿疼不能行立久之飲食不進困
憊之極仲淳診之曰此脾陰不足之候脾主四肢陰

不足故病下體向所飲藥雖多皆苦燥之劑不能益陰用石斛木瓜牛膝白芍藥酸棗仁爲主生地黃甘枸杞白茯苓黃蘗爲臣甘草車前爲使投之一劑輒効四劑而起昔人治病必求其本非虛語也

施靈脩乃正產後發寒熱咳嗽不止因本元虛弱誤用薑桂勢甚劇數劑輒定

鱉甲(四錢) 山查肉(五錢) 橘紅(二錢) 當歸(二錢) 青蒿子(二錢五分) 白芍藥(四錢) 牛膝(三錢) 杜仲(二錢五分) 棗仁(八錢) 遠志肉(一錢) 麥門冬(五錢) 五味子(一錢) 生地黃(四錢) 茯神(二錢) 益母草(五錢) 竹葉(二十片) ○偶傷風加荊芥(一錢) 防風(五分) ○咳嗽甚加桑白皮(三錢) ○有痰加蘇子貝母(各二錢) ○腰痛加枸杞子(五錢) ○閼血未盡加黑豆炒一大把○脾胃不佳去牛膝生地益母草

丸方

鱉甲(六兩) 牛膝(酒蒸六兩) 青蒿子(四兩) 懷生地 白芍藥 棗仁(各六兩) 當歸身 眞阿膠(另酒頓化入藥各四兩) 白茯苓(六兩) 遠志肉 杜仲(各一兩) 麥門冬(六兩) 五味子(三兩) 枸杞子(六兩) 懷山藥(切片炒黃四兩) 牡丹皮(酒洗二兩) 山茱萸肉(四兩) 砂仁(炒二兩) 牡蠣粉(火煆過細研入鱉甲中如此七次研如飛麵二兩) 細末煉蜜丸如梧子大每五錢空心白湯吞饑時更進一服

薑桂峯乃正產後頭疼大便秘用生料五積散一劑不効仲淳加歸身(一兩)一服大便通頭疼立止

張璇甫乃正產六朝發狂持刀殺人陰血暴崩肝虛火炎故也仲淳令先飲童便一甌少止再服

龍齒 澤蘭 生地 當歸 牛膝 茯神 遠志 酸棗仁 大劑仍加童便頓服而止

王六息乃正產後驚悸聞聲輒死非用力抱持則虛煩欲死如是累月仲淳曰此心脾肝三經俱虛也用人參酸棗仁茯神遠志芍藥石斛甘草麥門冬五味丹砂爲丸以龍眼湯吞彌月而愈

賀函伯乃正小產後陰血暴崩作暈惡心牙齦浮腫喉嚨作痛日夜叫號不絕仲淳曰此證因失血過當陰氣暴竭陽無所附火空則發故炎上胸中覺煩熱所謂上盛下虛之候也法當降氣氣降則火自降矣火降則氣歸元而上焦不煩熱齒齦腫消喉嚨痛止陽交於陰而諸病自已爾

蘇子(研細二錢五分) 麥門冬(去心四錢) 白芍藥(酒炒四錢) 青蒿子(二錢五分) 牛膝(四錢) 五味子(打碎五分) 鱉甲 生地黃 甘枸杞(各四錢) 枇杷葉(三大片) 川續斷(二錢) 酸棗仁(炒爆研五錢) 橘紅(二錢) 河水二鍾半煎一碗加童便一大杯贊金汁十二匙空心

服時進童便一杯

莊斂之次女產後惡露未淨至夜發熱脾胃却弱腰腹大痛時師謂產後氣血俱虛投以人參當歸諸補劑轉劇斂之深以爲憂恐其成蓐勞也余診視之謂不數帖即痊矣安用過慮爲爲疏一方白芍藥三錢紅麴二錢山茱萸肉四錢橘紅一錢五分麥門冬四錢蘇子二錢車前子二錢炙甘草八分乾葛一錢半白稨豆三錢杜仲二錢牛膝五錢黑豆八錢澤蘭一錢青蒿子四錢十劑而惡露淨發熱已腹痛亦止但腰痛尚未盡除而脾胃尚未健更爲改定一方白芍藥三錢山查肉二錢橘紅二錢砂仁二錢麥芽三錢石斛三錢蓮肉四十粒白稨豆三錢杜仲二錢五味子一錢山茱萸肉二錢炙甘草五分沙參二錢牛膝五錢十餘劑脾胃亦佳其疾遂瘳

調理丸方

懷生地　熟地各五兩　麥門冬去心　甘枸杞去枯者及蒂各六兩　杜仲如法　川斷續去蘆各五兩　五味子三兩　栢子仁六兩去油　酸棗仁炒爆研六兩　茯苓三兩　青蒿子四兩　山藥炒五兩　山茱萸肉五兩　牡丹皮擇厚者二兩　鹿角膠酒化入藥六兩　橘紅二兩　砂仁二兩炒　細末煉蜜和丸如梧子大每服五錢空心淡鹽湯吞忌食卵魚子白萊菔

治女人血崩

人參　黃芪　麥門冬各三錢　五味子七分　杜仲　熟地　山茱萸各二錢　枸杞子三錢　續斷二錢　荊芥穗八分炒　阿膠二錢　河水煎日進三服

又丸方

黃耆二兩蜜炙　人參一兩　熟地二兩　白芍藥一兩五錢酒浸切片半生半炒　五味子　懷山藥　續斷酒洗　杜仲酥炙　栢子仁酒浸二宿蒸搗如泥　青蒿子童便浸晒乾　麥門冬　酸棗仁各一兩五錢炒　鹿角膠二兩酒化　共末將酒化鹿角膠栢子仁泥同煉蜜丸如梧子大每服五錢空心白湯下

董龍山夫人患血崩由于中年鬱怒諸醫百藥不効用大劑參耆徧覓胎髮百餘丸火煅調入藥服久之漸愈火煅髮用小砂罐鹽泥煉極熟將髮入罐中封固陰乾以炭火圍之俟黑煙將盡即起若青煙出髮枯不可用矣非細心人不可任蓋火候不可過也

顧太學叔夏內人舟中爲火所驚身熱羸弱幾成瘵群醫誤投參芪勢危甚仲淳以淸肌安神之劑與之戒以勿求速効凡數十劑而安

麥門冬二錢　鱉甲三錢小便炙　青蒿子　銀柴胡　桑白皮蜜炙各二錢　五味子一錢　枇杷葉二錢　白芍藥一錢　生地黃

一錢 薏苡仁三錢

包海亭夫人患腹痛連少腹上支心日夜靡間百藥不効仲淳診其脉兩寸關俱伏獨兩尺實大按之愈甚詢知其起自暴怒風木鬱于地中投以芎藭上柴胡中升麻下下咽噯氣數十聲痛立已已而作脹仲淳曰是升之太驟也以四磨湯與之遂平

甲申夏舊婦因鬱火痰喘身熱手拳目張半月不眠食穀其胃口不痛諸醫疑其虛也或云中暑百藥試之痰喘滋急以皂角末嚏鼻通竅痰上逆如沸延楊石林診脈請亟吐之先大夫曰病久矣虛甚可奈何

石林曰經云上部無脉下部有脉其人當吐不吐則死即以鹽湯吞之去白痰數盌喘定先大夫曰何以藥之石林曰吐即藥也待其熟寐勿服藥以養胃氣夜半啜粥二碗茹且投六君子湯數劑而起石林者里中博雅士不行術而精方脉者也

高存之夫人患心口痛一日忽大發胸中有一物上升冲心三婦人用力捺之不下叫號欲絕存之曾預求仲淳立此方是日急煎服之服一蓋冲上者立墜下腹中作痛不升矣再服腹中痛者亦消二日後以病愈起洗沐又忽作嘔頭痛如劈存之曰此即前症煎前藥服之立安

白芍藥酒炒三錢 炙甘草五分 吳茱萸湯泡三次八分 白茯苓二錢 延胡索醋煮切片一錢 蘇子炒研一錢五分 橘紅鹽水潤過一錢二分 後加半夏一錢薑汁拌炒 旋覆花一錢 木通七分 竹茹一錢

予婦今春忽患心痛連下腹如有物上下撞痛不可忍急以手重按之痛稍定按者稍鬆即叫號仲淳曰此必血虛也脉之果然急投以白芍藥五錢 炙甘草七分 橘紅三錢 砂仁炒三錢 炒鹽五分 二劑稍定已又以牛黃蘇合丸觀其氣噯氣數次痛徐解予問故仲淳曰白芍藥甘草治血虛之聖藥也因久鬱氣逆故減甘草之

半仲景甲巳化土之論詳矣諸醫不解爾炒鹽者何曰心虛以炒鹽補之即水火既濟之意也予懼俗師槩以痰火食積療心腹之痛故踈其詳如左

昔年予過曲河適王宇泰夫人病心口痛甚日夜不眠手模之如火予問用何藥曰以大劑參歸補之稍定今尚未除也曰得無有火或氣乎宇泰曰下陳皮及凉藥少許即脹悶欲死非主人精醫未有不誤者予又存此公案以告世之不識虛實而輕執方者

梁溪一婦人喉間如一物上下作梗前後板痛服仲淳方二十劑全愈

番降香一錢 川通草五分二味服二劑去之 蘇子二錢 橘紅一錢二分 枇杷葉三片 人參一錢 炙甘草七分 石菖蒲一錢 麥門冬三錢 甘菊花一錢 白芍藥一錢 遠志一錢 白豆蔻仁四分 木瓜二錢 石斛一錢酒蒸

加蘆根汁一鍾同煎入薑汁二匙

梁溪一女子頭痛作嘔米飲不能下仲淳云因於血熱血虛火上炎

麥門冬五錢 橘紅二錢 枇杷葉三片 大蘇子一錢五分 白芍藥三錢 木瓜二錢 白茯苓二錢 甘菊花一錢五分 烏梅肉二枚 竹瀝一杯 蘆根汁半碗 一二劑嘔止頭尚痛加天門冬二錢 頭痛少止再加土茯苓二兩 小黑豆一撮 全愈

白帶赤淋

婦人多憂思鬱怒損傷心脾肺火時發血走不歸經此所以多患赤白帶也白帶多是脾虛蓋肝氣鬱則脾受傷脾傷則濕土之氣下陷是脾精不守不能輸爲榮血而下白滑之物矣皆由風木鬱於地中使然耳法當開提肝氣補助脾元宜以補中益氣湯加酸棗仁茯苓山藥黃蘗蒼朮麥冬之類濃煎不時飲之再用六味丸中加牡蠣粉海螵蛸杜仲牛膝蜜丸光大如豆空心饑時吞下五六錢陰虛火熾加枸杞子五味子黃蘗

白帶多屬氣虛補氣健脾治法之要領也

帶下如濃泔而臭穢特甚者濕熱甚也且多有濕痰下墜者宜蒼朮白朮黃蘗黃芩茯苓車前子爲主佐以升提

帶下如雞子清者脾腎虛極也面色必不華足脛必浮腰腿必痠宜五味子八味丸間用開脾養心之劑如歸脾湯之類陰虛有火宜六味丸中加五味子兔絲子車前子黃蘗叔和云崩中日久爲白帶漏下多時骨木枯蓋言崩久血氣虛脫而白滑之物下不止耳此症雖有血氣寒熱之分要歸總屬於虛赤淋多

因於心火肝火時熾不已久而陰血漸虛中氣漸損遂下赤矣治宜養心爲主兼以和肝緩中涼血清氣

赤帶久不止則血虛宜膠艾四物湯加便煅牡蠣粉酸棗仁麥門冬

標急而元氣不甚憊者先救其標

標急而元氣衰劇者則當本而標之也

治白帶

蛇床子[illegible]淘取沉水者蒸曬乾去皮炒爲細末每一兩加枯白礬末五分

山茱萸肉 五味子 車前子米泔浸蒸 香附三錢醋煮 各細末山藥糊丸如梧子大每四錢空心淡醋湯吞饑時

再進一服後用四物湯加山茱萸　五味子　炒砂
仁　白芍藥　杜仲　黃蘗　車前子各等分　鹿角膠
醋化丸如梧子大每日空心白湯吞五錢調理自除

治老年白帶

黃蘗去粗皮切片蜜炒四兩　砂仁炒二兩　杜仲去皮切片鹽酒炒去絲八兩　川
續斷酒洗一兩　補骨脂酒浸瓦上炒三兩　川芎二兩　香附入兩醋浸二宿晒乾
分作四分一分酥炙一分童便炒一分醋炒一分鹽水炒　蘄艾用及香附醋炒加山茱粉煑作糊拌
艾打成餅晒乾一兩五錢　山茱萸肉四兩　白茯苓如法水浸蒸晒乾二兩　白芍
藥酒浸六兩[illegible]半炒　鹿角膠醋化五兩　北五味蜜蒸四兩　車前子米泔浸蒸
晒乾二兩　牡蠣粉火煅醋淬研如飛麪二兩　細末和鹿角膠丸如梧子

大空心淡薑湯送下五錢

世母因兒痘驚苦積勞虛煩不得臥心膽虛怯觸事
驚悸百藥不效家弟長文偶于友人許聞與化陳丹
崖療一女人甚奇其症與母類叩其方乃溫膽湯也
試之數劑而効

半夏七錢　竹茹　枳實各二錢　陳皮四錢　白茯苓　炙甘
草各二錢二分半　分二劑薑棗煎服外加酸棗仁五炒後因虛
極加人參二錢質之仲淳曰此必有痰而善飯者也果
然

先安人因亡女忽患腰痛轉側艱苦至不能張口受
食投以鹿角膠不効以濕痰療之亦不効徧走使延
仲淳曰此非腎虛也如腎虛不能延至今日矣用
白芍藥三錢　橘紅二錢　白芷二錢　炙甘草一錢　香附童便浸炒三錢　肉
桂二錢　乳香　沒藥各七分半燈心同研細臨服下之　一劑腰脫然覺
猶體疼仲淳曰愈矣再煎滓服立起予駭問故仲淳
曰此在素問木鬱則達之顧諸君不識爾

姚公遠內子病延仲淳入診其繼母乘便亦求診仲
淳語伯道曰婦病不足慮嫂不救矣聞者駭甚曰吳
方新婚亡大恙何至是耶予私叩之仲淳曰脈弦數
眞弱症也不半歲夜熱咳嗽勢漸劇倉皇延仲淳既

方予之曰此盡吾心爾病不起矣逾年聚家百藥雜
試竟夭

瞿元立夫人素清癯不耐煩勞一日謂仲淳曰弟婦
未生子而弱煩兄爲診其故次日仲淳往診得其脈
弦細無神趙文肅公問曰兄從元立許來診其嫂得
何脈曰今雖無恙必不久矣文肅頓足曰有是哉夭
胡厄善人甚耶此丙戌四月事也至秋夫人歿

祝氏婦年五十餘患中滿腹脹兼崩漏下虛清上則
下虛彌甚實下則上脹彌甚仲淳爲立二方以蘇子
石斛陳皮貝母玄參人參白芍藥治其上以地榆阿

膠木瓜牛膝杜仲茜根椿皮治其下各爲丸分食前
後服之漸愈

廣筆記

幼科附痘疹

小兒初生即以粉草二錢切片江西淡荳豉三錢入沸湯一碗隔水煮乾至一二小杯以綿爲乳蘸藥汁入兒口吮之以盡爲度腹內有聲去胎糞數次方飲乳月內永無驚風諸病

兒初生不可剪臍帶三朝用麵和水成薄餅置兒腹穿臍帶於麵上將蘄艾火灸臍帶近臍處或三炷或五七炷灸須下帳避風灸畢仍將臍帶紮好聽其自脫至七日方脫者元氣足也瑨兒九日方脫其神甚王

凡兒生下每日夜時將清湯或苦茶蘸軟絹攪兒口內如齒邊有白點即以指爪或細針挑破取桑樹內汁濾清塗之永無驚風撮口之患予家用前三方兒月內並無殤者

治撮口　其症必先大便熱

用生犀角及真羊羚角磨和蜜汁飲之有効急則用大黃二錢甘草二錢煎服

治月內啼

以真牛黃飛辰砂極細末各五厘塗兒舌上立止

治胎驚　仲淳定有驗
人參　白芍藥酒炒各一兩　白茯神　酸棗仁各一兩五錢炙
甘草　遠志肉甘草汁浸蒸焙乾各一兩　真天竺黃另研如飛過　硃砂
另研如法各五錢　臍帶新瓦上炙焦存性另研細三條　天麻　犀角　滑石
末各一兩　如有紫河車加一具火炒乾研細忌鐵　石天竺黃　硃砂
臍帶另研外餘篩極細末然後加入另研三味再研
和令極勻用鈎藤濃汁四兩和煉蜜半觔搗和前藥
每丸重一錢二分儀時臨卧以燈心薄荷湯調化服
日可與二三服或以鈎藤　煎濃化藥更佳○如治
急驚本方去臍帶河車人參加白殭蠶炒炙六錢　全蝎十六錢

牛黃一錢二分　琥珀一錢　膽星八錢　麝香三分
治胎瘡　家弟患此服之神驗
人參三錢虛甚者加至一兩　白芍藥酒炒二錢　廣陳皮二錢　鱉甲醋炙
二錢　麥門冬二錢　厚朴二錢　青皮醋炒七分　山查肉二錢　水二鍾煎
八分溫服○脾胃不佳加川黃連薑汁炒一錢五分　真藿香
五分　白荳蔻二分五厘　蠶皮五分　竹葉三十片　白茯苓二錢
治小兒癇症或驚風不止　黃孟芳幼患此症久服効
天竺黃五錢　酸棗仁二兩　麥門冬去心二兩　人參一兩　明天麻五錢
天門冬去心一兩　白茯神一兩五錢　橘紅七錢　遠志肉甘草汁煮去骨一兩
白芍藥酒浸一兩　鈎藤五錢　細末煉蜜和丸如彈子大朱砂飛

極細硃砂為衣每服一丸燈心湯或龍眼湯化下又
一方加紫河車一具酒洗淨煮爛或焙乾為末入前
藥中

疳積散　宋二懷傳累試神効
治兒乳食不節過飽傷脾而黃腹大小便濁
如米泔大便黃泄酸臭皮毛枯索甚而雙目
羞明生翳形骸骨立夜熱晝凉等證並用此

方主之
厚朴去皮切片薑汁炒熟淨末一兩　廣陳皮去白淨末八錢　粉甘草去皮炙淨七錢
真蘆薈另研如泥者淨末七錢　蕪荑真孔林大而多口衣者去白衣淨末五錢　青

黛取淸輕浮中浮碎花青淘淨研二錢　百草霜取山庄人家鍋底煤二錢五分　旋覆花
淨末一錢五分　勺和成劑小兒每一歲用藥一分燈心湯空
心調服服後病愈再用肥兒丸調理如脾氣未實用
啓脾丸或大健脾丸如疳氣未盡用陳皮一兩　白木香
三錢　白茯苓五錢加平胃散二錢為末陳米湯調下
肥兒丸
人參三錢　蕪荑一兩　史君子肉一兩　白芍藥一兩　橘紅八錢　黃連
一兩　甘草五錢　紅麴七錢　麥芽七錢　砂仁五錢　白茯苓一兩　山查肉
七錢　滑石一兩　蓮肉二兩　楄荳一兩　青黛一兩　煉蜜丸彈子大每
服一丸空心白湯化下

治疳瀉痢見紅白積者

用前散子加黃連(薑汁土炒)肉荳蔻二味燈心湯少入熟蜜調服

治食積成疳

用前散砂仁湯調服　四方俱宋二懷傳

治小兒疳症唇白或紫腹大面黃髮乾上指

施季泉有丸藥如龍眼大納猪肝內白酒煮之止食肝一劑而愈其丸取出尚可救人方不傳兒輩累試之奇驗價亦廉

治疳眼

牛雞肝一具不拘大小雌雄二三歲者只用半具外去衣內去筋膜研極細如麵入疳積散若干調極勻加熟白酒厚薄相和隔湯頓極熱空心服或用甜酒少加熱白湯調服至眼開翳散乃止

又方

白芙蓉花(陰乾一錢四分驗用)以不油不蛀肉荳蔻一枚(麪裹煨)真胡黃連(五分)共細末將赤雄雞軟肝去筋膜入前藥末同研極細丸如龍眼核大白酒隔湯煮熟空心與兒吃其藥約分三分如兒小可再分作四分兒大者可一二次頓服立驗

治小兒走馬牙疳百驗方

冰片(三分)黃連(不拘)括蔞(末燒)紅褐子(燒存性研細)黃蠶繭殼(煆存性各五錢研)明礬(一錢五分煆過研)五穀蟲(要有尾者尾上煆過存性研二錢五分)各末和勻再碾連吹數次立効吹藥時先以米泔漱淨吹藥後仍以米泔漱淨

又將夜壺底內積垢取出燒灰存性研極細敷牙根腫爛處立愈

又將蝸牛連殼煆灰存性研極細末吹患處立愈

右二方俱施季泉傳

治小兒心口疼　仲淳定

牽牛(炒八錢)白木香(二錢)檳榔(二錢)紅麯(炒一兩)甘草(炙三錢)橘紅(八錢)綠礬(火煆紅以木醋淬另研如飛麪四錢)細末粉糊和丸如梧子大每服四錢白湯吞終身不可食蕎麥

存之幼郎病內傷大小便俱血諸醫競用紅花桃仁病愈甚仲淳曰桃仁之類既其瘀也血且行奈何又重傷之傷則補之而已以生地黃(四錢)川續斷及杜仲牛膝等飲之稍平而腹痛不已仲淳曰是在內經強者氣盈則愈弱者著而成病加人參(二錢)一劑而愈

月坪張氏兒十歲自幼心痛得於母氣不時發者發時飲食不進呻吟反覆三四日仲淳疏方藥入口即

止
檳榔一錢 黑丑一錢 木香五分 使君子二錢 橘紅二錢 白茯苓三錢
白芍藥二錢 旋覆花二錢 豬苓一錢五分

義與楊純父幼兒病寒熱勢甚棘諸醫以為傷寒也藥之不効仲淳曰此必內傷純父不信徧詢乳媼及左右並不知所以傷故仲淳問不已偶一負薪者自外至聞而訝曰義見郎君攀竹梢為戲梢折墜地傷或坐此乎仲淳曰信矣投以活血導滯之劑數服而起仲淳嘗言古人先望聞問而後切良有深意世人以多問嘲醫醫者含糊於脉以致兩誤悲夫

猴疳方　此胎毒濕熱從肛門或陰囊邊紅暈爛起漸至皮膚不結靨不治必爛死

生蘿蔔四兩 鰻魚一斤 共煮爛取濃汁塗之次用貝母灰存性二錢五分 牛黃 氷片各一錢 共研細末敷之如復發用綿花油一兩 大楓子肉 蛇床子 乳香 沒藥共四兩 青黛一兩 五味研細浸油內青布蓋口以錢壓之數日後以鷄翎蘸油塗之再用鰻骨灰 牛黃 氷片各少許 共為末敷之愈

兒服末藥
人中白三錢 胡黃連 青黛各五分 辰沙二分 甘草二分 人參二分 共為末蜜調服之

乳母服藥
當歸 黃連 金銀花 桔梗 連翹 川芎 甘草 山梔 薄荷各等分 水煎服 以上三方馬銘鞠傳

張守為幼郎患療疳嗜食易饑腹如蜘蛛過數日一瀉瀉則無度面目黧黑指節中亦幾無剩肉矣其母亦病診脉緊數骨蒸勞熱大渴引飲淋閉自產後已然馬銘鞠曰兒病實母病也用麥門冬枇杷葉懷生地白芍藥青蒿鱉甲之屬以治母用乾蟾為君加犀角羚羊角白芙蓉花牛黃每用分許日入雞肝內飯上蒸服以治兒再用滑石白扁豆白茯苓車前子山查肉五穀蟲等分為末拌人乳曬乾七次累入砂仁末陳米湯丸彈子大日進兩丸不二十日子母俱痊二方絕無藥氣故兒喜啖之

華叔蟾乃郎慢脾風五六日愈愈甫三四日即縱恣飲食連浴兩宵復痰壅沉迷面目俱浮胸腹腫滿嘔吐乳食不進角弓反張二便交秘有欲進以牛黃丸者馬銘鞠曰下咽死矣此病後虛症也然參且勿用

用麥門冬二錢 枇杷葉三片 貝母一錢五分 桑白皮一錢五分 杏仁一錢 藿香一錢 新鮮大梅球一枚 蒼朮用人乳汁炒三次八分 橘紅一錢

分二加燈心煎臨服入薑汁逾時小便隨利腹即寬而諸證悉退盡劑竟愈以此知嬰兒病後不可不慎即此兒半年後下午連食冷鴨子二枚午間又縱恣飲食更餘病發上不吐下不瀉胸腹脹滿口閉氣喘身熱按其胷腹則雙手來護馬曰食也鴨子黃閉氣得水則化今尚在胃口急索大棗數枚煎湯入砂仁錢許以通其氣兒渴頓飲碗許氣漸通目開手足亦漸流動再煎飲之夜半吐瀉交作次日勿藥而愈

萬中丞涵臺患癎證合琥珀丸不用棄去馬銘鞠曰此幼科絕勝藥也開緘而琥珀清香之氣觸鼻入腦

光瑩可愛取之凡遇慢驚所投神驗兼治小兒一切虛證如華虛舟五郎甚其善哭週歲中每哭即氣絕絕而甦一飯時許矣至三歲外其病日深哭而絕絕而甦其至經時刻或一月一發半月一發後則頻發有日再發者投以此藥人參圓眼湯下數丸遂瘥

琥珀丸方

琥珀二錢　天竺黃二錢　人參二錢　茯神二錢　粉甘草三錢　硃砂一錢五分　山藥一兩　膽星一錢　蓮肉三錢　煉蜜丸硃砂為衣每服一錢

莊欽之親嗣辛酉辛卯一子未及三月乳婦不善撫養感暑中擁炙令卧忽患丹毒遍遊四肢漸延腹背欲之金皇來告予曰兒方數月奈何苦之以藥急以犀角紋鮮梨汁磨服欲之問故予曰犀角能解心熱而梨汁更能豁痰且味甘則兒易服別疏一方用荊芥穗二錢半　鼠黏子二錢　懷生地四錢　牡丹皮一錢五分　玄參三錢　栝蔞根三錢　薄荷葉一錢　竹葉百片　麥門冬去心四錢　生甘草三錢　連翹三錢　貝母去心三錢　生蒲黃二錢　令煎與乳婦服之乳汁即湯液矣欲之依法治之一日夜赤者漸淡再越日丹盡退後卒以乳婦不戒患驚風而殤

稀痘神方

金銀花為末糖調不住服有効　鄧騰宇傳

又方　江右朱以功傳神方也

赤豆小赤豆　黑豆　菉豆　粉草各一兩　為細末用竹筒削去皮兩頭留節一頭鑿一孔以藥末入筒中用杉木砧塞緊黃蠟封固外以小繩繫之投入臘月廁中滿一月即取出洗淨風乾每藥一兩配臘月梅花片三錢和勻若得雪中梅花片落地者不着人手以針刺取者更妙如急用入紙封套內略烘即乾兒大者用一錢小者用五分俱以霜後絲瓜藤上小藤絲煎湯調空腹服湯宜多服服後忌葷腥十二日解出黑糞為驗一次可稀三次不出每年服一次

又方　婁江王相公傳甚効

菟絲子半觔好酒浸二宿煮乾去皮　黑玄參四兩　爲極細末煉蜜丸如彈子大每空心白湯調化一丸日二次

又方加生地黃　麥門冬各四錢　犀角末一兩

又方

兎腦不去骨兎肚不去糞　瑣瑣葡萄五錢　白葡萄五錢　共炙蜜丸每一錢白湯下此候少芝方

又方　丁見源此部傳

用白牛虱數百枚焙燥和糖令兒服之服數次有紅點發出此毒解之候也不効再服先頭面次心坎次腰肚次四肢以漸見點痘必稀白牛惟江北多虱藏牛耳中不多得須多服方効

痘症有二一曰血熱毒盛一曰氣虛毒盛氣虛者可以徐補血熱毒盛者勢必亟一發熱便口渴面赤氣喘狂躁譫語此其證也一見點即宜凉血解毒急磨犀角汁多飲之十可療四五稍遲難救矣又有血熱兼氣虛者初發先服凉血解毒之劑五六朝後可以併力補氣助漿唯初時不早凉血則毒不解毒不解延至六七朝勢必以參耆助漿漿必不來反滋毒火

又有血熱毒盛似氣虛者初熱放點神思昏亂足冷痘色白如水泡唯有唇腫口渴辨其火症醫者反以氣虛治之十無一生孫生東宿療鄭黄門子血熱毒盛初起急以犀角地黃湯療之不効至用白芍藥八錢一泄毒解徐補收功家弟玄第一發熱即譫語唇腫齒黑痘欲出不出醫者以爲發斑傷寒也延仲淳施季泉不至予曰事急矣以生地八錢　白芍藥五錢　黄芩黄連各二錢稍加發藥曰三劑勢稍定痘漸次出醫者曰初時宜發痘柰何以凉劑遏之予曰解毒即所以發也未幾季泉至以予言爲然第減地黃芍藥之半夜於助漿中兼清凉之劑九十朝漿足卒傷一目仲淳曰使予之言盡行則目亦可不至矣靨後方大便此

眞血熱症也

松江黄綺雲療徐氏兒痘兒幼遇冬月痘不起熾炭圍爐抱兒火邊以酒漿提火火氣薰兒痘立起

又有痘而腰痛者一醫以人參蘆二兩煎湯飲之一吐痘起痛毒解叩其故曰毒在下部提之則上升而毒散矣大抵痘家利吐吐中便有散毒之義

施季泉曰凡成婚或破陽後出痘而腰痛者可療童子而腰痛是先天之水不足也不治驚痘易治者以毒由心經出故輕非因恐嚇成驚反易治也其言甚

有味故存之施君諱一中住良渚去杭州塘棲一十五里

一小兒初痘血熱甚黃綺雲用懷生地三兩濃煎頓飲其痘紫色立轉紅

臧玉涵次郎年十六因新婚兼酒食忽感痘諸醫以爲不可治施季泉至八日發清寒戰咬牙譫語神思恍惚諸醫皆欲以保元湯大劑補之季泉以爲不然改用犀角地黃湯得脫痂後忽嘔吐大便燥結淹延一年羣醫束手告急仲淳仲淳視其舌多裂文曰必當時未曾解陽明之熱故有是症命以石膏一兩人參一兩麥門冬五錢枇杷葉橘紅竹瀝童便爲佐一劑即安再進二劑膈間如冷物隔定父母俱謂必斃仲淳曰不妨當以參湯投之服兩許即思粥食晚得大便夙疾頓瘳

治痘喘

取白花地丁以水煎服止喘甚神

治火痘毒盛遇火令　施季泉傳

白花地丁濾汁和淡白酒漿少服之立解

治痘泄

長兒痘初熱即泄日十數行見痘泄不止時醫以肥兒藥止之愈甚施季泉曰是在不治予強之曰止泄不難發藥中加黃連二錢黃芩一錢一劑泄止予喜甚施君曰非也毒火太熾故泄初泄時即以解利藥乘熱導之或可望生今遲矣過四日即欲解毒無及矣坐視七日死

臧玉涵幼兒甫半週身熱一日即見痘郡有專門知名者延治之云樹小花多頂平脚塌根窠薄百死一生之症也五朝固辭去藥以保元湯爲主擬六朝多用人參加附子疑慮間施季泉忽至曰此險症且誡云必發痒異常須看守嚴密藥用凉劑與前治大別七朝大發痒作瀉一日夜二十餘行或藥水或乳或湯飲俱傾注不變色舉家謂必無幸矣季泉怡然自若因強之用參必不許藥內加炒黑黃連瀉止十三朝復發痒口渴唇燥舌生白胎又加炒黃連白胎去到底不用參十九朝季泉別又誡曰慎防痘疔口瘡疔之發也必在腦後枕骨間當以收口膏藥貼之禁用摻藥口瘡惟君家人中白散爲妙不數日發疔口生瘡如其言治之輒効季泉口授一家傳秘方治痘後餘毒如神

人參　白茯苓　金銀花　犀角各二錢　甘草一錢五分　羚羊角一錢　珍珠八分　蜜丸每服一錢日二服

一小兒痘泄諸醫以升澁之劑投之不効黃綺雲至以白芍藥約三兩餘酒炒一劑即止此脾虛有熱故也

治痘虛寒將行漿時作泄用（若係火熱泄者不可）

蓮肉（去心炒）一味為末每末一兩加雲南啞片五分研勻兒大者用末五分兒小者三分白湯調下立止虛癢或虛煩躁不止亦如之

于中甫長郎痘患血熱兼氣虛先服解毒藥後毒盡作泄日數次不止痘平陷矣仲淳以鼻鴉片（五厘）加炒蓮肉末（五分）米飲調飲之泄立止王宇泰繼以人參（二兩）黃芪（二兩）鹿茸（一錢）煎服補其元氣漿頓足蓋以先服解毒藥已多無餘毒矣故可補而無餘證

存之孫女痘後泄以鴉片如法飲之不止仲淳更以糯米蓮肉作糜一匙立愈

一老醫有孫痘已脫痂少腹脹小水不通眾醫以為痘後餘毒以利水解毒藥投之愈脹老醫忽悟曰痘後無實證土堅則水清脾虛下陷故也用後方一服立効

人參（一兩）大棗（五枚）木香（五片）

治痘後脾虛作泄老人患此更効

黃耆（四兩）人參（四兩）肉豆蔻（二兩）五味子（四兩）山茱萸肉（四兩）蓮肉（六兩）白稨荳（四兩）白朮（三兩）為細末棗肉搗膏和丸如彈子大每用一丸薑湯磨化下

一小兒痘已脫痂初無他苦一醫視其目精無神帶白曰不可為已逾日亡

治痘痂難脫（血熱又兼血虛故難脫也尚宜保養候脫盡乃可見風）

人參（一錢五分）白芍藥（酒炒三錢）甘草（炙一錢）麥門冬（去心五錢）五味子（六錢）懷生地（四錢）金銀花（四錢）水煎饑時服

痘毒非元氣壯實者不可外治大忌圍敷藥戒之

痘疳神効方

雄黃牛糞尖燒灰存性為末每一錢加氷片（二分）研細吹患處立愈

治痘後翳瘢（不拘上下部腫爛淋漓者俱効）

象牙末（三錢）眞珠末（三錢）白殭蠶（一錢炒）孩兒茶（一錢五分）為極細末以濟寧胭脂調敷毒水如注漸漸收口

防痘傷目方　吳季泉傳自王府

雌雄檳榔二枚每枚用清水粗碗上磨一百轉隨將痘兒目閉者以口津潤開用鴨毛蘸檳榔水搽眼稍三四次其痘痂即落永不傷目

又方

用眞濟寧油胭脂塗眼眶週遭三四次永不傷目試之累驗

治痘後病目兼治血熱病目而脾胃壯實者

天門冬四兩 麥門冬四兩 枸杞子四兩 甘草一兩 生地黃八兩 五味子二兩五錢 甘菊花三兩 玄參三兩 地骨皮二兩 白蒺藜炒去刺五兩 穀精草三兩 木賊草二兩 密蒙花二兩 草决明二兩 女貞實同黑豆九蒸九晒六兩 槐角四兩 羚羊角三兩 蜜丸

梁溪一女子痘後目痛上白膜不見物服二十劑全愈　仲淳立

穀精草二錢 草决明炒研一錢五分 川黃連酒炒一錢五分 懷生地二錢

川芎八分 甘草六分 白蒺藜炒研一錢 柴胡七分 甘菊花二錢 石菖蒲一錢 木賊草一錢五分 玄參一錢五分 連翹一錢 麥門冬二錢

痧疹論并治法

痧疹者手太陰肺足陽明胃二經之火熱發而爲病者也小兒居多大人亦時有之殆時氣瘟疫之類歟其證類多咳嗽多嚏眼中如淚多泄瀉多痰多熱多渴多煩悶甚則躁亂咽痛唇焦神昏是其候也治法當以清涼發散爲主藥用辛寒甘寒苦寒以升發之惟忌酸收最宜辛散誤施溫補禍不旋踵辛散如荊芥穗乾葛西河柳石膏麻黃鼠黏子清涼如玄參括蔞根薄荷竹葉青黛甘寒如麥門冬生甘草蔗漿苦寒如黃芩黃連黃檗貝母連翹皆應用之藥也量證輕重制劑大小中病則已毋太過焉

痧疹續論

痧疹乃肺胃熱邪所致初發時必咳嗽宜清熱透毒不得止嗽疹後咳嗽但用貝母括蔞根甘草麥門冬苦梗玄參薄荷以清餘熱消痰壅則自愈慎勿用五味子等收斂之劑多喘喘者熱邪壅於肺故也愼勿用定喘藥惟應大劑竹葉石膏湯加西河柳兩許玄參薄荷各二錢如冬天寒甚痧毒爲寒氣鬱於內不

得透出者加蜜酒炒麻黃一劑立止凡熱勢甚者卽用白虎湯加西河柳忌用升麻服之必喘多泄瀉慎勿止瀉惟用黃連升麻乾葛甘草則瀉自止疹家不忌瀉瀉則陽明之邪熱得解是亦表裏分消之義也

痧後泄瀉及便膿血皆由熱邪內陷故也大忌止濇惟宜升散仍用升麻乾葛白芍藥甘草白扁豆黃連便膿血則加滑石末必自愈痧後牙疳最危外用雄黃牛糞尖煅存性研極細加眞片腦一分研勻吹之內用連翹荊芥穗玄參乾葛升麻黃連甘草生地黃水煎加生犀角汁二三十匙調服緩則不可救藥痧

後元氣不復脾胃虛弱宜用白芍藥炙甘草為君蓮肉白稨豆山藥青黛麥門冬龍眼肉為臣多服必漸強愼勿輕用參朮痧後生瘡不已餘熱未盡故也宜用金銀花連翹荊芥穗玄參甘草懷生地鱉甲胡麻黃連木通濃煎飲之良

痧瘮不宜依證施治惟當治本本者手太陰足陽明二經之邪熱也解其邪熱則諸證自退矣

治痧瘮發不出喘嗽煩悶躁亂

西河柳葉風乾為細末水調四錢頓服立定此神秘方也砂糖調服兼可治瘮後痢去歲銘鞠救吳少海子及其姪湯水不入矣逐口強灌之而生今歲張守為長郎初婚亦危矣治之亦愈皆仲淳法也

又方　仲淳立

蟬蛻一錢 鼠黏子炒研一錢五分 荊芥穗一錢 玄參二錢 甘草一錢 麥門冬去心二錢 乾葛一錢五分 薄荷葉一錢 知母蜜炙一錢 西河柳五錢 竹葉三十片 甚者加石膏五錢 冬米一撮 又方加三黃

賀知忍少子病痧瘮家人不知尚以肉飯與之仲淳適至驚曰此痧症之極重者何易視之遽以西河柳兩許雜以玄參三錢 知母五錢 貝母二錢 麥門冬一兩許 石膏半兩 竹葉七十片 二劑而痧盡現徧體皆赤連進四劑薄暮矣知忍曰兒今無恙乎仲淳曰痧雖出盡煩躁不止尚不可保再以石膏三兩 知母一兩 麥門冬三兩 加黃芩 黃連 黃柏各五錢 西河柳一兩 竹葉二百片 濃煎飲之煩躁遂定而瘥

冬月痧瘮因寒不得發透喘渴悶亂煩躁不定用麻黃去節湯泡過以蜜酒拌炒加一錢或七八分于治痧藥中一服立透藥用乾葛麥門冬貝母前胡荊芥玄參西河柳甘草知母

治痧後下積滯　仲淳立

川黃連酒炒一兩 升麻七分 乾葛八錢 甘草四錢 黃芩八錢 白芍藥酒炒八錢 滑石如法一兩 懷山藥粉和丸白湯吞三五錢

治痧後口瘡

雄黃牛糞尖一個火煅過研細 明礬五分 米片一分五厘 皮硝一錢

白硼砂三錢 銅青二分能作痛可去之 研細以鵝翎管吹入患處

治痧後癰　仲淳立

鱉甲如法一錢 山查肉二錢 橘紅二錢五分 貝母三錢 竹葉五十片 炙甘草七分 麥門冬去心二錢 知母一錢二分 白茯苓二錢 乾葛一錢五分

柴胡一錢 ○如不渴去知母渴甚加石膏五錢

廣筆記

腫毒

疔疽一切腫毒神方　仲淳立屢試神驗

生甘菊(連根打碎一兩五錢)紫花地丁(五錢)甘草(炙三錢)鼠黏子(炒研一錢五分)括蔞根(二錢)貝母(去心二錢)金銀花(五錢)白芷(一錢五分)懷生地(二錢)白芨(二錢)連翹(一錢五分)加五瓜龍(五錢四兩許)先用夏枯草六兩河水六碗煎三大碗去渣入前藥煎一碗不拘時服潰後加鹽水炒黃芪(五錢)麥門冬(五錢)五味子(一錢)

秘傳治癰疽訣

凡未發疽大熱作渴及愈後作渴大小便秘神昏作嘔不食不知痛全犯者不治腰痛者不治清便自調神思清爽能食知痛不嘔夜能睡不發熱易治

癰疽發熱作渴不知痛用黃芪(君)麥門冬(上)五味(中)甘草(下)煎湯服大小便秘用大黃下之毒氣攻心神昏作嘔不食用護心托裏散菉豆粉(上)硃砂(中)乳香(下)俱為極細末和勻每服三錢白滾湯下

圍陽症瘡瘍(外勢平而不起色黑暗其痛沉在內裏者用此)

紅藥子(四兩)白芨(一兩五錢)白蘞(一兩五錢)乳香(六錢)沒藥(六錢)硃砂(三錢)雄黃(二錢)麝香(一錢)冰片(一錢)黑狗下頦(一個煅存性)豌豆粉(一兩)各另研為極細末和勻以醋蜜調敷四圍以極滾熱醋醮潤兼可服

圍陽症瘡瘍(外勢高腫散大色紅甚者帶紫俱發亮鮮明發熱大小便不利用此)

大同城(以桑皮綿紙襯灰淋湯下十分)加桑灰淋汁(三分)下硃砂　雄黃　乳香　沒藥　冰片　白芨　白蘞　蟾酥(俱中)麝香　牛黃(俱下)明礬(上)五倍子　大黃(上)各藥另碾為細末待汁冷和勻入上好小口磁器罐中口上用鉛套套上外以黃蠟封好令固容點用

灸癰疽藥餅

夜明砂(五錢)月經布灰(存性一錢)麝香(二分)冰片(三分)乳香(一錢)沒藥(一錢)明礬(研細一錢五分)雄黃(一錢)蕎麥麵拌勻做薄餅放疽頭上加大炷艾火灸之先令病者吃些米飲及托裏等湯藥每灸至百壯痛者灸至不痛不痛者灸至痛但得一爆其瘡立愈元氣弱者停一會再灸鎮日夜灸方好

治發背及腫毒圍藥

麝黃(二錢五分研細)五倍子末(一兩)米醋調敷圍

治發背神方

一法單用敗龜板一味去肋塗黃蠟炙透內服外敷錫山保安寺僧秘訣也有奇效　馬銘鞠傳

又方

血竭一錢 雄黄一錢 没藥五分 麝香五厘 研細末用綿紙爲燃
長一尺二寸將藥四五分以真蔴油潤燃着燈頭令
病人避風處端坐執燃者離瘡四五分自外而內徐
徐照之瘡上微微覺熱即心神快爽不可太過恐傷
好肉初用三條每日加一條漸加七條勢消每日減
一條直燻至紅腫消盡爲度可貼太乙膏加琥珀燻
一次隨用敷藥日日如此燻時將猪蹄湯㳚去油用
新羊毛筆潤湯將敷藥洗淨始燻燻罷用後敷藥車
前子連葉根 豨薟草 金銀花 五爪龍俱用鮮者 各等分
擣爛加多年陳小粉調敷四圍紅腫處中留一孔恐

出膿如瘡口大用芴葉滾水泡洗開去內涎水拍熱
貼之如瘡口久不合恐流膿水再以藥敷之

太乙膏方

玄參 白芷 生地 甘草 當歸 血餘多 大黄多

治背毒初起 由於髯者遠志一味可治

遠志肉甘草汁煮去骨五錢 甘草一錢五分 甘菊花葉鮮一兩 貝母三錢
鮮忍冬藤五錢 紫花地丁鮮五錢 連翹一錢 白芨三錢

托裏敗毒散

綿黄芪鹽水炒三錢或五錢或八錢或一兩 甘草節炙二錢加至四五錢 可 赤芍
藥二錢 金銀花二錢 茜草江西出細如燈心者佳三錢 何首烏鮮者五錢 真

白殭蠶炙研六分 白芨二錢五分 皂角刺一錢 貝母去心二錢 括蔞根
二錢 穿山甲土炒研一錢 鼠黏子炒研一錢 蟬退去翅爪一錢 先用夏
枯草五兩河水五大碗煎三碗入前藥同煎至一碗
不拘時服陰症去後五味加人參三錢 麥門冬五錢

潰後服藥

人參二錢 麥門冬五錢 綿黄芪蜜炒五錢或一兩 甘草炙一錢 五味
子蜜蒸一錢 白芍藥酒炒三錢 金銀花三錢 山藥炒三錢 水二鍾煎
一鍾難得收口加肉桂胃氣弱加生薑二片 五 大棗枚
癰疽潰瘍忌术腫瘍忌當歸

替針散

蟹殼一個煅存性爲末酒調下不可多服

去爛肉方

用巴豆炒烟起焦黑爲度碾極細末敷上去舊生新

長肉方

用無人見處自死竹蘸菜油燒滴下油用磁碟盛之
搽上即生肉神驗

護膜礬蠟丸

白礬明亮者研二兩 黄蠟一兩溶化提起待稍冷入礬末不住手攪勻加蜜五六錢和勻衆
手丸如梧子大蠟冷不能丸以滾湯燉之便軟硃砂
爲衣每二十丸漸加至三四十丸白湯或酒吞此藥

護膜防毒氣內攻未破即內消已破即便合一日之中服百粒方有功終始服過半觔必萬全病愈後服之尤佳

又方

白礬（生研末四兩） 眞黃蠟（二兩半） 加煉蜜七八錢 硃砂研如飛麪水飛如法六錢 攪勻急須衆手爲丸如梧子大每四錢白酒呑

治癰疽對口疔瘡發背一切無名惡腫毒方名

無敵大將軍

桑柴灰（將柴另燒取其炭火置一大缸內待其自化成白灰取一斗綿紙襯入淘籮內清滾水淋

下汁磁缸盛貯淋至汁味不苦澁鹹則止將汁入磁碗中重湯燉如稀糊爲度） 茄稈燒灰（淋製如前法用一十） 礦灰（即石灰須柴燒者佳一斗淋汁如前法） 三味熬調和勻名三仙膏亦可點癰疽之稍輕者再和城水熬膏一兩加入後開細藥則成全方每三仙膏五兩眞正自收蟾酥（三錢五分酒化令勻） 梅花冰片（一錢） 眞正牛黃（一錢） 珍珠（二錢一味隻研如飛麪） 透明雄黃（二錢） 明礬（一錢） 硃砂（一錢五分） 白硼砂（二錢） 八味另研如飛麪方妙 眞麝香須用當門子（即麝香最上乘者碾勻一錢） 銅青（一錢五分） 硇砂（二分五厘） 火硝（三錢） 輕粉（二錢） 乳香（二錢打碎人乳浸爛研勻） 沒藥（一錢五分製法同前） 各藥研細末和勻再碾數千下將前膏加入攪得極勻入磁罐內罐須小口者

妙以烏金紙塞口封以好黃蠟勿令一毫氣走每遇毒取少許塗其頂乾則以米醋和蜜少許潤之其毒黑血或毒水爆出即時鬆解切忌不可着在好肉上或用蕎麥麪調若係疔瘡加鐵鏽黃一分研如麪和入多塗其正頂信宿其根爛出內服紫金錠一錠須內府者方効若係癰疽等症別服蠟礬丸及托裏解毒之劑此藥有奪命之功難以盡述倘一時無許多好藥則製半料亦救人無算矣

治疔丸

蟾酥（二錢） 冰片（一錢） 麝香（七分） 眞白殭蠶（一錢五分） 明礬（三錢） 牛黃

（一錢） 硃砂（一錢五分） 黃白占溶成油須令軟冷定加前藥末和丸如麻子大每七分葱頭白酒呑下取汗汗後即以半枝蓮爲君 連翹（上） 赤芍藥 甘草 白芨 白蘞 金銀花（中貝） 紫花地丁（五錢） 生甘菊（二兩） 河水二鍾煎一鍾下大黃隨病勢加之一滾即起服後必行然須察病人胃氣壯者可用行後方用敗毒托裏之藥調理之可不死矣大抵治疔毒在急急則毒氣未走若走黃多不可治走黃後發狂咬人便能發疔汗下時其穢氣觸人亦能發疔宜謹避之看瘰瀝疔毒須飲酒以麻油塗鼻

治疔膏　金太初傳神驗

以透明松香(澄青各五錢)麻子肉(二錢如冬季加五分)三味大青石上以鐵鎚鎚細鎚至前藥粘在鎚上拈起如清水一般為度又加飛丹(一錢)再鎚數百下取收小磁杯內如遇初起疔毒以新青布照疔瘡一般大小攤膏藥貼之痛即止少頃毒水漸漸流盡疔根如燈心一條拔出仍用原舊膏貼上至重者再換一膏藥全痊矣攤膏藥小磁盃(隔湯燉)化竹筋攤膏約一文錢厚

疔毒神驗方

用陳年露天鐵鏽礪如飛麪將金銀簪脚挑破毒處一孔納鐵鏽末於內仍將皮蓋好少頃黑水流盡中有白絲如細線慢慢抽盡此疔根也盡即立愈

又方用甘菊花并根葉搗汁以酒下之立消

顧聖符幼弟患髭疔醫者先用火針圍藥服至目與鼻俱隱入肉矛關緊急馬銘鞠用患者耳垢齒垢刮手足指甲屑和勻如豆大放茶匙內燈火上炙少許取作丸令洗淨圍藥將銀簪挑開疔頭抹入外用綿紙一層津濕覆之痛立止半日腫半消目可開次日服仙方活命飲二劑愈此法兼可治紅絲疔長洲華承溪指節間患之得此而痊又云可治面白疔未試也此方傳白道人

顧博士伯欽內人左耳患疔時方孕仲淳先以白蘇子末雞子清調塗腹上護胎次以夏枯草甘菊貝母忍冬地丁之屬大劑飲之一服痛止疔立拔胎亦無恙白藥子療馬病者也

治耳邊發腫連太陽腮齒俱痛不可忍

大黃(一兩)青木香(三錢)姜黃(二錢)檳榔(二錢)為末醋蜜調勻貼患處中留一孔出氣

治乳鵞

芒硝(研細一錢五分)膽礬(八分)雄黃(八分)明礬(八分)俱研細和勻吹入喉中

又方

用蛤蚆草(即土牛膝葉如荔枝)搗汁灌鼻內右鵞灌左鼻內左鵞灌右一吐而愈或急不及藥以針或蘆管刺喉令出黑血復以蜒蝣加烏梅少許搗爛取亂髮裹箸上塗前藥撓患處去其膩痰則愈矣蜒蚰不能卒辦梅雨時取製磁瓶內封固久而不壞

纏喉風方(即喉痹仲淳試過有驗)

明礬(三錢)巴豆(七粒去殼)溶礬入巴豆燒至礬枯去巴(豆存)研細吹入喉中流出熱涎立開

治喉癬內熱

貝母(去心二錢)鼠粘子(酒炒研二錢)玄參(二錢五分)射干(二錢不辣者是)甘草(二錢五分)括蔞根(二錢)懷生地(三錢)白殭蠶(一錢炒研)累連翹(一錢)竹葉(二十片)水二鍾煎八分備時服

倪仲昭患喉癬邑中治喉者遍矣喉漸漸腐去飲食用粉麪之爛者必仰口而咽每咽泣數行下馬銘鞠曰此非風火毒也若少年曾患黴瘡乎曰未也父母曾患黴瘡乎曰然愈三年而得我銘鞠以爲此必誤服升藥之故凡患此瘡者中寒凉輕粉之毒毒發於身升藥之毒毒發於愈後所生子女毒深者且延及於孫若錫備不以治結毒之法治之必死以甘桔湯爲君少入山豆根草龍胆射干每劑用土茯苓半觔濃煎送下牛黄二分半月而瘥竟不用吹藥既而詢之云父母病時果服升藥而瘥瘥後曾口碎非升藥而何今鑒家吉然用之不曉其中毒之深故特明其說

喉痺(附)

雄黄 芒硝(各一錢) 研細以鵞毛管吹少許數吹立散但待其腫甚而吹爲妙

又方用半枝蓮搗汁吃立散其渣須藏於家中勿令見風

吹喉方(治雙鵞單鵞神效)

火硝(一錢五分)官硼砂(五分)片腦(三厘即冰片)雄黄(一分不用亦可)鵞管蘆管銀管共可盛吹前藥用三匙吹上喉即吐痰涎愈從鼻孔中吹入亦效

瘰癧丸方

貝母(去心二兩)天花粉(一兩五錢)玄參(一兩五錢)甘草(一兩五錢)斑猫(百米炒去頭足翅用)肥皂(二斤每一肥皂去核入斑猫四個線縛蒸熟去斑猫并肥皂皮筋淨肉十兩)前藥爲末共搗爛為丸如梧子大每服一錢白滾湯呑服後腹疼勿慮此藥力追毒之故

又方

取過冬青(即荔枝草名天明精)五六枝同鯽魚入鍋煮熟去草及魚食汁數次即愈

朱文學鐮患癧仲淳爲灸肩井肘尖兩穴各數壯而愈

治瘰癧(同莊斂之仲淳試之有効)

眞芝蔴油(二觔)胎髮(四兩如無以童男髮洗淨代之)川山甲(五錢)白礬(飛過一兩)黄蠟(四兩)飛丹(二兩)松香(六兩)輕粉(一錢研)乳香 没藥(各五錢另研)燕窩泥(朝北者二兩微炒)五靈脂(五錢另研)麝香(另研五錢)蜜陀僧(五錢)將川山甲五靈脂煎數沸下胎髮熬㳂濾去渣

稀汗熱油一斤四兩仍入鍋内下白礬煎二三沸下
黄蠟黄丹煎一沸下松香官粉六兩再煎一沸下燕
土如沉香色滴水成珠住火方下乳香没藥攪匀少
頃下輕粉桃柳枝攪温可入手然後投麝香攪匀水
浸去火毒七日用貼瘰癧未破者軟已潰者乾内服
夏枯草湯

夏枯草湯

金銀花五錢 夏枯草二兩 柴胡七分 貝母二錢 土茯苓一兩白色者
鼠黏子一錢微炒 鱉虱胡麻仁二錢微炒 酸棗仁一錢 瓜蔞仁二錢
陳皮一錢略炒 皂角子一錢 白芍藥一錢酒炒 當歸身二錢 粉甘草
一錢 荆芥穗一錢 連翹一錢五分 何首烏五錢 漏蘆二錢 水煎食後
服

又方

夏枯草 蛇苗草 紫背天葵 紫花地丁 金銀
花 九龍草或汁者汁或末者末俱要以好酒調服

又方 萬病星膏兼治魚口一切等瘡

巴豆去殼炒黄色復以紙條炒火燒之候黑色用 海藻二錢炒 昆布一錢炒鹿角中
天南星一錢切碎浸二日炒 升麻五分 天花粉五分炒 各爲極細
末以香油和成稀膏用文火熬候燒乾入巴豆下巴
豆後略熬退火冬月加巴豆五錢南星一錢夏月減南星
五分加天花粉一錢

治熱癤 廖憲副夢衡傳

黄梅水時取新出蝦蟆黑而細者最 置瓶内木蓋口蠟封
埋地下久化成清水取出蘸抹之兼可治疔疽

治對口瘡 試之神效

鮮茄蒂七個 鮮何首烏等分輕重 水二鍾煎八分一服出膿
再服收口

又方

金銀花一兩 木槿樹根皮一兩切片 酒水各一碗煎食後
服面上疔加白芷一錢 蒲公英一根連根 和黄蜆打爛罨患
處以真麻布包之三日去藥

瘰癧 一女子頸下結一硬塊而不痛有似石癭

仲淳疏方服十劑全消

貝母三錢去心 連翹二錢 鼠粘子一錢五分酒炒研 括蔞根二錢 金銀
花五錢 何首烏去皮竹刀切片三錢 白蒺藜二錢 蒼耳子一錢五分研細 生甘
菊五錢 青木香一錢五分 紫花地丁五錢 先用夏枯草五兩 河水
五碗煎至三碗去渣納煎藥同煎至一碗

敷藥方

南星二兩 海藻 昆布 檳榔 薑黄 白蘞 猪牙
皂角各一兩 細末醋調敷

梁谿一婦人生癤臂上服此半日立出血膿愈

連翹二錢 白芷二錢 甘菊一兩 紫花地丁五錢 白芨一錢 粉甘草三錢 金銀花五錢 生地三錢 地榆四錢 皂角刺一錢 栝蔞根二錢 茜草二錢 鼠黏子一錢

治肺癰　馬銘鞠傳

其法用百年芥菜鹵久窨地中者數匙立起此鹵嘉興府城中大家多藏之目擊神效

又方

魚腥草水煑不住口食之治肺癰吐膿血神方也正名蕺草　兼治魚口

又方

金絲荷葉搗汁同生白酒數飲立効

乳癖乳痛方　神驗

用活鯽魚一個 山藥一段如魚長 同搗汁敷乳上以紙蓋之立愈

乳癖方　張玉屋居後江孟脩兄驗過

白芷一錢 雄鼠糞一二錢 種曬乾爲末用好酒調服必多飲取一醺睡而愈　雄鼠糞尖者是

又方

顧文學又善内人患左乳岩仲淳立一方夏枯草蒲公英爲君金銀花漏蘆爲臣貝母橘葉甘菊花雄鼠糞連翹白芷紫花地丁山茨菰炙甘草瓜蔞茜根陳皮乳香沒藥爲佐使另用夏枯草煎濃汁丸之服勳許而消三年後右乳復患用舊存餘藥服之亦消後以此方治數人俱効

里中婦沈姓者患乳癧潰爛經年不見臟腑者一膜爾馬銘鞠用鼠糞三錢 土楝樹子三錢經霜者佳川楝不用 露蜂房三錢 俱煅存性各取淨末和勻每服三錢酒下間兩日一服痛即止不數日膿盡收斂此方傳自江西販糖客因治祝氏喉癰得之

圍藥

白芨一兩研末 水調敷乳癖處候乾再以水潤二三次愈

會膿散　治腹中癰毒

川山甲炙 白殭蠶炒去絲嘴 白芷各五錢 大黃二兩 乳香 沒藥 五靈脂各五錢 爲末每服五錢酒服膿從大便出幼者用三錢

治腸癰　仲淳服之甚驗

金銀花五錢 貝母二錢 皂角刺一錢五分 連翹一錢五分 川山甲三錢 赤芍藥三錢 白芷一錢五分 地榆五錢 甘草節一錢 當歸二錢 夏枯草一兩熬汁和藥復煎 鼠黏子一錢五分 紫花地丁一兩 生甘菊花

根二兩擣汁和藥內服
一人患腸癰傴僂痛不能伸有道人教以飲純黃犬
血二碗和白酒服其人遂飲至四碗次日下膿血盡
而瘳
　治便毒仲淳親試之甚驗加穿山甲同患處者二片土炒引經更妙
棉地榆四兩白酒三碗煎一碗空心服雖有膿者亦愈
　又方
棉地榆四兩粉甘草一兩金銀花一兩白芷二錢皂角刺一錢五分
水二鍾煎一鍾空心溫服
　治下疳

仲淳治數友下疳用黃栢官粉膩粉杏仁珠末氷片
敷之無不愈者後去膩粉杏仁加黃芩更以小大薊
地骨皮湯洗淨敷之効更良
　又方
蟬蛻七分眞白殭蠶紫蘇葉包蜜炙七個杏仁七粒去皮尖芭蕉根五錢
搗爛獨核肥皂仁七粒雪裏紅一把打爛土茯苓白色者去皮二兩白
蘚皮一錢牛膝二錢黃栢一錢木通七分皂莢核七粒薏苡仁二錢
連翹一錢漢防巳酒浸六分甘草節一錢石斛二錢柴胡六分草薢
二錢地骨皮二錢水三大碗煎不拘時饑則服日三服氣
虛脾弱加蜜炙黃芪三錢血虛加生地三錢

　又極秘神方切楸樹下疳仲淳屢用神効
鮮小薊鮮地骨皮各五兩煎濃汁浸之不三四日即
愈
　治蛀疳服藥
珍珠生研細牙末牛黃氷片各一錢眞白殭蠶皂
角各二錢滴乳石一兩研細加飛甆細末每服九厘土茯苓湯
呑下以乾物壓之
　蛀疳摻方
橄欖燒灰研細末摻上
　治痔瘡出血過多東垣名黑地黃丸臧晉叔試之効

生懷慶一觔酒洗淨用水煮透磨爲末重湯熬成膏聽用茅山蒼朮切片用米泔浸一日夜去蟲蛀曬乾爲末北五味半觔曬乾爲末炒黑乾薑淨末八錢用黑
棗肉半觔去皮入前藥擣丸空心白湯每服三錢
　治痔瘡歸安陳汝良傳
用荔枝草即天明精一名地菘煎湯洗仍以草手搓
軟塞患處
　治漏
鉛花四兩研如麵黃牛胆邊合翁骨二兩酥炙焙爲末雄猪前脚
蹄二兩酥炙焙爲末青黛二兩杏花二兩人中白五錢煅過將藥總置
陽城礶內用鐵油盞隱泥封好置漏濕大米數粒[illegible]

盞上四面用火煆以米熟爲度取出研細炒爲丸如
梧子大每五錢空心下午各進一服淡鹽湯吞木白
酒二杯以猪蹄下酒醋紫蘇略吃些〻亦可

坐板瘡方　丁右武親驗有効

松香五錢研細雄黃一錢研細如濕瘡加蒼术二錢各末和勻以
綿紙包裹撚成紙撚二條臘月猪油浸透點火燒着
取滴下油搽上立効

治臂癰

一人患臂癰用五爪龍連枝搗汁酒漉服日進四五
次膿從大便出未成膿者内消如有頭以滓敷上立

散治魚口極効

治下部火丹　馬銘鞠傳

用鑪砂山梔黃連黃芩黃檗大黃寒水石共末水調
敷上立効　切忌用芭蕉根

又方

川黃連末冢和雞子清調敷　馬銘鞠云若遇抱頭
火丹必砭去惡血方効每用此法治人其不肯砭者
多誤事　予家兒輩試之甚驗

煎方

牛膝三錢木瓜〻〻石斛三錢生地五錢連翹二錢黃檗二錢甘草一錢金銀花五錢地榆五錢茜草二錢赤芍藥五錢水煎服

治懸癰　一名騎口癰生在陰囊後穀道前不早治穿潰爲漏則難治矣一婁試之得効

大粉甘草一兩每根劈作四片或二片用泉水二碗輪
流蘸炙以水盡爲度切片河水十碗熬至一碗空腹
服盡即愈　此孫真人方

談公武患跨馬癰外勢不腫毒内攻膿多瘡口甚小
突出如指大一塊觸之痛不可忍多飲寒劑外敷凉
藥毒内攻胃氣俱損銘鞠盡去闤藥洗淨瘡口但用
一膏藥以護其風用大劑黃芪山藥懷生地白芷牛
膝米仁金銀花雜以健脾藥十餘劑膿盡再數劑肉

長突出者平矣後服六味丸勸許精神始復

江都尹奉麓乃尊髡於腿癰其子九歲亦患之就醫
鋪月勢漸盛銘鞠按之堅如石幸兒氣厚可内消用
牛膝薏苡地榆生地鼠黏子金銀花連翹粉草皆仲
淳常用法也初劑加利藥微利之即稍寬過兩劑加
汗藥微汗之勢益寬至數劑取川山甲末五錢半入煎
半調藥送下兒善飲令兒一醉自此頓消半月地下
行矣初一醫欲開刀遇銘鞠中止凡瘡不利宜〻開刀
爲戒

梁谿一男子生瘋膝下楚甚仲淳適至即於寄

間作劑服之飲酒數杯擲立破出鮮血愈
連翹二錢 白芷一錢 粉甘草三錢水炙 金銀花五錢 牛膝三錢 懷生
地三錢 地榆四錢 皂角刺一錢 鼠黏子一錢酒炒研
陸封公養質患腿癰瘍醫用忍冬花角刺連翹白芷
貝母天花粉陳皮乳香沒藥治之不効仲淳卽前方
加綿地榆炙甘草紫花地丁服三四劑愈

治鶴膝風 一人患此五年數藥三日卽愈王心函傳

乳香 沒藥各一錢五分 地骨皮三錢 無名異五錢 麝香一分 各
爲末用車前草搗汁入老酒少許調敷患處

癩瘡方 章宇泰傳六郎乳母試之神効

松香一兩 輕粉三錢 乳香五錢 細茶五錢 四味共打成膏先將
茐頭花椒煎濃湯爊洗淨用布攤膏厚貼患處以絹
縛定黃水流盡爛肉生肌

又方 曹和尚傳

松香四兩 好韶粉一兩 先將松香投入滚水中一撈卽起
另研如飛麵後加韶粉研勻入眞麻油勿令太薄調
如極稠糊用筋挑起以不斷絲爲度仍用極緊細松
江布攤成膏貼於瘡上將寸許濶壯絹條紮急勿使
泄氣一日收緊二次三日一換膏藥半月必愈

癩瘡久不愈方

黃占 白占 輕粉 韶粉 臘月豬板油麻油各
半化勻調和前藥用薄油紙攤貼瘡上血風瘡久不
結痂亦妙 入芝麻油乳香更妙

足指疔毒

生甘菊一兩五錢 紫花地丁八錢 金銀花藤一兩 穿山甲三片土炒
木瓜一錢研細 牛膝五錢 薏苡一兩 生地五錢 連翹三錢 白芨三錢 夏
枯草六兩

李行甫患徵瘡俗呼番瘡 誤用水銀番硍等藥搓五心三
日間舌爛齒脫喉潰穢氣滿室吐出腐肉如豬肝色
湯水不入腹脹二便不通醫皆謝去獨用治喉藥吹

喉痰纏愈甚痛難忍幾死鉛鞘按其腹不痛雖脹滿
未堅猶未及心知水銀毒入腹未深法宜以鉛收之
急用黑鉛觔餘分作百餘塊加大劑甘桔湯料金銀
花粉草各用四五兩水二三十碗鍋內濃煎先取三
四碗入湯注中徐灌之任其自流逾時舌漸轉動口
亦漱淨卽令恣飲數盞另取渣再煎連前濃汁頻灌
手足次日二便去黑水無筭始安方用吹口藥及敗
毒托裏藥數劑而愈後賈傳有顏孝者亦患徵瘡誤
用水銀薰條其證一如行甫卽以前法治之次日立
起

治黴瘡

猪胰子二兩 金銀花二錢 皂角刺一錢 芭蕉根一兩 雩裡紅[illegible]錢 五加皮二錢 土茯苓二兩白色者 皂莢子七粒打碎 獨核肥皂仁七粒切片 白殭蠶七分炙 木瓜一錢 白蘚皮一錢 蟬蜕一錢 年久力衰者加薏苡仁五錢 甘草節二錢 綿黃芪二錢 懷生地二錢 人參二錢 久不愈加胡黃連三錢 胡麻仁二錢 全蝎七枚 水三大碗煎一碗不拘時饑則服

又方

棉花子仁一味研如泥入綿槐花末和丸如菉荳大每四錢空心及饑時吞

治結毒

獨核肥皂仁七粒 千年矮即雩裡紅一兩 皂莢子七粒 甘草節一錢五分 木瓜一錢五分 蟬蜕一錢 青木香一錢 土茯苓二兩白色者 綿黃芪三錢鹽水炒 白殭蠶炙炒研七分 鱉虱胡麻仁二錢炒研 白芷一錢 何首烏二錢 金銀花二錢 連翹一錢 水三大碗煎一碗不拘時饑則服

結毒丸方

鍾乳石研如飛麪水飛一兩五錢 眞牛黄研如飛麪三錢 珍珠研如飛麪四錢 猪牙皂角去皮膜爲極細末七錢 樺皮灰存性研如飛麪四錢 百草霜庄家鍋底者佳[illegible]錢

牛黄丸 神効

牛黄眞者研細三錢 象牙末三錢 白殭蠶二錢 紅鉛二錢 冰片五分 明礬一錢 極細末煉蜜丸如麻子大每服五分土茯苓白色者木槌打碎二兩 砂鍋内煮汁吞丸藥空心上下午饑時日三次

洗方

五倍子四兩 地骨皮四兩 皮硝五錢 甘草二兩 苦參四兩 葱頭十個 河水煎濃湯一鍋於無風處乘熱熏日浴三次浴時先吃飽或服煎藥一貼忌食茶醋牛肉麪河魨火酒

摻方

粉霜一錢五分甘草水煮過 眞冰片三分另研 二味和勻洗淨摻上立瘥

浸酒方

防風 當歸 羌活 白芷 白蘚皮 五加皮 蒼术 牛膝各二兩 荆芥 薏苡 蔓荆子 木瓜 白蒺藜去刺各一兩 生地黄三兩 烏稍蛇出吳江戶山方頸者佳一尾好 酒十觔浸煮三炷香卧時服丸亦可

治頭面結毒

斷艾去筋一兩 川椒去核八錢 麻黄去節二錢 川芎二錢 猪頭天靈蓋火煅存性五錢 白茯苓一兩 極細末蒸餅丸如菉荳大飯後

白湯送下每服三錢服後一二三日瘡口乾燥不足是其效也服至瘡口平復方住　忌牛羊魚腥房慾患久者宜間服十全大補湯十數劑佳川椒出桃花洞者佳嚼半粒口錬不能言者真每兩價五分

又治結毒方　兼治積年虛勞痰火健脾進食

極木一名十大功勞一名貓兒殘俗呼光蓏樹黑子者是紅子者名樞木亦可用取其葉或泡湯或為末不住服

譚公亮患結毒醫用五寶丹餌之三年不効仲寧云五寶丹非完方也無紅鉛靈柴不能奏功蒔無紅鉛姑以松脂鉛粉麻油調敷應手而減公亮先用喬伯珪所贈乳香膏止痛生肌甚捷及用此二味功効彌良乃知方藥中病不在珍貴之劑也

又方

銀硃二錢輕粉二錢白占二錢黃占三錢用麻油三兩先將二占化勻調前藥末攤成膏貼之戒房事必効

凡父母正患黴瘡時育兒鮮有免者其證渾身破爛自頂至踵兩目外幾無完膚日夜號泣或吐或瀉似癆似驚變態百出父母不知見有他證別作治療十無一生治法以牛黃為君稍加犀角羚羊角硃砂冰麝和入土茯苓粉生蜜調服使兒日日利去惡毒乃見有他證隨宜治之母亦隨宜用藥加以散毒劑不住口服其外用大粉草金銀花為極細末二三升破爛處洗淨大撒敷之半月後方易神効敷藥再敷數日自愈愈後一兩月當復發再後兩三月當再復發漸輕仍如法治之自愈愈後或口角眉角或肛門存二三餘毒不必治矣其混身或癬或瘡忽聚忽散數之便愈大抵年餘始得除根若母不禁口或兒漸大不能禁口有延至二三年者然不殺足矣胎中之毒徹骨入髓焉能旦夕除哉　馬銘鞠傳

升藥五靈散　馬銘鞠傳

膽礬治筋而益肝其色青應東方木　辰砂養血而益心其色赤應南方火　雄黃長肉而補脾其色黃應中央土　明礬理諸瘡而助肺其色白應西方金　磁石榮骨髓而壯腎其色黑應北方水

此方見焦氏筆乘喜其不用水銀製而用之功効遲緩後因加水銀一兩與前五味等分和勻入陽城罐內打火三香取出加敷藥中用之效如神

神效敷藥方　馬銘鞠傳

夜合花白者良陰乾　象皮同黃沙炒成珠切片再炒[illegible]　檸香炒　乳香　没藥各去油　血竭　孩兒茶[illegible]　花蕊石[illegible]　紅者良半生半煆各一兩　白占八錢　珍珠五錢　冰片一錢[illegible]

白芷研勻最後入氷片如欲去腐每兩加五靈散伍錢欲生肌每兩加前散三分或五分如治痘後膿水淋滴下疳等瘡只加一二分治湯火傷每兩加絲綿灰錢剔牙松皮煅存性五六錢韶粉煅黃五六錢或乾摻或香油調一切外症俱效

附海上單方

里中有周七者少年曾患毒左肢下得一異方用糯米炊飯乘熱入甕塊夾葱管少許搗極爛如膏貼患處輒消至中年腰間忽生一毒熱如火板硬痛不可忍傴僂跼蹐自分必死屢藥不効急思前方如法貼之未幾大便去糞如脂垢甚多硬者漸軟數日而痊

雜症

腦漏

腦者諸陽之會而爲髓之海其位高其氣清忽下漏者其變也東垣云上焦元氣不足則腦爲之不滿經云膽移熱於腦爲鼻淵夫髓者至精之物爲水之屬腦者至陽之物清氣所居今爲濁氣邪熱所干遂下臭濁之汁是火能消物濁有所傷也治法先宜清肅上焦氣道繼以鎮墜心火補養水源此其大畧耳藥多取夫辛凉者辛爲金而入肺有清肅之義故每用以引散上焦之邪如薄荷荊芥甘菊連翹升麻鼠粘天麻之屬鎮墜心火補養水源如犀角人參天冬麥冬五味朱砂甘草山藥生地茯苓牡丹皮之屬然須兼理乎肺肝蓋鼻乃肺之竅而爲腦氣宣通之路又治乎上焦而行清肅之令膽爲春升少陽之氣與厥陰爲表裡而上屬於腦戴人有云膽與三焦尋火治內經謂膽熱所干義亦明矣理肺用桑皮鼠粘桔梗二冬花粉竹瀝清肝膽以柴胡白芍羚羊竹茹棗仁川芎或者又謂世人多用辛温辛熱之藥取効此蓋何居蓋辛熱甘温多能宣通發散故病之微者亦能

奏効耳此從治刼法非不易常經明者察之

頭風神方 方觀頤中丞傳自一道人予僕婦患此痛甚欲自縊服一劑數年不發

上茯苓 忌鐵四兩 金銀花 三錢 蔓荊子 一錢 玄參 八分 防風 一錢 明天麻 一錢 辛夷花 五分 川芎 五分 黑豆 四十九粒 燈心 二十根 芽茶 五錢 河水井水各一鍾半煎一鍾服

治半邊頭痛 屬火痛者用之妙

大黃末 二分 黃芩末 一錢 二味和生白酒一碗頓熱調勻服之即愈

又方

用芝蔴炒熱舂碎乘熱將好燒酒入磁器中重湯熱入芝蔴扎緊只用一葱管孔插入磁瓶口內引鼻吸其氣左則薰左右亦如之虛寒用燒酒虛熱用好米醋代之內服對病方藥

髒證

紀華山先生雅自負數奇更無子時邑邑不快漸至瘧脹四年肌肉盡削自分死矣姑蘇張璉水胗而戲之曰公那須藥一第便當霍然以當歸六錢韭菜子一兩香附 童便炒八錢 下之紀有難色不得已減其半次日作二劑耶一服夜夢遺舉家懼哭張拍案曰吾正欲其通爾仍以前半劑進胸膈間若勇士猛力一推辟與

糞數升尋啜粥二碗再明日巾櫛起見客矣逾年生一子即表弟汝占也

治筋骨疼甚如夾板狀痛不可忍者 李景東中丞傳

將騾子脩下蹄爪燒灰存性研末或酒白湯調服立愈

癎症方 名補心寧志丸

天竺黃 另研如麪五錢 沉香 另研如麪一錢 天門冬 去心酒洗蒸二兩 白芍藥 酒炒二兩 白茯神 去心四兩 遠志肉 甘草汁浸蒸二兩 麥門冬 去心二兩 炙甘草 六錢 旋覆花 一兩五錢 真蘇子 研一兩 香附 酒浸曬乾童便拌炒 上炒三兩 半夏 薑汁拌以明礬末少許同浸二兩 皂角莢 不蛀者去黑皮酥炒去子取末二兩 爲末和勻懷山藥粉糊丸如菉豆大硃砂一兩研如法爲衣每服三錢用竹瀝點湯下

風癎病神方

好生犀角 四兩 剉末每用一兩加清水十碗入砂鍋內熬至一碗濾淨再加水十碗熬至二酒杯加淡竹葉 四兩 水六碗煎二碗去渣加犀角汁同服盡四劑即愈

治火上升有痰留滯喉間如有核上法宜降氣清火

真蘇子 研二錢 廣橘紅 三錢 貝母 三錢 括蔞根 二錢 白茯苓 三錢 麥門冬 五錢 白芍藥 酒炒三錢 黑連翹 一錢五分 黃檗 蜜炙一錢五分 五

味子一錢打碎水煎加竹瀝服

施靈脩有一里人善酒臥床蓐者三年靈脩憐而索方於仲淳仲淳親胗之知其酒病也夫酒濕熱之物多飲者濕熱之邪貫於陽明濕熱勝則下客於腎而爲骨痿昔人治痿病取陽明以五味子爲君黃連臣麥門冬乾葛白稨豆爲佐服之立起

治血痞沉香丸

沉香 血竭 辰砂各二錢五分 木香一錢二分 真麝香一錢二分 琥珀五分 當歸尾一錢五分 牡丹皮一錢五分 延胡索一錢五分 爲細末用磁罐煎甘草湯打糯米糊爲丸凡氣痛酒磨務

湯亦可産後血塊酒磨服

烏鬚神方

女貞實一斗如法去皮每斗用馬料黑豆一斗揀淨淘洗曬乾同蒸透九蒸九曬先將女貞實爲末加生薑自然汁三兩好川椒去閉口者及蒂爲末三兩同黑豆末和勻蜜丸如梧子大先食服四五錢白湯或酒吞

又方

將鱧腸草揀鮮者二三十觔擣汁入九蒸九曬過女貞實末再曬乾如前爲丸亦佳但服之腹痛作泄不若薑汁椒末爲佳蒸女貞實先將上好老酒浸一宿次日用黑豆蒸如此者九以其性寒故也更服八珍丸以實根本

又方 前傳女貞實旱蓮草二方試之甚驗苦于腹痛作泄仲淳再爲更定涼血兼理脾

何首烏勿去皮烏豆同牛膝蒸製如常法最佳用人乳浸曬三四十次赤白各二觔 女貞實酒拌九蒸九曬二觔 旱蓮草熬膏十二兩 烏飯子膏即南竺枝子也十二兩 茅山朮米泔浸蒸曬三次去皮切片十二兩 真川椒紅十二兩去白擇閉口勿用 沒石子十兩 爲細末以旱蓮草膏烏飯子膏同煉蜜和丸如梧子大每五錢空心饑時各一服白湯吞

碧霞丹 治內障外障暴赤眼腫澀昏花翳膜

當歸 沒藥各二錢 血竭 白丁香 硼砂 冰片 麝香各一錢 馬牙硝 乳香各五分 俱極細末比飛麪更細三五倍以川黃連去鬚切片三錢熬成膏子和前藥爲丸如豆大用銅綠一兩五錢爲衣每用一丸以新汲水半盞浸磁盒內日洗五六次一丸可洗七日重者半月輕者七日迎風冷淚三日見效 賀知忍傳

洗眼方 仲淳立予親試驗

皮硝一兩 杏仁去皮尖 銅綠 明礬各三分 側栢葉三錢 甘菊花二錢 桑白皮五錢 河水五碗煎至二大碗置銅盆內洗眼及肩後骨兩太陽涕出即爽然矣日夜不拘次數

一服冬可半月夏十日

牙痛方　鄧定宇先生傳

經霜西瓜皮燒灰敷患處牙縫內立効

擦牙散　章奉宇傳

石膏（半斤火煆熟）白蒺藜（去刺四兩）爲極細末每日擦牙漱口牙痛時頻頻擦之立愈

又方（陳鈞翁傳自江陰云旱蓮草開紅花者與此地不類）

旱蓮草以青鹽醃一二宿晒乾爲極細末置磁罐內擦牙以沸湯漱口嚥下久久兼能烏鬚種子

治胃火牙疼

馬蘭頭葉并放水溝內青苔搗爛以綿繭卷之左齒痛塞左耳右亦然

治聾　王槐亭服之驗

白蒺藜（炒去刺）爲末蜜丸空心服　沈四明相公專服此方延年益壽

治耳中瘟痛或出水出膿

金絲荷葉（即名虎耳草）搗汁滴入耳中如有膿可加枯礬末及乾胭脂末各少許

又方

用鮮薄荷葉同蝸牛搗汁滴耳中亦妙

孝本常女臂患紫雲風仲淳用稀薟蒼耳雄黃末之酤漆爲丸或疑漆有毒競沮之然竟以此藥收功（劉太）

（用生蟹黃攪和可化作水入藥）

稀薟丸　治爛風及風疹作癢如神

稀薟草取末調吞治癱瘓甚驗初時以人參蘇木等分熬膏和酒吞傷損皆除曾有八十老人試過五七九月採近根處剖開有小蟲一條能治小兒疳症

解牛肉毒

取蝦蟆一隻置滾酒內數沸去蝦蟆飲酒一吐即愈

又方　馬銘鞠傳

用甘菊花連根葉搗爛和酒服一兩碗立愈

治疝氣痛方（龍中吾同馬傳來見李滄州試之神驗）

六味地黃丸古方加北五味（三兩）肉桂（二兩去皮）甘菊（真）枸杞子（去蒂四兩）車前子（米泔浸蒸三兩）將糯米一斗炊飯乘熱下白酒藥并前藥拌和勻如常製白酒法三兩日後漿來用上好鏡面燒酒五十觔連酒漿并糟入大甕內泥封固一月開去糟濾清酒味甘香異常空心或饑時隨量飲飲多不渴

疝攻上作痛秘方　陳敬泉親驗

牛蒡子根有葉時用根葉搗爛絞汁和好酒服之覆

後出汗永不發

又腎方

用荳田中菟絲子草（一名黃砂草）煎濃湯洗之，時以手撈之隨消

治便紅或因酒毒發者　南昌鄧思濟傳

先用川黃連（去鬚切片酒炒）細末一服三錢，空心白酒調下。忌暈腥。一日服連末後必腹痛，去血愈多。復用白芍藥（酒炒）、白术（三錢）、甘草（二錢）同炒揀開，先用白芍藥煎湯服，腹痛自止。後以白术甘草同煎服遂愈。又一法以粳米三分糯米七分煮粥空腹服遂愈。此無他，補胃氣則陽明調，所以便紅自除也

腸風

黃芪（蜜炙三錢）、白芍藥（酒炒二錢）、炙甘草（一錢）、麥門冬（去心五錢）、生地（酒洗四錢）、當歸（酒洗二錢）、荊芥（炒一錢）、白芷（一錢）、柴胡（五分）、地榆（酒洗二錢）、人參（一錢）、五味子（八分去梗者打碎蜜蒸）河水二鍾煎八分空腹饑時服

治腸風（因飲酒過多得之者亦效）

專服北五味打碎蜜蒸為細末，蜜丸，每清晨服三錢。服至半年，因味酸，其服後喉中覺吞酸，加熟地黃等分為丸服，久腸風頓止

治猘犬傷

野荷荷根搗汁酒服

治蜈蚣傷

用舊竹筋火中將頭上燒黑，取下少許研細敷患處立愈

又方　馬銘鞠傳

一法取蜒蝣塗上，其痛立止，屢試神驗

治蛇傷

雄黃　雌黃　等分極細末，先以白芷磨菜油調塗患處，以溫火薰之，滴盡黃水為度，水出腫漸消

又方

明礬　麝香　二味為末摻上，以艾灸之，隨灸隨消

又方

慎火草（即景天，一名戒火草，一名護火草，一名血氣草，又名火杴）搗汁，同酒飲，一面搗敷咬傷處立愈

一婦人於壁上取雞翎卷耳，適蜈蚣生子在翎上，帶入耳中，生小蜈蚣，穿腦內，且痛且癢，百藥莫効。夢神人傳一方，令炒雞肉熱，置一器內，留一小孔，蓋上，令病者以耳受之，雞氣薰入，蜈蚣悉攢雞肉上，其病立

跌打秘方

用露天糞窖中磚瓦塊多年者或硯架溺水長流處磚瓦塊火煆紅研極細跌打傷者酒調服五分立愈末打服之可不痛不宜多服令人骨軟

金瘡并跌打破損出血方

煉過雲母粉菜油調敷立止痛更不作膿（雲母四錢一石斛）

金瘡止血方

真番降香（紫色者真切如箭大炒略焦研再炒）五味子（一兩）二味共研敷上

又方

舊毡帽簷燒灰敷上　舊網巾灰亦好

金石湯火跌損方

用花蕊石舊家有用為几上小屏風者取三錢為極細末真麻油調敷患處當日者立愈隔日敷之痛輕易收口　亦治產後瘀血攻心血暈神丹

桃花散治跌損刀傷狗咬爛腳

用陳年風化石灰一官升錦紋大黃（一兩切片）并石灰炒桃花色存性真麻油調敷患處當日敷之更妙

火傷兼治湯泡方

大松樹皮　川大黃　二味等分為細末生桐油調敷立愈

又方

用大黃一味為細末砂糖調敷立愈

火燒爛神方

將好黃酒一二甕入浴缸內令患者浸酒中極重不死

又方

用鼠初生者以真麻油浸之入磁瓶內封固患者將油搽上痛處即愈

湯火神驗方　佳方

猪毛煆存性研細末加輕粉白硼砂少許麻油調和敷之立效無瘢痕

治水渰　出葴海

凡遇溺水者視其心坎尚溫以圓器覆地下置門扇於上令死者仰臥以鴨血灌之口中或大小便出水即甦

臨杖預服藥　湖州司獄司內傳單神效

胎元（一個煆存性）黑犬對前腳上邊頂骨一副（煆灸存性）川麻皮（煆存性）麝香（五分）乳香　沒藥（各五錢）煉蜜丸如梧子大每服三錢酒吞

杖後煎劑

紅花 紅麴各一錢 延胡索 牛膝各三錢 牡丹皮 五靈脂 赤芍藥 番降香各二錢 炙甘草七分 桃仁七分 肉桂五分 水酒煎若傷重出虛汗加參耆

杖丹

風化石灰君 真番降香末上 半夏末上 黃芩 黃連 黃檗 大黃俱中 為細末麻油調敷患處

杖丹散血

龍鬚草二兩 大黃三兩 二味為末用麻油一觔蒸大黃焦色濾淨去渣加後藥 樟腦一兩五錢 麝香四錢 氷片四錢 降

香末一兩 乳香 沒藥各五錢 自然銅燒紅醋淬九次研細如煙六錢 共熬成膏藥先劃碎杖處用軟帛攤成膏紮於杖處蒸熟韭菜熨之黑血出盡愈

杖丹長肉

臘月猪油一觔 白占 黃占各二兩 黃連四兩 以猪油熬黃連轉焦色去渣下占熬敷上帛紮緊自愈

湯洗

用葱頭煮爛揩洗杖瘡傷

治杖夾神方

河胎封固煆五分 遠年糞缸內尾片醋淬七次二錢 雄黃一分 硃砂一分 木香五分 麝香三厘 細末和勻用芋芋活最能活血 搗爛絞汁和丸金箔為衣酒磨下

杖傷丸方

乳香 沒藥 血竭 孩兒茶 自然銅煆 川木鱉 無人中白 孩兒骨如無以狗胎代之倍加 地龍 土木鱉 無名異 為細末煉蜜丸如梧子大杖過酒服百丸

杖瘡方

水銀五分 輕粉 乳香 象牙末各一錢 細茶二錢 木香五分 麝少許 為細末雞子黃蠟羊油調搽

杖丹

如遇打出印將松香四兩溶化又將葱一握搗入松香內攪勻攤一膏藥貼患處外以綿帛掩上紮定五六日愈

又方 朱南溪傳

杖傷及跌磕者用落得打草似孩兒菊對節生枝不拘多少搗爛酒服 如杖夭杖傷出蛆 真麻油澆之立盡

附海上單方

顛犬咬方

先用蓑衣草煮住患處兩頭以衆人熱小便洗溺去血水次用胡桃殼半箇以本人熱糞裝滿蓋患處艾火灸七壯如本人不欲大便傍人者亦可急取班猫七箇去頭足并翅酒洗和濕糯米銅杓内炒米熟為度隨將二物研成細末加六一散三兩分作七服每清晨一服白滚湯調下本人頭頂心必有紅髮一根要不拘尋覓拔去

劉襟湖驗過方顛犬咬

防風五錢 黑牽牛二錢 雄黄三錢 斑蝥一錢占米炒 真麝香三分 錦紋大黄三錢 右為末温滚水調下空心每日服二錢 先將斑猫去頭翅足一兩和白糯米一升共炒去斑猫食米二撮許後服前藥其斑猫即合入前藥内服 一料後斑猫不可用外加雄黄二錢 或蜜或米粉丸藥再服即間二三日服亦可每服三分 茄子茄地切不可践食即茄蔾木亦須忌之二三年後不必忌也 此劉友自患顛犬咬三日内即服此方小便下血塊有形得以全愈有一人患犬咬六日服此方小便下血塊竟似犬狀亦終不救矣然劉友所傳

犬咬毒輕而得愈總不如前方屢試屢驗

犬咬毒入心經則以益元散為引經之藥甚為有理山鄉一時無處買藥多蓄斑猫須製益元散以救犬大是恩德

治酒疸

用苜蓿煎湯漸飲之愈

治刀瘡

化屍塲取燒過人骨不化者更佳 研細末敷刀瘡患處立愈

治小兒疳症方

用天南星一煎湯飲神効 以上二方俱馮權奇傳

治胴結丸方

川黄連八錢 白芍藥一兩五錢 檳榔八錢 粉草五錢 廣陳皮一兩去白 豆蔻不炒者五錢 不蛀史君子 為細末白糖調服

炮炙大法目錄

水部十四種
火部五種
土部六種
金部十四種
石部二十六種
草部一百五十六種
木部七十二種
果部二十四種
米穀部二十四種
菜部二十四種
人部九種
獸部二十三種
禽部三種
蟲魚部二十八種
附用藥凡例

炮炙大法

海虞繆希雍仲淳甫定
延陵莊繼光斂之甫校

按雷公炮製法有十七曰炮曰爁曰煿曰炙曰煨曰炒曰煅曰煉曰製曰度曰飛曰伏曰鎊曰摋曰𣸭曰曝曰露是也用者宜如法各盡其宜

水部

雨水 立春節雨水　梅雨水芒種後逢壬爲入梅小暑後逢壬爲出梅　液雨水立冬後十日爲入液至小雪爲出液得雨謂之液雨

冬霜 凡收霜以鷄羽掃之瓶中密封陰處久亦不壞

臘雪 用淨瓶收淨雪築實密封瓶口置於陰室中不見日色春雪有蟲水亦易敗所以不收

神水 五月五日午時有雨急伐竹竿中必有神水瀝取爲藥

半天河 此竹籬頭水及空樹穴中水也

流水 千里水東流水二水皆堪蕩滌邪穢煎煑湯液勞水卽揚之水張仲景謂之甘爛水用流水二斗置大盆中以杓高揚之千萬遍有沸珠相逐乃取煎藥蓋水性本鹹而體重勞之則甘而輕取其不助腎氣而益脾胃也虞摶醫學正傳云甘爛水甘溫而性柔故烹傷寒陰證等藥用之順流水性順而下流故治下焦腰膝之證及通利大小便之藥用之急流水湍上峻急之水其性急速而下達故通二便風痺之藥用之逆流水洄瀾之水其性逆而倒上故發吐痰飲之藥用之也

井泉水 反酌而傾曰倒流出甕未放曰無根無時初出曰新汲將旦首汲曰井華

地漿 此掘黄土地作坎深三尺以新汲水沃入攪濁少頃取清用之

熱湯 須百沸者佳若半沸者飲之反傷元氣作脹

生熟湯 以新汲水百沸湯合一盞和勻故曰生熟今人謂之陰陽水

潭水 山澗兩岸有天生甘菊花其下流泉是也

漿水 酢漿也炊粟米熱投冷水中浸五六日味酢生白花色類漿故名若浸至敗者害人

米泔水 即淘米汁也

繰絲湯 以磁瓶收密封埋淨土地中任經數年汲而愈妙

火部

桑柴火 凡一切補藥諸膏宜此火煎之

炭火 櫟炭火宜煅煉一切金石藥 烰炭火宜烹煎焙炙百藥丸散

蘆火竹火 宜煎一切滋補藥

凡服湯藥雖品物專精修治如法而煎藥者鹵莽造次水火不良火候失度則藥亦無功觀夫茶味之美惡飯味之甘餲皆係於水火烹飪之得失即可推矣是以煎藥須用小心老成人以深罐密封新水活火先武後文如法服之未有不效者火用陳蘆枯竹取其不強不損藥力也

燈火 凡燈惟胡麻油蘇子油然者能明目治病其諸魚油禽獸油諸菜子油棉花子油桐油豆油石腦油諸燈煙皆能損目亦不治病也

土部

黄土 三尺以上曰糞三尺以下曰土凡用當去上惡物勿令入客水

東壁土 此屋之東壁上土也當取東壁之東邊謂常先見日光刮取用之

伏龍肝 凡使勿誤用竈下土其伏龍肝是十年已來竈額內火氣積久自結如赤色石中黄其形貌八稜取得後細研以滑石水飛過兩遍令乾用熟絹裹却取子時安於舊額內一伏時重研了用

墨 陳久而料精者入藥新而粗者不堪

百草霜 此乃竈額及煙爐中墨煙也其質輕細故謂之霜山庄人家者良

梁上塵 須去煙火遠高堂殿上者拂下篩用之一云凡用倒掛塵燒令煙盡篩取末入藥當[illegible]所說似是梁上灰塵今人不見用

金部

金銀銅鐵 凡使只可渾安在藥中借氣生藥力而已勿入藥服能消人脂

赤銅屑 即打銅落下屑也或以紅銅火煆水淬亦自落下以水淘淨用好酒入砂鍋內炒見火星取研末用

自然銅 生出銅處方圓不定色青黄如銅凡使用甘草湯煮一伏時至明漉出攤令乾入臼中搗了重篩過以醋浸一宿至明用六一泥泥瓷盒子盛二升文武火養三日夜後乾用蓋蓋了火煅兩伏時去土研如粉用凡修事五兩以醋兩鎰為度今人只以火煅醋淬七次研細水飛過用一六製後半兩方可入一藥不可投人

銅青 生熟銅皆有青青即是銅之精華大者即空綠以次空青也銅青則是銅器上綠色者淘洗用之近時人以醋製銅生綠取收晒乾貨之

鉛 凡用以鐵銚溶化瀉瓦上濾去渣脚如此數次收用其黑錫灰則以鉛沙取黑灰白錫灰不入藥

鉛霜 以鉛打成錢穿成串瓦盆盛生醋以串橫盆中離醋三寸仍以瓦盆覆之置陰處候生霜刷下仍合住

鉛丹　即黃丹也生鉛一味火煅研細末水飛曬用今貨者多以鹽消砂石雜之凡用以水漂去消鹽飛去砂石澄乾微火炒紫色地上去火毒入藥

密陀僧　凡使搗細安甕堝中重紙袋盛柳蚛末焙之次下東流水浸滿火煮一伏時去柳末紙袋取出近人以煎銀爐底代之誤矣爐底能消一切衣帛焉可服耶如無真者勿用

古文錢　周秦漢五代者方可用以火煅醋淬六七次用入目者磨用入藥者火煅醋淬研成粉

鐵　畏慈石火炭皂莢豬犬脂乳香朴硝硇砂鹽鹵荔枝制石亭脂毒　凡諸草木藥皆忌鐵器方補腎藥尤忌之否則反消肝腎

鐵鏽　此鐵上赤衣也刮下用

石部

丹砂　即朱砂也有數種妙硫砂如拳許大或重一鎰有十四面面如鏡若遇陰沉天雨即鏡面上有紅漿汁出有梅柏砂如梅子許大夜有光生照見一室有白庭砂如帝珠子許大面上有小星現有神座砂又有金座砂玉座砂不經丹竈服之而自延壽命次有辰錦砂芙蓉砂鏡面砂箭鏃砂已上凡一種並宜入藥用之殺人者勿用升煉者勿用以緩火養之　惡磁石　畏鹹水　畏車前石韋皂莢決明書參肉桂地丁馬鞭草紫河車蛇蛻白附子諸血忌一切畜肉

雲母　凡使色黃黑者厚而頑赤色者經婦人手把者並不中用須要光瑩如水色者為上凡修事一斤先用小地膽草紫背天葵生甘草地黃汁各一鎰乾者細剉濕者取汁了於瓷鍋中安置下天池水三鎰著火煮七日夜水火勿令失度其雲母自然成碧玉漿在鍋底卻以天池水猛投其中將物攪之浮如蝸涎者即去之如此三度淘淨了取沉香一兩搗作末以天池水煎沉香湯三升已來分為三度再淘雲母漿了日中曬任用之　澤瀉為之使　惡徐長卿羊血　畏鮀甲礬石東流水百草上露茅屋漏水　制汞　伏丹砂

石鍾乳　凡使勿用頭粗厚并尾大者為孔公石不用色黑及經大火驚過并久在地上收者曾經藥物制者並不得用須要鮮明薄而有光潤者似鵝翎筒子為上有長五六寸者凡修事法以五香水煮過一伏時然後漉出又別用甘草紫背天葵汁漬再煮一伏時凡八兩鍾乳用沉香零陵香藿香甘松白茅各一兩以水先煮過一度了第二度方用甘草天葵二味各二兩再煮了漉出拭乾緩火焙之然後入臼杵如粉篩過卻入鉢中令有力少壯者二三人不住研三日夜勿歇然後以水飛澄了以絹籠之於日中曬令乾又入鉢中研二萬遍後以瓷合子收貯用之　蛇床為之使　惡牡丹玄石牡蒙人參白朮　忌羊血　畏紫石英蘘草韭實獨蒜胡蔥胡荽萋麥門冬貓兒眼草

礬石　生用解毒煅用生肌　甘草為之使　惡牡蠣　畏麻黃紅心灰藋

芒硝　水飛過用五重紙滴過去腳於鐺中乾之方入乳缽研如粉任用芒硝是朴硝中煉出形似麥芒者號曰芒硝　火為之使　惡苦參苦菜　畏女菀杏仁竹葉

滑石　以刀刮去淨研粉以牡丹皮同煮一伏時出去牡丹皮取滑石以東流水淘過七次於日中曬乾方用白如凝脂軟滑者良　石韋為之使　惡曾青　制雄黃

赤石脂　研如粉新汲水飛過三度曬乾用亦有火煅水飛者　惡大黃松脂　畏芫花豉汁

黃芩大黃官桂

白石英　可煮汁用張仲景只令㕮咀不為細末　惡馬目毒公

紫石英　凡使火煅醋淬為末水飛用　長石為之使　得茯苓人參芍藥主心中結氣　得天雄菖蒲主霍亂　畏扁青附子及惡鮀甲黃連麥句薑

爐甘石 以炭火煅紅童便淬七次以水洗淨研粉水飛過曬用

綠礬 火煅通紅淬入米醋中烘乾研如飛粉 畏醋

雄黃 取透明色鮮紅質嫩者研如飛塵水飛數次 畏南星地黃萵苣地榆黃芩白芷當歸地錦苦參五加皮紫河車五葉藤鷺鷥腸草鵝腸草鶩不食草圓桑葉蝸脂

石硫黃 研如飛塵用以殺蟲行血 曾青石亭脂爲之使 畏細辛朴消鐵醋黑錫猪肉鴨汁餘甘子桑灰益母天鹽車前黃蘗石韋蕎麥獨帚地骨皮地榆蛇牀黃麻菟絲蠶沙紫加皮稷桑白皮馬鞭草

食鹽 凡鹽多以礬消石灰之類雜之入藥須用水化澄去滓煎鍊白色乃良 扁蓄爲之使

水銀 凡使草中取者并舊朱漆中者經別藥制過者在屍過者半生半死者俱勿用在朱砂中產出者其色微紅收得後用葫蘆收免遺失先以紫背天葵并夜交藤自然汁二味同煮一伏時其毒自退 若修十兩用前二味汁各七鎰和合煮足爲度 畏慈石砒石黑鉛硫黃大棗蜀椒紫河車松脂松葉荷葉穀精草金星草萱草夏枯草莨菪子鴈來紅馬蹄香獨脚蓮水慈姑瓦松忍冬

水銀粉 凡水銀一斤用明礬焰硝皂礬食鹽各二兩同研細末不見星爲度用烏盆二箇以藥鋪盆底上用一盆合定以鹽泥石膏塞醋調封盆口勿令泄氣下盆底用鐵釘三脚支住四五寸高用炭火先文後武蒸半日次日令定輕輕取起上盆則輕粉盡騰其上以鵝翎掃下聽用此乃眞正輕粉生肌立效市肆多攙寒水石銀母石石膏焉得有用乎 黃連土茯苓陳醬黑鉛鐵漿可制其毒

戎鹽 即青鹽溫水洗去塵土淨研乾入藥

石膏 雪白有墻壁者眞即市之寒水石也石臼中搗成粉以密絹羅過生甘草水飛過不盡令燥

並研用之作散者煆熟入煎劑半生半熟 子爲之使 畏鐵 惡莽草巴豆馬目毒公

磁石 欲驗者一斤磁石四面只吸鐵一斤者此名延年沙四面只吸得鐵八兩者號曰續未石四面只吸五兩巳來者號曰磁石脩事一斤用五花皮一鎰地榆一鎰故綿十五兩三件并細剉以槌於石上碎作二三十塊子將磁石於瓷瓶中下草藥以東流水煮三日夜然後漉出拭乾以布裹之向大石上再捶令細了却入乳鉢中研細如塵以水沉飛過了又研如粉用之 柴胡爲之使 殺鐵毒消金 惡牡丹莽草 畏黃石脂 伏丹砂養汞去銅暈

起陽石 用火煅透紅研極細如麩 桑螵蛸爲之使 惡澤瀉雷丸菌桂石葵蛇蛻皮 畏菟絲子 忌羊血

瑪瑙 犬肉煮之火煅紅醋淬用 試瑪瑙法以研木不熱者爲眞

石灰 凡使用醋浸一宿漉出待乾下火煅令腥穢之氣出用瓶盛著密蓋放冷拭上灰令淨細研用 去錫暈 制三黃硇砂消石

砒霜 凡使用小瓷瓶子盛後入紫背天葵石龍芮二味三件便下火煅從巳至申便用甘草水浸從申至子出拭乾入瓶盛於火中煅別研三萬下用之 一法每砒霜一兩打碎用明礬一兩爲末蓋砒上貯罐中入明火一煅以枯礬爲度砒之悍氣隨烟而去駐形於礬中者庶幾無大毒用之不傷地用研細即用礬霜是也 似韻便 畏菉豆冷水 青鹽鶴頂草消石蒜木參常山盞奸獨帚木律蕁蒲二角煅蔦不食草皮硝萵苣苜蓿伏

礞石 與火硝相半入陽成罐封固煅 性研如飛塵入藥 良

花乳石 入丸散以罐固濟頂火煅過出火毒研細水 出陝華諸郡色正黃形之大小方圓無定凡 飛曬乾用

蓬砂 即硼砂也色白如明礬者良研如飛塵 畏知母芫荽薑蘗蘇龍帶何首烏鵝八食草

草部

人參 色微黃皮薄滋潤明亮獨而獨椿味甘回味不苦者良去蘆 茯苓馬藺為之使 惡鹵鹹溲踈 畏五靈脂

天門冬 劈破去心用柳木甑燒柳木柴蒸一伏時灑酒令遍更添火蒸出曝 地黃貝母垣衣為之使 忌鯉魚 畏曾青浮萍 制雄黃硇砂

麥門冬 產杭州筧橋細白而皺者良水洗去心大抵一斤須減去五六兩凡入湯液或以水潤去心或以瓦焙乘熱去心若入丸散須瓦焙熱即於風中吹令如此三四次即易燥且不損藥力或湯浸搗膏和藥亦可[illegible] 地黃車前為之使 惡款冬苦芙苦瓠 畏苦參青蘘木耳 伏石鍾乳

甘草 須去頭尾尖處其頭尾吐人截作三寸長劈破作六七片以瓷器盛之用酒浸蒸從巳至午出曝乾

或用清水蘸炙或切片用蜜水拌炒如瀉火生用 术苦參乾漆為之使 惡遠志 忌豬肉

生地黃 大如大指堅實者佳酒洗乾以手擘之有聲為度好者拌勻置甑蒸內包固重湯煮一晝夜勝於蒸者名熟地黃生者酒洗用 得清 麥門冬薑汁浸炒良 惡貝母 畏蕪荑 忌[illegible]諸血[illegible]勿犯銅鐵器 令人腎消白髮男損榮女損衛也

菖蒲 勿用泥菖夏菖其二件相似如竹根鞭形黑氣穢味腥不堪用石上生者根條嫩黃堅硬節稠長一寸有九節者是真也用銅刀刮上黃黑硬節皮一重了用嫩桑枝條相拌蒸出曝乾 秦皮秦艽為之使 惡麻黃地膽[illegible]糖[illegible]血[illegible]器 非真[illegible]黃連不許[illegible]之中有孔色[illegible]

黃連 去鬚切片分開揀細各置薑汁拌[illegible]先用山黃土炒乾研細用水和至[illegible]紙放上炒乾用加薑汁切不可用[illegible]者如是九次為度[illegible]中之於治本臟之火則生用之[illegible]實火則以豬膽汁浸炒治肝膽之虛火則以醋浸炒治上焦之火則以酒炒治中焦之火則以薑汁炒治下焦之火則以鹽水或朴硝炒治氣分濕熱之火則以茱萸湯浸炒治血分塊中伏火則以乾漆水炒諸法不獨為之導引蓋辛熱能制其苦寒鹹寒能制其燥性在用者詳酌之 黃芩龍骨理石為之使 忌豬肉 畏牛膝款冬 惡冷水菊花玄參白殭蠶白鮮芫花

胡黃連 似乾柳枝心黑外黃拆之塵出如煙者真 惡同黃連 忌鐵

菊花 真者味甘色黃單瓣去心去蒂用 术枸杞根桑根白皮青葙葉為之使

白朮 米泔浸去蘆者山黃土拌蒸曬九次洗淨去皮切片曬乾 防風地榆為之使 忌桃李雀肉菘菜青魚

蒼朮 出茅山細而帶糯香味甘者真米泔浸洗極淨刮去皮拌黑豆蒸又拌蜜酒蒸又拌人乳透蒸凡三次蒸時須烘曬極乾氣方透 忌同白朮

菟絲子 米泔淘洗極淨[illegible]揀去稃草子磨五六次酒浸一宿曬火者乾木槌去殼一次用酒去晝夜搗作餅曬乾然後復研方細一法以白紙條同研易細 薯蕷松脂為之使 得酒良 惡雚菌

牛膝 酒浸蒸曬乾形長二尺五寸已上者方佳蜀道及懷慶產者良 惡螢火龜甲陸英 畏白前 忌牛肉

茺蔚子 花紅者良 制三黃砒石 忌鐵

柴胡 凡使莖長軟皮赤黃鬚出在平州平縣即今銀州銀縣也西畔生處有白鶴綠鶴於此翔處是柴胡香直上雲間若有過往聞者皆氣爽也此種治骨蒸不入發表藥去鬚并頭勿令犯火立便無效也 半夏為之使 惡皂莢 畏女菀藜蘆

前胡 切開白色者良水洗用竹刀刮去蒼黑皮并髭土了細剉以甜竹瀝浸令潤日中曬乾用

惡皂莢
柴胡
獨活羌活
細挫拌淫羊藿裛二日後曝乾去淫羊藿用免煩人心此服食家治法尋常去皮或焙用爾蠡實爲之使
升麻
綠色者良治滯下用醋拌炒
車前子
自收玄色者良賣家多以葶藶子代充不可不辨使葉勿使莖蕋入補益藥中用米泔淘淨蒸入利水治泄瀉藥炒爲末用　常山爲之使
木香
形如枯骨由重者良忌見火入煎藥磨汁內熟湯中服若實大腸宜麪煨熟用
薯蕷
補益藥及脾胃中熟用外科生用切用　紫芝爲之使　惡甘遂
萎蕤
凡使勿用黃精并鉤吻二物相似萎蕤上有毛莖斑葉尖處有小黃點爲不同采得以竹刀刮去節皮洗淨以蜜水浸一宿蒸了焙乾用　畏鹵鹹

薏苡仁
顆小色青味甘用糯米炒咬著粘人齒凡一兩以糯米一兩同炒令糯米熟去糯米取使或以鹽湯煮過亦得一法滾湯泡三次去油蒸氣日乾用
澤瀉
不油不蛀者良細剉酒浸一宿漉出曝乾用一去米泔浸去毛莖或搗碎焙　畏海蛤文蛤　忌鐵
遠志
去心若不去心服之令人悶去心了用熟甘草湯浸一宿漉出曝乾用之　得茯苓龍骨冬葵子良　畏真珠飛廉藜蘆齊蛤
龍膽草
甘草湯中浸一宿至明漉出曝乾用勿空腹餌之令人溺不禁　貫眾赤小豆爲之使　惡地黃防葵
細辛
揀去雙葉服之害人洗淨去泥沙　曾青棗根爲之使　忌生菜狸肉　惡黃芪狼毒山茱萸　畏滑　硝石

石斛
長而中實味不苦者真去頭土了用酒浸一宿漉出於日中曝乾却用酥蒸從巳至酉却徐徐焙乾用石斛鎖涎澀丈夫元氣如斯修事服滿一鎰永不骨痛覺使酒蒸用服餌當如法　陸英爲之使　惡凝水石巴豆　畏雷丸
巴戟天
去心用枸杞子湯浸一宿待稍軟漉出却用酒浸一伏時又漉出用菊花同熬令焦黃去菊花用布拭令乾用今法惟以酒浸一宿剉入藥若急用只以温水浸軟去心也　覆盆子爲之使　惡雷丸丹參朝生
菴蕳子
蒸方作餅爲末作散俱可　荊子薏苡爲之使
芎藭
形塊重實色白者良　白芷爲之使　畏黃連
蒺藜
淨擇了蒸從午至酉出日乾於木臼中舂令皮上刺盡用酒拌再蒸從午至酉出日乾用一去刺炒研去刺爲末如入煎藥臨時調服不入湯煎　烏頭爲之使

沙苑蒺藜
綠色形如腰子細而香如天池茶者真同州多僞者或炒或酒拌蒸炒不入湯藥
黃耆
軟如綿直而細中有菊心味甘者良補氣藥中蜜炙用瘡瘍藥中鹽水炒用俱去皮　茯苓爲之使　惡白鮮龜甲
肉蓯蓉
好大者良得酒浸一宿至明以棕刷去沙土浮甲劈破中心去白膜一重如竹絲草樣是此偏隔人心前氣不散令人上氣不出凡使用先須酒浸并刷草了却蒸從午至酉出又用酥炙得　所忌鐵
防風
實而潤頭節堅者良去蘆并叉頭叉尾者形彎者令人吐勿用　畏萆薢　惡乾薑藜蘆白斂芫花
蒲黃
自擇者真勿用松黃并黃蒿其二件全似只是味跙及吐人凡欲使篩黃須隔三重紙焙令色

黃蓍半日去焙令乾用之
妙行血生用止血炒用

續斷 皺皮黃色折之煙塵起者良用酒浸一伏時 捶碎去筋焙乾用 地黃爲之使 惡雷丸

漏盧 枯黑如漆味不苦酸者真細剉拌生甘草相對 蒸從巳至申去甘草揀淨用 連翹爲之使

天名精 一名過冬青即蝦蟆藍枝草吳人又呼爲天 麻地菘擣汁服 垣衣地黃爲之使

決明子 炒研 使 惡大麻子 蓍實爲之

丹參 去蘆實家多染色 酒拭之 畏鹽水

茜根 勿用青蒻草根真似茜根只是味澁不入藥 中用若服令人患內障速服甘草水解之凡 使用銅刀於槐砧上剉日乾勿 犯鐵并鉛 畏鼠姑 制雄黃

五味子 遼東者佳去枯者銅刀劈作兩片用蜜浸蒸 從巳至申或曬或烘炒 蓯蓉爲之使 惡萎 蕤 勝烏頭

忍冬 採花葉陰乾不見日火 不拘時

蛇床子 凡使須用濃藍汁并百部草根自然汁二味同浸一伏時漉出日乾 却用生地黃汁相拌蒸從午至亥日乾用 惡牡丹 巴豆 貝母 伏硫黃

茵蔯蒿 須用葉有八角者陰乾去根細剉用勿 令犯火 茵蔯爲帶鍾 茵蔯即入角池

略炒

沙參 去蘆白實味甘者良 惡防己

王不留行 拌濕蒸之從巳至未以漿水浸一宿焙乾用

乾薑 馬湖者良微炒若治產後血虛發熱及止血 炒黑且中炮用散寒邪理肺氣止嘔生用 秦椒爲之使 惡黃芩黃連天鼠糞 殺半夏莨菪毒

生薑 不宜使熟宜搗汁待藥煎成然後入藥方不失生 字之義如入藥煎乃熟薑矣 生薑 畏 惡 殺

同乾薑

葉耳實 蒸用或炒熟搗去刺用 忌猪肉馬肉米泔

葛根 生白多粉者良

葛花 自爲煎飲

括樓根 雪白多粉者良 枸杞爲之使 惡乾薑 畏牛膝乾漆

括樓仁 搗碎用 紙壓去油

苦參 先須用糯米濃泔汁浸一宿上有腥穢氣并在 水面上浮並須重重淘過即蒸從巳至申出曝 乾細剉用之不入湯藥 玄參爲之使 惡貝母漏蘆菟絲子 伏汞 雌黃 焰硝

當歸 色白味甘者良去蘆并頭尖硬處一分已来洗 淨酒浸一宿若要破血即使頭一節硬實處若 要止痛止血即用尾若一槩用不如不使服食 無效單使妙也 惡蕳茹 濕麪 制雄黃 畏菖蒲 海藻 牡蒙 生薑

麻黃 陳久者良去節并沫若不盡服之令人悶用夾 刀剪去節并頭槐砧上用銅刀細剉煎三四 沸竹片掠去上沫盡漉出熬乾用之 厚朴白薇爲之使 惡辛夷 石韋

白芍藥 以竹刀刮去皮并頭上了剉之蜜水拌蒸 從巳至未曬乾用之今人多以酒浸蒸 切片或用炒亦良 須丸爲之使 惡石斛 芒硝

赤芍藥 製與白芍藥同 惡

瞿麥 只用蕊殼不用莖葉若一時使即空心令人氣 噎小便不禁凡欲用先須以蓳竹瀝浸一伏時 漉出晒乾 牡丹 蘘草爲之使 惡螵蛸 伏丹砂

玄參 用蒲草重重相隔入甑蒸兩伏時後 出曬乾勿令犯銅鐵餌之噎人喉喪人目揀去蒲 草盡了用之一法用酒洗去泥土切片 烱乾用 惡黃芪 乾薑 大棗 山茱萸

吐實秦并花實於腳文處取左文列爲文內

秦艽 治疾艽即發腳氣凡用秦艽以布拭上黃肉毛盡然後用童便浸一宿至明出日乾用 菖蒲爲之使 畏牛乳

百合 白花者良 酒拌蒸

知母 皮黃肉白者良於槐砧上細剉焙乾木臼杵搗 一法去毛蜜炙勿令犯鐵器 得黃蘗及酒良 大蓮

炒皆

貝母 黃白輕鬆者良先於柳木灰中炮令黃擘破去內口鼻上有米許大者心一小顆後拌糯米於鏊上同炒待米黃熟然後去米取出其中有獨顆團不作兩片無鏬者號曰丹龍精不入藥用若誤服令人筋脈不收 用黃精小藍汁合服立愈 厚朴白微爲之使 惡桃花 畏秦艽礬石莽草

白芷 白色不蛀者良 當歸爲之使 惡旋覆花 制雄黃硫黃

炮炙大法 草部 一四

淫羊藿 細剉用羊脂相對拌炒過待羊脂盡爲度每修事一斤用羊脂四兩爲度也 薯蕷紫芝爲之使 得酒良

黃芩 入諸經用枯芩去腐爛皮切炒入大腸或安胎等俱用子芩酒浸切炒 龍骨山茱萸爲之使 惡蔥實 畏丹砂牡丹藜蘆

狗脊 凡修事火燎去毛細剉了酒拌蒸從巳至申出曬乾用 萆薢爲之使 惡莎草敗醬

茅根 去淨揭曬 勿用露根

紫菀 凡用東流水洗淨用蜜浸一宿火上焙乾用凡修一兩用蜜二分 款冬爲之使 惡天雄瞿麥藁本雷丸遠志 畏茵陳

紫草 須用蠟水蒸之待水乾取去頭并兩畔髭細剉用 每修事紫草一斤用蠟二兩於鐺中鎔淨便投蠟水作湯用

通草 白木通也有紫白二色紫者皮厚味辛白者皮薄味淡二者皆能通利

藁本 去蘆水洗切 畏青葙子 惡蘭茹

石葦 背有黃毛須拭極淨羊脂拌炒焦黃色 杏仁滑石爲之使 得菖蒲良 制丹砂礬石

萆薢 其根細長淺白者真酒浸一宿焙乾 薏苡爲之使 畏前胡柴胡牡蠣大黃葵根 忌鐵

土茯苓 忌茶

白薇 凡修采得以糯米泔汁浸一宿至明取出去頭了於槐砧上細剉蒸從巳至申出用夏月浸二時許 惡黃芪乾薑大棗大戟乾漆山茱萸

大青 處處有之三四月采莖陰乾

艾葉 產蘄州者良入藥用陳久者治令細 苦酒香附爲之使 若用新者炙火

惡實 一名鼠粘子一名牛蒡子一名大力子 用酒拌蒸待上有薄白霜重出卻用布拭上然後焙乾搗如粉用

炮炙大法 草部 一五

水萍 紫背浮萍七月采之揀淨以竹篩攤曬下置水一盆映之即易乾也

王瓜 根能吐下子生用潤心肺治黃病炒用治肺痿吐血腸風瀉血赤白痢反胃吐食 取汁制雄汞

地榆 切之如綿者良酒洗 得髮良 惡麥門冬 伏丹砂雄黃硫黃

大小薊根 酒洗或生搗汁 血竭有性

海藻 凡使先須用生烏豆并紫背天葵和海藻三件同蒸一伏時候日乾用之近人但洗淨鹹味焙乾用 反甘草

澤蘭 凡使要別識雄雌其形不同大澤蘭形葉皆圓根青黃能生血調氣與榮合小澤蘭迥別採得後看葉上斑根須尖莖方此藥能破血通久積 凡修事大小澤蘭須細剉之用絹袋盛懸於

覺南畔角上令乾
用防巳爲之使

昆布 凡使先用弊甑簞同煮去鹹味焙細剉用每修事一斤用甑簞十箇同昆布細剉二味各一處下東流水從巳至亥水旋添勿令少

防巳 凡使勿使木條以其木條巳黃腥皮皺上有丁子不堪用凡使防巳要心花文黃色者然後細剉車前草根相對同蒸半日後出曬去車前草根細剉用之一法用酒洗切 殷孽爲之使 惡細辛畏萆薢女菀 鹵鹹殺雄黃硝石毒

天麻 透明者良天麻十兩用蒺藜子一鎰緩火熬焦熟後便先安置天麻十兩於瓶中上用火熬過蒺藜子蓋內外便用三重紙蓋并繫從巳至未時又出蒺藜子再入熬炒准前安天麻瓶內用炒了蒺藜子於中依前蓋又隔一伏時後出如此七遍瓶盛出後用布拭上氣汗用刀劈焙之細剉單搗用一法麩炒煨透切

阿魏 凡使多有訛僞有三驗第一驗將半銖安於熟銅器中一宿至明霑阿魏處白如銀永無赤色第二驗將一銖置於五斗草自然汁中一夜至明如鮮血色第三驗將一銖安於柚樹上樹立乾便是與色黑者力微黃溏者力上凡使先於淨鉢中研如粉了於熱酒器上裛過任入藥用

香薷 入九月十月間花着穗一時采之去根留葉陰乾勿令犯火服至十兩一生不得食白山桃也

白部根 去心皮用酒浸一宿漉出焙乾細剉用

款冬花 花半舒者良去梗蒂甘草水浸一時曬乾用 杏仁爲之使得紫菀良 惡玄參皂莢消石畏貝母麻黃辛夷黃芩黃芪黃連青葙

紅藍花 白種者眞得酒良

牡丹皮 凡使採得後日乾用銅刀劈破去骨了細剉如大豆許用清酒拌蒸從巳至未出日乾用潤而厚者良 忌蒜胡荽 伏砒 畏兔絲子貝母大黃

三稜 去毛米泔浸一日切片炒或醋煮熟焙乾入藥乃良

青黛 水飛去腳緣中有石灰入服餌藥中宜飛淨用一法用青布浸汁代之

鬱金 色赤似薑黃蟬肚者良須與假磨汁臨服入藥

蘆薈 上有青竹文斑并光膩微甘勿便和衆藥搗此藥先搗成粉待衆藥末出然後入藥中

延胡索 產茅山龍陵間粒粒金黃色者良醋煮切

肉豆蔻 不油不蛀不皺皮者佳糯米作粉使熱湯搜裹豆蔻於煻灰中炮待米團子焦黃熟然後出去米粉用勿令犯銅鐵

白豆蔻 藥煎成方炒研入一二沸即起入凡待諸藥細末後方入勿隔宿略炒吹去衣研用入湯丸法同白豆蔻得白

砂仁 須香豆蔻爲使入肺得人參益智爲使入脾得黃檗茯苓爲使入腎得赤白石脂爲使入大小腸得訶子白蕪荑鱉甲良

補骨脂 即破故紙形圓實色黑者良此藥性本太燥毒用酒浸一宿後漉出浮者去之却用東流水浸三日夜却蒸從巳至申出日乾用 忌鐵 得胡桃胡麻良 惡甘草 忌諸血芸薹

蓬莪茂 凡使於砂盆中用醋磨令盡然後於火畔吸令乾重篩過用一法火炮醋浸煨切得酒醋良

白前 用生甘草水浸一伏時後漉出去頭須了焙乾任入藥中用

[illegible] [illegible]

白芥子 末用

香附 [illegible]去毛以水洗淨[illegible]石臼內搗去皮用童便浸透曬搗用或以酒醋鹽水薑汁[illegible] 得芎藭[illegible] 忌鐵

澤瀉 [illegible]太寒宜[illegible] 忌鐵

使君子　慢煨香熟用或云七生七煨食亦良忌飲熱茶犯之即瀉

蒻草　治肺熱吐血有神舊出發州今產寧州

附子　底平有九角如鐵色一箇重一兩即是氣全堪用使事十兩於文武火中炮令皴拆者去之用刀刮上孕子并去底尖微細劈破於屋下午地上掘一坑可深一尺安於中一宿至明取出焙乾用熱炒熬炮者灰火勿用雜木火只用柳木最妙若陰制使即生去尖皮底薄切用東流水并黑豆浸五日夜然後漉出於日中曬令乾用凡使須陰制去皮尖了每十兩用生烏豆五兩東流水六升一云此物性太烈古方用火炮不若用童便煮透尤良　地膽爲之使　得蜀椒食鹽下達命門　惡蜈蚣豉汁　畏防風甘草人參黃芪綠豆烏韭童便犀角

半夏　陳久者良若修事四兩用搗了白芥子末二兩頭醋六兩二味攪令濁將半夏投中洗三遍用之半夏上有隟涎若洗不淨令人氣逆肝氣怒滿若入治痰飲藥用白礬湯入薑汁浸透焙淨用無白星爲度　一法用半夏不拘多少滾湯泡過宿搗篩每一斗入生薑一斤同搗之作餅子用乾稻稈或粟麥稈盦之如盦麴法乾之用　射干柴胡爲之使　惡皂莢海藻飴糖羊血　畏生薑乾薑秦皮龜甲雄黃

大黃　細切內文如水旋斑緊重剉蒸從巳至未將乾又用臘水蒸從未至亥如此蒸七度却灑薄蜜水再蒸一伏時其大黃擘如烏膏樣於日中曬乾用　如丁藥酒浸一時煮一二沸即服　黃芩爲之使　惡乾漆　忌冷水

桔梗　味苦而有心者良凡使去頭上尖硬二三分已來并兩畔附枝子於槐砧上細剉用百合水浸一伏時漉出緩火熬令乾用每修事四兩用生百合五分搗作膏投於水中浸一宿[illegible]用　節皮爲之使　畏白及龍膽龍眼　忌豬肉

草蒿　即青蒿[illegible]凡使惟中爲妙到膝即仰到腰即俛使子勿使葉使根勿使莖

炮炙大法　草部　十八

四件若同使翻然成痼疾採得葉不計多少用童溺浸七日七夜後漉出曬乾　伏硫黃

旋復花　去殼花巳至午曬乾用

射干　不族者良米泔水浸一宿漉出然後用堇竹葉煮從午至亥漉出日乾用之

常山　如雞骨者良春使莖葉夏秋冬使根酒浸一宿至明取出日乾熬搗少用勿令老人久病者服之切忌　畏玉札　忌葱菘菜　伏砒石

甘遂　用生甘草湯小薺苨自然汁二味攪浸三日其水如墨汁更漉出用東流水淘六七次令水清爲度漉出於土器中熬令脆用之一去髮　包裹煨去麵　瓜蒂爲之使　惡遠志

白斂　生取根搗[illegible]　腫　代赭爲之使

白及　水洗切　紫石英爲之使　惡理石　畏杏仁李核仁

貫眾　洗淨切片炒　雚菌赤小豆爲之使　伏石鍾乳

何首烏　冬不後採者良人稱剛芽而中空安北人以臘種致人香氣不能混也臨用勿去皮以苦竹刀切米泔浸經宿同豆九蒸九曬木杵臼搗之勿犯鐵器　茯苓爲之使　忌葱蒜蘿蔔諸血無鱗魚

威靈仙　去蘆酒洗　忌茶麵湯

牽牛子　即草金零入水中淘浮者去之取沉者蒸乾拌酒蒸從巳至未曬乾臨用舂去黑皮用之　黑者力速取頭末入藥　得乾薑青木香良

蓖麻子　[illegible]有黃黑斑點凡使須和皮鹽湯煮半日去皮取子研過用　忌炒豆　伏丹砂粉霜

天南星　[illegible]白者良薑湯明礬或鹽汁拌和泡用　一用[illegible]者爲末入臘月黑牛膽中陰乾用　蜀漆爲之使　得火牛膽良　惡莽草　畏附子乾薑生薑　伏雄黃丹砂焰硝

炮炙大法　草部　十九

豨薟 曰良揀葉陰乾爲 酒拌九蒸九曬忌鐵

苧根 此物大能補陰而行滯血方 兼以其日前曬物多不用

白頭翁 花子莖葉同蠡實 為之使得酒良

蘆根 逆水生并黃泡肥厚味甘者良露根勿用去鬚 節并赤黃皮用其汁療閉胃下氣除熱解一切食物魚 蟹河豚毒

馬兜鈴 凡使採得後去葉并蔓了用生綃袋盛於東 屋角畔懸令乾了劈作片取向裏子去革膜 並令淨用子勿令去革膜 不盡用之并皮炒入藥

仙茅 刮上皮於槐砧上用銅刀切豆許大却用生稀 布袋盛於烏豆水中浸一宿取出用酒濕拌了 蒸從巳至亥取出曝乾勿犯鐵斑 人鬚鬢禁食牛乳及黑牛肉

劉寄奴 凡使去梗以布拭上薄殼皮令淨拌酒蒸 從巳至申出曝乾用之莖葉花子皆可用

骨碎補 生江南根著樹石上採得用銅刀刮去上黃 赤毛盡便細切用蜜拌令潤架柳甑蒸一日 後出曬乾用一法去毛細切 後用生蜜拌蒸從巳至亥

連翹 黑不開口者 良去蒂根研

續隨子 凡用去殼取色白者以 紙包壓去油取霜用

山豆根 或末或磨 或嚼咽

白附子 竹節者良炮去 皮得火良

預知子 去皮 研服

木賊草 去節童便浸 一宿焙乾

蒲公草 自採鮮者入湯藥煎入 丸末傳癰毒搗爛用

穀精草 土瓜為之使 忌鐵伏汞砂

夏枯草 土瓜為之使 忌鐵伏汞砂

山慈菰根 山出浙江處州府遂昌縣洪山北方市中無 真者形光無毛本草註中云有毛誤也

燈心草 蒸熟待乾折取中心白穰撚燈者是為熟草 不蒸者生乾剝取為生草入藥用之最難研 以粳米粉漿染過曬乾研末入 水澄之浮者是燈心也曬乾用

海金沙 或丸或散沙及 草俱可入藥

茜草根 曬乾為末或用水煎 或煮研汁皆可服

藿香 自種者良揉之如茴香 氣者真薄荷香者非也

絡石 凡採得用粗布揩葉上莖蔓上毛了用熟甘 草水浸一伏時出切日乾任用 杜仲牡丹為 之使惡鐵落畏 貝母菖蒲殺孽毒

木部

桂 凡使勿薄者要紫色厚者去上麄皮取心中味 辛者使每斤大厚紫桂只取得五兩取有味厚 處生用如末用即用重密熟絹并紙裹勿令犯 風其州土只有桂草元無桂心用桂草煮丹陽 木皮遂成桂心凡用即單搗用之得人參甘 草麥門冬大黃黃芩調中益氣得柴胡紫石英 乾地黃療吐逆 忌生葱不見火

桂枝 即桂之枝 條輕薄者

槐實 凡採得後去單子并五子者只取兩子三子者 凡使用銅鎚搥之令破用烏牛乳浸一宿蒸過 用景天 為之使

槐花 未開時采收陳久者良入藥 揀淨酒浸微炒若止血炒黑

枸杞根 即地骨皮凡使根掘得後用東流水浸以物 刷上土了待乾破去心用熟甘草湯浸一宿 然後焙乾用其根若似物命形狀者上春食 葉夏食子秋食根并可也 制硫黃丹砂

枸杞子 去蒂及枯者酒潤一夜搗爛入藥

柏實 去油者酒拌蒸另搗如泥或蒸熟曝烈舂簸取仁炒研入藥 瓜子牡蠣桂為之使 畏菊花羊蹄諸石及麪麴 伏砒硝

柏葉 向月令採之春東夏南秋西冬北使良代可實

茯苓 堅白者良去皮搗為末於水盆中攪三次浮者去之是茯苓筋若誤服之令人眼中童子并黑睛點小兼盲目切記切記 水飛曬乾人乳拌蒸用赤茯苓則不必矣也 使惡畏忌同茯神

茯神 去皮木用 馬藺為之使 得甘草防風芍藥麥門冬紫石英療五臟 惡白斂 畏地榆秦艽牡蒙龜甲雄黃 忌米醋及酸物

琥珀 凡用紅松脂石珀水珀花珀物象珀瑿珀琥珀 紅松脂如琥珀只是濁太脆文橫 水珀多無紅色如淺黃多粗皮皺 石珀如石重色黃不堪用 花珀文似新馬尾松心文一路赤一路黃 物象珀其內自有物命動此使有神妙 瑿珀其珀是眾珀之長故號曰瑿珀 琥珀如血色熟於布上拭吸得芥子者真也大率以拾芥透明者為佳 入藥中用水調側柏子末安於瓷鍋子中安琥珀於末中了下火煮從巳至申別有異光別搗如粉重篩用 一法用細布包內豆腐鍋中煮之然後灰火略煨過入用 目翳用安心神生用

酸棗 粒粒堅實多薄皮者良炒熟研細入藥如欲生用勿隔宿 惡防已

黃蘗木 凌冬不凋者良也凡使用刀削上粗皮了用生蜜水浸半日漉出曬乾用蜜塗文武火炙令蜜盡為度凡修事五兩用蜜三兩 一法用鹽酒炒褐色 惡乾漆 伏硫黃

楮實 凡使採得後用水浸三日將物攪旋投水浮者去之然後曬乾卻用酒浸一伏時了便蒸從巳至亥焙令乾用之

炮炙大法 木部 二二

乾漆 研碎炒令煙起存性研如煙盡 半夏為之使 畏雞子紫蘇杉木漆姑草蟹 忌油脂

五加皮 五葉者是剝皮去骨陰乾 遠志為之使 畏玄參蛇皮

蔓荊實 凡使去蒂子下白膜一重用酒浸一伏時後蒸從巳至未出曬用 一法炒打碎用 惡烏頭石膏

辛夷 凡用去粗皮拭上赤毛了去心即以芭蕉水浸一宿漉出用漿水煮之從巳至未出焙乾用 若治眼目中患即一時去皮用向裏實者 芎藭為之使 惡五石脂 畏菖蒲蒲黃黃連石膏黃環

桑上寄生 凡使在樹上自然生獨枝樹是也採得後用銅刀和根枝莖細銼陰乾了用 忌火

杜仲 如厚者良削去粗皮每一斤用酥一兩蜜三兩和令一處塗火炙以盡為度 一法用酒炒斷絲以漸取 厚方不焦 惡玄參蛇蛻皮

炮炙大法 木部 二三

女貞實 按本草女貞實與冬青似是而非也女貞葉長四五寸子黑色冬青葉圓子赤然須俱霜後採 蒸乾去粗皮更多有之實 白色酒拌蒸晒乾一[illegible]入藥 [illegible]

楓香脂 凡用以齏水煮二十沸入冷水中揉扯數十次曬乾用 [illegible]

雞核 味[illegible]凡使湯浸去皮尖用[illegible] 芒硝[illegible]研[illegible]一兩收仁[illegible]木[illegible]七[illegible]入[illegible]法去[illegible]每[illegible]紙包[illegible]去用取

丁香 凡使[illegible]中用小[illegible]若欲人[illegible]真去[illegible]方中多[illegible]子[illegible]人[illegible]入[illegible]末調入[illegible]忌火 [illegible]乳

沉香 凡使[illegible]入一二沸即須[illegible]長[illegible] 水下為上也半沉者次也入散中用須候眾藥出即入拌和用之 [illegible]十[illegible]忌見火

圓小光明者佳以燈心同研或以糯米數

乳香

粒同研或以人指甲二三片同研或以乳鉢坐熱水中乳之云皆易細總不如研細和人乳一乳畢蒸再研勻曬乾研如飛塵罰以藥研沉下一二沸即起勿多煮

沒藥

透明者良製同乳香法

金櫻子

熬常服或和藥霜降後採金櫻子不拘多少以杵氣微搗去毛刺淨復擘破去子約有一斗用水二斗煮之一飯頃濾起清汁又入白水煮之又煎起又入白水煮三次之後其渣淡而無味去之將淨汁復以細密絹濾過淨鍋熬之加給乃止收時磁罈中坐涼水內一宿用服之大能固精良方二信丹郎其膏加入芡實粉

桑根白皮

自採入土東行者或竹刀或銅刀刮去黃粗皮手指成絲持審見上炙根浮土上者殺人桂心續斷麻子為之使忌鐵器

桑葉

前汾併汁為未得可採霜者方取洗服用

淡竹葉

箽竹葉別有用

竹瀝

用取新鮮金竹鋸尺許中留節兩頭去節劈開閒不拘多少用磚二塊架定竹兩頭出磚二寸許各以磁盤盛於下底瀝滴盡中用烈火薰逼則兩盞最點滴盞於盤中竹皆自然瀝便盡矣就將滴過瀝竹為勁又架削竹於磚上如前燒漏任取多少淡竹筀竹苦竹慈竹常四種各有浩堪用薑汁為之使

竹皮茹

取施鮮諸刮皮勞去外使青勿用上淡竹筀竹苦竹堪用餘不入藥用

吳茱萸

凡使先去葉核并雜物了用大盆一口使鹽水洗一百轉自然無涎日乾任入丸散中用修事十兩用鹽二兩研作末投東流水四斗中分作一百度洗別有大効若用醋煮即先沸醋三十餘沸後入茱萸待醋盡曬乾每用十兩使醋一鎰為度蓼實為之使惡丹參硝石白

堅白英

紫石英

檳榔

凡使取好存坐穩心文如流水碎破內文如錦紋者妙半白半黑并心虛者不入藥用凡使須別檳與榔頭圓身形矮毗者是榔身形尖紫文粗者是檳檳力小榔力大欲使先以刀刮去底細切勿經火恐無力効若熟使不如不用

梔子

凡使勿用顆大者號曰伏尸梔子無力須要如雀腦并須長有九路赤色者上凡使先去皮須了取九稜者仁以甘草水浸一宿漉出焙乾渴剛如下分未用大率治上焦中焦連殼用下焦去殼泡去黃漿炒用治血病炒黑用

騏驎竭

凡使勿用海母血真似騏驎竭只是味鹹并腥氣騏驎竭味微鹹甘似梔子氣是也凡使先研作粉篩過入丸散中任使用勿與眾藥同搗化作飛塵也得密陀僧良

龍腦香

即大并乳形似白松脂作杉木氣明淨者善久粒其丁成如雀屎者不佳今人多以樟腦

升打亂之不可不辨也一云合糯米炭相思子貯之則不耗非青主耳聾炒去殼氣嗅

蕪荑

如宿者真

枳殼

凡使勿使枳實緣性效不同若使枳殼取辛苦腥并有隙油能消一切瘴要陳久年深者為上用時先去穰以麩炒過待麩黑焦遂出用布拭上焦黑然後單搗如粉用產江右者良色黑陳久者良

枳實

去穰麩炒黃色

厚朴

凡使要紫色有油質厚者良去粗皮用酥炙過每修一斤用酥四兩炙了細剉用若湯飲下使用自然薑汁八兩炙一升為度用乾薑為之使惡澤瀉寒水石消石

山茱萸

凡使勿用雀兒蘇真似山茱萸只是核八稜不入藥用圓有紅潤肉厚者身酒拌砂鍋上蒸去核了一斤取肉皮用只秤成四兩已來荻用柳木甑去水入丸寸水不成共上餘惡淮蓼實為之使惡桔梗防風防己

胡桐淚 偽帶容而翠實火燒人者木淚乃樹溢流出者其汁如膏油石淚乃貼入土石間流其狀成塊以其得肉之氣放人蒸為路弧白

猪苓 凡採得用銅刀削去麤皮一重薄切下東流水浸一夜至明漉出細切蒸一日出曬乾用一云猪苓取其行濕生用更佳者良

烏藥 連珠者良沉淨者切沸湯

龍眼 主者不沸湯過食不勤

安息香 或燒黃或未服

仙人杖 先是節次成瞬立死者色黑如作五六月收之

海桐皮 蒲皮服方叫入前

五倍子 或生或炒性為末入藥

兎絲子 文夫不喫三人

大腹 擘去焦黑溫水洗日乾此料之鴆鳥多棲之樹故若皮上不達毒令人用之

天竺黃 輕者真伏粉霜

蜜蒙花 凡使先揀令淨用酒浸一宿漉出候乾却拌蜜令潤蒸從卯至酉出日乾如此拌蒸三度又却日乾用每修事一兩用酒八兩浸待色變用蜜半兩蒸為度

巴豆 凡使巴之與豆及剛子須在子細認勿誤用殺人巴顆小緊實色黃豆即顆有三稜色黑若剛子顆小似棗核兩頭尖巴與豆即用剛子勿使凡修事巴豆敲碎以麻油并酒等可煮巴豆子研膏後用每修事一兩以酒麻油各七合盡為度乾或研為膏 芫花為之使惡蘘草畏大黃藜蘆

蜀椒 凡使須去目及閉口者不用其椒子

杏仁為之使畏款冬花防風附子雄黃

皂莢 凡使須要赤膩肥并不蚛者用新汲水浸一宿用銅刀削上麤皮用酥反覆炙酥盡為度取出搥之去子擣篩皂莢一兩酥二分 柏實為之使惡麥門冬畏空青人參苦參伏丹砂粉霜硫黃

訶子 凡使勿用毗黎勒罨黎勒榔精勒雜路勒若訶黎勒文只有六路或多或少并是雜路勒毗黎勒個個毫殼罨黎勒皮不同狀如羊屎雜路勒文八路凡修事先於酒內浸然後蒸一伏時其訶黎勒以刀削路細剉焙乾用之

赤檉柳 又名雨師

楝實 凡採得後曬乾酒拌令濕蒸待上皮軟剝去皮取肉去核勿單用其核

椿木 凡使根不近西頭者上及不用葉只用根採出拌生蔥蒸半日出生蔥細剉用袋盛挂屋南畔陰乾用

無食子 凡使勿犯銅鐵并被火驚者顆小文細上無㲲米者妙凡修事用漿水於砂盆中研令盡焙乾再研如烏犀色入藥

雷丸 凡使用甘草水浸一宿了銅刀刮上黑皮破作四五片又用甘草湯浸一宿後蒸從巳至未出日乾却以酒拌如前從巳至未蒸日乾用 厚朴芫花為之使惡葛根

蘇方木 [illegible]木中尊色[illegible]節[illegible]若有中心[illegible]

椒 凡使只用肉[illegible]殼[illegible]入藥椒使殼胡 椒[illegible]多[illegible]於石臼中搗碎成粉用

益智子 去殼[illegible]研

杏皮 [illegible]

楮實 [illegible]皮[illegible]殺人[illegible]

木鱉子 入藥去[illegible]

柞木子 [illegible]

櫻櫚子 入[illegible]不可[illegible]

木槿 入[illegible]使[illegible]得[illegible]

炮炙大法 果部

豆蔻 [illegible]同[illegible]

蓮肉 去心[illegible]

荷鼻 [illegible]

橘皮 [illegible]去白[illegible]

橘核 取仁研[illegible]入藥

青皮 [illegible]

大棗 [illegible]小兒不宜食[illegible]

栗 日中曝乾食下氣補益火煨去汗亦佳生食有木氣不補益人蒸炒熟食壅氣凡患風人及小兒不可食 解羊肉[illegible]

覆盆子 凡使用東流水淘去黃葉并皮蒂盡子用酒拌蒸一宿以東流水淘兩遍曬乾方用爲妙也

雞頭實 凡用蒸熟烈日曬裂取仁亦可舂取粉用入[illegible]精藥有連殼用者 一云芡實一斗以防風四兩煎湯浸過用且經久不壞

烏梅 去核微炒用 造法取青梅籃盛於突上熏黑若以稻灰淋汁潤濕蒸過則肥澤不蠹 忌豬肉

木瓜 [illegible]宣州者[illegible]以小[illegible]勿令犯鐵 用銅刀削去硬皮并子薄切於日中曬却用黃牛乳汁拌蒸從巳至未其木瓜如膏煎却於日中薄攤曬乾用也 今止[illegible]隨時月用

炮炙大法 果部

柿 味甘[illegible]不用火烘日曬採青者收置器中自然紅熟[illegible] 不可與蟹同食作瀉[illegible]不香[illegible]汁

柿霜 用大柿去皮捻扁日曬夜露至乾內甕中待生白霜乃取出 今市者多僞不入藥 解[illegible]飲可

烏芋 即荸薺也 能消銅[illegible]

枇杷葉 凡使採得後秤濕者一葉重一兩乾者三葉重一兩是氣足堪用以粗布拭去毛令盡用甘草湯洗一遍却用綿再拭乾每一兩以酥一分炙之酥盡爲度 [illegible]毛不盡令人咳[illegible]

甘蔗 [illegible]

桃仁 去皮尖及雙仁者麩炒研如泥或[illegible]用[illegible]

二八

二九

行血宜連皮尖生用香附爲之使

桃花 三月三日采陰乾之勿使千葉者能使人鼻衄不止目黃凡用揀令淨以絹袋盛於簷下懸令乾去塵用

桃梟 是千葉桃花結子在樹上不落者於十一月內採得一云正月采之中實者良凡修事以酒拌蒸從巳至未焙乾以銅刀切焙取肉用一法搗碎炒若出白炒黑存性

杏仁 五月采之以湯浸去皮尖及雙仁者麩炒研用治風寒肺病藥中亦有連皮尖用者取其發散也

梨子 清熱痰加牛黃末療小兒風疾痰潤有神解熱毒久服不患癰疽

橄欖 中河豚毒煮汁服或生嚼

山查 水潤蒸去核淨肉用

炮炙大法

米穀部

胡麻 凡修事以水淘浮者去之沉者漉出令乾以酒拌蒸從巳至亥出攤曬乾於臼中舂令粗皮一重盡拌小豆相對同炒小豆熟即出去小豆用之蒸不熟令人髮落與茯苓相宜

麻子 極難去殼取帛包置沸湯中浸至冷出之垂井中一夜勿令著水次日日中曝乾就新瓦上挼去殼簸揚取仁粒粒皆完畏牡蠣[illegible]茯苓白微

飴糖 糯米作者入藥粟米者次之餘但可食耳

生大豆 [illegible]黑[illegible]者[illegible]各有用得前胡烏喙[illegible]豆黃[illegible]

赤小豆 [illegible]食[illegible]

大豆黃卷 [illegible]豆[illegible]長[illegible]乾之名爲黃卷一法壬癸日[illegible]或[illegible]或炒爲末用黑大豆爲蘗芽[illegible]大豆[illegible]芽[illegible]皮宜乾用得前胡杏仁牡蠣烏喙天雄鼠屎共蜜和良惡海藻龍膽

酒 人[illegible]火燒以陳酒浸之止痛救出火毒令人不死

粟米 即小米陳者良與杏仁同食令人吐瀉

秫米 小兒病人不宜多食

粳米 陳者下氣病人宜之

蘗米 凡穀皆可生蘗有粟黍穀麥豆諸蘗皆水浸脹候生芽曝乾去鬚取其中米炒研麪用其功皆主消導粟蘗[illegible]麥蘗各有用

舂杵頭細糠 凡穀皆有糠[illegible]方多用[illegible]杵頭[illegible]入藥[illegible]用丹家云糠火燒物倍於常力

炮炙大法

小麥 [illegible]者[illegible]揀淨[illegible]用

麥麩 性涼炒諸藥用

蕎麥 壓丹石毒作麪和豬羊肉熱食不過八九頓即患熱風鬚眉脫落還生亦希涇邠以北多此疾又不可合黃魚食常多犯此故特拈著食家

麴 凡使須陳久者搗作末後掘地坑深二尺用物裹內坑中至一宿明出焙乾用

神麴 五月五日或六月六日或三伏日爲諸神集會之辰故名神麴[illegible]造者[illegible]升也用白虎[illegible]麪[illegible]青龍[illegible]升[illegible]朱雀[illegible]升[illegible]玄武[illegible]升[illegible]勾陳[illegible]升[illegible]螣蛇[illegible]升[illegible]麻[illegible]去皮[illegible]桒[illegible]葉包[illegible]如造醬黃法[illegible]黃衣[illegible]夜之[illegible]用須火炒黃以助土氣陳久者良

藊豆 紫花者良炒去殼打碎[illegible]解魚一切草木毒生嚼及煮汁飲

淡豆豉 出江西者良[illegible]性平作[illegible]則溫[illegible]故能升能散得葱則發汗得鹽則能吐得酒則治風得薤則治痢得蒜則止血炒熟又能止汗

紅麯 亦出江西陳久者良吹淨炒研用

綠豆 生研絞汁或煮食用之宜連皮去皮則令人少壅氣宜是皮寒肉平故也圓小綠者佳反榧子殼忌鯉魚鮓解金石砒霜一切草木諸毒宜生研水服

醋 米造陳久者良[illegible]酒為用無所不入故製藥多用之服茯苓丹參不可食醋

醬 豆作者良麥作者不用以久久為佳又有肉醬魚醬皆呼為醬不入藥用

罌子粟 殼用[illegible]水泡軟擘去筋膜切成[illegible]蜜水米醋拌微炒晒乾用忌蒜醋胡椒

菜部

瓜蒂 凡使勿用白瓜蒂要採取青綠色瓜待瓜氣足其瓜蒂自然落在蔓莖上採得未用時使[illegible]

炮炙大法 菜部 三十二

葉裹於東牆有風處挂令吹乾用

白冬瓜 此物經霜後皮上白如粉塗故云白冬瓜也被霜後取置經年破取核水洗燥去殼擣仁月一用皮肉搗絞汁服

白芥子 研用

萊菔 生食熟食俱可治久脾逆行藥不効煮食經年無不效者但不可與地黃同食多食動氣惟生薑能制其毒伏硇砂

萊菔子 炒研能消食性峻利傷人真氣勿久服

黃蜀葵花 瘡家要藥作末及浸油俱可

葱頭 取根白一二寸連鬚用洗淨忌蜜及常山

韭 絞生汁飲其子入藥揀淨蒸熟暴乾簸去黑皮炒黃研用忌蜜及牛肉[illegible]石鍾乳乳香

荊芥 陳者良去梗取穗若用止血須炒黑

蘇子 自收方真市者俱偽略炒研極細煎成藥投入二三沸即傾

紫蘇 兩面俱紫白種者真

薄荷 產蘇州龍腦者良

苦匏 即苦壺盧也凡用須紋理瑩淨無[illegible]者乃佳不爾有毒

馬齒莧 凡使勿用葉大者不是馬齒莧亦無水銀忌與鼈同食食之俱變成鼈瘕入人腹云不可治

蕺菜 [illegible]蕺俗名魚腥草生陰處

木耳 桑槐樹上生者良煮羹食宜用[illegible]灰火內煨去濕存性為末入藥

人部

髮髲 凡使是男子年可二十已來無疾患顏貌紅白於頂心剪下者髮是乃於先[illegible]中先用苦參

炮炙大法 人部 三十三

水浸一宿漉出入瓶子以火煨之令通赤放冷研用

人乳汁 白而不稠者良

人牙齒 入藥燒用

人糞 宜用絕乾者擣末沸湯沃服之名[illegible]甕埋地中年久者良

人溺 取[illegible]無病童子[illegible]不[illegible]腥白者良

人中白 刮器中者良火煅研

褌襠 取中襠近隱處男用女女用男或取汁或燒灰服

天靈蓋 凡用彌腐爛者佳有一片如三指闊者取得用灰火罨一夜待腥穢氣盡却用童便於磁鍋中煮一伏時漉出於屋下掘得一坑深一尺置骨於中一伏時其藥魂歸神妙陽人使陰陰人使陽男骨色不赤女骨色赤以此別之一[illegible]香湯先洗[illegible]炙用或燒存性用

紫河車 首胎者男胎也首胎重十五兩以上將長流水洗去筋膜用銀簪脚挑去筋膜挂風銀器內加酒重湯煮一晝夜或文武火焙乾一法米泔浸入豬肚中蒸爛搗膏入藥 忌犯鐵

獸部

龍骨 骨細文廣者是雌骨粗文狹者是雄骨五色者上白色者中黑色者次黃色者稍得經落不淨之處并婦人採得者不用洗淨搗研如粉方入藥其效始神但是龍骨中者入腎藥中細安置屬龍骨受氣入腎臟中也雷公云生用法也一置成用酒一宿焙乾研粉水飛三度用如急用以酒煮焙乾一法云凡入藥須水飛曬乾每斤用黑豆一斗蒸一伏時曬乾用否則著人腸胃晚年作熱也 得人參牛黃良畏石膏鐵 忌魚

龍齒 搗碎入乳缽研細 得畏與龍骨同

麝香 其香有三等一者名遺香是麝子臍滿其麝自於石上用蹄尖彈臍落處一里草木不生並燋黃人若收得此香價與明珠同也二名膝香採得甚堪用三名心結香被大獸驚心破了因走遂亂投水被人收得擘破見心流在脾上結作一團乾血塊可隱人山嘗得閒之大香是香中之次也凡使當門子良凡用子日開之方用細研篩用之 忌大蒜

牛黃 凡使有四件第一件是生神黃是取之者又有一件是角中黃又有一心黃是病死後識者剝之取心其黃在心中如濃黃醬汁採得便投於水中黃沾水復便如碎蒺藜子許如豆者硬如帝珠子大有肝黃其牛身上光眼如血色多玩弄好照水自有夜光恐懼人或有人別採之凡用須先單搗細研如塵却絹裹又用黃嫩牛皮裹安於井面上去水三四尺已來一宿至明方取用之 人參為之使 得牡丹菖蒲利耳目 惡龍骨龍膽地黃常山蜚蠊 畏牛膝乾漆

象牙 錯取屑細研用

鹿角膠 作膠法自取用者良 酒化服為上或用麥門冬湯化或和藥或炒成珠 亦良 畏大黃 得火行

阿膠 凡使先於豬脂內浸一宿至明出於柳木火上炙待泡了可研用 真者光明色如琥珀 蛤粉炒成珠

白馬莖 凡使當以游牝時力勢正強者生取得陰乾百日用 一法用銅刀劈破作七片將生羊血拌蒸半日曬乾以粗布拭去皮及乾血剉碎用

鹿茸 用黃精自然汁浸兩日夜了漉出切焙乾搗用 又法以鹿茸鋸作片每五兩用羊脂三兩拌天靈蓋作末塗之慢火炙令內外黃脆了以鹿皮一片裹之安室上一宿其藥魂歸也至明則以慢火焙之令脆方搗作末用 中有小白蟲不可見入人鼻必為蟲顙藥不及

牛膽 臘月黃牛青牛者良

牡狗陰莖 六月上伏日取陰乾百日 凡使以酥塗炙

羚羊角 凡用有神羊角甚長有二十四節挂痕者真 勿令單用不復有驗 凡使不可單用須要不拆元對以繩縛之將鐵錯子錯之旋旋取用勿令犯風錯末盡處須三重紙裹恐力散也搗篩極細更研萬匝入藥中用免刮人腸也

犀角 凡使黑如漆黃如粟上下相透雲頭雨腳分明者為上次用烏黑肌皺坼裂光潤者良近人多巧偽入藥中湯煮不斷須辨之凡修治之時錯其屑入臼中搗令細入藥中用 一說人多以薄紙裹於懷中一宿易碎或磨汁入藥 松脂為之使 惡雷丸 升麻為之使 惡烏頭烏喙

烏家忌鹽姙娠勿服能消胎氣

虎骨 脛骨良頭頸骨俱可用色黃者佳雄虎者勝藥箭射殺者不可入藥其毒浸漬骨血間能傷人也製法並搥碎去髓塗酥或酒或醋各隨方法炭火炙黃入藥

豬懸蹄 古方有用左蹄甲者有用後蹄甲者酒浸半日炙焦用

豬四足 每猪者良

豬膽 陰乾汁亦可和藥

豬肚 猪水畜而胃屬土故方藥用之補虛以胃治胃也

麋角 煎膠與鹿角膠同法取角用水浸七日刮去皮錯屑以銀瓶盛牛乳浸一日乳耗再加至不耗乃止用油紙密封瓶口別用大麥鋪鍋中三寸上安置瓶以麥四周壅滿入水浸一伏時水耗旋加待屑軟如麪取出焙研成霜用

狐陰莖 炙為末酒服

獺肝 炙研 諸畜肝葉皆有定數惟獺肝一月一葉十二月十二葉其間又有退葉用之須見形乃可驗不爾多偽也

猯肉 [illegible]古人[illegible]衆中拔濕如和劑局方藥中用之

膃肭臍 此物多偽海中有獸號曰水烏龍海人採得殺之取腎將入者處在藥中修合恐有誤其物自殊有一對其有兩重薄皮裹丸氣肉核皮上自有肉黃毛三莖共一穴年年歷濕常如新兼將於睡着犬躡足置於人頭其犬驚如狂即是真也用酒浸一宿後以布裹微微火上炙令香細剉單擣用也以漢椒樟腦同收則不壞

禽部

雄雀屎 凡使勿用雀兒糞其雀兒口黃未經淫者糞名雀蘇不入藥雄雀屎兩頭尖圓者是凡採得

先去兩畔有附子生者勿用鉢中研如粉煎甘草湯浸一宿傾上清甘草水盡焙乾任用日華子云凡鳥左翼掩右者是雄其屎頭尖挺直

伏翼 凡使要重一斤者先拭去肉上毛及去爪腸留肉翅并嘴腳以好酒浸一宿取出以黃精自然汁五兩塗炙至盡炙乾用一法止煅存性近世用者多煅存性耳

天鼠屎 即伏翼糞也方言名天鼠一名夜明砂凡采得以水淘去灰土惡氣取細砂曬乾焙用其砂乃蚊蚋眼也惡白斂白微

蟲魚部

石蜜 [illegible]只得十二兩半是數若火少火過並用不得凡煉蜜每斤入水四兩銀石器內以桑柴火慢煉掠去浮沫至滴水成珠不散乃用開之水火煉法又法以器盛置重湯中煮一日候滴水不散取用更不傷火

蜜蠟 蠟乃蜜脾底也取蜜後煉過濾入水中候凝取之色黃者名黃蠟煎煉極淨色白者名白蠟一說新則白久則黃非也與今時产用蟲造白蠟不同惡芫花齊蛤

牡蠣 左顧者良東流水入鹽一兩煮一伏時後入火中燒令通赤然後入鉢中研如粉用也一法火煅醋淬七次研極細如飛麩貝母為之使得甘草牛膝遠志蛇床子良惡麻黃辛夷吳茱萸伏硇砂

真珠 於臼中擣令細以絹羅重重篩過却便研二萬下了用不細則傷人臟腑凡使要不傷破及鑽透者可用也一法入豆腐內蒸易碎入目生用不用苦尔上法為是

瑇瑁 入藥生用以其性味全也既經湯火即不堪用與生熟犀角義同

桑螵蛸 凡使勿用諸雜樹上生者不入藥中用須桑樹畔枝上者採得去核子用沸漿水浸淘七遍令水遍沸於瓷鍋中熬令乾用勿亂別修事卻無效也得龍骨止精畏旋覆花戴椹

石決明 負真珠母也七九孔者良先去上麄皮用鹽并東流水於大甆器中煮一伏時了漉出拭乾搗爲末研如粉更用東流水於甆器中如此每之三度待乾再研一萬匝方入藥中用凡脩事五兩以鹽半分則取服之十恐永不得食山桃令人喪目也

海蛤 此即鮮蛤子鴈食後糞中出有文彩者爲文蛤無文彩者爲海蛤鄉人多將海岸邊爛蛤殼被風濤打磨瑩滑者僞作之凡脩事一兩於漿水中煮一伏時後却以地骨皮柏葉各二兩又煮一伏時後於東流水中淘三遍拭乾細擣研如粉用 蜀漆爲之使 畏狗膽甘遂芫花

文蛤 脩事法同海蛤

蠡魚 俗名烏魚亦名黑魚諸魚中惟此膽甘可食

鯽魚 子不宜與猪肉同食同沙糖食生疳蟲同芥菜食成腫疾同猪肝鷄肉雉肉鹿肉猴肉食生癰疽同麥門冬食害人

蝟皮 作猪蹄者妙鼠脚者次燒灰而用

露蜂房 用治癰腫醋水調塗治瘡煎洗入藥炙 惡乾薑丹參黃芩芍藥牡蠣

蟬蛻 用沸湯洗淨泥土去頭足翅用攻毒全用

烏賊魚骨 凡使要上文頭渾用血鹵作水浸并煮一伏時了漉出於屋下掘一地坑可盛得前件烏賊魚骨多少先燒坑子去炭灰了盛藥一宿至明取出用之其効倍多 惡白及白蘞附子

原蠶蛾 炒去翅足用

蠶退 近世醫家多用蠶退紙而東方諸醫用蠶欲老眠起所蛻皮雖二者之用各殊然東人所用者爲正用之 當微炒

白殭蠶 凡使除絲綿并子盡以糯米泔浸一宿待蠶桑涎出如蝸牛涎浮於水面上然後漉出微火焙乾以布拭蠶上黃肉毛并黑口甲了搗篩如粉用也 白而直折開如亞青色者佳 惡桔梗茯苓茯神萆薢桑螵蛸

蛞蝓 即蜒蚰也 畏鹽

蝸牛 此即負殼蜒蚰也生研服入藥炒用 畏鹽

䗪蟲 即俗名地鱉也生人家墻壁下土中濕處治傷損續絕及消癥母爲必須之藥也能行瘀血 畏皂莢菖蒲屋遊

青魚膽 鮮者可煎服乾者用醋及水磨用

鼈甲 七九肋者良醋炙透焦研細再拌醋炙上焙乾再研如粉 惡礬石理石

蟹 形緊小者良 酒洗淨炙乾研

蟾酥 端午日取蝦蟆眉間其法取大蝦蟆用蛤蜊殼未雜者合蝦殼內用刀一捺則酥出於殼

[illegible]收[illegible]陰乾取用

鼠糞 其兩頭尖者[illegible]

蚺蛇膽 人多以[illegible]膽僞之試法剔取粟許著淨水中浮游水上迴旋行走者爲真[illegible]

蛇蛻 [illegible]

白頸蚯蚓 [illegible]

蜈蚣 [illegible]

蚣先以蜈蚣木和杉木刮用蜈蚣木於土器中炒令木香焦黑後去木木了用竹刀刮去足甲了用蜈蚣本不知是何木也今人惟以火炙去頭足用或去尾足以薄荷葉火煨用之 畏蛞蝓蜘蛛白鹽雞桑白皮

蛤蚧

凡使須認雌雄若雄為蛤口大身小尾粗雌為蚧口尖身大尾粗男服雌女服雄凡修事服之其毒在眼須去眼及頭甲上尾上腹上肉毛以酒浸透方乾用紙兩重於火上緩焙紙炙待兩重紙乾焦透後去紙取蛤蚧於瓷器中盛於東舍角畔懸一宿取用力可十倍勿傷尾効在尾也一云只含少許急奔百步不喘者真

水蛭

極難修製須細剉後用微火炒令色黃乃熟不爾入腹生子為害一法用米泔浸以竹筒盛待乾用米泔浸一夜曝乾展其身看腹中有子皆去之以冬豬脂煎令焦黃然後用 畏石灰食鹽

斑猫

入藥除翅足以糯米拌炒米焦黑去米取用生用則吐瀉人一法用麩炒過醋煮用 馬刀為之使 畏巴豆丹參空青 惡膚青甘草豆花 得豬芫青亭長地膽之毒 靛汁黃連黑豆葱茶解之

白花蛇

蛇一段一云去頭尾各一尺有大毒不可用只用中一云蛇長一丈故頭尾可去一尺若蛇止可酒浸尾各去一寸只取肉用骨刺須遠棄之傷人毒與生者同也一云十年亦不壞也其骨刺須遠埋之宿冬春秋三日取出炭火焙乾如此三次以砂瓶盛埋地中一宿出得酒良

烏蛇

製法同上

蜣螂

五月五日取蒸藏之臨用當炙勿置水中令人吐

五靈脂

此是寒號蟲糞也此物多夾砂石絕難修治凡用研為細末以酒淘飛澄去砂石晒乾用 伴炒 惡人參

穿山甲

一名鯪鯉 或炮或燒或酥炙醋炙童便炙或油煎土炒蛤粉炒當各隨本方未有生用者仍以尾甲乃力勝

予見今之時師董而習之俱藥性隱括駢語守為家珍而於神農本草及先賢炮炙法一切高文大篇竟未嘗夢見臨證用藥方產之真贋莫別修事之軌則全乖欲以攻病譬如克敵致勝責効於不練之卒至病者甘以七尺之軀往往聽其嘗試良可憫也先生曰子言誠然因檢目前常用諸藥品悉按雷公炮炙去其迂濶難遵者而裁以己法其無雷公者則自為闡發以益前人所未逮凡諸使制解伏并反忌惡畏等附系其下庶病家攷用一覽瞭然兼可質醫師之誤其所稗益功豈尠哉舊筆記所剳止九十餘種今廣至四百三十九種一一皆先生口授而予手錄之其間删繁舉要補闕訂訛句字之出入必嚴點畫之幾微必審稿凡四易始付殺青予竊有微勞焉

延陵莊繼光謹識

用藥凡例

藥劑丸散湯膏各有所宜不得違製

藥有宜丸宜散者宜水煎者宜酒漬者宜熬膏者亦有一物兼宜者亦有不可入湯酒者並隨藥性不可過越湯者盪也煎成清汁是也去大病用之散者散也研成細末是也去急病用之膏者熬成稠膏也液者搗鮮藥而絞自然真汁是也丸者緩也作成圓粒也不能速去病舒緩而治之也漬酒者以酒浸藥也有宜酒浸以助其力如當歸地黃黃栢知母陰寒之氣味假酒力而行氣血也有用藥細剉如法煮酒密封早晚頻飲以行經絡或補或攻漸以取効是也

凡煎湯用酒臨熟加之

細末者不循經絡止去胃中及臟腑之積及治肺疾咳嗽爲宜氣味厚者白湯調氣味薄者煎之和查服

凡藥去下部之病者極大而光且圓治中焦者次之治上焦者極小麵糊丸取其遲化直至下焦或酒或醋取其收歛如半夏南星欲去濕者以生薑汁稀糊丸取其易化也湯泡蒸餅又易化滴水尤易化煉蜜丸者取其遲化而氣循經絡也蠟丸者取其難化而遲取効也

凡修丸藥用蜜祇用蜜用餳祇用餳勿交雜用且如丸藥用蠟取其能固護藥之氣味勢力全備以過關膈而作効也今若投蜜相和雖易爲丸然下咽亦易散化如何得到臟中若其更有毒藥則便與人作病豈徒無益而又害之全非用蠟之本意

凡煉蜜皆先掠去沫令熬色微黃試水不散再熬二三沸每用蜜一斤加清水一酒杯又熬一二沸作丸則收潮氣而不粘成塊也

冬月煉蜜成時要加二杯水爲妙衍義云每蜜一斤祇煉得十二兩是其度數也和藥末要乘極滾蜜和之臼內用搗千百杵自然軟熟容易作條好丸也

凡丸散藥亦先細切暴燥乃搗之有各搗者有合搗者其潤濕之藥如天門冬地黃輩皆先切曝之獨搗或以新瓦慢火炕燥退冷搗之則爲細末若入衆藥隨以和之少停回潤則和之不均也又濕藥燥皆大餘耗當先增分兩待燥稱之乃准其湯酒中不須如此

凡篩丸藥用密絹令細若篩散藥尤宜精細若搗丸必于臼中搗數百過色理和同爲佳

凡藥浸酒皆須切細生絹袋盛乃入酒密封隨寒暑看

日數視其濃烈便可漉出不須待酒盡也查則暴燥微搗更漬飲之亦可散服之

凡合膏或以醋或酒或水或油須令淹浸密覆至煮膏時當三上三下以洩其熱勢令藥味得出上之使匝匝沸下之要沸靜良久乃上之如有韭白在中者以兩段漸焦黃爲度如有白芷附子者亦令小黃爲度絞膏要以新布若是可服之膏滓亦可以酒煮飲之可摩之膏查亦宜以傅患處此蓋欲兼盡其藥力也

凡湯酒膏中用諸石藥皆細搗之以新綿裹之內中

衍義云石藥入散如鍾乳粉之屬用水研乳極細必要二三日乃已以水漂澄極細方可服耳豈但搗細以絹篩之爲例耶

凡煎膏中有脂先須揭去革膜子方可用之如猪脂勿令經水臘月者尤佳

凡膏中有雄黃硃砂輩皆當令研如麪俟膏畢乃投入以物杖攪之不爾沉聚在下不勻也

凡草藥燒灰爲末如荷葉柏茅根薊根十灰散之類必燒焦枯用器蓋覆以存性若如燒燃柴薪煅成死灰性亦不存而罔効矣

凡諸膏腻藥如桃仁麻仁輩皆另搗如膏乃以内成散中旋次下臼合研令消散

煎藥則例

凡煎湯劑必先以主治之爲君藥先煑數沸然後下餘藥文火緩緩熬之得所勿揭蓋連罐取起坐凉水中候温熱服之庶氣味不泄若據乘熱揭封傾出則氣泄而性不全矣煎時不宜烈火其湯騰沸耗蝕而速涸藥性未盡出而氣味不純人家多有此病而反責藥不効咎將誰歸

發汗藥先煎麻黃二三沸後入餘藥同煎

止汗藥先煎桂枝二三沸後下衆藥同煎

和解藥先煎柴胡後下衆藥至于温藥先煎乾姜行血藥先煎桃仁利水藥先煎猪苓止瀉藥先煎白术茯苓止渴藥先煎天花粉乾葛去濕藥先煎蒼术防己去黃藥先煎茵陳嘔吐藥先煎半夏生姜風藥先煎防風羌活暑藥先煎香薷熱藥先煎黃連凡諸治劑必有主治爲君之藥俱宜先煎則効自奏也

凡湯中用麻黃先另煮二三沸掠去上沫更益水如本數乃内餘劑不爾令人煩

凡用大黃不須細剉先以酒浸令淹浹密覆一宿明

旦煮湯臨熟乃內湯中煮二三沸便起則勢力徃湯得快利丸藥中微蒸之恐寒傷胃也

凡湯中用阿膠飴糖芒硝皆須待湯熟起去査只內淨汁中煮二三沸鎔化盡仍傾盞內服

凡湯中用完物如乾棗蓮子烏梅仁決明子青葙蔓荆蘿蔔芥蘇韭等子皆劈破研碎入煎方得味出若不碎如米之在穀雖煮之終日米豈能出哉至若桃杏等仁皆用湯泡去皮尖及雙仁者或搗如泥或炒黃色用或生用俱可

凡用砂仁豆蔻丁香之類皆須打碎遲後入藥煎數沸即起不爾久久煎之其香氣消散也是以効少

凡湯中用犀角羚羊角一槩末如粉臨服內湯中後入藥一法生磨汁入藥亦通

凡用沉香木香乳没一切香末藥味須研極細待湯熟先傾汁小盞調香末服訖然後盡飲湯藥

凡煎湯藥初欲微火令小沸其水數依方多少大畧藥二十兩用水一斗煮四升以此爲准然利湯欲生少水而多取汁補湯欲熟多水而少取汁服湯宜小沸熱則易下冷則嘔涌

凡湯液一切宜用山泉之甘洌者次則長流河水井水不用

服藥序次

病在胷膈已上者先食後服藥病在心腹已下者先服藥而後食病在四肢血脉及下部者宜空腹而在旦病在頭目骨髓者宜飽滿而在夜雖食前食後亦停少頃然後服藥食不宜與藥並行則藥力稍爲混滯故也湯液云藥氣與食氣不欲相逢食氣稍消則服藥藥氣稍消則進食所謂食先食後蓋有義在其中也又有消服者飲服者冷服者煖服者服湯有疎有數者煮湯有生有熟者各有次第並宜詳審而勿略焉

清熱湯宜凉服如三黃湯之類消暑藥宜冷服如香薷飲之類散寒藥宜熱服如麻黃湯之類溫中藥宜熟而熱補中藥皆然利下藥宜生而溫如承氣湯之類

病在上者不厭頻而少病在下者不厭頓而多少服則滋榮於上多服則峻補於下

凡云分再服三服者要令勢力相及并視人之強弱羸瘦病之輕重爲之進退增減不必局于方說則活潑潑地也又云晬時周時也從今旦至明旦亦有止

一宿者

服藥禁忌

服柴胡忌牛肉　服茯苓忌醋

服黃連桔梗忌猪肉　服乳石忌參朮犯者死

服丹石不可食蛤蜊腹中結痛

服大黃巴豆同劑反不瀉人

服皂礬忌蕎麥麪　服天門冬忌鯉魚

服牡丹皮忌胡荽　服常山忌葱

服半夏菖蒲忌飴糖羊肉

服白朮蒼朮忌雀蛤肉青魚鮓胡荽大蒜桃李

服鱉甲忌莧菜馬齒莧尤甚

服商陸忌犬肉　服地黃忌蘿蔔

服細辛忌生菜　服甘草忌菘菜

服粟殼忌醋　服芫花甘遂忌鹽忌甘草

服荊芥忌驢馬肉黃顙魚

服柿蒂忌蟹犯者木香湯能解

服巴豆忌蘆笋

服蜜及蜜煎菓食忌魚鮓

服藜蘆忌狐狸肉

若瘡毒未愈不可食生薑雞子犯之則肉長突出作塊而白

凡服藥不可雜食肥猪犬肉油膩羹膾腥臊陳臭諸物

凡服藥不可多食生蒜胡荽生葱諸果諸滑滯之物

凡服藥不可見死尸産婦淹穢等事

妊娠服禁

蚖斑水蛭及虻虫烏頭附子配天雄野葛水銀并巴豆牛膝薏苡與蜈蚣三稜代赭芫花射大戟蛇蛻黃雌雄牙硝芒硝牡丹桂槐花牽牛皂角同半夏南星與通草瞿麥乾姜桃仁通硇砂乾漆蟹甲爪地膽茅根都不中

妊娠禁忌前歌所列藥品未盡特爲拈附

烏喙　側子　藜蘆　薇蓹　厚朴　槐實　𣗥根

蕳茹　茜根　赤箭　茵草　鬼箭　紅花　蘇木

麥蘖　葵子　常山　錫粉　硇砂　砒石　硫黃

石蠶　芫青　班蝥　蜘蛛　螻蛄　衣魚　蜥蜴

飛生　䗪蟲　樗鷄　蚱蟬　蠐螬　蝟皮　牛黃

兎肉　犬肉　馬肉　驢肉　羊肝　鯉魚　蝦蟇

羊躑躅　葛上亭長　鰍　鱓　龜　鼈　生薑

小蒜　雀肉　馬刀

六陳

枳殼陳皮并半夏茱萸狼毒及麻黃六般之藥宜陳久入用方知功効良

十八反

本草明言十八反逐一從頭說與君人參芍藥與沙參細辛玄參與紫參苦參丹參并前藥一見藜蘆便殺人白芨白蘞并半夏瓜蔞貝母五般真莫見烏頭與烏喙逢之一反疾如神大戟芫花并海藻甘遂已上反甘草若還吐蠱用翻腸尋常犯之都不好蜜蠟莫與葱相覩石決明休見雲母藜蘆莫使酒來浸人若犯之都是苦

當禁不禁犯禁必死

張子和云病腫脹既平當節飲食忌鹽血房室犯者病再作乃死不救

病癆嗽忌房室膏粱犯者死

傷寒之後忌葷肉房事犯之者不救

水腫之後忌油鹽

病脾胃傷者節飲食

滑瀉之後忌油膩此數者決不可輕犯也

時病新差食蒜膾者病發必致大困

時病新愈食犬羊肉者必作骨蒸熱

時病新愈食生棗及羊肉必作膈上熱蒸

時病新愈食生菜令人顏色終身不平復

病人新愈飲酒食韭病必復作

不必忌而忌之過

張子和曰臟毒酒毒下血嘔血等症如婦人三十已下血閉及六七月間血痢婦初得孕擇食者已上皆不禁口

凡久病之人胃氣虛弱者忽思葷茹亦當少少與之聞引漿水穀氣入胃此權變之道也若專以淡粥責之則病不悅而食減不進胃氣所以難復病所以難痊此忌之之過也智者通之

傷寒舌鑑一卷

（清）張登撰

清康熙七年刻本

傷寒舌鑑一卷 浙江巡撫採進本

國朝張登撰。登字誕先，吳江人。是書備列傷寒觀舌之法，分白胎、黃胎、黑胎、灰色、紅色、紫色、黴醬色、藍色八種，末附妊娠傷寒舌，爲圖一百二十，各有總論。案古經於診候之外，兼及辨色聆音，而未嘗以舌觀病。舌白胎滑之說，始見張機傷寒論，其傳亦古。然其法不詳，亦未嘗言及種種之別。後金鏡錄推至三十六圖，未爲賅備。觀舌心法衍至三十七圖，又頗病繁蕪。登以己所閱歷，參證於二書之閒，削煩正舛，以成是編。較之脈候隱微，尤易考驗，固診傷寒者所宜參取也。

自序

嘗讀仲景書止言舌白胎滑並無黃黑刺裂至金鏡錄始集三十六圖逮後觀舌心法廣至一百三十有七何後世證變之多若此寧知傷寒自表傳裏舌胎必由白滑而變他色不似伏邪瘟疫等熱毒自內達外之一病便見黃黑諸胎也觀仲景論中一見舌白胎滑即言難治安有失治而致變者乎所以仲景止言白胎已見一班不煩瑣屑後人無先聖治未病之能勢不得不反覆辨論以啓蒙昧蓋邪氣入裏其虛實寒熱之機必現于舌非若脈法之隱而不顯也況陰盛格陽與邪熱鬱伏多有假證假脈惟驗舌上胎色之滑燥厚薄昭若冰鑑無所遁形由是取觀舌心法正其錯誤削其繁蕪汰其無預于傷寒者而參入家大人治按所紀及已所親歷共得百二十圖命曰傷寒舌鑑授之

剞劂以公同志臨證之一助云

康熙戊申如月誕先張登書于雋永堂

傷寒舌鑑目錄

白胎舌二十九圖

黃胎舌一十七圖

黑胎舌一十四圖

灰色舌一十一圖

紅色舌二十六圖

紫色舌一十二圖

霉醬色胎舌三圖

藍色胎紋舌二圖

妊娠傷寒舌六圖

目錄終

長洲張登誕先纂
同邑邵之鵬三山校

白胎舌總論

傷寒邪在皮毛。初則舌有白沫。次則白涎白滑。再次白屑白疱。有舌中舌尖舌根之不同。是寒邪入經之微甚也。舌乃心之苗。心屬南方火。當赤色。今反見白色者。是火不能制金也。初則寒鬱皮膚毛竅不得疏通。熱氣不得外泄。故惡寒發熱。在太陽經。則頭痛身熱項背強。腰脊疼等證。傳至陽明經。則有白屑滿舌。雖證有煩躁。如脉浮緊者。猶當汗之。在少陽經者。則白胎白滑。用小柴胡湯和之。胃虛者。理中湯溫之。如白色少變黄者。大柴胡。大小承氣。分輕重下之。白舌亦有死證。不可忽視也。

微白滑胎舌



寒邪初入太陽。頭疼。身熱惡寒。舌色微白。有津。香蘇散羌活湯之類發散之。

滿白滑胎舌



此太陽裏證舌也。二三日未曾汗。故邪入丹田漸深。急宜汗之。或太陽與少陽合病有此舌者。柴胡桂枝湯主之。

厚白滑胎舌



病三四日，其邪只在太陽，故胎純白而厚，却不乾燥，其證頭疼發熱，脉浮而緊，解表自愈。

乾厚白胎舌



病四五日未經發汗，邪熱漸深，少有微渴，過飲生冷，停積胸中，營熱胃冷，故令發熱煩躁，四肢逆冷而胎白乾厚，滿口白屑，宜四逆散加乾薑。

白胎黃心舌

此太陽經初傳陽明府病舌也。若微黃而潤，宜再汗；待胎燥裏證具，則下之。若煩躁嘔吐，大柴胡湯加減。亦有下淡黃水沫，無稀糞者，大承氣下之。

白胎黃邊舌

舌中見白胎，外有微黃者，必作泄，宜用解毒湯；惡寒者，五苓散。

乾白胎黑心舌



此陽明肉兼太陽舌。其胎邊白中心乾黑者。因汗不徹。傳至陽明所致。必微汗出不惡寒。脉沉者可下之。如二三日未曾汗。有此舌必死。

[illegible]胎[illegible]自利舌

此陽明府兼少陽舌也。二三日自利脉長者生。脉弦者死。如有宿食用大承氣下之。十可全五。

白胎滿黑刺乾舌

白胎中生滿乾黑芒刺。乃少陽之裏證也。其[illegible][illegible]寒反惡熱者。大柴胡加芒硝急下之。然亦危證也。

白滑胎黑心舌



白胎中黑。為表邪入裏之候。大熱讝語。承氣等下之。倘食復而發讝。或利不止者難治。

半邊白滑舌



白胎見於一邊。無論左右。皆屬半表半裏。並宜小柴胡湯。左加葛根。右加茯苓。有欬嗽引脇下痛。而見此舌。小青龍湯。夏月多汗自利。人參白虎湯。

臟結白胎舌



或左或右。半邊白胎。半邊或黑或老黃者。寒邪結在臟也。黃連湯加附子。結在咽者。不能言語。宜生脈散合四逆湯。可救十中一二。

白胎黑斑舌



白胎中有黑小斑點亂生者。乃水來剋火。如無惡候。以涼膈散。承氣湯下之。十中可救一二。

白胎燥裂舌



傷寒胸中有寒。丹田有熱。所以舌上白胎。因過汗傷營。舌上無津。所以燥裂。內無實熱。故不黃黑。宜小柴胡湯加芍藥和之。

白胎黑根舌



舌胎白而根黑，火被水剋之象，雖下亦難見功也。

白尖黃根舌



邪雖入裏，而尖白未黃，不可用承氣，宜大柴胡湯加減，下後無他證，安卧神清可生，倘再有變證多凶。

白胎雙黃舌

此陽明裏證舌也。黃乃土之正色，因邪熱上攻，故令舌亦見黃，如脈長惡熱，大渴，人氣煩躁者，大柴胡、調胃承氣下之。

白胎雙黑舌



白胎中見黑色兩條，乃太陽少陽之邪入於胃，因土氣衰絕，故手足厥冷，胸中結痛也，理中湯、瀉心湯選用，如邪結在舌根，咽嗌而不能言者，死證也。

白胎雙灰色舌

此夾冷食舌也。七八日後見此舌而有津者可治。理中四逆選用。無津者不治。如乾厚見裏證則下之。得溏次日灰色去者安。

白[illegible]舌

舌尖白面根灰黑、少陽邪熱傳府。熱極而傷冷飲也。如水停津液固結而渴者。五苓散。自汗而渴者。白虎湯。下利而渴者。解毒湯。如黑根多白尖少者不[illegible]難治。

白胎尖紅舌



滿舌白滑而尖却鮮紅者。乃熱邪內盛。而復感客寒入少陽經也。小柴胡湯加減。

白胎中紅舌



此太陽初傳經之舌也。無汗者發汗。有汗者解肌。亦有少陽經者。小柴胡湯加減。

白胎變黃舌



少陽合證初見陽明裏證白胎變黃色兼大便者大柴胡湯下之

白尖紅根舌



舌尖胎白邪在半表半裏也其證寒熱耳聾口苦脇痛脉弦小柴胡湯和解之

白胎尖灰根黃舌



此太陽濕熱併於陽明也如根黃色潤目黃小便黃者茵陳蒿湯加減

白胎尖根俱黑舌



舌根尖俱黑而中白乃金水太過火土氣絕於內雖無凶證亦必死也

熱白舌



白胎老極如煮熟相似者心氣絕而肺色乘於上也始因食瓜果冰水等物陽氣不得發越所致為必死候用枳實理中間有生者

淡白透明舌



年老胃弱雖有風寒不能變熱或多服湯藥傷其胃氣所以淡白通明似胎非胎也宜補中益氣加減治之

白胎如積粉舌



此舌乃瘟疫初犯募原也達原飲見三陽表證加柴胡葛根見裏證加大黃

黃胎舌總論

黃胎者裏證也傷寒初病無此舌傳至少陽經亦無此舌直至陽明腑實胃中火盛火乘土位故有此胎當分輕重瀉之初則微黃次則深黃有滑甚則乾黃焦黃也其證有大熱大渴便秘譫語痞結自利或因失汗發黃或蓄血如狂皆濕熱太盛小便不利所致若目白如金身黃如橘宜茵陳蒿湯五苓散梔子柏皮湯等如蓄血在上焦犀角地黃湯中焦桃仁承氣湯下焦代抵當湯凡血證見血則愈切不可與冷水飲之必死大抵舌黃證雖重若脈長者中土有氣也下之則安如脈弦下利舌胎黃中有黑色者皆危證也

純黃微乾舌



舌見黃胎胃熱之極土色見於舌端也急宜調胃承氣下之遲則恐黃老變黑為惡候

微黃胎舌

舌微黃而不甚燥者表邪失汗而初傳裏也用大柴胡湯若身目俱黃者茵陳蒿湯

黃乾舌



舌見乾黃裏熱已極急下勿緩下後脈靜身涼者生反大熱而喘脈躁者死。

黃胎黑滑舌



舌黃而有黑滑者陽明裏證具也雖不乾燥亦當下之下後身涼脈靜者生大熱脈躁者死。

黃胎黑斑舌



黃胎中亂生黑斑者其證必大渴譫語身無斑者大承氣下之如脈澀譫語循衣摸床身黃斑黑者俱不治下出稀黑糞者死。

黃胎中黑通尖舌



黃胎從中至尖通黑者乃火土燥而熱毒最深也兩感傷寒必死惡寒甚者亦死如不惡寒口燥咽乾而下利臭水者可用調胃承氣湯下之十中可救四五口乾齒燥形脫者不治。

老黃隔瓣舌

舌黄乾濇而有隔瓣者，乃邪熱入胃，毒結已深。煩躁而渴者，大承氣湯；發黃者，茵陳蒿湯；少腹痛者，有瘀血也，抵當湯；結胸，大陷胸湯。

黄尖舌

舌尖胎黄，熱邪初傳胃腑也，當用調胃承氣湯。如脉浮惡寒，表證未罷，大柴胡兩解之。

黄胎灰根舌



舌根灰色而尖黄，雖比黑根少輕，如再過一二日亦黑也，難治。無煩躁直視，脉沉而有力者，大柴胡加減治之。

黄尖紅根舌



根紅而尖黄者，乃濕熱乘火位也。瘟熱初病多有此舌，涼膈解毒等湯消息治之。

黃尖黑根舌



舌黑根多而黃尖少者，雖無惡證惡脈，誠恐暴變一時，以胃氣竭絕故耳。

黃胎黑刺舌



舌胎老黃極而中有黑刺者，皆由失汗所致，邪毒內留已深，急用調胃承氣下之，十中可保一二。

黃大脹滿舌

舌黃而脹大者，乃陽明胃經濕熱也。證必身黃、便秘、煩燥，茵蔯蒿湯；如大便自利而發黃者，五苓散加茵蔯、梔子、黃連等治之。

黃尖白根舌

舌根白尖黃，其色倒見，必是少陽經傳陽明腑病。若陽明證多者，大柴胡湯；少陽證多者，小柴胡湯加減；如煩躁者，調胃承氣湯。

黄根白尖舌



舌尖白根黄，乃表邪少而裏邪多也。天水散[illegible]合用以[illegible]陽[illegible]小便不利心[illegible]者必發黄，茵陳蒿湯。

[illegible]尖舌



舌乃火位，今見根黄尖[illegible]，是土來傷火也。[illegible]不利，心煩而渴，皆乃胃中有鬱熱也。調胃承氣加黄連。

黄根白尖短縮舌



舌見根黄尖白而短縮，不燥不濕，但不能伸出，多譫妄煩亂。此[illegible]食[illegible]據中宮，大承氣加薑半[illegible]之。

黑胎舌總論

傷寒五七日舌見黑胎，最為危候，表證皆無此舌。如兩感一二日間見之必死。若白胎上漸漸中心黑者，是傷寒邪熱傳裏之候。紅舌上漸漸黑者，乃瘟疫傳變，坏證將至也。蓋舌色本赤，今見黑者，乃水來剋火，水極似火，火過炭黑之理。然有純黑，有黑暈，有刺，有隔瓣，有黑瓣底紅，黑瓣底黑，大抵尖黑猶輕，根黑最重，如全黑者，總神丹亦難救療也。

純黑舌

遍舌黑色，是火極似水，臟氣已絕，脈必代結，一二日中必死，切勿用藥。

黑瓣底紅舌

黃胎久而變黑，實熱亢極之候，又未經服藥，肆意飲食，而見脈伏，目閉口開，獨語譫妄，醫遇此證，必須開[illegible]者可[illegible]下之

黑胎瓣底中舌

凡見瓣底黑者，不可用藥，雖無惡候，脉亦暴絕，必死不治。

滿黑刺底紅舌



滿舌黑胎，乾燥而生大刺，揉之觸手而響，掘開刺底紅色者，心神尚在，雖火過極，下之可生。有肥盛多痰濕人，感冒發熱痞脹閉亂，一見此舌，急用大陷胸丸攻下，後與小陷胸湯調理。

傷寒舌鑑

刺底黑舌



刺底黑者，言刮去芒刺，底下肉色俱黑也。凡見此舌，不必辨其何經何脉，雖無惡候，必死勿治。

黑爛自齧舌

舌黑爛而頻欲齧，必爛至根而死，雖無惡候怪脉，切勿用藥。

中黑邊白滑胎舌



舌見中黑邊白而滑表裏俱虛寒也脈必微弱證必畏寒附子理中湯溫之夏月過食生冷而見此舌則宜大順冷香選用

紅邊中黑滑舌

舌黑有津證見譫語者必表證時不曾服藥不戒飲食冷物結滯於胃也虛人黃龍湯或枳實理中加大黃其實者用備急丸熱下之夏月中暍多有此舌以人參白虎湯主之

通尖黑乾邊白舌

兩感一二日間便見中黑邊白厚胎者雖用大羌活湯恐無濟矣

黑邊暈內微紅舌

舌邊圍黑中有紅暈者乃邪熱入於心胞之候故有此色宜涼膈合大承氣下之

中焙舌

舌胎中心黑厚而乾，為熱盛津枯之候，急宜生脈散合黃連解毒湯以解之

中黑無胎乾燥舌

舌黑無胎而燥，津液受傷而虛火用事也，急宜生脈散合附子理中主之

黑中無胎枯瘦舌



傷寒八九日，過汗津枯血燥，舌無胎而黑瘦，大便五六日不行，腹不硬滿，神昏不得臥，或時呢喃歎息者，炙甘草湯

黑乾短舌

舌至乾黑而短，厥陰熱極已深，或食填中脘腹脹所致，急用大劑大承氣下之，可救十中一二，服後糞黃熱退，用生，糞黑熱不止者死

灰色舌總論

灰色舌有陰陽之異若直中陰經則即時舌便灰黑而無積苔若熱傳三陰必四五日表證罷而苔變灰色也有在根在尖在中者有渾舌俱灰黑者大抵傳經熱證則有灰黑乾苔皆當攻下泄熱若直中三陰之灰黑無苔者即當溫經散寒又有蓄血證其人如狂或瞑目譫語亦有不狂不語不知人事而面黑舌灰者當分輕重以攻其血切勿誤與冷水引領敗血入心而致不救也

純灰舌



舌灰色無苔者直中三陰而夾冷食也脈必沉細而遲不渴不煩者附子理中四逆湯救之次日舌變灰中有微黃色者生如漸漸灰缺甚乾黑者死

灰中舌

灰色現於中央而消渴氣上衝心饑不欲食食即吐蚘者此熱傳厥陰之候烏梅丸主之

灰黑胎乾紋裂舌



上邪勝水布舌見灰黑紋裂涼膈調胃皆可下之十中可救二三下後渴不止熱不退者不治

灰根黃尖中赤舌



舌根灰色而中紅尖黃乃腸胃燥熱之證若大渴譫語五六日不大便轉失氣者下之如温病熱病惡寒脈浮者涼膈雙解選用

灰色重暈舌

此瘟病熱毒傳遍三陰也熱毒傳內一次舌即灰暈一層毒盛故有重暈最危之證急宜涼膈雙解解毒承氣下之一暈尚輕二暈為重三暈必死亦有橫紋二三層者與此重暈不殊

灰[illegible]刺舌

灰黑舌中又有乾刺而見咽乾口燥喘滿乃邪熱結於少陰當下之然必待其轉失氣者方可下若下之早令人小便難

灰黑尖舌



已經汗解而見舌尖灰黑有宿食未消或又傷飲食邪熱復盛之故調胃承氣湯下之。

灰尖乾刺舌

舌尖灰黑有刺而乾是得病後猶加飲食之故雖證見耳聾脇痛發熱口苦不得用小柴胡必大柴胡或調胃承氣加消導藥方可取効

灰中墨滑舌

舌邊灰色中間有滑苔生黑如墨汁此熱傳裏而中有宿食未化也大柴胡湯。

灰黑多黃根少舌



舌灰色而根黃乃熱傳厥陰而胃中復有停滯也傷寒六七日不利便發熱而利汗出不止者死正氣脫也

逆厥中紫舌

舌邊[illegible]黑而中淡紫[illegible]腎舌尖為爽乃少陰厥氣逆上[illegible]致可治

紅色舌總論

夫紅舌者伏[illegible]自裏而達於表也仲景云冬傷於寒至春[illegible]變為熱病故舌紅面赤又有瘟疫[illegible]皆同者舌亦正赤而加積胎也若更多食[illegible]蒸發舌紅面赤甚者面目俱赤而舌瘡也然病有輕重舌有微甚且見於舌之根尖中下左右疵蝕脹[illegible]細長短種種異形皆瘟疫火熱蘊化之所為也其所治亦不同當解者內解其毒當砭者砭去其血若[illegible]液無過大小承氣黃連解毒三黃石膏[illegible]可也

純紅舌



舌見純紅色乃瘟疫之邪熱初蓄於內也宜敗毒散加减或升麻葛根湯合之

紅中淡黑舌

舌紅中見淡黑色而有滑者乃太陽瘟疫也如惡寒有表證雙解散合解毒湯微微汗之汗罷急下如結胸煩躁直視者不治

紅中焦黑舌

舌見紅色中有黑形如小舌乃瘟毒內結於胃火極反兼水化也宜涼膈散若黑而乾硬以指甲刮之有聲者急用調胃承氣湯下之

紅中黑斑舌

見小黑斑星於紅舌上者乃瘟熱乘虛入於陽明胃熱則發斑也身上亦必有紅赤斑者宜黑參升麻湯化斑湯治之

紅中黑尖舌



舌本紅而尖黑者足少陰瘟熱乘於手少陰也竹葉石膏湯

紅色人字紋裂舌

舌紅甚而又有紋裂者陽明熱毒熏蒸膈上故現人字紋也宜涼膈散或調胃湯甚者大小承氣斟酌下之

紅斷紋裂舌

相火來乘君位致令舌紅燥而紋裂作痛宜黃連解毒湯加麥門冬寒潤之

紅內紅星舌

舌見淡紅色又有大紅星點如瘡瘰者濕熱傷於脾土罨而欲發黃之候宜茵陳蒿湯五苓散選用

深紅蟲碎舌

舌紅更有紅點坑爛如蟲蝕之狀，乃水火不能既濟，熱毒熾盛也。不拘傷寒，宜小承氣湯下之，不退再以大承氣湯下之。

紅色紫瘡舌

瘟疫多有此舌。其證不惡寒，便作渴煩躁，或發斑者，宜解毒湯加黑參薄荷，并益元散治之。尺脈無者必死。戰慄者亦死。

紅中微黃根舌



此乃陽明胃熱，故舌根微黃。若頭汗身涼，小便難者，茵陳蒿湯加梔子香豉。

紅中微黃滑舌



病五七日，舌中有黃胎，是陽明證。如脈沉實譫語，雖胎滑，宜大柴胡湯。若乾燥者，此內邪熱盛，急用大承氣下之。

紅長脹出口外舌

舌長大脹出口外，是熱毒乘心，內服瀉心湯，外以砭去惡血，再用片腦入中黃糝舌上，即愈。

紅舐舌



舌頻出口爲弄舌，舐至鼻尖上下或口角左右者，此爲惡候，可用解毒湯加生地黃，效則生，不效則死。

紅痿舌



舌痿軟而不能動者，乃是心藏受傷，當參脈湯加減施治，然亦十難救一也。

紅硬舌



舌根強硬失音，或邪結咽嗌以致不語者，死證也。如脈有神而外證輕者，可用清心降火去風痰藥，多有得生者。

紅尖出血舌



舌上出血如濺者，乃心臟邪熱壅盛所致，宜用犀角地黃湯加大黃、黃連輩治之。

前中裂灰乾舌



瘟熱病而舌見兩路灰色，是病後復傷飲食所致，令人身熱譫語，循衣撮空，如脈滑者，下之便安，如脈濇下出黑糞者死。

紅尖白根舌



紅尖是本色，白胎為表邪，如惡寒身熱頭痛，宜汗之；不惡寒身熱煩渴者，此太陽裏證也，五苓散兩解之。

紅戰舌

舌戰者，顫掉不安，蠕蠕瞤動也。此證因汗多亡陽，或漏風所致，十全大補、大建中湯選用。

紅細枯長舌

舌色乾紅而長細者，乃少陰之氣絕於內而不上通於舌也。縱無他證，脈再衰絕，朝夕恐難保矣。

紅短白泡舌



口瘡舌短有泡，聲啞咽乾煩躁者，乃瘟疫強汗或傷寒未汗而變此證，宜黃連犀角湯、黃石膏湯選用。

邊紅通尖黑乾舌



瘟病不知調治，或不禁飲食，或不服湯藥，而致舌心乾黑，急下一二次，少留再下，以平為期。

紅尖紫刺舌



汗後食復而見紅尖紫刺，證甚危急，枳實梔子豉湯加大黃下之，仍刮去芒刺，不復生則安，再生則危。

紅尖黑根舌



瘟疫二三日舌根灰黑急用涼膈雙解微下之至四五日後火勢仍未殺更不黑下無背尖若黑結于咽目瞪脈絕油汗者一二日內死。

紅嫩無津舌



汗下太過津液耗竭而舌色鮮紅柔嫩如新生望之似潤而實燥涸以生脈散合人參白虎湯治之然多不應也。

紫色舌總論

紫舌胎者酒後傷寒也或大醉露臥當風或已病而仍飲酒或感冒不服藥而用葱薑熱酒發汗汗雖出而酒熱留於心胞衝行經絡故舌見紫色而又有微白胎也胎結舌之根尖長短厚薄涎滑乾焦種種不同當察其源而治之。

純紫舌

傷寒以葱酒發汗。酒毒入心。或酒後傷寒。皆有此舌。宜升麻葛根湯加石膏滑石。若心煩懊憹不安。梔子豉湯。不然必發斑也。

紫中紅斑舌

舌渾紫而又滿舌紅斑。或渾身更有赤斑者。宜化斑湯解毒湯。俱加葛根黃連青黛。有下證者涼膈散。

紫上白滑舌



舌紫而中見白胎者。酒後感寒。或誤飲冷酒所致。亦令人頭痛惡寒身熱。隨證解表可也。

淡紫青筋舌

舌淡紫帶青而潤。中伴青黑筋者。乃直中陰經。必身涼四肢厥冷。脈沉面黑。四逆理中等治之。

紫上赤腫乾焦舌



舌邊紫而中心赤腫。足陽明受邪，或已下便食酒肉，邪熱復聚所致。若赤腫津潤，大柴胡湯微利之。若煩躁厥逆脈伏，先用枳實理中，次用小承氣。

紫上黃胎乾燥舌



嗜酒之人傷於寒。至四五日，舌紫上積乾黃胎者，急用大承氣下之。如表證未盡，用大柴胡湯。

紫短舌



舌紫短而團圞者，食滯中宮而熱傳厥陰也。急用大承氣湯下之。下後熱退脈靜舌柔和者生，否則死。

紫上黃胎溼潤舌

舌淡青紫而中有黃滑胎，此食傷太陰也。脈必沉細，心下臍傍按之硬痛，或失氣者，小承氣加生附子，或黃龍湯主之。

紫尖蓓蕾舌



感寒之後不戒酒食而見欬嗽生痰煩躁不寧舌色淡紫尖生蓓蕾乃酒濕傷膽味厚傷胃所致也宜小柴胡湯加減治之。

熟紫老乾舌



舌全紫如煮熟者乃熱邪傳入厥陰至篤之兆當歸四逆湯。

淡紫帶青舌



舌色青紫無胎且滑潤瘦小為直中腎肝陰證吳茱萸湯四逆湯急温之

淡紫灰心舌

舌淡紫而中心帶灰或青黑不燥不濕者為邪傷血分雖有下證只宜犀角地黃湯加酒大黃微利之。

微醬色胎舌總論

微醬色胎者。乃夾食傷寒。一二日間即有此舌。爲寒傷太陰。食停胃腑之證。輕者胎色亦薄。臍腹痛不下利。桂枝湯加楂朴枳橘。甚加大黃。冷食不消加乾薑厚朴。其胎色厚而腹痛甚不止者必危。舌見醬色。乃黃兼黑色。爲土邪傳水。證必有口乾燥火。勢雖用下劑。亦有得愈者。

純微醬色舌

舌見微色。乃飲食填塞於胃。復爲寒邪鬱遏。內熱不得外泄。濕氣熏蒸。盦而變此色也。其脈多沉緊。其人必煩躁腹痛。五七日下之不通者必死。太陰少陰氣絕也。

中微浮厚舌

傷寒不戒葷腥。致胎如醬餡浮於舌中。乃食滯中宮之象。如脈有胃氣。不結代。嘴不尖。齒不燥。不下利者。可用枳實理中湯。加薑汁炒川連。若舌胎揩去復長。仍前者。必難救也。

微色中黃胎舌

舌微色中有黃胎乃濕熱之物鬱滯中宮也二陳加枳實黃連若胎乾黃更加酒大黃下之

藍色胎舌總論

藍色胎者乃肝木之色發見於外也傷寒病久已經汗下胃氣已傷致心火無氣胃土無依肺無所生木無所畏故乘膈上而見純藍色是金木相併火土氣絕之候是以必死如微藍或稍見藍紋可用溫胃健脾調肝益肺藥治之如純藍色者是肝木獨盛無畏雖無他證必死

微藍舌

舌見純藍色，中土陽氣衰微，百不一生之候，切勿用藥。

藍紋舌

舌見藍紋，乃胃土氣衰，木氣相乘之候。小柴胡去黃芩加炮薑；若因寒物結滯，急宜附子理中、大建中。

妊娠傷寒舌總論

妊娠傷寒，邪入經絡，輕則母病，重則子傷，枝傷果必墜，理所必然。故凡治此，當先固其胎氣，胎安則子母俱安。面以候母，舌以候子，色澤則安，色敗則斃。面赤舌青者，子死母活；面舌俱青，沫出者，母子俱死；亦有面舌俱白，母子皆死者，蓋謂色不澤也。

孕婦傷寒白胎舌

孕婦初傷於寒而見面青舌上白滑即當微汗以解其表如面舌俱白因發熱多飲冷水陽極變陰所致當用溫中之藥若見厥冷煩躁誤與凉劑則厥逆吐利而死

孕婦面赤黃胎舌



妊娠面赤舌黃五六日裏證見當微利之庶免熱邪傷胎之患若面舌俱黃此失於發汗濕熱入裏所致當用清熱利水藥

孕婦傷寒灰黑舌

妊娠面舌俱黑水火相刑不必問其月數子母俱死面赤舌微黑者還當保胎如見灰黑乃邪入子宮其胎必不能固若面赤者根本未傷當急下以救其母

孕婦傷寒純赤舌



妊娠傷寒溫熱而見面舌俱赤宜隨證汗下子母無虞傷寒面色皎白而舌赤者母氣素虛當用薑桂等藥補之令胎[illegible]安常所宜也若面黑舌赤亦非吉兆若在臨月則子得生而母當殞

孕婦傷寒紫青舌



妊娠傷寒而見面赤舌紫若渾身壯熱所致如淡紫或青傷陰中寒必食停用枳實理中丸逐其寒邪為功也若面赤舌青母雖無妨子殞腹內急宜平胃散加芒硝下之

孕婦傷寒卷短舌

孕婦傷寒



妊娠面黑而舌乾卷短或黃黑刺裂乃裏證至急不下則熱邪傷胎下之危在頃刻如無青腹循衣撮空[illegible]證十中可救一二

周髀算經二卷

題（漢）趙君卿註　（北周）甄鸞重述　（唐）李淳風等註釋

周髀算經音義一卷

（宋）李籍撰

宋刻本

周髀算經二卷、音義一卷、（永樂大典本）

案隋書經籍志天文類首列周髀一卷、趙嬰註。又一卷、甄鸞重述。唐書藝文志李淳風釋周髀二卷、與趙嬰甄鸞之註列之天文類。而歷算類中復列李淳風註周髀算經二卷。蓋一書重出也。是書內稱周髀長八尺。夏至之日、晷一尺六寸。蓋髀者股也。於周地立八尺之表以為股、其影為句。故曰周髀。其首章周公與商高問荅、實句股之鼻祖。故

御製數理精蘊載在卷首而詳釋之、稱為成周六藝之遺文。榮方問於陳子以下、徐光啟謂為千古大愚。今詳考其文、惟論南北影差以地為平遠、復以平遠測天、誠為臆說。然與本文已絕不相類、疑後人傳說而誤入正文者。如夏小正之經傳參合、傅崧卿未訂以前、使人不能讀也。其本文之廣大精微者、皆足以存古法之意、開西法之源。如書內以璇璣一晝夜環繞北極一周而過一度。冬至夜半璇璣起北極下子位。春分夜半起北極左卯位。夏至夜半起北極上午位。秋分夜半起北極右酉位。是為璇璣四游所極。終古不變。以七衡六閒測日躔發斂、冬至日在外衡。夏至日在內衡。春秋分在中衡。當其衡為中氣。當其閒為節氣。亦終古不變。古蓋天之學、此其遺法。蓋渾天如毬、寫星象於外、人自天外觀天。蓋天如笠、寫星象於內、人自天內觀天。笠形半圓、有如張蓋、故稱蓋天。合地上地下兩半圓體、即天體之渾圓矣。其法失傳已久、故自漢以迄元明、皆主渾天。明萬歷中歐邏巴人入中國、始別立新法、號為精密。然其言地圓、即周髀所謂地法覆槃、滂沱四隤而下也。其言南北里差、即周髀所謂北極左右、夏有不釋之冰、物有朝生暮穫。中衡左右、冬有不死之草、五穀一歲再熟。是為寒暑推移、隨南北不同之故。及所謂春分至秋分極下常有日光、秋分至春分極下常無日光。是為晝夜永短、隨南北不同之故也。其言東西里差、即周髀所謂東方日中、西方夜半。西方日中、東方夜半。晝夜易處、如四時相反。是為節氣合朔加時早晚、隨東西不同之故也。又李之藻以西法製渾蓋通憲、展晝短規使大於赤道規、一同周髀之展外衡使大於中衡。其新法歷書述第谷以前西法、三百六十五日四分日之一、每四歲之小餘成一日。亦即周髀所謂三百六十五日者三、三百六十六日者一。

也。西法出於周髀、此皆顯證。特後來測驗增修、愈
推愈密耳。明史曆志謂堯時宅西居昧谷、疇人子
弟散入遐方、因而傳爲西學者、固有由矣。此書刻
本脫誤多不可通。今據永樂大典內所載詳加校
訂、補脫文一百四十七字、改譌舛者一百一十三
字、刪其衍複者十八字。舊本相承、題云漢趙君卿
註。其自序稱爽以暗蔽。註內屢稱爽或疑焉。爽未
之前聞、蓋卽君卿之名。然則隋唐志之趙嬰、殆卽
趙爽之譌歟。註引靈憲乾象、則其人在張衡劉洪
後也。舊有李籍音義、別自爲卷。今仍其舊。書內凡
爲圖者五、而失傳者三、譌舛者一。謹據正文及註
爲之補訂。古者九數惟九章周髀二書流傳最古、
譌誤亦特甚。然溯委窮源、得其端緒、固術數家之
鴻寶也。

周髀算經序

趙　君卿　撰

夫高而大者莫大於天厚而廣者莫廣於地體恢洪而廓落形脩廣而幽清可以玄象課其進退然而宏遠不可指掌也可以晷儀驗其長短然其巨闊不可度量也雖窮神知化不能極其妙探賾索隱不能盡其微是以詭異之說出則兩端之理生遂有渾天蓋天兼而並之故能彌綸天地之道有以見天地之賾則渾天有靈憲之文蓋天有周髀之法累代存之官司是掌所以欽若昊天恭授民時爽以暗蔽才學淺昧隣高山之仰止慕景行之軌轍負薪餘日聊觀周髀其旨約而遠其言曲或作典而中將恐廢替濡滯不通使談天者無所取則輒依經為圖誠冀頹毀重仞之墻披露堂室之奧庶博物君子時迴思焉

周髀算經卷上

趙　君卿　注

甄　鸞　重述

唐朝議大夫行太史令上輕車都尉臣李淳風等奉　勅注釋

昔者周公問於商高曰竊聞乎大夫善數也周公姓姬名旦武王之弟商高周時賢大夫善筭者也周公位居冢宰德則至聖尚卑己以自牧下學而上達況其凡乎請問古者包犧立周天曆度包犧三皇之一始畫八卦以商高善數能通乎微妙達乎無方無大不綜無幽不顯聞包犧立周天曆度建章蔀之法易曰古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地此之謂也夫天不可階而升地不可得尺寸而度邈乎懸廣無階可升蕩乎遐遠無度可量請問數安從出心昧其機請問其目商高曰數之法出於圓方圓徑一而周三方徑一而匝四伸圓之周而為句展方之匝而為股共結一角邪適弦五此圓方邪徑相通之率故曰數之法出於圓方圓方者天地之形陰陽之數然則周公之所問天地也是以商高陳圓方之形以見其象因奇耦之數以制其法所謂言約旨遠微妙幽通矣圓出於方方出於矩圓規之數理之以方方周匝也方正之物出之以矩矩廣長也矩出於九九八十一推圓方之率通廣長之數當須乘除以計之九九者乘除之原也故折矩故者申事之辭也將為句股之率故曰折矩也以為句廣三應圓之周橫者謂之廣句亦廣廣短也股脩

四應方之匝從者謂之股亦脩脩長也徑隅五自然相應之率徑直隅角也亦謂之弦既方之外半其一矩句股之法先知二數然後推一見句股然後求弦先各自乘成其實實成勢化爾乃變通故曰既方其外或并句股之實以求弦實之中乃求句股之分并實不正等更相取與互有所得故曰半其一矩其術句股各自乘三三如九四四一十六并為弦自乘之實二十五減句於弦為股之實一十六減股於弦為句之實九環而共盤得成三四五盤讀如盤桓之盤言取而并減之積環屈而共盤之謂開方除之其一面故曰得成三四五也兩矩共長二十有五是謂積矩兩矩者句股各自乘之實共長者并實之數將以施於萬事而此先陳其率也故禹之所以治天下者此數之所生也禹治洪水決流江河望山川之形定高下之勢除滔天之災釋昏墊之厄使東注於海而無浸逆乃句股之所由生也

句股圓方圖

弦實二十五朱及黃

弦圖



朱實六黃實一

右圖

句實九青

股實之矩十六黃



左圖

股實十六黃

句實之矩九青



句股圓方圖

句股各自乘併之為弦實開方除之即弦案弦圖又可以句股相乘為朱實二倍之為朱實四以句股之差自相乘為中黃實加差實亦成弦實以差實減弦實半其餘以差為從法開方除之復得句矣加差於句即股凡并句股之實即成弦實或矩於內或方於外形詭而量均體殊而數齊句實之矩以股弦差為廣股弦并為袤而股實方其裏減矩句之實於弦實開其餘即股倍股在兩邊為從法開矩句之角即股弦差加股為弦以差除句實得股弦并以并除句實亦得股弦差令并自乘與句實為實倍并為法所得亦弦句實減并自乘如法為股股實之矩以句弦差為廣句弦并為袤而句實方其裏減矩股之實於弦實開其餘即句倍句在兩邊為從法開矩股之角即句弦差加句為弦以差除股實得句弦并以并除股實亦得句弦差令并自乘與股實為實倍并為法所得亦弦股實減并自乘如法為句兩差相乘倍而開之所得以股弦差增之為句以句弦差增之為股兩差增之為弦倍弦實列句股差實見弦實者以圖考之倍弦實滿外大方而多黃實黃實之多即句股差實以差實減之開其餘得外大方大方之面即句股并也令并自乘倍弦實乃減之開其餘得中黃方黃方之面即句股差以差減并而半之為句加差於并而半之為股其倍弦為廣袤合而令句股見者自乘為其實四實以減之開其餘所得為差以差減合半其餘為廣減廣於弦即所求也觀其迭相規矩共為返覆互與通分各有所得然則統敘羣倫弘紀眾理貫幽入微鉤深致遠故曰其裁制萬物唯所為之也

臣鸞釋曰按君卿注云句股各自乘并之爲弦實開方除之即弦臣鸞曰假令句三自乘得九股四自乘得十六并之得二十五開方除之得五爲弦也注云按弦圖又可以句股相乘爲朱實二倍之爲朱實四以句股之差自相乘爲中黃實臣鸞曰以句弦差二倍之爲四自乘得十六爲左圖中黃實也臣淳風等謹按注云以句股之差自乘爲中黃實鸞云倍句弦差自乘者苟求異端雖合其數於率不通注云加差實亦成弦實臣鸞曰加差實一并外矩青八得九并中黃十六得二十五亦成弦實也臣淳風等謹按注云加差實一亦成弦實鸞曰加差實并外矩及中黃者雖合其數於率不通注云

以差實減弦實半其餘以差爲從法開方除之復得句矣臣鸞曰以差實九減弦實二十五餘十六半之得八以差一加之得九開之得句三也臣淳風等謹按注宜云以差實一減弦實二十五餘二十四半之爲十二以差一從開方除之得句三鸞云以差實九減弦實者雖合其數於率不通注云加差於句即股臣鸞曰加差一於句三得股四也注云凡并句股之實即成弦實臣鸞曰句實九股實十六并之得二十五也注云或矩於內或方於外形詭而量均體殊而數齊句實之矩以股弦差爲廣股弦并爲袤臣鸞曰以股弦差一爲廣股四并弦五得九爲袤左圖外青也注云

而股實方其裏臣鸞曰爲左圖中黃十六注云減矩句之實於弦實開其餘即股臣鸞曰減矩句之實九於弦實二十五餘一十六開之得四股也注云倍股在兩邊爲從法開矩句之角即股弦差臣鸞曰倍股四得八在圖兩邊以爲從法開矩句之角九得一也注云加股爲弦臣鸞曰加差一於股四則弦五也注云以差除句實得股弦并臣鸞曰以差一除句實九得九即股四弦五并爲九也注云以并除句實亦得股弦差臣鸞曰以九除句實九得股弦差一注云令并自乘與句實爲實臣鸞曰令并股弦得九自乘爲八十一又與句實九加之得九十爲實注云倍

并爲法臣鸞曰倍股弦并九得十八爲法注云所得亦弦臣鸞曰除之得五爲弦注云句實減并自乘如法爲股臣鸞曰以句實九減并自乘八十一餘七十二以法十八除之得四爲股也注云股實之矩以句弦差爲廣句弦并爲袤臣鸞曰股實之矩以句弦差二爲廣句弦并八爲袤注云而句實方其裏減矩股之實於弦實開其餘即句臣鸞曰句實十九方在圖裏以減矩股之實十六於弦實二十五餘九開之得三句也注云倍句在兩邊臣鸞曰各三也注云爲從法開矩股之角即句弦差加句爲弦臣鸞曰加差二於句三則弦五也注云以差除

股實得句弦并臣鸞曰以差二除股實十六得八句三弦五并爲八也注云以并除股實亦得句弦差臣鸞曰以八除股實十六得句弦差二注云令并自乘與股實爲實臣鸞曰令并八自乘得六十四與股實十六加之得八十爲實注云倍并爲法臣鸞曰倍句弦并八得十六爲法注云所得亦弦臣鸞曰除之得弦五也注云股實減并自乘如法爲句臣鸞曰以股實十六減并自乘六十四餘四十八以法十六除之得三爲句也注云兩差相乘倍而開之所得以股弦差增之爲句臣鸞曰以股弦差一乘句弦差二得二倍之爲四開之得二以股弦差一增之得三句也注云以句弦

差增之爲股臣鸞曰以句弦差二增之得四股也注云兩差增之爲弦臣鸞曰以股弦差一句弦差二增之得五弦也注云倍弦實列句股差實見弦實者以圖考之倍弦實滿外大方而多黄實黄實之多即句股差實臣鸞曰倍弦實二十五得五十滿外大方七七四十九而多黄實黄實之多即句股差實也注云以差實減之開其餘得外大方大方之面即句股并臣鸞曰以差實一減五十餘四十九開之即大方之面七也亦是句股并也注云令并自乘倍弦實乃減之開其餘得中黄方黄方之面即句股差臣鸞曰并七自乘得

四十九倍弦實二十五得五十以減之餘即中黄方差實一也故開之即句股差一也注云以差減并而半之爲句臣鸞曰以差一減并七餘六半之得三句也注云加差於并而半之爲股臣鸞曰加差一於并七得八而半之得四股也注云其倍弦爲廣袤合臣鸞曰倍弦二十五爲五十爲廣袤合臣淳風等謹按列廣袤術宜云倍弦五得十爲廣袤合今鸞云倍弦二十五者錯也注云令句股見者自乘爲其實四實以減之開其餘所得爲差臣鸞曰令自乘者以七七自乘得四十九四實者大方句股之中有四方一方之中有方十二四實有四十八減上四十九餘一也開之得一即句股差一臣淳風等謹按注意令自乘者十自乘得一百

四實者大方廣袤之中有四方若據句實而言一方之中有實九四實有三十六減上一百餘六十四開之得八即廣袤差此是股弦差減股弦并餘數若據股實而言之一方之中有實十六四實有六十四減上一百餘三十六開之得六即廣袤差此是句弦差減句弦并餘數也鸞云令自乘者以七七自乘得四十九四實者大方句股之中有四方一方之中有方十二四實有四十八減上四十九餘一也開之得一即句股差一者錯也注云以差減合半其餘爲廣臣鸞曰以差一減合七餘六半之得三實也臣淳風等謹按注意以差八六各減合十餘二四半之得一二一即股弦差二即句弦差以差減弦即各袤廣也鸞云以差一減合七餘六半之得三廣者錯也注云減廣於弦即所求也臣鸞曰以廣三減弦五六所求差二也

臣淳風等謹按注意以廣一二各成弦五即所求股四句三也鸞云以廣三減弦五即所求差二者錯也

周公曰大哉言數心達數術之意故發大哉之歎請問用矩之道謂用表之宜則望之法商高曰平矩以正繩以水繩之正定平懸之體將欲慎毫釐之差防千里之失偃矩以望高覆矩以測深臥矩以知遠言施用無方曲從其事術在九章環矩以爲圓合矩以爲方既以追尋情理又可造製圓方言矩之於物無所不至方屬地圓屬天天圓地方物有圓方數有奇耦天動爲圓其數奇地靜爲方其數耦此配陰陽之義非實天地之體也天不可窮而見地不可盡而觀豈能定其圓方乎又曰北極之下高人所居六萬里滂沲四隤而下天之中央亦高四旁六萬里是爲形狀同歸而不殊途隆高齊觀而易以陳故曰天似蓋笠地法覆槃方數爲典以方出圓夫體方則度影正形圓則審實難蓋方者有常而圓者多變故當制法而理之理之法者半周半徑相乘則得方矣又可周徑相乘四而一又可徑自乘三之得四而一又可周自乘十二而一故圓出於方笠以寫天笠亦如蓋其形正圓戴之所以象天寫猶象也言笠之體象天之形詩云何蓑何笠此之義也天青黑地黃赤天數之爲笠也青黑爲表丹黃爲裏以象天地之位既象其形又法其位言相方類不亦似乎是故知地者智知天者聖言天之高大地之廣遠自非聖智其孰能與於此乎智出於句句亦影也察句之損益知物之高遠故曰智出

於句句出於矩矩謂之表表不移亦爲句爲句將正故曰句出於矩焉夫矩之於數其裁制萬物唯所爲耳言包含幾微轉通旋還也周公曰善哉善哉言明曉之意所謂問一事而萬事達昔者榮方問於陳子榮方陳子是周公之後人非周髀之本文然此二人共相解釋後之學者謂爲章句因從其類列於事下又欲尊而遠之故云昔者時世官號未之前聞曰今者竊聞夫子之道榮方問陳子能述商高之旨明周公之道知日之高大日去地與圓徑之術光之所照日旁照之所及也一日所行日行天之度也遠近之數冬至夏至去人之遠近也人所望見人目之所極也四極之窮日光之所遠也列星之宿二十八宿之度也天地之廣袤袤長也東西南北謂之廣長夫子之道皆能知之其信有之乎而明察之故不昧不疑陳子曰然言可知也榮方曰方雖不省願夫子幸而說之欲以不省之情而觀大雅之法今若方者可教此道邪不能自料訪之賢者陳子曰然言可教也此皆算術之所及言周髀之法出於算術之妙也子之於算足以知此矣若誠累思之累重也言若誠能重累思之則達至微之理於是榮方歸而思之數日不能得雖潛心馳思而才單智竭復見陳子曰方思之不能得敢請問之陳子曰思之未熟熟猶善也此亦望遠起高之術而

子不能得子之於數未能通類定高遠者立兩表望懸邈者施累矩言未能通類求句股之意是智有所不及而神有所窮言不能通類是情智有所不及而神思有所窮滯夫道術言約而用博者智類之明夫道術聖人之所以極深而研幾唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務是以其言約其旨遠故曰智類之明也問一類而以萬事達者謂之知道引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣故謂之知道也今子所學欲知天地之數筭數之術是用智矣而尚有所難是子之智類單筭術所包尚以為難是子智類單盡夫道術所以難通者既學矣患其不博不能廣博既博矣患其

不習不能究習既習矣患其不能知不能知類故同術相學術教同者則當學通類之意同事相觀事類同者觀其旨趣之類此列士之遇智列猶別也言視其術鑒其學則遇智者別矣賢不肖之所分賢者達於事物之理不肖者闇於照察之情至於役神馳思聰明殊別矣是故能類以合類此賢者業精習智之質也學其倫類觀其指歸夫學同業而不能入神者此不肖唯賢智精習者能之也無智而業不能精習俱學道術明智不察不能以類合類而長之此心遊日蕩義不入神也是故筭不能精習吾豈以道隱子哉固復熟思之凡教之道不憤不啓不悱不發憤之排之然後啓發既不精思又不

學習故言吾無隱也爾固復熟思之舉一隅使反之以三也榮方復歸思之數日不能得復見陳子曰方思之以精熟矣智有所不及而神有所窮知不能得願終請說之自知不敏避席而請說之陳子曰復坐吾語汝於是榮方復坐而請陳子說之曰夏至南萬六千里冬至南十三萬五千里日中立竿測影臣鸞曰南戴日下立八尺表表影千里而差一寸是則天上一寸地下千里今夏至影有一尺六寸故其萬六千里冬至影一丈三尺五寸則故其十三萬五千里此一者天道之數言天道數一悉以如此周髀長八尺夏至之日晷一尺六寸晷影也此數望

之從周城之南千里也而周官測影尺有六寸蓋出周城南千里也記云神州之土方五千里雖差一寸不出畿地之分先四和之實故建王國髀者股也正晷者句以髀為股以影為句股定然後可以度日之高遠正影者日中之時節也正南千里句一尺五寸正北千里句一尺七寸候其影使表相去二千里影差二寸將求日之高遠故先見其表影之率日益表南晷日益長候句六尺候其影使長六尺者欲令句股相應句三股四弦五句六股八弦十即取竹空徑一寸長八尺捕影而視之空正掩日以徑寸之空視日之影髀長則大矩短則小正滿八尺也捕猶索也掩猶擭也而日應空之孔掩若重規更言八尺舉其定也又曰近則大遠則小以影六尺為正

由此觀之率八十寸而得徑一寸以此爲日髀之率故以句爲首以髀爲股首猶始也股猶末也句能制物之率股能制句之正欲以爲總見之數立精理之本明可以周萬事智可以達無方所謂智出於句句出於矩也從髀至日下六萬里而髀無影從此以上至日則八萬里臣鸞曰求從髀至日下六萬里者先置南表晷六尺上十之爲六十寸以兩表相去二千里乘得十二萬里爲實以影差二寸爲法除之得日底地去表六萬里求從髀至日八萬里者先置表高八尺上十之爲八十寸以兩表相去二千里乘之得十六萬爲實以影差二寸爲法除之得從表端上至日八萬里也若求邪至日者以日下爲句日高爲股句股各自乘并而開方除之

得邪至日從髀所旁至日所十萬里旁此古邪字求其數之術曰以表南至日下六萬里爲句以日高八萬里爲股爲之求弦句股各自乘并而開方除之即邪至日之所也臣鸞曰求從髀邪至日所法先置南至日底六萬里爲句重張自乘得三十六億爲句實更置日高八萬里爲股重張自乘得六十四億爲股實并句股實得一百億爲弦實開方除之得從王城至日十萬里今有十萬里問徑幾何曰一千二百五十里八十寸而得徑一寸以一寸乘十萬里爲實八十寸爲法即得以率率之八十里得徑一里十萬里得徑千二百五十里法當以空徑爲句率竹長爲股率日去人爲大股大股之句即日徑也其術以句率乘大股股率而一此以八十里爲法十萬里爲實實如法而一即得日徑故曰日晷徑千二百五

十里臣鸞曰求以率八十里得徑一里十萬里得徑千二百五十里法先置竹孔徑一寸爲千里作大句更置邪去日十萬里爲股以句千里乘股十萬里得一億爲實更置日去地八萬里爲法除實得日晷徑千二百五十里故云日晷徑也臣淳風等謹按夏至王城望日立兩表相去二千里表高八尺影去前表一尺五寸去後表一尺七寸舊術以前後影差二寸爲法以前影寸數乘表間爲實實如法得萬五千里爲日下去南表里又以表高八十寸乘表間爲實實如法得八萬里爲表上去日里仍以表寸爲日高影寸爲日下待日漸高候日影六尺用之爲句以表爲股爲之求弦得十萬里爲邪表數目取管圓孔徑一寸長八尺望日滿筒以爲率長八十寸爲一邪去日十萬里日徑即千二百五十里以理推之法云天之處心日高於外術六萬里者此乃語與術違句六尺股八尺弦十尺角隅正方自然之數蓋依繩水之定植之

於表矩然則天無別體用日以爲高下術既平而邊高下從何而出語術相違是爲大失又按二表下地依水平法定其高下若此表地高則以爲句以間爲弦置其高數其影乘之其表除之所得益股爲定間若此表下者亦置所下以法乘除所得以減股爲定間又以高下之數與間差法而一所得加弦日邪去地此三等至皆以日爲正求日下地高下者置戴日之遠近地高下率乘之如間率而一所得爲日下地高下形勢隆殺與表間同可依此率若形勢不等非代所知率日徑求日大小者徑率乘間如法而一得日徑此徑當即得不待影長六尺凡度日者先須定二矩水平者影南北立句齊高四尺相去二丈以二弦候牽于句上并率二則擬爲候影句上立表弦下望日前一則上畔後一則下畔引則就影令與表日參直二至前後三四

日閒影不移匙即是當以候表並望人取一影亦可日徑影端表頭為則然地有高下表望不同後六術乃窮其實第一後高前下術高為句一表為弦後影為所求率表為所有率以句為所有數所得益股為定間其定間第二後下術以其所下為句表間為弦置其所下以影乘表除所得減股餘為定間第三邪下術依其高率高其句影合與地勢陸殺相以餘同平法假令郡邪下而南其邪亦同不須別望但弦矩與句股不得相應其南里數亦隨地勢不得校平平則從若用此術但得南望者即用句股南下之術當比高之地第四邪上術依其後下之率下其句影此謂矩望北極以為高不遠者望去取差亦同南望此術弦長亦與句股不得相應唯得比望不得南望若南望者即用句影北高之術第五平術不論高下周髀度日用此平術故東西南北四望皆通近遠一差不須別術第六術者是外術其經云四十七萬六千里半之得二十三

萬八千里者是外衡去天心之處心高於外衡六萬里為率南行二十三萬八千里下校六萬里約之得南行一百一十九里下較三十里一百一十九步差下三十步則三十步大強差下十步以此為準則不合有平地地既平而用術尤乖理驗且自古論晷影差變每有不同今略其殘欲取其推步之要尚書考靈曜云日永影尺五寸日短一十三尺日正南千里而減一寸張衡靈憲云懸天之影薄地之儀皆移千里而差一寸鄭玄注周禮云凡日影於地千里而差一寸王蕃姜岌因此為說按前諸說差數並同其言更出書非直有此以事考量恐非實矣謹案宋元嘉十九年歲在壬午遣使往交州度日影夏至之日影在表南三寸二分太康地里志交趾去洛陽一萬一千里陽城去洛陽一百八十里交趾西南望陽城洛陽在其東南較而言之今陽城去交趾近於洛陽去交趾一百八十里則交趾去陽城一萬八百二十里而影差尺

有八寸二分是六百里而影差一寸也況復人路迂迴羊腸曲折方於鳥道所較彌多以事驗之又未盈五百里而差一寸明矣千里之言固非實也何承天又云詔以土圭測影考校二至差三日有餘從來積歲及交州所上驗其增減亦相符合此則影差之驗也周禮大司徒職曰夏至之影尺有五寸馬融以為洛陽鄭玄以為陽城尚書考靈曜日永影一尺五寸鄭玄以為陽城日短十三尺易緯通卦驗夏至影尺有四寸八分冬至一丈三尺劉向洪範傳夏至影一尺五寸八分是時漢都長安而向不言則影處所若在長安則非晷影之正也夏至影長一尺五寸八分冬至一丈三尺一寸四分向又云春秋分長七尺三寸六分此即總是虛妄後漢曆志夏至影一尺五寸後漢洛陽冬至一丈三尺自梁天監已前並同此數魏景初夏至影一尺五寸魏初都許昌與潁川相近後都洛陽又在地中之數但易緯因漢曆舊影似不別影之冬

至一丈三尺晉姜岌影一尺五寸宋都建康在江表驗影之數遙取陽城冬至一丈三尺宋大明祖冲之曆夏至影一尺五寸宋都秣陵遙取影同前冬至一丈三尺後魏信都芳注周髀四術云按永平元年戊子是梁天監之七年也見洛陽測影又見公孫崇集諸朝士共觀秘書影同是夏至之日以八尺之表則日中影皆長一尺五寸八分雖無六寸近六寸梁武帝大同十年太史令虞劆以九尺表於江左建康則夏至日中影長一尺三寸二分以八尺表測之影長一尺一寸七分強冬至一丈三尺七分八尺表影長一丈一尺六寸二分弱隋開皇元年冬至影長一丈二尺七寸二分開皇二年夏至影一尺四寸八分冬至長安測夏至洛陽測及王邵隋靈藏志冬至一丈二尺七寸二分長安則也開皇四年夏至一尺四寸八分洛陽測也冬至一丈二尺八寸八分洛陽則也大唐正觀二年己丑五月二十三日癸亥夏至中影一尺四寸

六分長安測也十一月二十九日丙寅冬至中影一丈二尺六寸三分長安測也按漢魏及隋所記夏至中影或長短齊其盈縮之中則夏至之影尺有五寸為近定實矣以周官推之洛陽為所交會則冬至一丈二尺五寸亦為近矣按梁武帝都金陵云洛陽南北大較千里以尺表今其有九尺影則大同十年江左八尺表夏至中影長一尺一寸七分若是為夏至八尺表千里而差一寸弱矣此推驗即是夏至影差升降不同南北遠近數亦有異若以一等永定恐皆乖理之實

日高圖



日高圖

黄甲與黄乙其實正等以表高乘兩表相去爲黄甲之實以影差爲黄甲之廣而一所得則變得黄甲之表上與日齊按圖當加表高今言八萬里者從表以上復加之青丙與青己其實亦等黄甲與青丙相連黄乙與青己相連其實亦等皆以影差爲廣 臣鸞曰求日高法先置表高八尺爲八萬里爲表以兩表相去二千里爲廣乘表八萬里得一億六千萬里爲黄甲之實以影差二寸爲二千里爲法除之得黄乙之表八萬里即上與日齊此言王城去天名曰甲日底地上至日名曰乙上天名青丙下地名青戊據影六尺王城上天南至日六萬里王城南至日底地亦六萬里是上下等數日夏至南萬六千里者立表八尺於王城影一尺六寸影寸千里故王城去夏至日底地萬六千里也

周髀算經卷上

法曰周髀長八尺句之損益寸千里句謂影也言懸天之影薄地之儀皆千里而差一寸故曰極者天廣袤也言極之遠近有定則天廣長可知今立表高八尺以望極其句一丈三寸由此觀之則從周北十萬三千里而至極下謂冬至日加卯酉之時若春秋分之夜半極南兩旁與天中齊故以爲周去天中之數榮方曰周髀者何陳子曰古時天子治周古時天子謂周成王時以治周居王城故曰昔先王之經邑奄觀九隩靡地不營土圭測影不縮不盈當風雨之所交然後可以建王城此之謂也此數望之從周故曰周髀

言周都河南爲四方之中故以爲望主也髀者表也因其行事故曰髀由此捕望故曰表影爲句故曰句股也日夏至南萬六千里日冬至南十三萬五千里日中無影以此觀之從南至夏至之日中十一萬九千里諸言極者斥天之中極去周十萬三千里亦謂極與天中齊時更加南萬六千里是也北至其夜半亦然日極在極北正等也凡徑二十三萬八千里并南北之數也此夏至日道之徑也其徑者圓中之直者也其周七十一萬四千里周匝也猶夫戴日行其數以三乘徑至日道徑法列夏至日去天中心十一萬九千臣鸞曰求夏里夏至夜半日亦去天中心十一萬九千里并之得夏至日道徑二十三萬八千里三乘徑得

周髀算經卷上

周七十一萬四千里也從夏至之日中至冬至之日中十一萬九千里冬至日中去周十三萬五千里除夏至日中去周一萬六千里是也北至極下亦然則從極南至冬至之日中二十三萬八千里從極北至其夜半亦然凡徑四十七萬六千里此冬至日道徑也其周百四十二萬八千里從春秋分之日中北至極下十七萬八千五百里春秋之日影七尺五寸五分加望極之句一丈三寸 臣鸞曰求冬至日道徑法列夏至去冬至日中十一萬九千里從夏至日道北徑亦十一萬九千里并之得從冬至日中北極下二十三萬八千里從極至夜半亦二十三萬八千里并之得冬至日道徑

四十七萬六千里以三乘徑即冬至日道周一百四十二萬八千里從極下北至其夜半亦然凡徑三十五萬七千里周一百七萬一千里故曰月之道常緣宿日道亦與宿正內衡之南外衡之北圓而成規以爲黃道二十八宿列焉日之行也一出一入或表或裏五月二十三分月之二十一道一交謂之合朔交會及月蝕相去之數故曰緣宿也日行黃道以宿爲正故曰宿正於中衡之數與黃道等臣鸞曰求春秋分日道法列春秋分日中北至極下十七萬八千五百里從北極北至其夜半亦然并之得春秋分日道徑三十五萬七千里以三乘徑即日道周一百七萬一千里求黃道徑法列從北極南至夏至日中一十一萬九千里以從極北去冬至夜半二十三萬八千里并之得黃道三十五萬七千里從極南至冬至日北至夏至日夜半亦黃道徑也以三乘徑周得一百七萬一千里也南至夏至之日中北至冬至之夜半南至冬至之日中北至夏至之夜半亦徑三十五萬七千里周一百七萬一千里此皆黃道之數與中衡等春分之日夜分以至秋分之日夜分極下常有日光春秋分者晝夜等春分至秋分日內近極故日光照及也秋分之日夜分以至春分之日夜分極下常無日光秋分至春分日外遠極故日光照不及也故春秋分之日夜分之時日光所照適至極陰陽之分等也冬至夏至者日道發斂之所生也至晝夜長短

之所極發猶往也斂猶還也極終也春秋分者陰陽之脩晝夜之象脩長也言陰陽長短之等晝者陽夜者陰以明暗之差爲陰陽之象春分以至秋分晝之象北極下見日光也日永主物生故象晝也秋分以至春分夜之象北極下不見日光也日短主物死故象夜也故春秋分之日中光之所照北極下夜半日光之所照亦南至極此日夜分之時也故曰日照四旁各十六萬七千里至極者謂璇璣之際爲陽絕陰彰以日夜之時而日光有所不逮故知日旁照十六萬七千里不及天中一萬一千五百里也人所望見遠近宜如日光所照日近我一十六萬七千里之內及我我目見日故爲日出日遠我十六萬七千里之外日則不見我我亦不見日故爲日入是爲日與目見於十六萬七千里之中故曰遠近宜如日光之所照也從周所望見北過極六萬四千里自此已下諸言減者皆置日光之所照若人目之所見十六萬七千里以除之此除極至周十萬三千里臣鸞曰求從周所望見北過極六十萬四千里法列人目所極十六萬七千里以王城周去極十萬三千里減之餘六萬四千里即人望過極之數也南過冬至之日三萬二千里除冬至日中去周十三萬五千里臣鸞曰求冬至日中三萬二千里法列人日所極十六萬七千里以冬至日中去王城十三萬五千里減之餘即過冬至日中三萬二千里也夏至之日中光南過冬至之日中光四萬八千里除冬至之日中相去十一萬九千里臣

鸞曰求夏至日中光南過冬至日中光四萬八千里法列日高照十六萬七千里以冬夏至日中相去一十一萬九千里減之餘即南過冬至之日中光四萬八千里南過人所望見一萬六千里夏至日中去周萬六千里臣鸞曰求夏至日中光南過人所望見萬六千里法列王城去夏至日中光南過人所望見萬六千里加日光所及十六萬七千里得十八萬三千里以人目所極十六萬七千里減之餘即南過人目所望見一萬六千里也北過周十五萬一千里除周夏至之日中一萬六千里臣鸞曰求夏至日中光北過周十五萬一千里法列日光所及十六萬七千里以王城去夏至日中一萬六千里減之餘即北過周十五萬一千里北過極四萬八千里除極去夏至之日十一萬九千里臣鸞曰求夏至日中光北過極四萬八千里法列日光所及十六萬七千里以北極去夏至夜半十一萬九千里減之餘即北過極四萬八千里也冬至之夜半日光南不至人所見七千里倍日光所照里數以減冬至日道徑四十七萬六千里又除冬至日中去周十三萬五千里臣鸞曰求冬至夜半日光南不至人目所見七千里法列日光十六萬七千里倍之得三十三萬四千里以減冬至日道徑四十七萬六千里餘十四萬二千里復以冬至日中去周十三萬五千里減之餘即不至人目所見七千里不至極下七萬一千里從極至夜半除所照十六萬七千里臣鸞曰求冬至日光不至極下七萬一千里法列冬至夜半去極二十三萬八千里以日光一十六萬七千里減之餘即不至極下七萬一千里夏至之日中與夜半日光九萬六千里過極相接倍日光所照以夏至日道

徑減之餘即相接之數臣鸞曰求夏至日中日光與夜半相接九萬六千里法列倍日光所照十六萬七千里得徑三十三萬四千里以夏至日過徑二十三萬八千里減之餘即日光相接九萬六千里也冬至之日中與夜半日光不相及十四萬二千里不至極下七萬一千里倍日光所照以減冬至日道徑餘即不相及之數半之即各不至極下臣鸞曰求冬至日光與夜半日不及十四萬二千里不至極下七萬一千里法列冬至日道徑四十七萬六千里以倍日光所照三十三萬四千里減之餘即日光不相及十四萬二千里半之即不至極下七萬一千里也夏至之日正東西望直周東西日下至周五萬九千五百九十八里半求之術以夏至日道徑二十三萬八千里為弦倍極去周十萬三千里得二十萬六千里為股為之求句以股自乘減弦自乘其餘開方除之得句一十一萬九千一百九十七里有奇半之各得周半數臣鸞曰求夏至日正東西去周法列夏至日道徑二十三萬八千里為弦自相乘得五百六十六億四千四百萬為弦實更置極去周十萬三千里倍之為二十萬六千里為股重張自相乘得四百二十四億三千六百萬為股實以減弦實餘一百四十二億八百萬即句實以開方除之得正東西去周一十一萬九千一百九十七里二十三萬八千三百九十五分里之七萬五千一百九十一半之即周東西各五萬九千五百九十八里半經曰奇者分也若求分者倍分母得四十七萬六千七百九十即一方得五萬九千五百九十八里半四十七萬六千七百九十分里之七萬五千一百九十一本經無所餘筭之次因而演之也冬至之日正東西方不見日正東西方

者周之夘酉日在十六萬七千里之外故不見日以筭求之日下至周二十一萬四千五百五十七里半求之術以冬至日道徑四十七萬六千里爲弦倍極去周十萬三千里得二十七萬六千里爲句爲之求股句自乘減弦之自乘其餘開方除之得四十二萬九千一百一十五里有奇半之各得東西數　臣鸞曰求冬至正東西方不見日法列冬至日道徑四十七萬六千里爲弦重張相乘得二千二百六十五億七千六百萬爲弦實更列極去周十萬三千里倍之得二十萬六千里爲句重張相乘得四百二十四億三千六百萬以減弦實餘一千八百四十一億四千萬即股實開方除之得周直東西四十二萬九千一百一十五里八十五萬八千二百三十一分里之三十一萬六千七百七十五半即周一方去日二十一萬四千五百五十七里半亦倍分母得一百七十一萬六千

四百六十二分里之三十一萬六千七百七十五凡此數者日道之發斂凡此上周徑之數者日道往還之所至晝夜長短之所極冬至夏至觀律之數聽鍾之音觀律數之生聽鍾音之變知寒暑之極明代序之化也冬至晝夏至夜冬至晝夜日道徑半之得夏至晝夜日道徑法置冬至日道徑四十七萬六千里半之得夏至日中去夏至夜半二十三萬八千里以四極之里也差數及日光所還觀之以差數之所及日光所還以此觀之則四極之窮也四極徑八十一萬里從極南至冬至日中二十三萬八千里又日光所照十六萬七千里凡徑四十萬五千里北至其夜半亦然故日徑八十一萬里八十一者陽數之終日之所極　臣鸞曰求四極徑八十一萬里法列冬至日中去極二十三萬八千里復加冬至日光所

及十六萬七千里得四十萬五千里北至其夜半亦然并南北即是大徑八十一萬里周二百四十三萬里三乘徑即周　臣鸞曰以三乘八十一萬里得周二百四十三萬里自此以外日所不及也從周南至日照處三十萬二千里半徑除周去極十萬三千里　臣鸞曰求周南三十萬二千里法列半徑四十萬五千里以王城去極十萬三千里減之餘即周南至日照處三十萬二千里周北至日照處五十萬八千里半徑加周去極十萬三千里　臣鸞曰求周去冬至夜半日北極照處五十萬八千里法列半道徑四十萬五千里加周夜半去極十萬三千里得冬至夜半北極照去周五十萬八千里東西各三十九萬一千六百八十三里半求之術以徑八十一萬里爲弦倍去周十萬三千里得二十萬

六千里爲句爲之求股得七十八萬三千三百六十七里有奇半之各得東西之數　臣鸞曰求東西各三十九萬一千六百八十三里半法列徑八十一萬里重張自乘得六千五百六十一億爲弦實更置倍周去北極二十萬六千里爲句重張自乘得四百二十四億三千六百萬以減弦實餘六千一百三十六億六千四百萬即股實開方除之得股七十八萬三千三百六十七里一百五十六萬六千七百三十五分里之十四萬三千三百一十一半之即得去周三十九萬一千六百八十三里半分母亦倍之得三百一十三萬三千四百七十分里之十四萬三千三百一十一也周在天中南十萬三千里故東西矩中徑二萬六千六百三十二里有奇求矩中徑二萬六千六百三十二里有奇法列八十一萬里以周東西七十八萬三千三百六十七里有奇減之餘

即矩中徑之數臣鸞曰求矩中徑二萬六千六百三十二里有奇法列八十一萬里以周東西七十八萬三千三百六十七里有奇減之餘二萬六千六百三十三里取一里破爲一百五十六萬六千七百三十五分減一十四萬三千三百一十一餘一百四十二萬三千四百二十四即徑東西矩二萬六千六百三十二里一百五十六萬六千七百三十五分里之一百四十二萬三千四百二十四

周北五十萬八千里冬至日十三萬五千里冬至日道徑四十七萬六千里周一百四十二萬八千里日光四極當周東西各三十九萬一千六百八十三里有奇

此方圓之法此言求圓於方之法





萬物周事而圓方用焉大匠造制而規矩設焉或毀方而爲圓或破圓而爲方方中爲圓者謂之圓方圓中爲方者謂之方圓也

七衡圖



七衡圖

青圖畫者天地合際人目所遠者也天至高地至卑非合也人目極觀而天地合也日入青圖畫內謂之日出出青圖畫外謂之日入青圖畫之內外皆天也北辰正居天之中央人所謂東西南北者非有常處各以日出之處為東日中為南日入為西日沒為北北辰之下六月見日六月不見日從春分至秋分六月常見日從秋分至春分六月常不見日見日為晝不見日為夜所謂一歲者即北辰之下一晝一夜黃圖畫者黃道也二十八宿列焉日月星辰躔焉使青圖在上不動貫其極而轉之即交矣我之所在北辰之南非天地之中也我之卯酉非天地之卯酉內第一夏至日道也第四春秋分日道也外第七冬至日道也皆隨黃道日冬至在牽牛春分在婁夏至在東井秋分在角冬至從南而北夏至從北而南終而復始也

凡為此圖以丈為尺以尺為寸以寸為分分一千里凡用繒方八尺一寸今用繒方四尺五分分為二千里方為四極之圖盡七衡之意

呂氏曰凡四海之內東西二萬八千里南北二萬六千里呂氏秦相呂不韋作呂氏春秋此之義在有始第一篇非周髀本文爾雅云九夷八狄七戎六蠻謂之四海言東西南北之數者將以明車轍馬跡之所至河圖括地象云而有君長之州九阻中國之文德及而不治又云八極之廣東西二億二萬三千五百里南北二億三萬三千五百里淮南子地形訓云禹使大章步自東極至于西極豎亥步自北極至子南極而數皆然或其廣闊將焉可步矣亦後學之徒未之或知也夫言億者十萬曰億也

凡為日月運行之圓周春秋分冬夏至璿璣之運也七衡周而六間以當六月節六月為百八十二日八分日之五節六月者從冬至至夏至日百八十二日八分日之五為半歲六月節者謂中氣也不盡其日也此日周天通四分之一倍法四以除之即得也　臣鸞曰求七衡周而六間以當六月節六月為一百八十二日八分日之五此為半歲也列周天三百六十五日四分日之一通分內子得一千四百六十一為實倍分母四為八除實得半歲一百八十二日八分日之五也

故日夏至在東井極內衡日冬至在牽牛極外衡也東井牽牛為長短之限內外之極也衡復更終冬至冬至日從外衡還黃道一周年復於故衡終于冬至

故曰一歲三百六十五日四分日之一歲一內極一外極從冬至一內極及一外極度終於星月窮於次是為一歲三十日十六分日之七月一外極一內極欲分一歲為十二月一衡間當一月此舉中相去之日數以此言之月行二十九日九百四十分日之四百九十九則過周天一日而與月合宿論其入內外之極大歸粗通未必得也日光言內極月光言外極日陽從冬至起月陰從夏至起往來之始易曰日往則月來月往則日來此之謂也此數置一百八十二日八分日之五通分內子以六間乘分母以除之得三十以三約法得十六約餘得七　臣鸞曰求三十日十六分日之七法列半歲一百八十二日八分日之五通分內子得一千四百六十一為實以六間乘分母八得四十八

除實得三十日不盡二十一更置法實求等數平於三即以約法得十六約餘得七即是從中氣相去三十日十六分日之七也是故一衡之間萬九千八百三十三里三分里之一即為百步此數夏至冬至相去十一萬九千里以六間除之得矣法與餘分皆半之臣鸞曰求一衡之間一萬九千八百三十三里三分里之一法置冬至夏至相去十一萬九千里以六間除之即得法與餘分半之得也欲知次衡徑倍而增內衡之徑倍一衡間數以增內衡即次二衡徑二之以增內衡徑二乘所倍一衡之間數以增內衡徑即得三之衡徑次衡放此次至皆如數內一衡徑二十三萬八千里周七十一萬四千里分為三百六十五度四分度之一度得一千九百五十四里二百四十七步千四百六十一分步之九百三十三通周天四分之一為法又以四乘衡周為實實如法得一百步不滿法者十之如法得十步不滿法者十之如法得一步不滿者以法命之至七衡皆如此臣鸞曰求內衡度法置夏至徑二十三萬八千里以三乘之得內衡周七十一萬四千里以周天分母四乘內衡周得二百八十五萬六千里為實以周天分一千四百六十一為法除之得一千九百五十四里不盡一千二百六即因而三之為三千六百一十八以法除之得二百步不盡六百九十六步上十之如法而得四十步不盡一千一百一十六復上十之如法而一得七步不盡九百三十三即是一千九百五十四里二百四十七步一千四百六十一

分步之九百三十三次二衡徑二十七萬七千六百六十六里二百步周八十三萬三千里分里為度度得二千二百八十里百八十八步千四百六十一分步之千三百三十二通周天四分之一為法四乘衡周為實實如法得里數不滿者求步數不盡者命分臣鸞曰求第二衡法列一衡間一萬九千八百三十三里少半里倍之得三萬九千六百六十六里太半里增內衡徑二十三萬八千里得第二衡徑二十七萬七千六百六十六里二百步是三分里之二又以三乘之步滿三百成一里得二衡周八十三萬三千里以周天分母四乘周得三百三十三萬二千為實更置周天三百六十五度四分度之一通分內子得一千四百六十一為法除之得二千二百八十里不盡九百二十一以三乘之得二十七萬六千復以前法除之得一百八十八步不盡一千三百三十二即是度得二千二百八十里一百八十八步一千四百六十一分步之一千三百三十二次三衡徑三十一萬七千三百三十三里一百步周九十五萬二千里分為度度得二千六百六里百三十步千四百六十一分步之二百七十通周天四分之一為法四乘衡周為實實如法得里數不滿法者求步數不盡者命分臣鸞曰求第三衡法列倍一衡間得三萬九千六百六十六里三分里之二增第二衡徑二十七萬七千六百六十六里二百步即三分里之二得第三衡徑三十一萬七千三百三十三里

一百步以三乘徑步步滿三百成里得周九十五萬二千里又以分母四乘周得三百八十萬八千為實以周天分一千四百六十一為法以除實得二千六百六里不盡六百三十四以三百乘之以法除之得一百三十步不盡二百七十即是度得二千六百六里一百三十步一千四百六十一分步之二百七十

次四衡徑三十五萬七千里周一百七萬一千里分為度度得二千九百三十二里七十一步千四百六十一分步之六百六十九通周天四分之一為法四乘衡周為實實如法得里數不滿法者求步數不盡者命分 臣鸞曰求第四衡法列倍一衡間三萬九千六百六十六里三分里之二增第三衡徑三十一萬七千三百三十三里一

百步步滿三百成里得徑三十五萬七千里以三乘之得周一百七萬一千里以分母四乘之得四百二十八萬四千為實以周天分一千四百六十一除之得二千九百三十二里不盡三百四十八以三百乘之以法除之得七十一步不盡六百六十九即是度得二千九百三十二里七十一步一千四百六十一分步之六百六十九

次五衡徑三十九萬六千六百六十六里二百步周一百一十九萬里分為度度得三千二百五十八里十二步千四百六十一分步之千六十八通周天四分之一為法四乘衡周為實實如法得里數不滿法者求步數不盡者命分 臣鸞曰求第五衡法列倍第一衡間三萬九千六百六十六里三分里之二增第四衡徑三十五萬七千里滿三百成里得第五衡徑三十九萬六千六百六十六里二百步以三分乘徑得周一百一十九萬里又以分母四乘周得四百七十六萬為實以周天分一千四百六十一為法除之得三千二百五十八里不盡六十二以三百乘之以法除之得十二步不盡一千六十八即是度得三千二百五十八里十二步一千四百六十一分步之一千六十八

次六衡徑四十三萬六千三百三十三里一百步周一百三十萬九千里分為度度得三千五百八十三里二百五十四步千四百六十一分步之六通周天四分之一為法四乘衡周為實實如法得一里不滿法者求步不盡者命分 臣鸞曰求第六衡法列倍第一衡間三萬九千六百六十六里三分里之二以增第五

衡徑三十九萬六千六百六十六里二百步又三乘徑得周一百三十萬九千里又以分母四乘周得五百二十三萬六千為實以周天分一千四百六十一為法除之得三千五百八十三里不盡一千二百三十七以三百乘之以法除之得二百五十四步不盡六即是度得三千五百八十三里二百五十四步一千四百六十一分步之六

次七衡徑四十七萬六千里周百四十二萬八千里分為度度得三千九百九里一百九十五步千四百六十一分步之四百五通周天四分之一為法四乘衡周為實實如法得里數不滿法者求步數不盡者命分 臣鸞曰求第七衡法列倍第一衡間三萬九千六百六十六里三分里之二增第六衡徑四十三萬六千三百三十三里一百

步得第七衡徑四十七萬六千里以三乘之得周一百四十二萬八千里以分母四乘之得五百七十一萬二千爲實以周天分一千四百六十一爲法除之得三千九百九里不盡九百五十一又以三百乘之所得以法一千四百六十一除之得一百九十五步不盡四百五即是度得三千九百九里一百九十五步一千四百六十一分步之四百五

其次曰冬至所北照過北衡十六萬七千里冬至十一月日在牽牛徑在北方因其在北故言照過北衡爲徑八十一萬里倍所照增七衡徑周二百四十三萬里三乘倍增七衡周分爲三百六十五度四分度之一度得六千六百五十二里二百九十三步千四百六十一分步之三百二十七過此而往者未之或知過八十一萬里之外或知者或疑其可知或疑其難知此言上聖不學而知之上聖者智無不至明無不見考靈曜曰微式出冥唯審其形此之謂也故冬至日晷丈三尺五寸夏至日晷尺六寸冬至日晷長夏至日晷短日晷損益寸差千里故冬至夏至之日南北游十一萬九千里四極徑八十一萬里周二百四十三萬里分爲度度得六千六百五十二里二百九十三步千四百六十一分步之三百二十七此度之相去也臣鸞曰求冬至日所北照十六萬七千里并南北日光得三十三萬四千里增冬至日道徑四十七萬六千里得八十一萬里三之得周二百四十三萬里以周天分母四乘之得九百七十二萬里爲實以周天分一千四百六十一爲法除之得六千六百五十二里不盡一千四百二十八以三百乘之得四十二萬八千四百復以法除之得二百九十三步不盡三百二十七即是度得六千六百五十二里二百九十三步一千四百六十一分步之三百二十七

其南北游日六百五十一里一百八十二步一千四百六十一分步之七百九十八

術曰置十一萬九千里爲實以半歲一百八十二日八分日之五爲法半歲者從外衡去內衡以爲法除相去之數得一日所行也而通之通之者數不合齊常以法等得相通入以八乘也得九十五萬二千爲實通十一萬九千里所得一千四百六十一爲法除之通百八十二日八分日之五也實如法得一里不滿法者三之如法得百步一里三百步當以三百乘而言之三之者不欲轉法便以一位爲百實故從一位命爲百不滿法者十之如法得十步上不用三百乘故此十之便以位爲十實故從一位命爲十不滿法者十之如法得一步復十之者但以一位爲實故從一位命爲一不滿法者以法命之位盡於一步故以法命其餘分爲殘步臣鸞曰求南北游法置冬至十一萬九千里以半歲一日分母八乘之得九十五萬二千爲實通半歲一百八十

二日八分日之五得一千四百六十一以除得六百五十一里不盡八百八十九以三百乘之得二十六萬六千七百復以法除之得一百八十二步不盡七百九十八即得日南北游日六百五十一里一百八十二步一千四百六十一分步之七百九十八

周髀算經卷上

周髀算經卷下

趙君卿注

甄鸞重述

唐朝議大夫行太史令上輕車都尉臣李淳風等奉勅注釋

凡日月運行四極之道運周也極至也謂外衡也日月周行四方至外衡而還故曰四極也極下者其地高人所居六萬里滂沲四隤而下游北極從外衡至極下乃高六萬里而言人所居蓋復畫外衡滂沲四隤而下如覆槃也天之中央亦高四旁六萬里四旁猶四極也隨地穹隆而高如蓋笠故日光外所照徑八十一萬里周二百四十三萬里日至外衡而還出其光十六萬七千里故云照故日運行處極北北方日中南方夜半日在極東東方日中西方夜半日在極南南方日中北方夜半日在極西西方日中東方夜半凡此四方者天地四極四和四和者謂之極子午卯酉得東西南北之中天地之所合四時之所交風雨之所會陰陽之所和然百物阜安草木蕃庶故曰四和則晝夜易處南方爲晝北方爲夜加四時相及南方日中北方夜半然其陰陽所終冬夏所極皆若一也陰陽之數齊冬夏之節同寒暑之氣均長短之晷等天象蓋笠地法覆槃見乃謂之象形乃謂之法在上周回無差運變不二

故準蓋在下故擬槃象法義同蓋槃形等互文異器以別尊卑仰象俯法名號殊矣天離地八萬里然其隆高相從其相去八萬里冬至之日雖在外衡常出極下地上二萬里天地隆高高於外衡六萬里冬至之日雖在外衡其相望爲平地直常出地北極下地上二萬里言日月不相障蔽故能揚光於晝納明於夜故日兆月日者陽之精譬猶火光月者陰之精譬猶水光月含影故月光生於日之所照魄生於日之所蔽當日即光盈就日即明盡月稟日光而成形兆故云日兆月也月光乃出故成明月待日然後能舒其光以成其明星辰乃得行列靈憲曰衆星被曜因水火轉光故能成其行列是故秋分以往到冬至三光之精微以成其道遠日從中衡往至外衡其徑日遠以其相遠故光微不言從冬至到春分者俱在中衡之外其同可知此天地陰陽之性自然也自然如此故曰性也欲知北極樞璿周四極極中不動璿璣也言北極璿璣周旋四至極至也常以夏至夜半時北極南游所極游在樞南之所至冬至夜半時北游所極游在樞北之所至冬至日加酉之時西游所極游在樞西之所至日加卯之時東游所極游在樞東之所至此北樞璿璣四游北極游常近冬至而言夏至夜半者極見冬至夜半極不見也正北極樞璿璣之中正北天之中正極之所游極處璿璣之中天心之正故曰璿璣也冬至日加

酉之時立八尺表以繩繫表顛希望北極中大星引繩致地而識之顛首希仰致至也識之者所望大星表首及繩至也參指直而識之也又到旦明日加卯之時復引繩希望之首及繩致地而識其兩端相去二尺三寸日加卯酉之時望至地之相去子也故東西極二萬三千里影寸千里故爲東西所致之里數也其兩端相去正東西以繩至地所謂兩端相直爲東西之正也中折之以指表正南北所識兩端之中與表爲南北之工加此時者皆以漏揆度之此東西南北之時冬至日加卯酉者北極之正東西日不見矣以漏度之者一日一夜百刻從夜半至日中從日中至夜半與冬夏常各五十刻中分之得二十五刻加極卯酉之時揆亦度也其繩致地所識去表丈三寸故天之中去周十萬三千里北極東西之時與天中齊故以所望表句爲天中去周之里數何以知其南北極之時以冬至夜半北游所極也北過天中萬一千五百里以夏至南游所極不及天中萬一千五百里此皆以繩繫表顛而希望之北極至地所識丈一尺四寸半故去周十一萬四千五百里過天中萬一千五百里其南極至地所識九尺一寸半故去周九萬一千五百里其南不

及天中萬一千五百里此璿璣四極南北過不
及之法東西南北之正句以表爲股以影爲句極至地所亦如短中
徑二萬六千六百三十二里有奇法列八十一萬里以周東西七十八萬三千三百六十七里
有奇減之餘二萬六千六百三十二里取一里破爲一百五十六萬六千七百三十五分庶一
十四萬三千三百一十一餘一百四十二萬三千四百二十四即徑東西二萬六千六百三十
二里一百五十六萬六千七百三十五分里之一百四十二萬三千四百二十四周去
極十萬三千里日去人十六萬七千里夏至去
周一萬六千里夏至日道徑二十三萬八千里
周七十一萬四千里春秋分日道徑三十五萬

七千里周一百七萬一千里冬至日道徑四十
七萬六千里周一百四十二萬八千里日光四
極八十一萬里周二百四十三萬里從周南三
十萬二千里影言正句者四方之影皆正而定也璿璣徑二萬三
千里周六萬九千里此陽絕陰彰故不生萬物
春秋分謂之陰陽之中而日光所照適至璿璣之徑爲陽絕陰彰故萬物不復生也
其術曰立正句定之正四方之法也以日始出立表而
識其晷日入復識其晷晷之兩端相直者正東
西也中折之指表者正南北也極下不生萬物

何以知之以何法知之也冬至之日去夏至十一萬九
千里萬物盡死夏至之日去北極十一萬九千
里是以知極下不生萬物北極左右夏有不釋
之冰水凍不解是以推之夏至之日外衡之下爲冬矣萬物當死此日遠近爲冬夏非陰
陽之氣爽或疑焉春分秋分日在中衡春分以往日益
北五萬九千五百里而夏至秋分以往日益南
五萬九千五百里而冬至并冬至夏至相去十一萬九千里以往日
益北近中衡以往日益南遠中衡中衡去周七萬五千五百里
影七尺五寸五分中衡左右冬有不死之草夏長之類

此欲以內衡之外外衡之內常爲夏也然其脩廣爽未之前聞此陽彰陰微故
萬物不死五穀一歲再熟近日陽多農再熟凡北極之
左右物有朝生暮獲獲疑作穫謂葶藶薺麥冬生之類北極之下從春分
至秋分爲晝從秋分至春分爲夜物有朝生暮獲者亦有春錫而秋熟然其所育皆是周地冬
生之類薺麥之屬言左右者不在璿璣二萬三千里之內也此陽微陰彰故無夏長之類
立二十八宿以周天曆度之法以用也列二十八宿之度用周
天
術曰倍正南方倍猶背也正南方者二極之正南北也以正句定
之正句之法日出入識其晷晷兩端相直者正東西中折之以指表正南北即平地

徑二十一步周六十三步令其平矩以水正（如定水之平故曰平矩以水正也）則位徑一百二十一尺七寸五分因而三之爲三百六十五尺四分尺之一（徑一百二十一尺七寸五分周三百六十五尺二寸五分者四分之一而或言一百二十尺舉其全數）以應周天三百六十五度四分度之一審定分之無令有纖微（所分平地周一尺爲一度二寸五分爲四分度之一其令審定不欲使有細小之差也纖微細分也臣鸞曰求一百二十一尺七寸五分因而三之爲三百六十五度四分度之一法列徑一百二十一尺七寸五分以三乘得三百六十五尺二寸五分二寸五分者即四分之一此即周天三百六十五度四分度之一）分度以定

則正督經緯而四分之一合各九十一度十六分度之五（南北爲經東西爲緯督亦通周天四分之一又以四乘分母以法除之臣鸞曰求分度以定四分之一合各九十一度十六分度之五法列周天三百六十五度以四分度之一而通分內子得一千四百六十一爲實更以四乘分母得十六爲法除之得九十一不盡五即是各九十一度十六分度之五也）於是圓定而正（分所圓爲天度又四分之皆定而正）則立表正南北之中央以繩繫顛希望牽牛中央星之中（引繩至經緯之交以望之星與表繩參相直也）則復候須女之星先至者（復候須女中當以繩望之）則如復以表繩希望須女先至定中（須女之先至者又復如上引繩至經緯之

交以望之）即以一游儀希望牽牛中央星出中正表西幾何度（游儀亦表也游儀移望星爲正知星出中正之表西幾何度故曰游儀）各如游儀所至之尺爲度數（所游分圓周一尺應天一度故以游儀所至尺數爲度）游在於八尺之上故知牽牛八度（須女中而望牽牛游在八尺之上故牽牛爲八度）其次星放此以盡二十八宿度則之矣（皆如此上法定）立周度者（周天之度）各以其所先至游儀度上（二十八宿不以一星爲體皆以先至之星爲正之度）以車輻引繩就中央之正以爲轂則正矣（以經緯之交爲轂以圓度爲輻知一宿得幾何度則引繩如輻湊轂爲正望星定度皆以方爲正南知二十八宿爲幾何度然後環分而布之也）日所以入亦以周定之（亦同望星之周）欲知日之出入（出入二十八宿）即以三（東西南北面之宿列置各應其方立表望之知日出入何宿從出入徑幾何度）百六十五度四分度之一而各置二十八宿（以二十八宿列置地所圓周之度使四面之宿各應其方）以東井夜半中牽牛之初臨子之中（東井牽牛相對之宿也東井臨午則牽牛臨於子也）東井出中正表西三十度十六分度之七而臨未之中牽牛初亦當臨丑之中（分周天之度爲十二位而十二辰各當其一所應十二月從午至未三十度十六分度之七未與丑相對而東井牽牛之所居分之法已

陳於上矣　臣鸞曰求東井出中正表西三十度十六分度之七法先通周天得一千四百六十
十一爲實以位法十二乘周天分毋四得四十八爲法除實得三十度不盡二十一更副置法
實等數平於三約不盡二十一得七約法四十八得十六即部三十度一十一十六分度之七於
是天與地協協合也置東井牽牛使居丑未相對則天之列宿與地所爲圓周相
應合得之矣乃以置周二十八宿從東井牽牛所居以置十二位焉
置以定乃復置周度之中央立正表置周度之中央者經
緯之交也以冬至夏至之日以望日始出也立一游
儀於度上以望中央表之晷從日所出度上立一游儀皆望中表
之晷所以然者當曜不復當日得以視之也晷參正則日所出之宿

度游儀與中央表及晷參相直游儀之下即所出合宿度日入放此此日出法
求之
牽牛去北極百一十五度千六百九十五里二
十一步千四百六十一分步之八百一十九牽牛
冬至日所在之宿於外衡者與極相去之度數
術曰置外衡去北極樞二十三萬八千里除璣
璣萬一千五百里北極常近牽牛爲樞過極萬一千五百里此求去極故以
除之其不除者二十二萬六千五百里以爲實以三
百乘之里爲步以周天分一千四百六十一乘步分內衡之度以周天分爲法法有分故以周

天乘實齊同之得九百九十二億七千四百九十五萬以內衡一度數千
九百五十四里二百四十七步千四百六十一
分步之九百三十三以爲法如上乘內步步爲通分內子得八億
五千六百八十萬實如法得一度以八億五千六百八十萬爲一度法不
滿法求里步上求度故以此欲求里次求步約之合三百得一
以爲實上以三百乘里爲步而求里故以三百約餘分爲里之實以千四百
六十一分爲法得一里里步皆以周天之分爲毋求度當齊同法實等
故乘以散之度以定當次求故還爲法不滿法者三之如法得百
步上以三百約之爲里之實此當以三乘之爲步之實而言之者不欲轉法便以一位爲百

實故從一位命爲百也不滿法者又上十之如法得一步
又復上之者便以一位爲一實故從一實爲一不滿法者以法命之位盡
於一步故以法命餘爲殘分次放此次婁與角及東井皆如此也　臣鸞曰求牽牛
星去極法先列衡去極樞二十三萬八千里減極去樞心一萬一千五百里餘二十二萬六千
五百里以三百乘里得六千七百九十五萬步又以周天分一千四百六十一乘之得九百九
十二億七千四百九十五萬步爲實更副置內衡一度數一千九百五十四里二百四十七步
一千四百六十一分步之九百三十三亦以三百乘一千九百五十四里爲步內二百四十七
步得五十八萬六千四百四十七步又以周天分毋千四百六十一乘步內子九百三十三得
八億五千六百八十萬爲法以除實得一百一十五度不盡七億四千二百九十五萬去下法

不用更以三百約餘分七億四千二百九十五萬得二百四十七萬六千五百爲實更以周天分千四百六十一除之得一千六百九十五里不盡一百五以三百乘之得三萬一千五百復以前法除之得二十一步不盡八百一十九即牽牛去北極一百二十五度千六百九十五里二十一步千四百六十一分步之八百一十九

婁與角去北極九十一度六百一十里二百六十四步千四百六十一分步之千二百九十六婁春分日所在之宿也角秋分日所在之宿也爲中衡也

術曰置中衡去北極樞十七萬八千五百里以爲實不言加除者婁與角準此極在樞兩旁正與樞齊以婁角無差故便以去樞之數爲實如上乘里爲步步爲分得七百八十二億三千六百五十五萬以內衡一度數爲法實如法得一度不滿法者求里步不滿法者以法命之臣鸞曰求婁與角去極法列中衡去極樞十七萬八千五百里以三百乘之得五千三百五十五萬步又以周天分千四百六十一分乘之得七百八十二億三千六百五十五萬爲實以內衡一度數千九百五十四里二百四十七步千四百六十一分步之九百三十三亦以三百乘里內步二百四十七得五十八萬六千四百四十七步又以分母千四百六十一分乘之內子得八億五千六百八十萬爲法以除實得九十一度不盡二億六千七百七十五萬以三百約之得八十九萬二千五百下法不用以周天分千四百六十一除之得六百一十里不盡千二百九十以三百乘之得三十八萬七千如前法除之得二百六十四步不盡一千二百九十六即是婁與角去極九十一度六百一十里二百六十四步千四百六十一分步之千二百九十六

東井去北極六十六度千四百八十一里一百五十五步千四百六十一分步之千二百四十五東井夏至日所在之宿爲內衡

術曰置內衡去北極樞十一萬九千里加璿璣萬一千五百里北極游常近東井爲樞不及極萬一千五百里此求去極故加之得十三萬五百里以爲實如上乘里爲步步爲分得五百七十一億九千八百一十五萬分以內衡一度數爲法實如法得一度不滿法者求里步不滿法者以法命之臣鸞曰求東井去極法列內衡去極樞十一萬九千里加璿璣萬一千五百里得十三萬五百里以三百乘里爲步復以分母千四百六十一乘之得五百七十一億九千八百一十五萬爲實通分內衡一度數爲步步爲分得八億五千六百八十萬爲法以除實得六十六度不盡六億四千九百三十五萬以三百約之得二百一十六萬四千五百下法不用更以周天千四百六十一爲法除之得千四百八十一里不盡七百五十九以三百乘之得二十萬七千七百復以周天分除之得一百五十五步不盡一千二百四十五即是東井去北極六十六度千四百八十一里一百五十五步千四百六十一分步之一千二百四十五

凡八節二十四氣氣損益九寸九分六分分之

一冬至晷長一丈三尺五寸夏至晷長一尺六寸問次節損益寸數長短各幾何

冬至晷長丈三尺五寸

小寒丈二尺五寸小分五

大寒丈一尺五寸一分小分四

立春丈五寸二分小分三

雨水九尺五寸二分小分二

啓蟄八尺五寸四分小分一

春分七尺五寸五分

清明六尺五寸五分小分五

穀雨五尺五寸六分小分四

立夏四尺五寸七分小分三

小滿三尺五寸八分小分二

芒種二尺五寸九分小分一

夏至一尺六寸

小暑二尺五寸九分小分一

大暑三尺五寸八分小分二

立秋四尺五寸七分小分三

處暑五尺五寸六分小分四

白露六尺五寸五分小分五

秋分七尺五寸五分

寒露八尺五寸四分小分一

霜降九尺五寸三分小分二

立冬丈五寸二分小分三

小雪丈一尺五寸一分小分四

大雪丈二尺五寸小分五

凡爲八節二十四氣二至者寒暑之極二分者陰陽之和四立者生長收

藏之始是爲八節節三氣三而八之故爲二十四氣損益九寸九分六分分之一損者減也破一分爲六分然後減之益者加也以小分滿六得一從分冬至夏至爲損益之始冬至晷長極當反短故爲損之始夏至晷短極當反長故爲益之始此爽之新術

術曰置冬至晷以夏至晷減之餘爲實以十二爲法十二者半歲十二氣也爲法者一節益之法實如法得一寸不滿法者十之以法除之得一分求分故十之也不滿法者以法命之法與餘分皆半之也舊晷之術於理未當謂春秋分者陰陽晷等各七尺五寸五分故中衡去周七萬五千五百里按春分之影七尺五寸七百二十三分秋分之

影七尺四寸二百六十二分差一寸四百六十一分以此準之是爲不等冬至至小寒多半日之影夏至至小暑少半日之影芒種至夏至多二日之影大雪至冬至多三日之影又半歲一百八十二日八分日之五而此用四分日之二率故一日得七百三十分寸之四百七十六非也節候不正十五日有三十二分日之七以一日之節率十五日爲一節至令差錯不通尤甚易曰舊并無會時舍也言法三十日實當改而舍之於是爽更爲新術以一氣率之使言約法易上下相通周而復始除其紕繆　臣鸞曰求二十四氣損益之法先置冬至影長丈三尺五寸以夏至影一尺六寸減之餘一丈一尺九寸上十之爲實以半歲十二爲法除之得九寸不盡十一後上十之如法而一得九分不盡二與法十二皆半之得六分之一即是氣損益法先置冬至影長丈三尺五寸以氣損益九寸九分六分分之一其破一分以爲六分減其餘即是小

蔡玫

寒影長丈二尺五寸小分五餘悉依此法求益法置夏至影一尺六寸以九寸九分六分分之一增之小分滿六從大分一即是小暑二尺五寸九分小分一次氣故此　臣淳風等謹按此術本及趙君節注求二十四氣影例損益九寸九分六分分之一以爲定率檢勘術注有所未通又按宋書曆志所載何承天元嘉曆影冬至一丈三尺小寒一丈二尺四寸八分大寒一丈一尺三寸四分立春九尺九寸一分雨水八尺二寸八分啓蟄六尺七寸二分春分五尺三寸九分清明四尺二寸五分穀雨三尺二寸五分立夏二尺五寸小滿一尺九寸七分芒種一尺九寸九分夏至一尺五寸小暑一尺六寸九分大暑一尺九寸七分立秋二尺五寸處暑三尺三寸五分白露四尺二寸五分秋分五尺三寸九分寒露六尺七寸二分霜降八尺二寸八分立冬九尺九寸一分小雪一丈一尺三寸四分大雪一丈二尺四寸八分司馬續漢志所載四

分曆影亦與此相近至如祖沖之曆宋大明曆影與何承天雖有小差皆是量天實數雖按三曆足驗君卿所立率虛誕且周髀本文外衍下於天中六萬里而二十四氣率乃足平遷所以知者按望影之法日近影短日遠影長又以高下言之日高影短日卑影長夏至之日最近此又最高其影尺有五寸自此以後日行漸遠向南天體又漸向下以及冬至冬至之日最近南君於外衍日最近下故日影丈三尺此當每歲差降有別不可均爲一擬設其升降之理今此文自冬至畢芒種自夏至畢大雪均差每氣損九寸有奇是爲天體正平無高卑之異而日但南北均行又無升降之殊即無內衡高於外衡六萬里自相矛楯又按尚書考靈曜所陳格上格下里數及鄭注升降遠近雖有成規亦未璣理實欲求至當符依天體高下遠近脩規以定差數自霜降畢於立春升降差多南北差少自雨水畢於寒露南北差多升降差少依此推

蔡玫

步乃得其實既事涉渾儀與蓋天相反

月後天十三度十九分度之七

月後天者月東行也此見日月與天俱西南遊一日一夜天一周而月在昨宿之東故曰後天又曰章歲除章月加日周一日作率以一日所行爲一度周天之日爲天度術曰置章月二百三十五以章歲十九除之加日行一度得十三度十九分度之七此月一日行之數即後天之度及分　臣鸞曰月後天十三度十九分度之七法列章月二百三十五以章歲十九除之得十二度加日行一度得十三度餘十九分度之七即月後天之度分

小歲月不及故舍三百五十四度萬七千八百六十分度之六千六百一十二

小歲者十二月爲一歲一歲之

月十二月則有餘十三月復不足而言大小歲通閏月爲不及故舍亦猶後天也假令十一月朔旦冬至日月俱起牽牛之初而月十二與日會此數月發牽牛所行之度也

術曰置小歲三百五十四日九百四十分日之三百四十八小歲者除經歲十九分月之七以七乘周天分千四百六十一得萬二百二十七以減經歲之積分餘三十三萬三千一百八十八則小歲之積分也以九百四十分除之即得小歲之積日及分以月後天十三度十九分度之七乘之爲實通分內子爲二百五十四乘之者乘小歲積分也又以度分母乘日分母爲法實如法得積後天四千七百三十七度萬七千八百六十分度之六千六百一十二以月後天分乘小歲積分得八千四百六十萬九千四百三十二則積後天分也以度分母十九乘日分母九百四十得萬七千八百六十除之即得以周天三百六十五度萬七千八百六十分度之四千四百六十五除之此猶四分之一也約之即得當於齊同故細言之通分內子爲六百五十二萬三千三百六十五除積後天分得十二周天即去之其不足除者不足除者不及故舍之六百三十二萬九千五十二是也三百五十四度萬七千八百六十分度之六千六百一十二以萬七千八百六十除不及故舍之分得此分矣此月不及故舍之分度數佗皆放此次至經月皆如此　臣鸞曰求小歲月不及故舍法列經歲三百六十五

日九百四十分日之二百三十五通分內子得三十四萬三千三百三十五是爲經歲之積分以十九分月之七以七乘周天分一千四百六十一得萬二百二十七以減經歲積分不盡三十三萬三千一百八小歲積分也以九百四十除之得三百五十四日不盡三百四十八還通分內子復得本積分三十三萬三千一百八更置月後天十三度十九分度之七通分內子得二百五十四以乘本積分得積後天分八千四百六十萬九千四百三十二爲實更列月後天分母十九以乘日分母九百四十得萬七千八百六十爲法除之得積後天四千七百三十七度不盡六千六百一十二即是得四千七百三十七度萬七千八百六十分度之六千六百一十二還通分內子得本分八千四百六十萬九千四百三十二爲實更列周天三百六十五度萬七千八百六十分度之四千四百六十五即通分內子得六百五十二萬三千三百六十五以除實得十二下法不用餘分即不及故舍之分六百三十二萬九千五十二更以日月分母相乘得萬七千八百六十爲法除分不及故舍之分六百三十二萬九千五十二得三百五十四度不盡六千六百一十二即不及故舍三百五十四度萬七千八百六十分度之六千六百一十二

大歲月不及故舍十八度萬七千八百六十分度之萬一千六百二十八大歲者十三月爲一歲

術曰置大歲三百八十三日九百四十分日之八百四十七大歲者加經歲十九分月之十二以十二乘之周天分千四百六十一得萬七千五百三十二以加經歲積分得三十六萬八百六十七則大歲之積分也以九百

四十除之即得以月後天十三度十九分度之七乘之爲實又以度分母乘日分母爲法實如法得積後天五千一百三十二度萬七千八百六十分度之二千六百九十八此月後天分乘大歲積分得九千一百六十六萬二百一十八則積後天分也以周天除之除積後天分得十四周天即去之其不足除者不足除者三十三萬三千一百八是也此月不及故舍之分度數臣鸞曰求大歲月不及故舍法列經歲三百六十五日九百四十分日之二百三十五通分內子得經積分三十四萬三千三百三十五更以十九分月之十二乘周天分千四百六十一得一萬七千五百三十二以經歲積分加大歲積分得三十六萬八百六十七爲實以九百四十除之得大歲三百八十三日九百四十分日之八百四十七還通分內子本分三十六萬八百六十七更列月後天十三度十九分度之七通分內子得二百五十四以乘本分得積後天分九千一百六十六萬二百一十八爲實以萬七千八百六十爲法除之得積後天度五千一百三十二不盡二千六百九十八即命分還通分內子得本積後天分九千一百六十六萬二百一十八爲實以周天分六百五十二萬三千三百六十五爲法除實得十四周天之數餘以日月分母萬七千八百六十除之得大歲不及故舍十八度不盡萬一千六百二十八即以命分也經歲月不及故舍百三十四度萬七千八百六十分度之萬一百五經常也即十二月十九分月之七也

術曰置經歲三百六十五日九百四十分日之二百三十五經歲者通十二月十九分月之七爲二百三十五乘周天千四百六十一得三十四萬三千三百三十五則經歲之積分又以周天分母四乘二百三十五得九百四十爲法除之即得以月後天十三度十九分度之七乘之爲實又以度分母乘日分母爲法實如法得積後天四千八百八十二度萬七千八百六十分度之萬四千五百七十以月後天分乘經歲積分得八千七百二十萬七千九十則積後天之分以周天除之除積後天分得十三周天即去之其不足除者不足除者二百四十萬三千三百四十五是也此月不及故舍之分度數臣鸞曰求經歲月不及故舍十二月十九分月之七通分內子得二百三十五以乘周天分千四百六十一得三十四萬三千三百三十五即經歲分也以日分母四乘二百三十五得九百四十爲法以除得經歲三百六十五日不盡二百三十五即命分還通分內子即復本歲分三十四萬三千三百三十五更列通月後天度分二百五十四以乘經歲分得積後天八千七百二十萬七千九十爲實更列萬七千八百六十除實得積後天度四千八百八十二不盡萬四千五百七十即命分還通分內子復本積後天分爲實以周天分六百五十二萬三千三百六十五除實得十三周天即去之餘分二百四十萬三千三百四十五以萬七千八百六十除之得不及故舍百三十四度不盡萬一百五即以命分也小月不及故舍二十二度萬七千八百六十分

度之七千七百五十五小月者二十九日為一月一月之二十九日則有餘三十日復不足而言大小者通其餘分

術曰置小月二十九日小月者減經月之積分四百九十九餘二萬七千二百六十則小月之積也以九百四十除之即得以月後天十三度十九分度之七乘之為實又以度分母乘日分母為法實如法得積後天三百八十七度萬七千八百六十分度之萬二千二百二十以月後天乘小月積分得六百九十二萬四千四十則積後天之分也以周天分除之除積後天分得一周天即去之其不足除者不足除者四十萬六百七十五此月不及故舍之分度數臣鸞曰求小月不及故舍法置二十九日以九百四十乘之得二萬七千二百六十則小月之分也更列月後天十三度十九分度之七通分內子得二百五十四以乘小月分得六百九十二萬四千四十為實以萬七千八百六十為法除實得三百八十七度不盡萬二千二百二十以命分還通分內子得本實更列周天分六百五十二萬三千三百六十五除本實得一周天不盡四十萬六百七十五即不及故舍之分又以萬七千八百六十除不及故舍之分得二十二度不盡七千七百五十五即以命分

大月不及故舍三十五度萬七千八百六十分度之萬四千三百三十五大月者三十日為一月

術曰置大月三十日大月加經積分四百四十一得二萬八千二百則大月之積分也以九百四十除之即得以月後天十三度十九分度之七乘之為實又以度分母乘日分母為法實如法得積後天四百一度萬七千八百六十分度之九百四十以月後天分乘大月積分七百一十六萬二千八百則積後天之分也以周天除之除積後天分得一周天即去之其不足除者不足除者六十三萬九千四百三十五是也此月不及故舍之分度數臣鸞曰求大月不及故舍法置三十日以九百四十乘之得二萬八千二百以後天分二百五十四乘之得七百一十六萬二千八百為實以萬七千八百六十為法以除實得四百一度不盡九百四十即以命分還通分內子復本實更以周天六百五十二萬三千三百六十五為法除本實得一周餘不足除積六十三萬九千四百三十五分以萬七千八百六十為法以除實得大月不及故舍三十五度不盡萬四千三百三十五即命分也

經月不及故舍二十九度萬七千八百六十分度之九千四百八十一常月者一月日月與日合數

術曰置經月二十九日九百四十分日之四百九十九經月者以十九乘周天分一千四百六十一得二萬七千七百五十九則經月之積以九百四十除之即得以月後天十三度十九分度之七乘之為實又以度分母乘日分母為法實如法得積後天三百九十四度萬七千八百六十

分度之萬三千九百四十六以月後天分乘經月積分得七百五
萬七百八十六則積後天之分以周天除之除積後天分得一周天即去之其
不足除者不足除者五十二萬七千四百二十一是也此月不及故
舍之分度數臣鸞曰求經月不及故舍法以十九乘周天分千四百六十一得二
萬七千七百五十九即經月積分以九百四十除積分得經月二十九日九百四十分日之四
百九十九還通分內子得本經月積分以後天分乘本積分得七百五萬七百八十六即後天
之積分更以萬七千八百六十除之得積後天三百九十四度不盡萬三千九百四十六即以
命分還通分內子得本後天積分為實以周天六百五十二萬三千三百六十五除之得一周
餘分五十二萬七千四百二十一即不及故舍之分以一萬七千八百六十除之得經月不及
故舍二十九度不盡九千四百八十一即以命分
冬至晝極短日出辰而入申如上日之分入何宿法分十二辰於
北所圓之周合相去三十度十六分度之七子午居南北卯酉居東西日出入時立一游儀以
望中央表之晷游儀之下即日出入陽照三不覆九陽日也覆猶徧也照三者
南三辰巳午未東西相當正南方日出入相當不覆三辰為正南方夏
至晝極長日出寅而入戌陽照九不覆三不覆三者
北方三辰亥子丑冬至日出入之三辰屬晝晝夜互見是出入三辰分為晝夜各半明矣考靈
曜曰分周天為三十六頭頭有十度九十六分之十四長日分於寅行二十四頭入於戌行十
二頭短日分於辰行十二頭入於申行二十四頭此之謂也東西相當正北

方出入相當不覆三辰為北方日出左而入右南北行聖人南面
而治天下故以東為左西為右日冬至從南而北夏至從北而南故曰南北行故冬至
從坎陽在子日出巽而入坤見日光少故曰寒
冬至十一月斗建子位在北方故曰從坎坎亦北也陽氣所始起故曰在子巽東南坤西南日
見少晷陽照三不覆九也夏至從離陰在午日出艮而入乾
見日光多故曰暑夏至五月斗建午位南方故曰離離亦南也陰氣始生故
日在午艮東北乾西北日見多晷陽照九不覆三也日月失度而寒暑相
蒙考靈曜曰在璿璣玉衡以齊七政璿璣未中而星中是急急則日過其度不及其宿璿璣
玉衡中而星未中是舒舒日不及其度夜月過其宿璿璣中而星中是周周則風雨時風雨時
則草木蕃庶而百穀熟故書曰急常寒若舒常燠若急舒不調是失度寒暑不時即相蕩往
者詘來者信也故屈信相感從夏至南往日益短故曰詘從冬至
北來日益長故曰信言來往相推詘信相感更衰代盛此天之常道易曰日往則月來月往則
日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也
屈信相感而利生焉此之謂也故冬至之後日右行夏至之後
日左行左者往右者來冬至日出從辰來北故曰右行夏至日出從寅
往南故曰左也故月與日合為一月從合至合則為一月日復日
為一日從旦至旦則為一日也日復星為一歲冬至日出在牽牛從牽牛
周牽牛則為一歲也外衡冬至日在牽牛內衡夏至日在東井六氣

復返皆謂中氣中氣月中也言日月往來中氣各六傳曰先王之正時履端於
始舉正於中歸餘於終謂中氣也陰陽之數日月之法謂陰陽之度數
日月之法十九歲為一章章條也言閏餘盡為法章條也乾象曰辰為歲中以
御朔之月而納焉朔為章中除朔為章月月差為閏臣鸞曰歲中除章中為章歲求餘法置
中氣相去三十日十六分日之七通分內子得四百八十七又置從朔至朔一月之日二十九
九百四十分日之四百九十九通之得二萬七千七百五十九二者法異當同之者以中氣分
母十六乘朔分得四十四萬四千一百四十四變為中氣積分也以朔分母九百四十乘中氣
分得四十五萬七千七百八十為朔日積分以少減多求等數平之得一千九百四十八為法
除中氣積得二百二十八即章中也更以一千九百四十八除朔積分得二百三十五即章月

也章月與章中差七即一章之閏更置二百二十八以歲中十二除之得十九為章歲也更置
章月二百三十五以章歲十九除之得十二月十九分月之七即一年之月也四章為
一蔀七十六歲蔀之言齊同日月之分為一蔀也一歲之月十二月十九分月
之七通分內子得二百三十五一歲之日三百六十五日四分日之一通之得一千四百六十
一分母不同則子不齊當互乘之以齊同之者以日分母四乘月分得九百四十即一蔀之月
以月分母十九乘日分得二萬七千七百五十九即一蔀之日以日月分母相乘得七十六得
一蔀之歲以一歲之月除蔀月得七十六歲又以一歲之日除蔀日亦得七十六歲矣月餘既
終日分又盡衆殘齊合羣數畢滿故謂之蔀臣鸞曰求蔀法列章歲十九以四乘之得一蔀
七十六歲求一蔀之月法十二月十九分月之七通分內子得二百三十五即月分也更列一

歲三百六十五日四分日之一通分內子得一千四百六十一以日分母四乘月分得九百四
十即一蔀之月以月分母十九乘日分得二萬七千七百五十九即一蔀之日以日分母四乘
月分母十九得七十六即一蔀之歲更以月分母十九乘蔀月九百四十得一萬七千八百六十
為實以十二月十九分月之七通分內子得二百三十五為法以除實得七十六亦一蔀之歲
也更列一蔀之日二萬七千七百五十九以分母四乘之得十一萬一千三十六為實以周天
分千四百六十一除之得一蔀之歲七十六也二十蔀為一遂遂千五
百二十歲遂者竟也言五行之德一終竟極日月辰終也乾鑿度曰至德之數先立
金木水火土五凡各三百四歲五德運行日月開闢甲子為蔀首七十六歲次得癸卯蔀七十
六歲次壬午蔀七十六歲次辛酉蔀七十六歲凡三百四歲木德也主春生次庚子蔀七十六

歲次己卯蔀七十六歲次戊午蔀七十六歲次丁酉蔀七十六歲凡三百四歲金德也主秋成
次丙子蔀七十六歲次乙卯蔀七十六歲次甲午蔀七十六歲次癸酉蔀七十六歲凡三百四
歲火德也主夏長次壬子蔀七十六歲次辛卯蔀七十六歲次庚午蔀七十六歲次己酉蔀七
十六歲凡三百四歲水德也主冬藏次戊子蔀七十六歲次丁卯蔀七十六歲次丙午蔀七十
六歲次乙酉蔀七十六歲凡三百四歲土德也主致養其得四正子午卯酉而朝四時焉凡一
千五百二十歲終一紀復甲子故謂之遂也求五德日名之法置一蔀者七十六歲德四蔀因
而四之為三百四歲以一歲三百六十五日四分日之一乘之為十一萬一千三十六以六十
去之餘三十六命甲子算外得庚子金德也求次德加三十六去之命如前則次德日也求算
蔀名置一章歲數以周天分乘之得二萬七千七百五十九以六十去之餘三十九命以甲子

筭外得癸卯蔀求蔀加三十九滿六十去之命如前得次蔀 臣鸞曰求遂法列一蔀七十六歲以二十乘之得千五百二十歲即以遂之歲求五德金木水火土法列一蔀七十六歲以周天分千四百六十一乘之得十一萬一千三十六即以六十除之餘三十六命從甲子筭外得庚子凡三百四歲主秋成金德也加三十六得七十二以六十除之餘十二命從甲子筭外得丙子凡三百四歲火德主夏長火故此求一蔀名列一章十九歲以周天分一千四百六十一歲乘之得二萬七千七百五十九以六十去之餘三十九命從甲子筭外得癸卯蔀七十六歲復加三十九亦六十去之餘十八命亦起甲子筭外次得壬午蔀次放此至甲子即止之 三遂為一首首四千五百六十歲首始也言日月五星終而復始也考靈曜曰日月首甲子冬至日月五星俱起牽牛初日月若合璧五星如聯珠青龍甲寅攝提格

並四千五百六十歲積及初故謂首也 臣鸞曰求一首法列遂一千五百二十歲三之得一首四千五百六十歲也 七首為一極極三萬一千九百二十歲生數皆終萬物復始極終言日月星辰弦望晦朔寒暑推移萬物生育皆復始故謂之極 臣鸞曰求極先列一首四千五百六十以七乘之得一極三萬一千九百二十 天以更元作紀曆元始作為七紀法天數更始復為法述之 何以知天三百六十五度四分度之一而日行一度而月後天十三度十九分度之七二十九日九百四十分日之四百九十九為一月十二月十九分月之七為一歲非周髀本文蓋人問師之辭其欲知度之

所分法術之所生 周天除之除積後天分得一周即棄之 其不足除者如合朔古者包犧神農制作為曆度元之始見三光未如其則三光日月星則法也 日月列星未有分度則星之初列謂二十八宿也 日主晝月主夜晝夜為一日 日月俱起建星建六星在斗上也日月起建星謂十一月朔旦冬至日也為曆術者度起牽牛前五度則建星其近也 月度疾日度遲度日月所行之度也 日月相逐於二十九日三十日間言日月二十九日則未合三十日復相過 而日行天二十九度餘如九百四十分日之四百九十九 未有定分未知餘分定幾何也 於是三百六十五日南

極影長明日反短以歲終日影反長故知之三百六十五日者三三百六十六日者一影四歲而後知 蓋一日是為四歲共一日故歲得四分日之一 故知一歲三百六十五日四分日之一歲終也月積後天十三周又與百三十四度餘經歲月後天之周及度求之餘者未知也言欲求之也 無處後天十三度十九分度之七未有定無處者粗計也 此已得月後天數而言未有者求之意未有見故也 於是日行天七十六周月行天千一十六周及合於建星月行一月則行過一周而與日合七十六歲九百四十周天所過復九百四十日七十六周并之得一千一十六為

一月後天率分盡度終復還及初也　臣鸞曰求於是日行天七十六周月行天千一十六周及合於建星法以九百四十周井七十六周得一千一十六周則日月氣朔合於建星　置月行後天之數以日後天之數除之得一十三度十九分度之七則月一日行天之度以日度行率除月行率一日得月度幾何置月行率一千一十六爲實日行率七十六爲法實如法而一法及餘分皆四約之與乾象同歸而殊塗義等而法異也　復置七十六歲之積月置章歲之月二百三十五以四之得九百四十則蔀之積月也象以七十六歲除之得十二月十九分月之七則一歲之月亦以四約法除分蔀歲除月與章歲除章月同也　置周天度數以十二

月十九分月之七除之得二十九日九百四十分日之四百九十九則一月日之數通周天四分日之一爲千四百六十一通十二月十九分月之七爲二百三十五分母不同則子不齊當互乘以同齊之以十九乘千四百六十一爲二萬七千七百五十九以四乘二百三十五爲九百四十及以除之則月與日合之數　臣鸞曰求日行一度法還置前一千一十六以七十六歲除之得十三度不盡二十八以求等平於四以四約餘得七約分得十九是十三度十九分度之七更列一章歲積月二百三十五以周天分母四乘之即一蔀月九百四十亦以七十六歲除之得一歲之十二月十九分月之七餘分及法並以四約更通周天得千四百六十一復通十二月十九分月之七得二百三十五分母不同互乘之以月分母十九乘日分得二萬七千七百五十九以日分母四乘月分得九百四十除之二萬七千七百五十九得二十九日九百四十分日之四百九十九而月與日合此其數也

周髀算經卷下

秘書省

周髀算經一部上下共二冊

元豐七年九月　日校定承奉郎秘書省校書郎臣葉　祖洽上進

校定承議郎行秘書省校書郎臣王　仲脩

校定朝奉郎行秘書省校書郎臣錢　長卿

奉議郎守秘書丞臣韓　宗古

朝請郎試秘書少監臣孫　覺

降授朝散郎試秘書監臣趙　彥若

周髀算經音義

假承務郎秘書省鉤考算經文字臣李籍撰

周髀序

周髀 步米切周髀算經者以九數句股重差算日月周天行度遠近之數皆得於股表即推步蓋天之法也髀者股也以表為股周天曆度本包犧氏立法其傳自周公受之於大夫商高周人志之故曰周髀

趙君卿撰 雛兗切述也君卿趙爽字也不詳何代人

恢 苦回切大也

廓落 上枯郭切下歷各切

晷儀 居洧切日影也

度量 上達各切下錄章切

探賾 上吐南切下士革切賾者含畜含畜者探之可及故易曰探賾

索隱 上色白切下於謹切隱者隱匿隱匿者索之可得故曰索隱

詭異 上古委切莊子曰恢詭譎怪

渾天 胡昆切渾天者言天地之體狀如鳥卵天包地外猶殼之裹黃也周旋無端其形渾渾然故曰渾天史官候臺所用銅儀則其法也立八尺圓體具天地之形以正黃道占察發斂以行日月以步五緯精微深妙百代不易之道也官有其器而無本書

蓋天 居大切蓋天之說即周髀是也其言天以蓋笠地似覆槃天地各中高外下北極之下為天地之中其地最高而滂沲四隤三光隱映以為晝夜天中高於外衡冬至日之所在六萬里北極下地高於外衡下地亦六萬里外衡高於北極下地二萬里天地隆高相從日去地常八萬里日麗天而平轉分冬夏之間日前行道為七衡六間每衡周徑里數各依算術用句股重差推晷影極游以為遠近之數皆得於表股者也故曰周髀又周髀家云天圓如張蓋地方如棊局天旁轉如推磨而左行日月右行隨天左轉故日月實東行而天牽之以西沒譬之於蟻行磨石之

上磨左旋而蟻右去磨疾而蟻遲故不得不隨磨以左迴焉天形南高而北下日出高故見日
入下故不見天之居如倚蓋故極在人北是其證也極在天之中而今在人北所以知天之形
如倚蓋也靈憲許建切靈憲張衡所述其說主於渾天重仞上直龍切下音刃八
尺曰切臾於到切迥戶頂切遠也

周髀卷上

甄鸞上之人切下歷官切甄鸞漢司隸校尉重述上直龍切下時律切趙爽既加
注釋甄鸞又從而發明故曰重述筭數色具切數算也包犧上蒲交切下虛宜切
曆度徒固切而度大各切量也
句股圓方圖句古侯切股公土切圓徑一而周三方徑一而匝四申圓之周而爲

句股方之匝而爲股共結一角而邪適五乃圓方邪徑相通之率也句股圓方圖蓋以此設學
者觀之思過半矣弦胡田切共結一角也率朔律切數相與也又音律奇耦上居
宜切下烏口切矩俱雨切折之列切更相上古衡切下息羊切共盤上渠
用切下蒲官切昏墊都念切下也書曰下民昏墊并畢政切句股之差
楚佳切不齊也句股之差其數差一謂句三股四也量均力仗切爲表莫候切長
也偃矩覆矩偃於蹇切仰也覆數目切俯也拒表也仰表所以望高俯表所以測
深方屬地珠玉切下同滂沲上普郎切下唐何切四隤徒回切列
星之宿息救切二十八宿之度也禮記月令宿離不忒是也不省息井切省竊也
不省不言不竊也猜言不敏也累息魯水切累重也直龍切才單德寒

切單盡也馳思相吏切慮也捕影蒲故切索也掩日衣檢切覆也表
間古閑切隆殺所介切薄地補谷切迫也姜岌逆及切晉人也交
阯音止郡名也去洛陽一萬一千里路迂雲俱切遠也潁川庾頃切郡名
祖冲之持中切冲之宋南徐州從事史撰綴術五卷秣陵音末郡名信都
芳並如字善筭者也撰器準三卷虞𠠎古郭切梁太史令
日高圖並如字日高圖者求日高之法也求日高法先置表八尺爲八萬里爲表以兩
表相去二千里爲廣廣表相乘得一億六千萬里爲黃甲之實以影差二寸爲二千里爲法除
之得黃乙之表八萬里即上與日齊此設圖之意也黃甲古押切王城去天名曰甲黃
乙億栗切日底地上至日名曰乙青丙補永切上天名青丙青戊莫候切下地名

何金刀

青戊極者竭憶切諸言極者斥天之中極去周十萬三千里奄觀衣檢切覆也
九隩於到切可居也土靡地毋被切無也斥昌石切指也緣宿息救
切二十八宿也蝕乘力切日月虧曰蝕稍小侵虧如蟲食草木之葉也適至施直切恰
也發斂力冉切發往斂遲也璿璣上音旋下音機逮音逮及也有奇居宜
切數之餘也易曰歸奇於扐冬至夏至觀律之數聽鍾之音
律呂戌切聽佗定切此謂冬夏二至合八能之上以觀律之數而聽鍾音之清濁也晉律曆志
曰陰陽和則景至律氣應則灰除是故天子常以冬夏至日御前殿合八能之士陳八音聽樂
均度晷影候鍾律權土炭效陰陽冬至陽氣應則灰除是故樂均清影長極黃鍾通土炭輕而
衡仰夏至陰氣應則樂均濁景短極蕤賓通土炭重而衡低進退於先後五日之中八能各以

候狀閱太史令封上效則和否則占 **七衡圖** 何庚切七衡者七規也謂規爲衡者取其衡運則生規規者正圓之謂也內一衡徑二十三萬八千里次二衡徑二十七萬七千六百六十六里二百步次三衡徑三十一萬七千三百三十三里一百步次四衡徑三十五萬七千里次五衡徑三十九萬六千六百六十六里二百步次六衡徑四十三萬六千三百三十三里一百步次七衡徑四十七萬六千里即其徑而三之則各得其周也凡日月運行之圓周七衡周而六間一衡之間萬九千八百三十三里一百步以六衡乘之即夏至冬至相去十一萬九千里也 **青圖畫者** 胡卦切界也俗作畫 **合際** 上胡閤切下子例切 **常處** 昌據切所也 **躔** 呈延切次也 **卯** **酉** 上莫飽切下以久切皆辰名也卯正東也酉正西也 **牽牛** 上輕煙切下如字牽牛北

方宿也冬至日在牽牛 **婁** 盧侯切婁西方宿也春分日在婁 **東井** 子郢切南方宿也夏至日在東井 **角** 訖岳切東方宿也秋分日在角 **用繒** 慈陵切帛也 **呂氏** 兩舉切呂氏者呂氏春秋也呂不韋爲秦相國集當世儒士使著所聞爲十二紀八覽六論合十餘萬言備古今之事名爲呂氏春秋 **四海** 呼改切呂氏春秋曰凡四海之內東西二萬八千里南北二萬六千里爾雅云九夷八狄七戎六蠻謂之四海言東西南北之數者將明車轍馬跡之所至河圖括地象亦云里數而有君長之州九阻中國之文德及而不治又云八極之廣東西二億二萬三千五百里南北二億三萬三千五百里淮南子地形訓云禹使大章步自東極至于西極豎亥步自北極至于南極而數皆然 **河圖括地象** 括音聒河圖括地象緯書名也 **淮南子** 並如字漢淮南王安所著之書也 **大章** 音泰人名

六間 古閑切兩衡相去之間也 **粗通** 徂五切略也 **放此** 甫兩切效也下同

周髀卷下

四和 户戈切調也四和者謂之極子午卯酉得東西南北之中天地之所合四時之所交風雨之所會陰陽之所和然則百物阜安草木蕃庶故曰四和 **阜安** 房缶切盛也 **蕃** **庶** 符袁切茂也 **易處** 夷益切交也 **蓋笠** 上居大切下音立 **覆槃** 上方六切下蒲官切 **離地** 力智切去也 **障蔽** 上之亮切隔也下必袂切奄也 **日兆** **月** 直紹切日者陽之精譬猶火光月者陰之精譬猶水光月含影故月光生於日之所照魄生於日之所蔽當日則光盈就日則明盡月稟日光而成形兆故云日兆月也 **魄** 匹陌切月之明消也康誥曰惟三月哉生魄孔安國曰三月始生魄月十六日明消而魄生揚子曰既望

則終魄於東亦此意也 **行列** 胡剛切 **極樞** 春朱切爾雅曰樞謂之根郭璞云門户扉樞也此言極樞者取其居中而臨制四方也 **繩繫** 古詣切結也 **表顛** 多年切頂也 **中折** 之列切屈也 **漏** 盧侯切漏以銅受水刻節晝夜百刻晷漏中星略例日日行有南北晷漏有長短然二十四氣晷差遲疾不同句股使然也直規中則差遲與句股數齊則差慈隨辰極高下所遇不同如黃道刻漏此乃數之淺者近代且猶未曉今推黃道去極與晷影漏刻昏距中星四衡返覆相求消息同率旋相爲中以合九服之變 **揆度** 上巨癸切下大各切 **繹** 施隻切散也 **朝生** 陟遙切旦也 **暮獲** 胡麥切 **穫** 胡郭切收也 **葶藶** 上音亭下音歷 **薺麥** 在禮切 **正句** 上音攻下音鉤 **無令** 韓星切使也 **纖微** 思廉切細也 **督** 音篤察也 **分度** 徒固切數也 **經緯**

上堅丁切下于貴切南北爲經東西爲緯圓定正音政則復扶富切又也須
女如字星名也游儀如字游儀所以望星也正觀中李淳風造四游儀元樞爲軸以
連結玉衡游筩而貫約規矩又元樞北立北辰南距地玉軸旁轉於內玉衡在元樞之間而南北
游仰以觀天之辰宿下以識器之晷度一開元九年率府兵曹參軍梁令瓚以木爲游儀一行是
之乃奏黃道游儀古有其術而無其器昔人借思末能得今令瓚所爲日道月交皆自然契合
於推步尤要請更鑄以銅十年儀成車輻方六切所以實輪而湊轂者也以圓度爲輻
爲轂古祿切所以受輻也以經緯之交爲轂二十八宿息救切副置
敷救切別也別置筭也下同地協檄頰切合也相應於證切參正上倉
含切下音政八節並如字二至者寒暑之極二分者陰陽之和四立者生長收藏之始
是爲八節二十四氣並如字一歲凡八節節三氣三而八之故爲二十四氣氣
損益九寸九分六分分之一並如字損者減也破一分爲六分然
後減之益者加也加以小分滿六分得一從加分冬至並如字至極也冬至夏至寒暑之極
啓蟄直立切藏也易曰龍蛇之蟄以存身也左氏傳曰啓蟄而郊春分府文切分
之言中也春分爲陽之中秋分爲陰之中芒種上莫郎切下之用切處暑昌據切所
也時舍音捨用也不虛誕音但謾也一概古代切矛楯上莫浮切
下食閏切矛所以句楯所以蔽器不同不相爲用凡言矛楯者況其所趣異也後天並如
字月後天者月東行者也此見日月與天俱西南游一日一夜天一周而月在昨夜之東故曰
月後天小歲並如字小歲者十二月爲一歲故舍式夜切舍謂二十八宿之舍也

積後天資昔切以月後天分看小歲積分則積後天分也大歲徒蓋切大歲者
十三月爲一歲經歲堅丁切經常也經歲者通十二月十九分之七小月並如字小
月者二十九日爲一月大月徒蓋切大月者三十日爲一月經月堅丁切經月者
以十九乘周天分則經月之積合朔上曷閤切下色角切覆九敷救切蓋也下同
當音璫正南方音政三十六頭並如字考靈曜曰分周天爲三十六頭頭
有十度九十六分之十四長日分於寅行二十四頭入於戌行十二頭短日分於辰行十二頭
入於申行二十四頭此之謂也坎苦感切正北方之卦也巽蘇困切東南隅之卦也
坤苦昆切西南隅之卦也離呂支切正南方之卦也艮古恨切東北隅之卦也
乾渠焉切西北隅之卦也章止良切章條也十九歲爲一章言餘閏盡爲曆法章條也
蔀蒲口切蔀之言齊同日月之分也而又衆殘齊合擧數畢滿故謂之蔀四章爲一蔀凡七
十六歲也遂徐醉切遂者終也言五行之德一終盡極日月辰終也二十蔀爲一遂凡千五
百二十歲首始九切首始也言日月五星終而復始也三遂爲一首凡四千五百六十歲也
極如字極終也言日月星辰弦望晦朔寒暑推移萬物生育終而復始故謂之極七首爲一
極凡三萬一千九百二十歲也乾鑿度徒固切乾鑿度易緯書也

周髀筭經音義

周髀筭經二卷古蓋天之學也以句股之法度天地之高厚推日月之運行而得其度數其書出於商周之間自周公受之於商高周人志之謂之周髀其所從來遠矣隋書經籍志有周髀一卷趙嬰注周髀一卷甄鸞重述而唐之藝文志天文類有趙嬰注周髀一卷甄鸞注周髀一卷其曆筭類仍有李淳風注周髀筭經二卷本此一書耳至於　本朝崇文總目與夫中興館閣書目皆有周髀筭經二卷云趙君卿注甄鸞重述李淳風等注釋趙君卿名爽君卿其字也如是則在唐以前則有趙嬰之注而　本朝以來則是趙爽之本所記不同意者趙嬰趙爽止是一人豈其字文相類轉寫之誤耶然亦當以隋唐之書爲正可也又崇文總目及李籍周髀音義皆云趙君卿不詳何代人今以序文考之有曰渾天有靈憲之文蓋天有周髀之法靈憲乃張衡之所作實後漢安順之世而甄鸞之重述者乃是解釋君卿之所注出於宇文周之時以此推之則君卿者其亦魏晉之間人乎若夫乘句股朱黃之實立倍差減并之術以盡開方之妙百世之下莫之可易則君卿者誠筭學之宗師也嘉定六年癸酉十一月一日丁卯冬至承議郎權知汀州軍州兼管內勸農事主管坑冶括蒼鮑澣之仲祺謹書

紹聖新儀象法要三卷

（宋）蘇頌撰

清鈔本

新儀象法要三卷（內府藏本）

宋蘇頌撰。頌字子容，南安人，徙居丹徒。慶歷二年進士，官至右僕射兼中書門下侍郎，累爵趙郡公。事蹟具宋史本傳。是書爲重修渾儀而作，事在元祐間。而尤袤遂初堂書目稱爲紹聖儀象法要。宋藝文志有儀象法要一卷，亦註云紹聖中編。蓋其書成於紹聖初也。案本傳稱時別製渾儀，命頌提舉。頌既邃於律算，以吏部令史韓公廉有巧思，奏用之。授以古法，爲臺三層，上設渾儀，中設渾象，下設司辰，貫以一機，激水轉輪，不假人力。時至刻臨，則司辰出告，星辰躔度所次，占候測驗，不差晷刻。晝夜晦明，皆可推見，前此未有也。葉夢得石林燕語亦謂頌所修制之精，遠出前古。其學略授冬官正袁惟幾，今其法蘇氏子孫亦不傳云云。案書中有官局生袁惟幾之名，與燕語所記相合，其說可信。知宋時固甚重之矣。書首列進狀一首。上卷自渾儀至水趺，共十七圖。中卷自渾象至冬至曉中星圖，共十八圖。下卷自儀象臺至渾儀圭表，共二十五圖。圖後各有說，蓋當時奉勅撰進者。其列璣衡制度，候視法式，甚爲詳悉。南宋以後，流傳甚稀。此本爲明錢曾所藏，後有乾道壬辰九月九日吳興施元之刻本於三衢坐嘯齋字兩行。蓋從宋槧影摹者。元之字德初，官至司諫，嘗註蘇詩行世。此書卷末天運輪等四圖及各條所附一本云云，皆元之據別本補入，校核殊精。而曾所鈔尤極工緻。其撰讀書敏求記，載入是書，自稱圖樣界畫，不爽毫髮，凡數月而後成，楮墨精妙絕倫，不數宋本，良非誇語也。我

朝儀器精密，度越千古，頌所創造，宜無足輕重，而一時講求制作之意，頗有足備參考者。且流傳祕冊，閱數百年而摹繪如新，是固宜爲寶貴矣。

御製題影宋鈔新儀象法要

梁代渾儀已制之失傳蘇頌乃重為有註有繪述詳驗具說與圖

期後貴亦日用心究鉤股即看影無太寬豐

太成圜象精備泰

皇祖鴻貽萬世視

乾隆乙未孟春上澣

紹聖新儀象法要卷上

渾儀　　六合儀　　三辰儀
四游儀　　天經雙環　　陰緯單環
天常單環　　三辰儀雙環　　赤道單環
黃道雙環　　四象單環　　天運單環
四游儀雙環　　望筒直距　　龍柱
鼇雲　　水趺
進儀象狀

臣竊准元祐元年冬十一月詔旨定奪新舊渾儀尋集日官看詳前後論列于諸文字赴翰林天文院太史局兩處新舊渾儀係至道皇祐中置造並校行用舊渾儀係熙寧中所造璣器儀銅木趺依舊難以行使奉聖旨下秘書省依所定施行臣竊以儀象之法度數備存而日官所以互有論訴者蓋以器未合古名亦不正至于測候須人運動人手有高下故躔度亦隨而移轉是致兩說各指得失終無定論蓋古人測候天數其法有二一曰渾天儀規天矩地機隱於內上布經躔以日星行度察寒暑進退如張衡渾天開元水運銅渾是也二曰銅候儀今新舊渾儀翰林天文院與太史局所用者是也又案吳中常侍王蕃云渾天儀者羲和

之舊器積代相傳謂之璣衡其為用也以察三光以分宿度者也
又有渾天象者以著天體以布星辰二者以考於天蓋密矣詳此
則渾天儀銅渾儀之外又有渾天象凡三器也渾天象歷代罕傳
其制惟隋書志稱梁代秘書有之云宋元嘉中所造者由是而言
古人候天具此二器乃能盡妙今惟一法誠恐未得親密然則張
衡之制史失其傳開元舊書唐世已亡國朝太平興國初巴蜀人
張思訓首創其式以獻太宗皇帝召工造於禁中踰年而成詔置
文明殿今文德殿是也東鼓樓下題曰太平渾儀自思訓死機繩斷壞無
復知其法制者臣昨訪聞得吏部守當官韓公廉通九章算術常
以鉤股法推考天度臣切思古人言天有周髀之術其說曰髀股
也股者表也日行周徑里數各依其術用句股重差推晷影極游
以為遠近之數皆得來股周人受之故曰周髀若通此術則天數
從可知也因說與張衡一行梁令瓚張思訓法式大綱問其可以
尋究依仿製造否其人稱若據算術案器象亦可成就既而撰到
九章鉤股測驗渾天書一卷并造到木樣機輪一坐臣觀其器
雖不盡如古人之說然激水運輪亦有巧思若令造作必有可取
遂具奏陳乞先創木樣進呈差官試驗如候天有準即別造銅器
奉二年八月十六日詔如臣所請置局差官及專作材料等遂奏
差鄭州原武縣主簿充壽州州學教授王沇之充專監造作兼管
勾收支官物太史局夏官正周日嚴秋官正于太古冬官正張仲
宣等與韓公廉同充製度官局生袁惟幾苗景張端節級劉仲景
學生侯永和于湯臣測驗晷景刻漏等都作人員尹清部轄指畫
工作至三年五月先造成小樣有旨赴都堂呈驗自後造大木樣
至十二月工畢又奏乞差承受內臣一員赴局預先指說因依關
內中進呈日　闕　宣問十月入內內侍省差到供奉官黃卿
從至闕十二月一日具劄子取索安立去處得旨置於集英殿臣
嘗謂歷代天文之器制範頗多法亦小異至於激水運機其用則
一蓋天者運行不息水者注之不竭以不竭逐不息之運苟注挹
均調則參校旋轉之勢無有差忒也故張衡渾天云置密室中以
漏水轉之令司之者閉戶唱之以告靈臺之觀天者璇璣所加某
星始見某星已中某星今沒皆如符合唐開元中詔浮屠一行與
率府兵曹梁令瓚及諸術士更造鑄銅渾為之圓天之象具列
宿及周天度數注水激輪令其自轉一日一夜天轉一周又別置
二輪絡在天外綴以日月令得運行每天西轉一匝日東行一
度月行十二度有奇凡二十九轉而日月會三百六十五轉而日
行匝乃置木櫃以為地平令儀半在地上又立二木偶人於地平

之前置鐘鼓使木人自然撞擊以候辰刻命之曰水運渾天俯視圖既成置武成殿前以示百僚梁朝渾象以木為之其圓如丸徧體布二十八宿三家星（謂巫咸石申甘德三家星用以青黃赤三色別之）黃赤道及天河等別為候視璣以統其外上下半之以象地張思訓渾儀為樓數層高丈餘中有輪軸關戾激水以運輪又有直神搖鈴扣鐘擊鼓每一晝夜周而復始又有十二神各直一時時至則自執牌循環而出報隨刻數以定晝夜之長短至冬水凝運行遲澁則以水銀代之故無差舛又有日月星象皆取仰觀黍循法日月行度皆人力運新制成於自然尤為精妙然則據上所述張衡所謂渾象注

璇璣者謂渾儀候儀之法也置密室中者渾象也故葛洪云張平子陸公紀之徒（張衡字平子陸績字公紀）咸以為推步七曜之運以度歷象昏明之證候校以二八之氣考以刻漏之分占晷景之往來求形驗於事情莫密於渾象也開元水運俯視圓亦渾象也思訓準開元之法而上以蓋為紫宮旁為周天度而正東西轉出其新意也今則兼採諸家之說備存儀象之器共置一臺中臺有二隔渾儀置於上渾象置於下樞機輪軸隱於中鐘鼓時刻司辰運於輪上木閣五層設於前司辰擊鼓搖鈴執牌出沒於閣內以水激輪輪轉而儀象皆動此兼用諸家之法也渾儀則上候三辰之行度增黃

道為單環環中日見半體使望筒常指日日體常在筒竅中天西行一周日東移一度此出新意也渾象則列紫宮於北頂布中外官星二十八舍周天度黃赤道天河徧於天體此用王蕃及隋志所說也又以五色珠為日月五星貫以絲繩而曳以鉤環掛於南北軸使七曜運転遲疾留逆移徙令常在見行躔次之內晝夜隨天而旋使人於其旁驗星在之次與臺上渾儀相應以不差為準此用一行思訓所說而增損之也二器皆出一機以水激之不由人力故之前古與法雖未易知而器度筭數亦彷彿其遺象也又制刻漏四副一曰浮箭漏二曰稱漏皆與今太史及朝堂所用略

同三曰沈箭漏四曰不息漏并採用術人所製法式置於別室使掌壺卒常遞時刻與儀象牙相參考以合天星行度為正所以驗器數與天運不差則寒暑氣候自正也虞書稱在璇璣玉衡以齊七政蔡邕觀四七之中星以知節候之早晚考靈曜曰觀玉儀之游昏明主時乃命中星者也璇璣中而星未中為急急則日過其度月不及其宿璇璣未中而星中為舒舒則日不及其度月過其宿璇璣中而星中為調調則風雨時庶草蕃滋而五穀登萬事康由是言之觀璇璣者不獨視天時而布政令抑欲察災祥而省得失也易曰先天而天不違後天而奉天時此之謂也今依月令創為四

時中星圖以既窮之度附于卷後併以上備聖上南面之省覽此
儀象之大用也又上論渾天儀銅候儀渾天象三器不同古人之
說亦有所未盡陳由謂張衡所造蓋亦止在渾象七曜而何承天
莫辨儀象之異若但以一名之命則不能盡其妙用也今新製備
二器而通三用當總謂之渾天恭俟聖鑒以正其名也
光祿大夫守吏部尚書兼侍讀上護軍武功郡開國侯臣
蘇頌上

渾儀



右渾儀其制為輪三重一曰六合儀縱置於地渾中即天經也與地
渾相結其體不動二曰三辰儀置六合儀內三曰四游儀置三辰
儀內曰六合者象上下四方天地之體也曰天經者對地渾也又
名陽經環者以地渾為陰緯環對名也又植龍柱於渾下之四維
各繞以龍故名曰龍柱又置鰲雲於六合儀下承以雲氣雲下有
鰲趾名曰鰲雲又四龍柱下設十字水趺鑿溝通水道以平高下
故名曰水趺別設天常單環於六合儀內又設黃道雙環赤道單
環皆在三辰儀內東西相交隨天運轉以略列舍之行又為四象
環附三辰儀相結於天運環黃赤道兩交又為直距二縱置於四

游儀內北屬六合儀地渾之上以正北極出地之度南屬六合儀地渾之下以正南極入地之度此渾儀大形也直距內夾置望筒一筒之半設關軸附直距上使運轉低昂筒則四方之星度李淳風制六合儀三辰儀四游儀凡三重六合儀有金渾緯規其法創[illegible]持孔挺所增四游儀即游璿璣玉衡之遺法也本朝至道中韓顯符止用淳風六合四游儀移三辰儀黃赤道安於六合儀如孔挺之說逮皇祐中復從黃赤道附於三辰儀今則全用淳風三重之制而於三辰儀上設天運環以水運之水運之法始於漢張衡成於唐梁令瓚及僧一行復於本朝張思訓今又變于其制及天運環下以天柱關輪之類上動渾儀此出新製也

六合儀



右六合儀其制有天經有地渾有天常環天經即雙規也古謂之言外雙規李淳風始有六合之名梁令瓚名陽經雙規韓顯符名天經雙元豐後復曰陽經雙規地渾之制梁名單橫規李淳風名金渾緯規梁令瓚名陰緯單環又謂之金渾韓顯符名地盤平準皇祐周琮及元豐所制與今儀復曰陰緯單環天經則縱置地渾橫置天經環內面各布列周天度數半在地渾之上半在地渾之下地渾環面之上為天其下為地其南北與天經環相屬持之地渾面鑿渠為平水溝以正天地高下於環內布列八千四維十二辰位以象地天常環於天經地渾之內衡置之環側布列十有一時

與時初正之分列以成百刻之數

三辰儀



右三辰儀其制為雙環在陽經環內兩環面各布周天度數環內附帶黃道赤道今又新置四象環附於三辰儀相結於天運環黃赤道兩交及天運環近南極下與黃雲內牙軸相銜若叢雲中天柱動則天運環動以轉三辰儀輪古無此儀李淳風造黃道儀始置之僧一行梁令瓚因之周琮造渾儀與元豐儀及今儀皆循用之

四游儀



右四游儀舜典曰璿璣蔡曰雙環規李淳風曰四游儀梁令瓚曰璇樞雙環韓顯符曰游規周琮及元豐所制并今儀復曰四游儀其儀為雙環在三辰儀內南北各有杠夾於雙環各有軸以運杠環兩面各布周天度數直距在雙環內連環體屬於六合儀南北極之杠軸內直北上屬北極直南下屬南極置望筒於直距內其半以關軸夾持之使得運轉凡游儀東西運轉則望筒南北低昂故游儀運動無所不至而望筒隨游儀所至又置半筒以備測天運環相對之星以窺知天象

天經雙環



右天經雙環兩環各直徑七尺七寸七分闊五寸厚八分與地渾單環相結於子午正環兩面各列周天三百六十五度有畸其環半出地上半入地下於地單面自北扶天而上二十有五度少弱則北極出地之度也於地渾面自南為地而下三十有五度少弱則南極入地之度也環內當南北極為樞孔夾置杠軸軸本出環外各為臍二層以安三辰四游之杠內各為孔與直距內望筒之孔相通其北則北極出地之度自此而止也其南則南極入地之度自此而止也北極出地三十有五度少仍以週而運之凡七十度半弱其度常見於地上則為紫微垣其星凡三十有七其數

一百八十有三於四時常見不隱謂之上規南極入地三十五度少弱以規而還之凡七十度半弱其包常隱於地下其下規常隱而不見謂之下規上下規間一百二十有二度則黃道赤道內外宮也其星凡二百四十有六其數一千二百八十二則近日而隱遠日而見謂之中規

陰緯平環



右陰緯平環其直徑與闊如陽經環之度其厚二寸半其環與陽經南北子午相銜陽經當陰緯環上下之半故陰緯環面上為天下為地其上下各一百八十二度有時環面鑿為平水溝通流以為準其環旬向布列八卦維辰之位其如前說

天常單環



右天常單環其直徑六尺七寸七分闊九分厚五分其環入兩經陰緯環裏古人以爲設之之裏黃況之內與三辰儀重置居赤道之表環面列有十二時晝夜百刻以接時刻之度具如前設古無此環用淳等造三重儀始置之元豐儀用之今新儀循用

三辰儀雙環



右三辰儀雙環其直徑六尺四寸八分闊一寸八分厚七分兩面各列周天三百六十五度有畸內帶黃赤道下帶天運環在六合儀內轉動不息

赤道單環



右赤道單環其直徑六尺三寸闊九分厚六分其環結於三辰儀內横絡天腹謂之中徑以格黃道外則正與六合儀天常環相對環兆面分列二十八舍周天之度內列二十有四氣六十有四卦環外列七十有二候其四正日躔之宿舊據歷法推步今以新儀考測知日躔與今天道差違凡三度蓋元豐甲子歲冬之日至在赤道斗三度夏之日至在井九度少弱春分日在奎初度強秋分日在軫七度太弱定為四正之宿占測七政以叶天度

黃道雙環



右黃道雙環今所創也其直徑闊厚如赤道之數環面列周天之度與赤道同其環結于三辰儀與六合儀相疊以定南北極則黃道正在三辰儀南北其東西與赤道相結黃道出赤道外二十四度弱去極一百一十五度少弱為冬至黃道入赤道內二十四度弱去極六十七度半弱為夏至其東西與道相交去極各九十一度少弱為春秋二分冬夏二至春秋二分謂之四正太陰五星出入皆循其道合有度數古制雖有赤道後漢和帝時知赤道與天度頗有進退詔賈逵始置黃道李淳風一行梁令瓚韓道顯符周琮熙寧元豐儀又因之今新儀循用不改惟顯符從黃道附于六合

儀黄道舊單環外於北際見太陽體不全見以刖半日為法今以望筒於黄道雙環中全見日體若仰窺太陽隨天運轉則太陽適周於雙環之内

四象單環



右四象單環今之所創也附於三辰儀南北極末與南天運環黄赤道東西交相結今兩交無低墊之患隨天運環轉與天符合

天運單環



右天運單環亦今所創也附於三辰儀居黃道之南環外周設四百七十八牙距下與黃雲中天轂相銜其最下動機輪軸一牙上動天柱一牙距乃上轉天運環一距天運環轉則三辰儀與環俱動以象天運無窮惜三辰儀未有水運故無此環今創為之其四百七十八牙距做周周天度分之法

一本云其直徑四尺一寸四分半闊一寸九分厚七分附於三辰儀居黃道之南環外周設六百牙距 一云 其六百牙距即做周元豈新浮漏六百分之法

四游儀雙環



右四游儀雙環直徑六尺闊一寸七分兩旁外唇厚六分半內唇半隱起二分共厚八分半即舜典所謂璿璣也環內面布周天三百六十五度有畸其環外與六合三辰儀三重相疊其南北端兩樞內置直距直距中夾橫簫使南北低昂六合儀不動以定天體三辰儀則隨天運環動轉以追天運若四游儀則有時轉動亦追天運以橫簫窺測無所不至

望筒直距



右直距二望筒一直距各長五尺六寸六分闊一寸六分厚八分安四游儀中上屬北極下屬南極中施關軸以夾望筒望筒即舜典所謂玉衡也亦謂之横簫李淳風曰玉衡梁令瓚曰玉衡望筒韓顯符曰窺管周琮及元豊所制并今新儀復曰望筒中空長五尺七寸四分方一寸六分其兩首各為方榰方一寸七分方榰中各為圜孔孔徑七分半望其上孔通明曰體於直距中南北低昂旋運持正窺測七曜與列宿距度之遠近

龍柱

右四龍柱各高七尺七寸每柱植於十字水趺之末上屬陰緯環之四維而上下各以一龍繞之案舊法其勢端直映蔽四維今因元豊制作為曲抱之勢使人立其下便於窺測

鰲雲



右鰲雲其高四尺下植於水趺十字之心飾以雲氣上承六合儀令無墊墜承以鰲坐故曰鰲雲皆中空內應天柱上屬天運環古制無鰲雲後魏永興中詔造候部鐵儀於水平上以龜負雙規韓顯符不用元豐儀周日嚴等設鰲雲於水趺之上今新儀因之其應天柱上屬天運環乃新制也

水趺



右十字水趺後魏曰十字水中植立四龍柱李淳風曰準基未鎮鰲足以張四表梁令瓚曰水平槽韓顯符復曰十字水平元豐所制并今新儀復曰水趺其制各長一丈四寸高七寸五分闊八寸四分十字置之中鑿水道深一寸五分相通以行水視水平目高下正矣四末為水斗外各方一尺二寸高下與水趺等鑿方孔以以受四龍柱於水斗中其十字之會開天門方二寸自下撥軸運天柱由鰲雲中上屬六合儀雙環水趺舊無天門今創為之以度天經　撥天運環動三辰儀

紹聖新儀象法要卷中

渾象
渾象六合儀
渾象地櫃
渾象赤道牙
渾象紫微垣星圖
渾象東北方中外官星圖
渾象西南方中外官星圖
渾象北極星圖
渾象南極星圖
四時昏曉加臨中星圖
春分昏中星圖
春分曉中星圖
夏至昏中星圖
夏至曉中星圖
秋分昏中星圖
秋分曉中星圖
冬至昏中星圖
冬至曉中星圖

渾象



右渾象一座舊無今依隋制增損製之上列二十八宿周天度及紫微垣中外官星以渾規七政之運轉納於六合儀天經地渾內周以一木櫃載之其中貫以鐵軸軸南北出渾象外南長北短渾在本櫃而橫置之以象地天經與地渾相結繫置之半在地上半隱地下以象天其鐵軸北貫天經上杠中末與杠平出櫃外三十五度少弱以象北極出地南亦貫天經出下杠外入櫃內三十五度少弱以象南極入地就赤道為牙距四百七十八牙以銜天輪隨機輪之地轂以運動按隋志云渾天象者其制有機而無衡梁末秘府有以木為之其圓如丸其天數圍南北兩頭有軸遍體

布二十八宿三家星黄赤二道及天漢等別爲横規以抱其外高下半之（此謂北規抱渾以象地南軸頭入地注於南植植柱也以象高下謂之半）象南極北軸頭出於地上注於北植以象北極正東西運轉昭明中星既其應度分至氣節亦驗在不差而已今所製大平儀此並爲梁令瓚張思訓法別爲日月五星循繞三百六十五度隨天運轉又王蕃云渾象之法地當在天内其勢不便故反觀其形地爲外郭而已解者無異在内詭狀殊體而合於理可謂奇巧也今地渾亦有渾象外蓋出蕃法也

一副以象南極入地則設天運輪一側置渾象天牙轂當南樞軸之杙其軸爲牙距六百以銜天軸軸下接天輪隨機擒之地轂以運動

渾象六合儀



右渾象六合儀其制有天經雙規地渾單環雙規直徑五尺四寸七分厚八分縱置木櫃小單環直徑五尺四寸七分闊三寸七分厚一寸五分横置木柱面渾象納其中半隱地下半出地上以視南北極之高下

右渾象木地櫃一以安渾象及天經地渾内置天輪與赤道牙相接隨天輪運轉

右渾象赤道牙　渾體正圓如毬傍出天丈六分半上紙成牙三百六十五度有畸中外官星其名二百四十六其數一千二百八十一紫微垣在渾象北上規星其名三十七其數一百八十三二項總名二百八十三星數一千四百六十四東西繞以黃赤二道二十八舍相距於四方日月五星所行中貫以軸南北置之赤道牙與天輪相銜候天輪動則與渾象俱轉其天度星舍等及黃赤道日月五星所行周旋渾象各有名數距度次序標道

上本有天運輪無赤道牙

渾象赤道牙



渾象紫微垣星之圖



右紫微垣星凡一九三十七名一百八十二星布列渾象之北上規所以正天地之南北也北斗七星在垣內所以正四時也史志曰中宮北極五星鉤陳六星皆在紫微宮中北極北辰之最尊者也其紐星天之樞天運無窮三光迭耀而極星不移故曰居其所而衆星拱之舊說皆以紐星即天極在正北為天心不動今驗天亦晝夜運轉其不移處乃在天極之內一度有半故渾象杠軸正中置之不動以象天心也自天極外諸星皆隨渾象運轉以象列宿隨天左旋也天有二十八宿為十二次舍布列四方三百六十五度有奇而天極亦具其數古人所謂天形[illegible]天心為蓋之杠軸列舍如蓋之橑輻分布十二次舍之度[illegible]星近天者故[illegible]而密列舍布四方故闊而疎也北斗七星所謂璿璣玉衡以齊七政者也魁四星為璿璣杓三星為玉衡杓携龍角杓斗柄也龍角東方星携連之衡殷南斗衡斗中央殷中魁枕參首魁斗第一星為魁用昏建者杓杓斗第七星也夜半建者衡衡殷中亦建寅則夜半平旦建者魁斗為帝車運於中央臨制四海分陰陽建四時均五行移節度定諸紀皆繫於斗故楊子雲云日一南而萬物死謂夏至已後日漸南陸一尺南陸漸長為枯所以死之日一北而萬物生謂冬至已後日漸北陸一尺北道漸長萬物所以生也斗一北而萬物虛謂立冬後杓建亥自亥之後陰主於時萬物以斂故曰斗一南而萬物盈謂立夏已後斗杓建巳自巳之後萬物茂盛陽主於時故曰盈日之南也右行而左還斗[illegible]也左行而右還日月七星則西而南天右行謂春行西方歷七星而南秋行東方歷七星而北始南而北方故云右運從東方故云左還也斗則隨天而行春指東歷三辰而南秋指西方歷三辰而北始指東方故云左行也星從西方故云右行也由是言之天形無垠晝夜不息所以分節候達寒暑日異[illegible]建相推移於上而成歲於下也所以著於圖象者欲俯仰之參合先天而趣務也故人君南面聽天常視四七之中星察玉衡之杓建考日躔之南北順天時而布民政自唐虞以來莫不尚之然則渾象人居天外故俯視之星圖人在天裏故仰觀之二者相資蓋俯仰之異也其下中外官星亦倣此



渾象東北方中外宮星圖 其星名二百二十九 其數六百六十六



渾象西南方中外宮星圖 其星名一百一十七 其數六百一十五

右渾象中外官星圖二凡二百四十六名一千二百八十一星分布於四方周遍天體惟南極入地常隱不見紫微宮常見不隱餘星近日而伏遠日而出四時互見二十八宿為十二次三百六十五度有畸日月五星之所舍也史志曰東宮蒼龍謂角亢氐房心尾箕七宿其形如龍故曰蒼龍也南宮朱鳥謂東井輿鬼柳七星張翼軫七宿其形如鶉鳥在南方故曰朱鳥也西宮咸池白虎謂奎婁胃昴畢觜觿參為曰虎在西方故曰白虎也北方元武謂斗牽牛女虛危營室東壁有龜蛇體北方故曰元武也凡星皆隨天左旋日月五星常違天右轉昏曉燦是乎正寒暑於是乎生歲時於是乎成所以著於渾象者將以儀察而知七政行度之所在也著於圖者將以俯觀而合乎天象也星有三色所以別三家之異也出於石申者赤出於甘德者黑出於巫咸者黃紫宮諸星亦同出三家中外官與紫宮星總二百八十三名一千四百六十四星漢志所載紫宮及中外官星才百一十八名積數七百八十三星至晉武帝時太史令陳卓總三家所著星圖方具上數至今不改然則施於渾象者惟天極北斗二十八舍為占候之要其餘備載者所以具上象之全體也

渾象北極星圖



渾象南極星圖



右渾象北極南極星圖二古圖有圓縱二法圓圖視天極則親視南極則不及橫圖視列舍則親視兩極則踈何以言之夫天體正圓如兩蓋之相合南北兩極猶兩蓋之杠轂二十八宿猶蓋之弓橑周禮考工記蓋弓二十八以象星注云蓋弓橑也然則古之置蓋者亦取法於天赤道橫絡天腹如兩蓋之交處赤道之北為內郭如上覆蓋赤道之南為外郭如下仰蓋故列舍之數近兩轂則狹漸遠漸闊至交則極闊勢之然也亦猶列舍之度近兩極則狹漸遠漸闊至赤道則極闊也以圓圖視之則近北星頗合天形近南星度當漸狹則反闊矣以橫圖視之則去兩極星度皆闊失天形矣今傚天形為覆仰兩圓圖以蓋言之則星度並在蓋外皆以圓心為極自赤道而北為北極內官星圖赤道而南為南極外官星圖兩圖相合全體渾象則星宮闊狹之勢與天合以之占候則不失毫釐矣

四時昏曉加臨中星圖



右四時昏曉加臨中星圖聖人南面視四時之中所以候四時之早晚以布民政故堯命羲和歷象日月星辰敬授人時舜在璿璣玉衡以齊七政皆謂此也然則天以二十八宿分布四方凡三百六十五度有時爲日月五星之次舍日行一度爲一日周天爲一歲月行三十日一周天爲一月故日月一歲十二會爲四時時有孟仲季仲爲分至人君不能日夕察候星度故舉四時之中以驗之曰日中春分也曰日永夏至也曰宵中秋分也曰日短冬至也所謂星鳥者南方七爲朱鳥體春分則見於南方也所星火者東方之星七爲蒼龍體夏至則見於南方也所謂星虛者北方之星七爲元武體秋分則見於南方也所謂星昴者西方之星七爲白虎體冬至則見於南方也鄭康成云凡記昏明中星者爲人君南面而聽天下視時候以授民事也既舉四時之中又昏旦視四方列宿則孟季之月與周天之度數從可知也故歷代聖王尚之經史記云夏有小正周有時訓秦漢暨唐及本朝皆有月令所以順天時而督民務也詩曰定之方中作于楚宮又有三星在天在隅在戶之候春秋傳曰啓蟄而郊龍見而雩又曰凡土功水昏正而栽丈曰九焉日中而出日中而入此皆視列宿而行國政也然其上所記及唐虞之世日行次舍如此歷三代漢唐至今數千年日行漸遠故中星隨而轉移今以禮記月令洎唐及本朝所測合爲四昏旦中星圖所以上備宸庭觀覽順陰陽而頒政令也四神圖別出于後圖稱月令者是漢太初歷星度稱唐者是開元大衍歷星度稱今者是元豐所測見今星度也

春分昏中星圖

禮記月令弧中弧在輿鬼南　唐井宿二十三度中　今井宿二十一度中　日在奎宿二度少弱



春分曉中星圖

禮記月令建星中建星在斗上　唐斗二度中　今箕六度中　日在奎一度少弱



夏至昏中星圖

禮記月令亢中夏至昏亢案月令與呂氏春秋皆同疑所記誤唐氐一度中今亢六度中日在井九度中



夏至曉中星圖

禮記月令危中夏至曉亢亦疑所記誤與昏中同唐室宿一度中今危宿十四度中日在井九度半少弱



秋分昏中星圖

禮記月令昏牛中 唐斗宿十九度中 今斗宿十度中 日在軫五度半少弱



秋分曉中星圖

禮記月令觜觽中秋分曉觜觽亦疑所記誤與夏至同唐井宿五度中今參宿七度中日在軫五度半弱



冬至昏中星圖

禮記月令東壁中 唐壁二度中 今室十度中 日在斗三度



冬至曉中星圖

禮記月令軫中冬至軫中亦疑所記誤與夏至同唐角三度中今軫十六度中 日在箕十三度



紹聖新儀象法要卷下

水運儀象臺　運動儀象制度
木閣晝夜機輪　機輪軸
天輪　撥牙機輪
木閣第一層　晝時鐘鼓輪
木閣第二層　晝夜時初正司辰輪
木閣第三層　報刻司辰輪
木閣第四層五層　夜漏金鉦輪
夜漏司辰輪　漏箭輪退水壺
鐵樞軸　天梯
天衡　天池平水壺
天權　昇水上下輪
河車天河　儀象運水法
渾儀圭表

水運儀象臺



右水運儀象臺其制為臺四方而再重上狹下廣高下相地之宜四面以巨杉木為柱柱間各設廣椽周以板壁下布地栿上布板面內設胡梯再休隔上開南北向各一門隔下開二門各南向偶扉（列木云再休隔上開南西一門東西向各一門隔下開二門各南向）偶扉渾儀置上隔（陽面七）渾儀有三重曰六合儀曰三辰儀曰四遊儀其上以脫摘板屋覆之六合儀有陽經雙規渾天規緯規縱置之陰緯單規為地渾橫置之三辰儀南北天運環（天運環添都瓶）渾象連木地櫃置臺中隔渾象亦有天經雙規縱置木地櫃中半出地上半隱地下有地渾單規置地櫃面（為櫃之口渾）象等今倣隋書志所瓶臺內仰設晝夜機輪八重貫以機輪軸第一重曰天

輪在天束上與渾象赤道牙相接第一重曰晝時鐘鼓輪第三重
時刻鐘鼓輪第四層曰時初正司辰輪第五重曰報刻司辰輪第
六重曰夜漏金鉦輪（鉦今號曰鉦鐃是也）第七重曰夜漏更籌司辰輪最下
第八重曰夜漏箭輪外以五層半座木閣藏之層皆有門以見木
人出入第一層左搖鈴右扣鐘中擊鼓第二重報時初及時正第
三層報刻第四層擊夜漏金鉦第五層報夜漏更籌又於八輪之
北側設樞輪其輪以七十二輻為三十六洪束以三輞夾持受水
三十六壺轂中橫貫鐵樞軸一南北出軸南為地轂運撥地輪天
柱中動機輪動渾象上動渾儀（刻本云又於八輪之北側設樞輪以軌十八輻四十八洪束以三輞）
夫天受水四十八壺樞（以鐵樞軸一南北出軸南為地轂以天梯）
轂以運天梯上動渾儀（以地轂運撥牙距輪上動渾象）
又樞輪左設天池平水壺平水壺受天池水注入受水壺以激樞
輪受水壺水落入退水壺由壺下北竅引水入昇水下壺以昇水
下輪運水入昇水上壺上壺內昇水上輪及河車同轉上下輪運
水入天河天河復流入天池周而復始
一云三辰儀南北天運環渾象運木地櫃置臺中隔渾象云
云半隱地下上有地渾地平規置地柜內體外亦施天渾故消斷
敘
臺內仰設晝夜機輪

運動儀象制度



右運動儀象制度先設樞輪一機輪八以天柱西植於臺內樞樞
二東西橫安於天柱前後以載樞軸天梁二安於天柱樞梁上以
掛天閥左右天柱二南北置之南寄臺前東西柱北貫天柱東西
天梁之下梁之上機輪軸樞一立置臺中天束一以橫木二合為
一天束橫置之兩末安於東西天柱中天輪之下撥牙機之上中
竅以束機輪軸機輪軸下為地極橫置之兩不及東西兩地足中
地極之正中安鐵樞臼一以承機輪軸之鐏纂亦以鐵為之天池在
天柱之左平水壺在天池之南兩壺各以木架載之平水壺西接
天池水竅其底西樞輪受水壺西相次退水壺在樞輪之下上下

昇水軸壺并河車兩軸並寄樞梁天梁下横桄之中其晝夜八機輪同貫機輪軸撥牙軸所以轉七輪樞輪三十六三十六一云四十八雙輪共貫一轂受水壺三十六在樞輪外輻間所以受水運樞輪也天衡、置樞輪上天關、置衡腦天權一置衡尾天條一在衡之前天衡關舌一以天條綴之所以激發天衡謂也樞衡一在天衡關舌上腦為格叉格音閣以拒受水壺以樞權掛其末所以節受水壺之壓降也左右天鎖二分置東西天柱間梁上所以撓正樞輪也

木閣



右木閣五層在機輪前第一層時初木人左搖鈴刻至中擊鼓時正夜扣鐘第二層木人出報時初又時正第三層木人出報十二時中百刻第四層夜漏擊金鉦第五層分布木人出報夜漏箭

晝夜機輪



右晝夜機輪八重第一重曰天輪以撥渾儀之赤道牙第二重曰撥牙機輪上安牙距隨天柱中輪轉動以運上下七輪第三重曰時刻鍾鼓輪上安時初正百刻撥牙以擊鍾鼓鉦第四重曰時初正司辰輪上安時初十二司辰時正十二司辰第五重曰報刻司辰輪上安百刻司辰第六重曰夜漏金鉦輪上安撥牙以擊夜漏金鉦第七重曰夜漏更籌司辰輪上安日出入昏曉待旦更籌司辰第八重曰夜漏箭輪以載金鉦夜漏箭輪以上八重並貫於軸上以天束束之下以鐵樞臼承之外以前木閣五層以蔽之赤道牙一本云天運輪

機輪軸



右機輪軸一上貫於天束契之下納於地極上樞臼中以安晝夜八機輪

天輪



右天輪直徑三尺八寸上安六百牙距其轂貫於鐵軸在天東上與渾象天運輪相接於輪之南稍上銜天軸所以運天運輪天運輪斜對南極之中如側蓋之勢以天軸撥其牙距以運渾象故下機輪軸上豎天機輪動則天輪西轉天輪西轉則天軸東向反使天運輪與渾象同時西旋

撥牙機輪



右撥牙機輪隨天柱中輪轉動在晝時鍾鼓輪上直徑六尺七寸輪下施六百牙距以待中輪動作每中輪動機輪六牙距為一刻五十牙距為一時其六百牙為十二者元豐法也

一本云撥牙機輪與後樞輪相對在第三層閣內與樞刻司辰輪相疊直徑六尺七寸下施六百牙距以待樞輪動作每樞輪動機輪六牙距

木閣第一層



右木閣第一層開三門每時初即服緋司辰於左門內搖鈴刻至則服綠司辰中門內擊鼓時正即服紫司辰右門內扣鐘

晝夜時鐘鼓輪



右晝夜時鐘鼓輪在木閣第一層內徑六尺七寸上應百刻十二時每時初正及每刻與機輪六百牙距相應輪上置撥牙刻至則中擊鼓時初則左搖鈴時正則右扣鐘

木閣第二層



時初正

右木閣第二層正中開一門每於晝夜時初正司辰執牌時初則服緋司辰執牌出報時正則服紫司辰執牌出報

晝夜時初正輪



右晝夜時初正司辰輪在木閣第一層內直徑七尺三寸上置二十四司辰十二人報時初十二人報時正每至時正時初其司辰各執牌出見於中門之内

木閣第三層



右木閣第三層亦正中開一門每機輪轉則報刻司辰輪動刻至則服綠司辰執牌出報

報刻司辰輪



右報司辰輪在木閣第三層內直徑七尺三寸上布十二時之首刻分布報刻司辰除時初外以刻言之其司辰九十六人以應正衙鐘鼓樓報刻之節每刻則司辰各執牌出見

木閣第四五層



右木閣第四層第五層正中開一門每日入昏五更待旦曉日出木人皆擊金鉦以應第五層司辰第五層司辰出報夜漏等日入後二刻半爲昏昏爲初更每更有五籌更盡爲待旦十刻待旦十刻曉曉後二刻半爲日出其日入服緋司辰出報昏二刻半服綠司辰出報更有五籌初一籌服緋司辰出報更初餘四籌服綠司辰各出報凡五更總司辰二十五待旦十刻服綠司辰各出報曉二刻半服綠司辰出報日出服緋司辰出報司辰各執牌出見於中門之外

夜漏金鉦輪



右夜漏金鉦輪在第四層木閣內直徑六尺七寸其設夜漏更籌箭每籌施一撥牙每更籌至日出日入皆擊金鉦

夜漏司辰輪

右夜漏司辰輪在木閣第五層內直徑八尺與夜漏箭輪相疊每遇日出入昏曉及待旦刻并更籌各有司辰執牌出報於中門之內箭輪徑六尺七寸其輪與司辰輪相疊凡冬夏夜有長短不可以一法測之故一歲設六十一箭箭亦有長短故隨節氣更換則四時之晝夜各無差舛

樞輪



退水壺

右樞輪一退水壺一樞輪直徑一丈一尺以七十二輻本云九十一雙植於一轂爲三十六洪三十六一本云四十八束以三輞每洪夾持受水壺一總三十六壺每壺長一尺闊五寸深四寸於壺側置鐵撥牙以撥天衡右樞輪轂中貫以鐵樞軸南北出南以運儀象退水壺長一丈一尺四寸闊一尺九寸東高三尺二寸西高二尺五寸五分中高一尺五寸五分置樞輪下以接退水每受水一壺過水落入退水壺北下爲竅水由下竅北流入昇水下壺

右儀樞輪軸一長五尺九寸方壹寸八分貫於輪轂中南北出於又前後相隨去樞梁闊狹鑢為兩圓項於樞梁上為鐵仰月承之使運撥安南北轂以撥天柱下輪運轉天柱二本云前後相去處

右天柱長丈九尺五寸其法以木為之上帶蓋雲中為天柱上輪以動天轂中為天柱中輪以動機輪下為天柱下輪以待樞輪北轂動作一本為天柱天轂有天梯天托

右天轂二置於渾儀天經中以仰月承之後天轂以待天柱上輪動作前天轂與天運環相銜與後轂貫于一軸後轂動則前轂動前轂動則天運環動一本云仰月承之使運轉輪南安地轂以撥機輪牙距次安梯下轂以撥天梯



右天池壺一平水壺二平水壺上有準水箭自河車發水入天河以注天池壺天池壺受水有多少緊慢不均故以平水壺節之即注樞輪受水壺晝夜停勻時刻自正





右天衡一在樞軸之上中為鐵關軸於東天柱間橫桄上為駝峯植兩鐵頰以貫其軸常使轉動天權一掛於天衡尾天關一掛於縋天條一（即鐵鶴膝也）繳於權裏右貫（長短隨樞輪高下）天衡關舌一末為鐵關軸寄安於平水壺架南北桄上常使轉動首繳於天條舌動則關起左右天鎖各一末皆為關軸寄安左右天柱橫桄上東西相對以拒樞輪上輻樞衡樞權各一在天衡關舌上正中為關軸於平水壺南北橫桄上為兩頰以貫其軸常使運動首為格叉西距樞輪受水壺權隨於衡東隨水壺虛實低昂



右昇水上下輪各一直徑各五尺六寸上輪與河車同貫一軸末南寄天梁下橫桄上正中北寄臺腹木關橫桄上為枝手拄載之木閣高七尺一寸長七尺三寸闊二尺五寸上布板面板面南下立木柱二北臺桄上使人在其上運河車寄下輪軸末南寘桄梁下橫桄正中北亦為枝手拄載之柱寄於臺後地面竅上昇水上下壺各一上壺長七尺四寸闊九寸五分兩頭高二尺三寸中一尺五寸下壺長七尺二寸闊一尺六寸高二尺一寸並在二輪下以承輪天河在升水上輪之上以受上輪水下壺南為水竅與退水壺竅相通河車轉則昇水上下輪俱轉河車與上輪俱東向即下輪逆行西向昇水下輪發昇水下壺水上入昇

水上壺昇水上輪發昇水上壺水左入天河注入天池



右河車一天河一河車直徑四尺八寸天河長三尺八寸闊七寸高六寸東為木簇與天池白相接河車外出十六撥牙以撥昇水下輪十六距對撥牙北安手把八以運河車二輪轄外安戽斗二十四上輪十六下輪八河車轉則上下輪俱常戽斗運水入天河天河注水入天池

儀象運水法
水運之制始於下壺先實水於昇水下壺壺滿則撥河車入距河
車動則昇水上下輪俱動昇水下輪以入昇斗運水入昇水上壺
昇水上輪以十六昇斗運水入天河天河東流入天池天池水南
流渴烏注入平水壺由渴烏西注入樞輪受水壺受水壺之東與
鐵樞衡格又相對格又以距受水壺壺虛即格叉昇格所以能受
水水實即格叉不能勝壺故格叉落格叉落即壺側鐵撥擊關天
衡關右舁動天條天條動則天衡起發動天衡關左天鎖開即放
樞輪一輻過一輻過即樞軸動其樞輪所檢括者二一以運渾儀
二以動機輪所謂運渾儀者樞輪動則地轂動地轂動則天柱下
輪動天柱下輪動則天轂後輪動天轂後輪動則天轂前輪動天
轂前輪動則天運環動天運環動則三辰儀隨天運轉此樞輪之
所運渾儀也所謂動機輪者樞輪動則地轂動地轂動則天柱下
輪動天柱下輪動則天柱中輪動天柱中輪動則機輪動此樞輪
之所以動機輪也機輪所以檢括者四一以天輪運渾象二以動
鐘鼓輪三以動時初正司辰輪四以動報刻司辰輪所謂以天輪
運渾象者機輪動則天輪動天輪動則渾象隨天運轉此天輪所
以動渾象也所謂動鐘鼓輪者機輪動則晝時鐘鼓輪相隨而動
其輪上有牙距時初則撥左木人所執鈴竿以搖鈴時正則撥右
木人所執搥竿以扣鐘刻至則撥中木人所執椎以擊鼓三者並
在木閣第一層左右及中門內相應此機輪所以動鐘鼓輪也所
謂動時初正司辰輪者機輪動則晝夜時初正司辰輪相隨而動
時至則輪上木人執牌出木閣第二層門中以報初及正此機輪
所以動時初正司辰輪也所謂動報刻司辰者機輪動則報刻司
辰輪相隨而動刻至則輪上木人於木閣第三層門中出報此機
輪所以動報刻司辰輪也已上樞輪一輻過則左天鎖及天關開
左天鎖及天關開則一受水落入退水壺一壺落則關鎖再拒次
壺則激輪右回故以右天鎖拒之使不能西也每受水一壺過水
落入退水壺由下竅北流入昇水下壺再動河車水入上水壺周
而復始

渾儀圭表



右渾儀至表一舊法渾儀圭表各爲一器故渾象不能測晷景之長短土圭亦不能驗七政之行度今以二器合爲一法其制於渾儀下安圭座面與水趺中心相結各爲水溝道流以定平準圭之一丈三尺爲日行晷之南北於圭面分尺寸兩旁列二十四氣自圭面上與陰緯環面與直距望筒之半爲表之高表高八尺故自陰緯環面及望筒之半至赫雲之下亦高八尺常於午正以望筒指日令景透筒竅至圭面以竅心之景指面之尺寸爲準望筒所以上考時刻五星留逆徐疾日道昇降黄道去極遠近圭面所以不俟二十四氣晷景之長短二法相參則氣候與上象相合考正歷數免有差舛

渾象天運輪



右渾象天運輪一渾象體正圓如毬徑四尺五寸六分半上布周
天三百六十五度有畸中外官星其名二百四十六其數一千二
百八十一紫微垣在渾象北上規星其名三十七其數一百八十
三星數一千四百六十四東西繞以黃赤二道二十八舍相距於
四方日月五星所行中貫以梲軸南北置之軸末貫以天運輪下
以天軸及天轂牙距相銜候天輪動作則天運輪與渾象俱動以
天經舍等入黃赤道日月五星所行周旋渾象各有名數距度

鐵天軸



右鐵天軸一置於渾象木地櫃底軸兩頭安於臺中櫃上東西横
桄下在天輪天運輪中與兩輪牙相銜其天輪西向則天軸東
旋天軸東旋則天運輪西旋天運輪西旋則渾象隨輪而轉象天
西旋

天梯



右天梯長一丈九尺五寸其法以鐵括聯周匝上以龍雲中天梯上轂掛之下貫梔軸中天梯下轂每運一括則動天運環一距以轉三辰儀隨天運動

天托



右天托二龍雲內各高三尺七寸下為鐵叉水趺之心下闊濶三寸一分南托上四分之一為曲尺上間闊四寸五分為曲天轂夾天梯於曲尺間對開三竅置三軸以貫四轂上曰上天轂上與渾儀天運環相距次曰中天轂與上天轂相距下曰下天轂與中天轂相距下之次曰天梯上轂在下天轂之北並貫一軸以掛天梯